



H O L L E R  
D E M O R B  
I N T E R N

11826















Res 11826

IACOBI  
HOLLERII  
STEMPANI, MEDICI

PARISIENSIS CELE-  
berrimi, De morbis internis, Lib. II.

*Illustrati doctissimis eiusdem authoris scholiis & observationibus non  
antea excussis : deinde LUDOVICI DVRETI professoris  
Regij in eundem adversariis: & Anthony Valetij doctoris medi-  
ci exercitationibus luculentis.*

EIVSDEM HOLLERII

DE { Febribus. } Rhemediis. *scilicet* *romens* in Galeni  
{ Peste. } *D. E.* { libros.  
Materia Chirurgica.

*Quae omnia Ant. Valet. Medici opera auctiora &  
castigatiora in lucem prodeunt.*



PARISIIS,


Apud Carolum Macaeum, sub signo Pyramidis.

1577.

CVM PRIVILEGIO REGIS.



# Typographus candido<sup>2</sup> Lectori.

 V M multi medicinae studiosi  
pene quotidianis precibus à me  
contenderent, Lector optime: ut  
libros Hollerij medici doctissi-  
mi, quos frater meus annis superioribus in  
lucem emiserat, rursus typis elegantiori-  
bus excudendos curarem: id non antè mihi  
faciendum esse duxi, quam experitissimis  
medicis quid de his sentirent, intelligerem.  
Nam etsi me non latebat Hollerium sem-  
per apud doctos viros maximè in honore ex-  
titisse: multos de eius singulari eruditione  
tam honorifice iudicasse, ut nihil ab eo pro-  
ficisci posse ducerent, quod non esset dili-  
genter elaboratum: tamen cum antè vita  
discesserit, quàm his postremam manum  
imponere potuerit, existimabam mihi &  
reipublicæ melius consultum iri, si prius-



quam hos libros rursus in lucem ederem,  
clarissimorum medicorum incorruptum de  
his iudicium perspectum haberem. Itaque  
aliquot summos medicos qui doctrina &  
usu valerent, obnixè rogavi: ut si quid tem-  
poris à quotidiana vitæ occupatione liberi  
haberent, id in his libris legendis & studio-  
se examinandis collocarent, ac quid de his  
sentirent ingenue mihi aperirent. Qui his  
accurate perlectis & examinatis, sanctis-  
sime affirmarunt: nihil ab Hollerio in his  
libris scriptum esse, quod veterum medico-  
rum præceptionibus non sit consentaneum,  
& ad morbos depellendos accommodatissi-  
mum. Continent enim utiles, veras, & sibi  
mutuo consentientes, de morborum inter-  
norum & externorum depulsione, præ-  
ceptiones: quas summus medendi artifex,  
quotidiana experientia qua cæteros medi-  
cos superabat, verissimas esse comprobavit.  
Neque enim rudis ac tyro ad scribendum  
se contulit (quod plerique temere facere con-

sueuerunt) sed cum multos annos in uni-  
 uersa medicina cum magna nominis com-  
 mendatione docenda, & fœliciter summo  
 agrorum commodo exercenda, consumpsis-  
 set: longo rerum usu edoctus, animum ad-  
 scribendum appulit. Intelligebat enim vir  
 sapientissimus, his solis de arte medica sine  
 reprehensione scribere licere, qui in ea &  
 docenda, & factitanda, diu multúmque e-  
 laborassent: qualem optimi quique medici  
 Hollerium fuisse agnoscunt, qui generalem  
 medendi prudentiam, cum singulari, quoad  
 vixit, diligenter maxima agrorum leua-  
 tione coniunxit, eoque nomine inter ceteros,  
 medendi laude claruit, & gloriam immor-  
 talem sibi comparauit. Ex quo facilè intel-  
 ligitur quanta utilitas ex his libris ad stu-  
 diosos medicinæ sit peruentura, qua profe-  
 cto caruissent, nisi vir clarissimus Andreas  
 Pastoreus eius gener & senator sapientissi-  
 mus, hos libros propter immaturam autho-  
 ris mortem in tenebris iacentes, in lucem

protulisset : unde merito maxima gratia  
clarissimo viro habenda est, & cæteris do-  
ctis viris, qui hoc opus quod nondum po-  
stremam manum acceperat, emendarunt,  
& suo splendori restituerunt. In quo-  
rum numero primas partes obtinet Ia-  
cotius medicus, cuius labore & studio  
prior editio à fratre meo suscepta, auctior  
& castigatior in lucem prodiit. Neque  
vero minor laus debetur Ioanni Valetio  
doctori medico peritissimo, qui hos libros  
non solum à mendis quibus adhuc scatebant  
vindicauit, verumetiam doctissimis scho-  
liis illustravit, & locupletavit : cui ego me  
hoc nomine plurimum debere profiteor.

Quidquid enim bene & fæliciter in hac  
tertia editione à me gestum est, id eius in-  
dustrie & diligentie tribui debet. Cuius  
propensam in te voluntatem si aliqua gra-  
ti animi significatione recognoueris, cum  
tui studiosissimum ad reliqua eiusdem au-  
thoris opera pari studio illustranda inflam-

mabis, Est enim mihi in animo doctissimas  
eiusdem Hollerij commentationes, quas  
in aphorismos Hipocratis & cocas prædi-  
ctiones scripsit, propediem in lucem emit-  
tere, in quibus emendandis suam ope-  
ram est mihi pollicitus si suos la-  
bores tibi non ingratos ex-  
titisse intellexerit.

V A L E.

# ΑΝΤΟΝΙΟΣ Ο ΒΑΛΗΤΙΟΣ

εἰς φρονιμώτατον ὄλληρον.

Ἰπποκράτης μὲν ἄκρῳ σωτάρματα κρυπτὰ κατέπειπε  
Γαλήνης, βίβλοις αὐτὰρ ἀπειρεσίαις.  
Λαμπρότερον δὲ κλέος κατέχεις Ὀλλήρ ἐπίθιμων,  
αὐτὸς ἐπαγγέλλεις, ὅσα γράφ' ἀμφότερος.

*Idem ab eodem latinitate donatum.*

*Mirandi Hippocratis decuit referasse Galenum  
Arcana, innumeris penè voluminibus.  
Spectate Holleri, maius decus arte capessis  
Qui presse quicquid scripsit uterque refers.*


## Εἰς Δοα. ΔΟΥΡΕΤΟΝ ΤΩΝ

ἱατρῶν λαμπρότατον.

Πάνθ' ἔθεν Ἰπποκράτης ἀρρήτος δόγματ' ἐδίωκε.  
Κ' ὁδεῖς ἐνδηλῶς μὲν ἔκκεν ὀφιογόνοις.  
Τόσα δὴ (ὥς ἀσαφῆ) τὸ πάρος μυθήρια κείβ  
Cί τε μεταξὺ βρόβι σώματα ἀσθενέες.  
ΔΟΥΡΕΤΟΣ ἀφ' ἑτυχ' ἐν σωτέος καὶ δῖος ἱγῆρ,  
δόγματ' Ἰπποκράτης δῆλ' ἄτ' ἀδύλα πόρων.  
Ὅ' ὤκεν αἰδίον παρὰ πᾶσι πορίζετο δόξαν.  
Οὐ πέλετ' Ἰπποκράτης, νῦν πέλετ' Ἰπποκράτης.  
*Iacob. Basilus Labrousquius.*

ODE DE LOYS DE HVGVES,<sup>5</sup>

SEIGNEVR DV MONESTIER  
de Gap. en Daulphiné, à Ant. Válet,  
Docteur en Medecine.

 I Phebus Roy de la lyre  
M'echauffoit de sa fureur,  
En daignant faire reluire.  
son feu diuin sur mon cœur:  
Et si ses sœurs immortelles

De leurs petites mammelles  
Tirans les bouts precieux,  
Auoyent ma leure ensucrée  
De ceste liqueur sacrée  
Qui met l'homme au rang des dieux  
Iusques au Ciel plain de gloire  
Valet i' enuoyroy ton nom,  
Et semeroy ta memoire  
Depuis le dernier sablon  
Du riuage de l'Espaigne,  
Où le soleil au soir baigne  
Ses moreaux, las du chemin,  
Iusques à la mer perleuse  
De l'Indie plantureuse  
D'où il se leue au matin.

Après ie viendroy à bruire  
Sur les filets abbatus  
Dessus le fust de ma lyre,  
Tes plus louables vertus:  
Comme le ciel t'a fait naistre  
Icy bas pour un iour estre

*Des Medecins vne fleur.  
Et le solas de tant d'hommes  
Qui en ce siecle, où nous sommes,  
Vivent presséz de douleur.*

*Comme Apollon t'empoinçonne  
De son eguillon iumeau,  
Et d'une double couronne  
Ceint le tour de ton cerueau:  
Pour la recompense digne  
D'accoupler la Medecine  
Au nombre inegal des vers,  
Qui en mille & mille sortes  
Portent sur leurs ailes fortes  
Ton renom par l'univers.*

*Je diroy encores comme  
Mespriant les courtisans,  
Tu as choisy vn pauvre homme  
De l'orde des Mandians,  
Pour le secours de ta peine,  
Ton solas, & ton Mecene,  
Esperant plus mille fois  
De sa petite largesse,  
Que de toute la richesse  
De tous noz Princes François.*

*Et que de ceste esperance  
Tu net'es trouué deceu,  
Puis qu'ainsi comme ie pense,  
Tu t'es ia bien aperceu.  
Comme sa main secourable,  
Sa main douce & charitable,  
Sçait aider aux bonseffris,  
Qui peuuent maugré l'enuie,*

*Aux mors redonner la vie  
A l'aide de leurs escrits.*

*Et comme en vn champ fertile  
Le laboureur haletant,  
D'une main prompte & subtile  
Va deçà de là iettant  
La graine de sa semence,  
Qui venant en accroissance  
Grossit en espais tuyaux:  
Puis usurant à sa peine,  
Voit apres sa grange pleine  
De gerbes de bleds nouveaux:*

*Ainsi ce Pere honorable,  
Mon oncle & ton Mecenas,  
T'eslargissant secourable  
Ses faueurs, dont tu fais cas,  
A semé en terre bonne,  
Qui usurant or luy donne  
De ses fruiets trop plus qu'assez:  
Desquels luy, & moy encores,  
Nous nous en resentons ores  
Plus que bien recompensez.*

*Mais, Valet, puisque la Muse,  
Qui n'eut onc de moy soucy,  
Ceste faueur me refuse,  
Il faut demeurer icy,  
Et tout prendre en patience:  
Car si ma foible puissance  
Ne peut atteindre si haut,  
Ma volonté tant honeste,  
Et mon audace modeste  
Supleront a ce defect.*



EIVSDEM  
IN IACOBI HOLLERII ME-  
dici Clarissimi interitum  
Αὐτοσχέδιος Υ'ποτύποσις

*Faucibus ex Erebi dum languida corpora summus  
Hollerius reuocat, moribundis tradere vitam  
Instituit reducem, fatorum lege soluta  
Mortis de imperio genij candore triumphat:  
Ecce repente struit querimonia perfida diras  
Insidias, Stygiū quas liuor ducit ab antris.*

*Pristina fatales ubi nānque labascere iura  
Senserunt Parca, querula pia numina voce  
(Plantibus ut fictis fuit ultio tetra gerenda)  
Conuenere simul, verbis propè talibus orsa.*

*Dij maris & terræ, cali mundi que Toparchæ,  
Qui seculi rerūque vices statuistis ab omni  
Tempore perpetuo firmatas ordine, nulla  
Ætate occiduas, nostris assistite votis:  
Nec sinite ut iuris sit quæ pars irrita nostri.  
Nos hominum vitæ sorti que præesse caducæ  
Quis vetet? Hollerium mandatum frangere vestrum  
An deceat? licet hic pertractet grauiter artes,  
Quas sibi adoptiuo legauit munere Apollo?  
Vos meminisse iuuat (Superi) quæ fœdere fixo  
Sanxistis: quæ non tempestas turbida quæuis,  
Quæ non heroës, quæ non valuere Gigantes  
Rumpere terrificis conatibus, impete vasto.*

*Tum Iouelis agitur sub iudice: Iuppiter alta  
Quas Parca lachrymas fuderunt, mente recondit.  
At tribus è Parcis Lachesis crudelior una*

*Acrius instabat, donec moderator olympi  
 Imperat Hollerium accersi, æthereâmq; vocata  
 Consulat ut causâ, confestim accedere ad aulam,  
 Hinc pius Hollerius sacrosancta capessere diuum  
 Iussa sibi fas esse putat, nec cedere terris  
 Huic graue, sed nobis funestum (proh dolor) istud,  
 In cælum rapitur, stat supplex ante tribunal  
 Ille Panumphæi Iouis: & plaudentibus astris  
 Excipitur. Mox censor adest æquissimus vlt: ò  
 Iupiter: ancipitem qui sic componere litem  
 Aggreditur. Quid [aut] moliris liuida Parca?  
 Iuris habere putes si quicquam in mente decorum  
 Hollerium nostrum, demens te cura remordet.  
 Mortali est fato maior, qui rite merendo  
 Deuinxit cunctos: quem clara trophæa sequuntur,  
 Præmia quandoquidem virtutis nesci a lethi.  
 Tu procul hinc abeas scelerata, adsitq; superstes  
 Hollerius, volo quem vita meliore potiri.*

*Tandem syderei videt ut splendoris honore  
 Se fulgere, putat satius spectare superna,  
 Humanis iterum quàm se submittere rebus.*

AD IACOBVM HOLLE-  
RIVM MEDICVM CLARIS-  
SIMVM HENRICI MO-

nantholij Rhemi  
Camen.



*I*upiter aeternum terris infensus habebat,  
(Nescio quid, si quid mouerit ante Io-  
uem)

Δεῖνα Φέρον, vasto quod nos tremefecit  
hiatu,

*N*ostra tot impendens vas super ora dies.

*H*inc febres, hinc pestifero condita veneno,

*H*inc Acherontigenis mens agitata deis:

*H*inc ἡμίτρεταῖο hinc nigro carbunculus igne,

*H*inc veneris culta plena madore lues:

*H*inc polypi, hinc Elephas, atque hinc Apoplexia, longis

*H*inc crescens pedibus rumina Cancer edit:

*H*inc vertigo, Caros, Catoche, Paralyssis, & omne,

*Q*uod tam homines torsit tempora longa, malum.

*Q*uis tantum in superos potuit committere crimen?

*I*n miseros homines sic stimulare Iouem?

*H*ic, quisquis fuit, ignotus sine nomine pendit,

*Q*uas merito pœnas Rex Acherontis habet.

*S*ed torquendo homini totus non sufficit orcus,

*T*ormina tam dirum nulla piare scelus:

*I*lle licet pœnas referat quas Tantalus, aut quas

*S*isiphus, aut Tityi tempus in omne iecur

*P*ropter quem meruere homines tot adire ruinas,

*T*ortâque tot iactis membra videre malis,

paterentur adhuc, passuri plura, nisi quis

Doctus Apollonia sorte tulisset opem.

hic miseros tandem (seu quis sis ipse deorum,

Siue Holleri hominum nunc miseratus ades)

loribus electis, cocta radice, suavi

Exhibito potu subtrahis omne malum.

as Iouis exhauris totum: vel si qua profundo

Im mittantur adhuc, irrita tela facis.

ergo tuum ut nomen iam sæcula nulla latebit

(Si Deus equalis fāsque nefāsque videt)

ic tibi non quicquid cælos extra eminet omnes,

Sufficiet meritis reddere iusta tuis.

AD ILLVSTRISSIMVM  
NOBILISSIMVMQVE VIRVM

D.Ioannem Faietanum, D. d'Aute-  
feuille, Christopho-  
rus Burgenfis.

*Te tua nobilitas generis, patriũque tuorum  
Iam iam nobilitant stemmata clara satis.  
Ad summos effert præstantia mentis honores,  
Et tua te virtus inclÿta, ad astra vehit.  
Hinc tibi me dedam quæ sit mihi causa requirĩs?  
Si virtus animos imperiosa rapit?*

AD DESIDERIVM IACO-  
TIVM MEDICVM

clarissimum, Gabriel  
Deuagneus Me-  
dicus.

*Quem duo suscipiunt concordi Marte laborem  
Mutua seruata perficit arte manus.  
Burgenfi tua dum coniungis scripta, Iacoti,  
Clarior à docto prodit utroque labor.  
Sic fera quod nunquam valeat delere vetustas  
Vnica seruabit nomen utrunque dies.  
Quòd quoque tam iunctis, Iacoti proficis orbi  
Scriptis, se iactet nunc Arelata tuis.*



ANTO. VALETIVS  
LECTORI.



VM ea munera, quibus Deus Optimus Maximus humanum genus amplissimè auctum, & cohonestatum liberalissimè voluit, mecum ipse considero, Candide Lector, eam in sententiam facilè ad-

ducor, ut maius nullum, nullumue honorificentius reperiri posse existimem, quàm præclarissimam artiũ omnium Medicinam, quæ publicæ salutis temonem dirigit, & communi mortalium vitæ ad summum splendorem consecrandum viam munit. Quod prudens imprimis antiquitas optimè edocta, meliora semper ingenia ad eam artem ab exiguis & rudibus profectam initiis, mirificis doctrinæ atque experientiæ incrementis locu-

pletandam tam auspicate transtulit ac excitauit, vt admirationis materiã magis, quam imitationis spem, posteris visa sit reliquisse. Primis nanque temporibus cùm abdita illa Deorum doctrina ( siue ex adscriptis templo Æsculapij monumentis petita esset, seu ab hominum ægrotantes viciatim exportatos inuisentium congressibus accepta atque tradita) sola obseruatione constaret, & collectis tantùm affectuum similitudine remediis inniteretur, proximum sanè fuerat, vt nocte densissima ingruente, in qua iam adúsque Peloponnesiacum Græciæ bellum trecentesimo Romanæ Urbis anno gestum, miserè ac infelicitè delituerat, penitus interempta iaceret, ni diuinissimus ex Æsculapidum familia Hippocrates eam è tenebris in lucem reuocasset, & veluti nouo quodam partu genuisset, per omnia membra aluisset, eduxisset, omni denique ornatu insignem & plausibilem reddidisset. Ab Hippocrate quanquam fama & ætate secundi fuerunt quamplurimi, Diocles Carystius, Praxagoras Cous, Chrysippus, Herophilus, Erasistratus Chius, Serapion Alexandrinus, Apollonius, Glaucias, Heraclides, Acron, Asclepiades, Themison, Dioscorides, Antonius Musa, Artorius, Euphorbius, Valgius, Cassius

Felix, Cornelius Celsus, qui pari studio inflammatis Medicas artes propagare, exornareque enixissimè contenderint, tandem tamen vnus emerfit ac emicuit Galenus, qui superiores Medicos vt & ingenij magnitudine, & doctrina, & diligentia infinitis propemodum parasangis superauit, ita salutaris illius boni instaurator ac illustrator peculiari nomine meruerit appellari. Ea fermè tempestate, aut certè continuò pòst, alios atque alios extulit Græcia, qui grata mente & Viri tanti opera vterentur, & lätos vberésque fructus ad publicos vsus redundaturos multa scriptorum editione premerent: quam de præstanti consilio suo spem & expectationem fausto & prospero successu confirmarunt. Græcos æmulaturi mox prodierunt Arabes, qui Græciam concinnitatem & elegantiam quo stylo potuerunt, horrido nimirum & inculto, in suam linguam transfuderunt: indèque factum, vt Barbaris illis sexagenariis, qui primitus in quibúsque disciplinis, tanquam in latifundiis prædiis que suis, regnabant non impudenter minùs, quàm superciliosè, Medicinæ sermone suo, rudi quamuis & incompto, euulgandæ cupiditas incesserit admiranda. Verum enim verò instaurata plurima



post secula Latina linguâ , & visi sunt olim è nostris non pauci ingenium suum ad priscæ normam vetustatis rectè , præclarèque exigere, & eandem etiam perbellè interpolare : & hoc nostro tempore cultiorum disciplina- rum feraci non desunt , qui cum antiquis certent : vt effœta non vsque adeò natura hac conspicitur ætate, quin paria illis ingenia proferat , quæ æquè fortasse sint de posteris promeritura. Quod vt verum & expressum, non item adumbratum , quiuis intelligat, spectet, quæso , quot quantæque Medicinæ numina hac vna è nostra Parisiensi Academia omnium longè florentissima , celebratissimæque, exierint , quæ suo iampridem fulgore Orbi innotuerunt vniuerso : protinus meherculè viderit secundos nobis illuxisse Hippocrates , Dioscorides , Galenos , summos medendi magistros. Etenim vt Rüellium, Syluium , Fernclium, omnium suæ tempestatis Medicorum Principes, omittam, vnus mihi Hollerius, velut Οὐλῖος alter, id est salutifer & pæanicus Apollo, omnium instar fuerit , qui nota de meliore toti veniat posteritati commendandus. Hunc siquidem, si quem vnquam alium, nodosum illum baculum, quem Æsculapij simulachro ad artis si-

gnandam difficultatem Veteres appofuerunt, explicitum habuiffe, & fubiectum Draconem peruigilis ac oculatæ mentis aciei in Medico maximè defiderandæ hieroglyphicum, cum multiuga illa fuperiorum rerum ac inferiorû cognitio, quâ feſe cunctis ad miraculum fufpiciendum exhibuit, tum verò expedita in Medicina factitanda dexteritas, quæ de vulgari, fupinâque oſcitâtia ſatis ſupérque triumphauit, eſt cumulatiffimè teſtata. Nam cum Medicam facultatem doct̃inarum omnium confortio ac circulo perfectâ eſſe didiciſſet, quantum licuit per admirabiles ingenij fui dotes, orbem illum multiplicem, quem ἐνκυκλοπαίδειαν vocant, adæquauit: nec deſtitit priùs, quam ſummum in Virum euafirit, & (quod eſt in Medicina laudatiſſimum) omnia nôrit quæ in Proteo, & quidem magna illa & honorifica, Poëta laudauit,

*Quæ ſint, quæ fuerint, quæ mox ventura trahantur.*  
Vt autem ad primorum Medicorum conſuetudinem laudabilem ſe totum primarius ille Medicus componeret ac compararet, quicquid à praxi ſupererat ocij, id ſtudio captus indefatigabili modò ſcriptionibus, modò prælectionibus committebat: vnde ſibi laudis tantum quæreret, vt quo donatus quondam fuit

Hippocrates elogio , eo meritò debuerit ubi-  
uis gentium celebrari.

Ὁ Μένειος Φάος ἰὼ μερόπων, καὶ πῶετο λαῶν  
Ἐθνεα, καὶ νεκρῶν ἦν πάντις ἐν αἰδῇ.

Id est, ut ego verito,

*Lex hominum Hollerij & populos tutatus, in Orco  
Fecit ut umbrarum copia rara foret.*

Huic rei fidem faciunt locupletissimam tum  
hæ de medendis morbis eruditissimæ elucu-  
brationes, tum quæ nondum in publicum ve-  
nerunt paraphrastica in Aphorismos Hippo-  
cratis, Prognostica, Epidemia & Coacas præ-  
notiones Commentaria, quibus nihil quic-  
quam esse in eo genere perfectius deierare au-  
sim : imò non dubitem quin quod de Pericle  
scriptum est, aculeos in doctissimorum homi-  
num animis, vel leuiter gustata relictura sint.  
Atque utinam Hollerij exemplo moniti pri-  
mi ordinis Doctores iisdem vestigiis insiste-  
rent, & quantum ab ea arte, quam ad fastum  
& gloriam profitentur multi, luminis & de-  
côris mutuuntur, tantum in eandem confer-  
re ornamentis studerent, vel saltem studio-  
rum conatus, ex quorum insectatione per-  
uersè nomen aucupantur, æquiùs consule-  
rent, ac interpretarentur. Meliùs meo iudicio,  
optimi quique Medici audirent, nec ita passim

apud multos contemptui haberentur : nec  
stulta quadam animorum cæcitate boni &  
mali, docti & indocti, eadem forte censerentur.  
Verùm, prohi Deum atque hominum fidem,  
iniquos videas hoc tempore permultos,  
quorum impiis technis ars pulcherrima,  
saluberrima, & sacratissima mirum in modum  
proscinditur & conculcatur. Alij probis vi-  
ris insultant, quò suas nugas liberiùs insinuent  
& iactent: alij iuniores medicos, tanquam in-  
expertos, crassæ imperitiæ apud vulgus crimi-  
nantur, quòd absolutos (vti aiunt) consumma-  
tòsque ac perfectos Medicos non nisi ætate  
confectos esse oporteat. Quinetiam quod æ-  
griùs ferendum, & mihi, meisque coætaneis  
magis ominosum videtur, insuper dictitant  
boni illi Patres sese in refarciendis pragma-  
teix nostræ vitiis frequentius occupari, si for-  
tè ad consilium adhibiti, in ægri, aut affiden-  
tium aures quicquam potuerint insusurrare,  
quod palam dicere salua pace nequeant. At  
certè quotidie videre est Medicos, quibus &  
intonsa sit velut Æsculapio barba, quibùsque  
retorto.

*Pæonium in morem senior sit forma capillo,  
communes istos in errores prolabi, & iuue-  
num plerunque solertia dexteriore leuari.*

Hinc intereà accidit, vt & imperitam plebeculam iamiam nocentissima inuaserit opinio & occasio suspicandi nullam artem esse Medicinam, quæ tam dissidentes, & velut in trāsuerfum actos, sui ferat professores. Hac quoque data porta in tanta rei medicæ luce irruūt in communem mortalium omnium perniciem, internecionemque impostores Empirici, & artem optimam malè eментiti, posthabitis Academicis legibus, abrogatis Facultatum privilegiis, neglectis optimorum Principum decretis, de humano corio miserabiliter ludunt. Sicque magno applausu ac concursu suas quisque ineptias promouet: alius editis vernacula lingua centonibus & experimentis quibú suis etiam aniculis demētatis & idiotis probatis: alius antimonio præparato: alius nescio qua theriaca noua ex intimis magni cuiusdam Medici secretis eruta: alius denique Alchymisticis fumis, quos magno studio venditat. Hinc fallaces mille vagatores experimenta, tanquam certa auxilia, sub pignore capitis proclamant, vel pro rostris etiam in vulgum edicunt: vitam pollicentes, mortem vendentes: idque, quod apud Christianos maxime dolendum, inultè. Nostrorum sanè permagni, interesset Medicorum istas circumfora-

neorum pestes artem nobilissimam turpiter  
prophanantium longissimè arcere, non mu-  
tuas altercationes & odia, quæ viros ἀνύμο-  
νας & irreprehensibiles (quales vbique Medi-  
cos Homerus appellauit) exercere. Sed de his-  
ce viderit Magistratus, ne longiùs ista perua-  
getur calamitas nimium ac nimium in viros  
doctos iniuriosa. Quod ad meum attinet in-  
stitutum, Candidissime Lector, tanti apud me  
est rem Medicam iuuandi studium, vt censo-  
riam quamuis subeam animaduersionem, si  
modò quippiam tibi vsui & commodo futu-  
rum moliri valeam ac meditari. Et quanquam  
in me nullam agnosco industriam, quæ im-  
mensam iudiciorum varietatem atque intem-  
perantiam expleat, tamen & vtile aliquid ag-  
gredi præclarum semper, & honestum esse iu-  
dico, nihil hominum maleuolentia suffuso-  
rum iniquissimum iudicium, occæcatam opi-  
nionem, elatam ac superbam despicientiam  
moratus. Itaque cùm quatuor abhinc annis  
Hollerij Medici clarissimi praxim secundò in  
lucem dedissem, eamque plagiaris & furtiuis  
è manibus Caspari Vvolphij Germani tem-  
pestiuè satis extorsissem, de tertia editione co-  
gitare cœpi, & quod antè non licuerat mihi,  
ex sine manuscripti exemplaris cuius copiam

ANDRAEAS PASTOREVS Hollerij dignissimus gener, & Regius in curia Parisiensi Senator, pro ea, qua literatos viros vir ipse omnium literatissimus & doctissimus completitur, humanitate, mihi fecerat, omnia emendare. Et ut meæ tandem apud omnes constaret diligētiae fides, quæ excusationis errorum viam faciliùs inueniret & exoraret, in Chironiis aliquot & Telephiis vlceribus detergendis, quæ pro deploratis habueram, nisi Autor ipse, medicus arte summus, præsentissima præsidia suggessisset, aliquantum operæ posui. Næuos verò omnes si minùs, vti debui, castigavi, optima spes est fore, ut boni omnes excusent, nec tamen ob id impensum laborem sibi sinant ingratum esse. Neque enim occupatissimo homini, & asperiore cum fato perpetuam luctam agenti vacat aliquid omnibus numeris ac partibus absolutum excogitare. Accuratissima autem, elaboratissima, & Hippocratis supellectile refertissima priorem in librum Scholia, quæ Desiderij Iacotij Vandoperani Medici Arclatenensis nomine hætenus sunt circumlata, quia αὐτοχρημῶς in Hollerij codicibus enotata reperi, nefas putavi non ea legitimo Autori suo restituere. Nihil tamen Iacotij sedulitati detractum velim, qui aliena qui-

dem, sed non sua, communi bono gratulaturus publicârit. Ludouici Duretî Regij Medici & Professoris celeberrimi Aduersaria, è penitissimis Iatricæ artis mysteriis, quæ de communi Medicorum Deo Apolline plus quàm alius hausit, deprompta, denuò adiciere libuit, quæ Zoilis etiam extremis vnguiculis perprurientibus plausibiliter accepta, illum impellere debent ad proferēdas in publicum, quas domi tam longum tempus continet, in Hippocratem Commentationes antiquis & posteris palmam facilè prærepturas. Ego verò qui in alieno elaboro, nec vllius laudis particeps fio, nec fieri quidem cupio: nam hæc ferè talis est apud plurimos opera, vt omnem quem pro laboribus meretur, laudis fructum intercipiat: quasi ei, qui derelictum cuiuspiam ac sentibus occupatum agrum suo labore expurgârit, colueritque, enatarum inde frugum pars nulla debeatur. Quò proptereà libentiùs hac sum deinceps opera & curiositate superfessurus. Interim verò tantulas nostras Exercitationes raptim scriptas & exaratas damus: non quæ sint eiusmodi, vt Hollerij scripta venustiora, vel locupletiora faciant, sed quæ tamen ad accommodatam profligandis morbis reme-



diorum fyluam comparandam quippiam adiumenti sint allaturæ. Obtendat quascunque voluerit vocolas maleuolus: nihil esse nouum dicat: nihil allatum quod non sit scriptum prius: denique & mediocris esse hominis hinc illinc excerptis cõmunibus locis libros quantumuis exiguos ampliare: huic etsi quid respondeam in promptu sit, tamen cùm planè ridiculum ducam ocioso cum homine verba commutare, hoc cum rogarim vnum, me scilicet existimet non sibi placere studuisse, sed vnius aut alterius Roscij (id est Medicinæ studiosi, qui conatus meos sit æquanimiter accepturus) quàm theatri totius, plausum referre maluisse. Vale.

AD CLARISSIMUM VIRVM,  
ANDRAEAM PASTOREM  
Regium in Curia Parisiensi Senatorem,  
IO. AVRATI POETÆ REGII  
EPIGRAMMA.

QUI solitus medius animas de faucibus Orci  
Eripere, & triplicem detinuisse colum,  
Ille idem Hollerius medio reuocatur ab Orco:  
Et sua produci stamina secta videt.  
Si non arte sua, qua non habet ille secundum,  
Pastorei certè sedulitate sui.  
Qui gener ut soceri genus haud sinit esse caducum,  
Hollerij genitos stirpe per Holleridas,  
Sic quoque ne soceri pereat cum nomine fama,  
Scripta palam vulgans Holleriana, vetat.  
Quæ ferus intercepta Lupus cum nuper abactam  
Ceu stabulis teneram dilaniaret ouem,  
Sedulus ut Pastor prædam de dente Lupino  
Excudit, & nomen re probat ipse suum.  
Felix Hollerius, vino cui fauit Apollo,  
Effet Apollinea ne quis in arte prior.  
Felix Hollerius, cui Pastoralis Apollo  
Pastoreum, sibi qui seruet ouile, dedit.  
Quilibet ut veniat notus feritate Lycaon,  
Hollerij frustra dente laceffet oues.  
Quilibet ut veniat fallax Germanus Iason,  
Aurata vacuus pelle redibit iners.

EIVSDEM AVRATI

In Vvolphij furtum à Valetio deprehenfum.

Vvolphius, áne lupus patriæ qui nomine linguæ  
Dicitur, & nomen moribus ipse probat,  
Viribus, infidúsque valens in furta lupinis,  
Hollerij libros finxerat esse suos?

Hollerij, Medica cui cedat in arte Machaon  
Viuo, nunc vulgus scripta superstes habet.

Illos qui potuit manifesto ledere furto

Phœbigenæ manes, Phœbigenæque rogam,  
Non hunc posse putes turbare Nouendia sacra,  
Libáque semicremo deripuisse rogo?

Non impunè sed ille nefas immane patrauit  
Deprensa furti calliditate lupus.

Nam lupicida vetus Phœbus, Liciúsque Lycoreúsque  
Hinc dictus, rabidum perdidit ipse lupum.

Et quia Diis hominum mos est sibi sumere vultus,  
Sic & ab iniustus sumere supplicium

In tua transformans se Cynthius ora, Valeti,  
Furta ministeriis arguit arcta tuis.

Sícque dedit meritas pœnas Phœbóque, suóque  
Phœbigenæ Hollerio, Vvolphius ille rapax.

NICOLAI ELLAIN, DOCTORIS MEDICI  
Parisiensis, ad Casparum Vuolphium Philo-  
sophum & Medicum Tigurinum, Hendecasyllabi.

**D**IC Vuolphi precor, ore cur lupino,  
Quot Ciermāia sonare lingua fertur,  
Et clamore laeſis an, ſerino,  
Dū ſiſque inſequenti calumnioſis,  
Vrgeſque immritum meum ſodalem,  
Politum nitidum, Virum probatum,  
Doctum candidum & integram Valetum,  
Clarum multiplici eruditione,  
Cui etiam tempora Phœbi utraq; lauru,  
Inſignem Medicum optimum Poetam,  
Æque Diis ſuperis amatum & iſtis,  
Æque principibus Viris amatum, &  
Plebi, nec minùs exteris amatum,  
Quàm ſuis, patriæ decuſque gentis?

An neſcis homines vi eruditos  
Nemini ſiſſe decere contumaces,  
Moſtiſtos neque contumelioſos,  
Sed comes potiùs venuſtuloſque,  
Benignos, faciles, modeſtiſque  
Inſignes, iſepidos & elegantes.  
Sic veſtras quoque diſputationes  
Non debere grauem hanc & insolentem  
Rixam admittere, ſed modeſtorem?

Ergo, ſi ſapis impotentis aſtutus  
Mentis comprimito, & graues ſurores.  
Iam iam mitte meo moſtiſtus eſſe  
Sodali, moneo, precorque amicè.  
Iam iam mitte meum inſequi ſodalem.  
Politum nitidum Virum probatum  
Doctum candidum & integram Valetum,  
Clarum multiplici eruditione,  
Coſtum tempora Phœbi utraq; lauru,  
Inſignem Medicum optimum Poetam,  
Æque Diis ſuperis amatum & iſtis,  
Æque Principibus Viris amatum, &

*Plebi, nec minùs, exteris amatum,  
 Quàm sui patriæ decusque gentis.  
 Quod si consilium & preces amicas  
 Negligis, neque contumeliosa  
 Modum ponis adhuc loquacitati,  
 Pergesque immeritum meum sodalem,  
 Politum nitidum, virum probatum,  
 Doctum candidum & integrum Valetum,  
 Clarum multiplici eruditione,  
 Cinctum tempora Phœbi utraq; lauru,  
 Insignem Medicum, optimum Poetam,  
 Aequè diis superis amatum & iunù,  
 Aequè Principibus Viris amatum, &  
 Plebi, nec minùs exteris amatum,  
 Quàm suis, patriæ decusque gentis,  
 Exercere ferus, iocante Musa  
 Iam non Hendecasyllabos venustos,  
 Sed multo potius furente Musa  
 Versus Archilochi seneriores  
 Expectato Lycambico furore  
 Famosos, laqueoque Bupalino.*

ADRIANVS TARTERIVS ME-  
 dicus Trecensis, ad Candidatum  
 Medicinæ.

*Iam dudum manibus tuis teruntur  
 Perdocti Hollerij graues labores,  
 Lector, nec rectè manu sat ampla  
 Fructus Hollerij labore dignos.  
 Nil miror deerat suo Valetus  
 Doctori Hollerio: sed ambo iuncti  
 Iam iam perficiunt viam medendi.*



IACOBI

# HOLLERII

STEMPANI, MEDICI

PARISIENSIS CELE-

BERRIMI, DE MORB.

internis Liber I.

Antonij Valetij opera iam nunc multò quàm  
antehàc auctior & emaculatio factus,  
necnon luculentis exercitationi-  
bus illustratus.

*De dolore capitis*

CAP. I.

**D**O LET CAPVT, I intempe-  
rie, aut solutione continui. Intemperies  
simplex, composita: sine materia, cum  
materia: illàque vel in toto cerebro,  
vel in venis, arteriis, membranis,  
neruosisque corporibus. 2 Solutio continui fit acri  
humore erodente, putri, bilioso, falso, vulnere, càsu  
concussione, punctura, maligna qualitate, vt in lue  
venerea, carie, distentione. Distentio ferè à copia  
humorum, vel flatuum: humorum, quidem, vel om-  
nium, vel aliquorum, vel alicuius. Fit quoque ob-

1 Quæ est iẽ-  
peramẽti ni-  
mias, aut  
paucitas.

2 Hæc est al-  
tera doloris  
causa, cum in  
parte simila-  
ri, tum in or-  
ganica. Sol-  
uunt solue-  
tionẽ cõ mui-  
tata simili-  
rum, quæ r-  
dunt, incidunt,  
distendunt, re-  
hemeter cau-  
faciunt, aut  
refrigerant.

3 Hic vel aliud  
de affluunt  
vel in capite  
magis.

## DE MORB. INTERNIS

structione,quū videlicet angustias meatuum capitis intercipit humor crassus & viscidus,aut spiritus vehemēter vaporosus,in suturis,ossibus palati colatoriiis,& quę ad nares,aures,oculos & spinā pertinent.

Dignoscitur ex varietate causarum efficientium, ex partium laborantium natura, ex loco, ex qualitate propria. Causę efficientes, externę, internę. Externę, æstus, perfrictio, ebrietas( à vini enim potu multo caput quasi spiritu distēditur) casus, ictus, victus, vapor aliquis, vt fumus, grauis odor, aut naturę ægri repugnās. Quinetiam adstrictis arctiore veste & iugularibus, & inferioribus venis, sursum sanguis regurgitat, venas capitis distendens. Internę, intemperies naturalis, aut contracta morbo, quantitas, qualitas materię humorum, vel vaporum, mala conformatio, obstructio. A partium natura, neruorum corporum, magis punctorius: arteriarum, pulsatorius: stupidior in venis, & cerebri substantia. In perioestio superficialis: altus in meningibus. Intra caluariam ad radices oculorum extensus. In plenitudine, grauis: in acri humore & vapore, rodens: sed vapor distendit magis, humor magis mordicat. Vbi distentio citrà rosionem, spiritus flatuosi vel humoris non rodentis copiam indicat. Distentio cum pulsu, membranarū inflammationem sequitur: cum grauitate, copiam membranis conceptam & inhærentem: sine grauitate & pulsatione, copiā crudi flatus. A sanguine ferè in frontem: à pituita in occiput: à bile, in dextrum latus: à melancholia, in sinistrum decumbit. Sunt quibus arteriarum intēperies sanguinem spirituosum multum colligit, vnde dolor pulsatorius & vehemens

excitatur. Quibusdā vermes generantur in cerebro. Id raram esse scripsit Auicennas, quod tamen memoria nostra visum est. Et cuidā Italo ex frequenti odoratu basilicæ herbæ natus scorpio in cerebro, vehementes dolores & lōgos, mortem denique attulit. Humor autem & vapor vel in cerebro gignitur, vel aliundè ascendit, ab extremo police, & plāta pedis à venenato vulnere clauso, vtero, hepate, liene, ventriculo, pulmone & aliis. Cæterum de causis dolorum capitis mulierum ab vtero abundè Galenus differit cōmentario in illā sententiam lib. 6. Epidem. Quibuscūque ex fœtu abortiuo, atque vteri tumoribus, ad capitis grauitatē cōuersio fit &c. Sed iis adiunges pericranij & capillorum sordes, capitis vincula, & similia à recentioribus obseruata.

*Curatio.*

Curatio in his est: in phlebotomia, arteriotomia sanguisugis, cucurbitulis, purgatione, potionibus & medicamentis materiam præparantibus, topicis repellentibus, concoquentibus, mitigantibus, alterantibus, digerentibus, roborantibus, phœnigmis, sinapismis, cauteriis, paracentesi. Hæc omnia remedia sunt dolorum capitis.

Phlebotomia 4 imperatur, si 5 plenitudo & sanguinis copia, si vehemens 6 obstructio est, si vulnus, casus, concussio, febris, inflāmatio atque adeò, vbi intolerabilis 7 dolor est.

Si à reliquo 8 corpore vitiū est, 9 primū axillarem, deinde 10 cephalicā, aut semel mediā diuidito.

Si à suppressis mēsis, aut hæmorrhoidibus, ve-

10 Ad auersionem materiæ propinqua, & amotionem causæ coniunctæ.

4 Ad reuul-  
sionē materia  
antecedentis.

5 Vniuersalis  
Et singularis.

6 Contumace  
illa obstru-  
ctio grauita-  
te doloris per-  
cipitur.

7 Cuius leniē  
di causa ad  
lipothymiam  
mittitur san-  
guis.

8 Vi à ple-  
thora vniuer-  
sali, aut trā-  
flatione sym-  
ptomatica.

9 Axillaris  
seu interna  
vena, basilica  
vulgò dicta,  
primū  
pertunditur,  
si doloris cau-  
sa & fons

perēnis sit in  
hepate, liene,  
& toto gene-  
re venoso: id-  
que fit ad de-  
clinationem  
causæ antecē-  
dētis, & ad  
generationem



# DE MORB. INTERNIS

- 11 *Ab obstru-* nas malleoli incidito : 11 perseverante malo, 12 ve-  
*ctione contu-* nam frontis, temporum, quæque post aures sita est,  
*maci, cause* aperito. Eam tamen eligito, in cuius regione dolor  
*coniecta ma-* incumbit magis.  
*gnitudine.*
- 12 *In dolore* Arteriotomia probatur in iis, qui ob intemperiem  
*enim fixo par* arteriarum capite dolent, ac vertigine : atque vbi  
*is propin-* sanguis calidus & vaporosus dolorem facit. Eligē-  
*quioris vena* da in fronte, temporibus, aut post aures, quæ micat,  
*secanda, per* magis calet & rubet, & vbi dolor acerbior est. Ex  
*apho. 68. li. 5* libr. 6. de sanitat. tuend. lib. 13. Metho. libro de sang.  
 13 *Diffuso* missione.  
*humore inter*  
*pericranium,*  
*& os.*
- 14 *Præpara-* Vacuato iam corpore & contumaci 13 malo, 14  
*buntur hyru-* sanguisugæ extremo naso affiguntur, post aures, &  
*dines ex præ-* venis, quæ in caluaria eminent. Aliquando iis, qui  
*scripto Gale-* ita 15 assueti sunt, & multi sunt sanguinis, post ma-  
*ni lib. de cu-* iora remedia sanguinem è naribus 16 irritamus.  
*curbitulis,*  
*hirud. scarif.*
- 15 *Quib<sup>9</sup> hu-* Cucurbitulæ primùm leues occipitio, vel ceruicis  
*iores sunt* initio, deinde cum scarificatione affiguntur.  
*ἐν ἀρροῖς.*
- 16 *Vt mille* Post phlebotomiam & ante phlebotomiam im-  
*folio naribus* peratur 17 purgatio, aliquando etiam sine phlebo-  
*imposito.* tomia purgamus.
- 17 *Quæ lesi* Ante phlebotomiam leui pharmaco, cuius vis he-  
*pharmacoper* par non superet, sed tantùm venter, mesenterium,  
*ficietur, ad* sima hepatis, & intestina repurgētur: quale hoc erit.  
*primæ regio-* Ț. cassiæ, aut cathol. Ț. i. aut cassiæ Ț. β. quadrante  
*nis cruditate* 18 horæ ante pastum.  
*excludendam*  
*ne in venas*  
*cū sanguine*  
*raptatur.*
- 18 *Ne in ci-* Purgationis vices clyster persæpè supplet: qui in  
*bum & ali-* doloribus capitis tãti est momenti, vt deorsum ma-  
*mentum natura vertatur.* teriam reuellendo plerunque repetitiones ipsas fie-  
 ri prohibeat. Vnde periodicis in doloribus, instan-  
 te etiam accessione, commodè iniicitur, totaque

morbi historia repetitur. Clysteris communis hæc erit formula

℞. decoct. comm. clysteris ℥. i. dissolue cassiæ & cathol. ana ℥. β. mell. ros. sacch. rub. ana ℥. i. vel ℥. x. olei violacei quart. i. f. clyster.

Dein post phlebotomiam, si quis humor vitiosus relictus est, & si quidem recens dolor est, materia sequax, & subtilis, & tenuis, nulla quoque obstructio est, leui pharmaco vteris, vt Cassia, Rhabarb. 19 Manna, mollioribus atque diuinitibus: electario de succo rosarum, diapruno, hieræ puluere, Catholico in aliis. Quales sunt hæ formulæ.

℞. decoct. prunorum, tamarindorum, passulorum, trium florum, cardiacorum, quantum sufficit ad dissolutionem ℥. i. mannæ.

℞. Cassiæ fistulæ ℥. β. mannæ ℥. i. dissolue in suprâ dicta decoctione, vel sero lactis, vel aqua hordei, ptisana.

Pauperibus, loco mannæ, penidia imperabis, vel cathol. drach. 6. cassiæ fistulæ vnc. β. aut cathol. vel cassiæ drach. 6. diapruni ℥. 2. Ex his omnibus cum saccharo fiat bolus: aut, vt suprâ dictum est, dissoluantur. Rhabarbarum aliquando per se, aliquando cum cassia imperabitur. Pueris ℥. 2. rhab. infunduntur in aqua endiuia, cum modico cinamomi: mulieribus, à ℥. i. ad ℥. i. & semissem: viris, ad drach. 3. Mollioribus, & quibus aluus facile commouetur, ℥. 3. cassiæ, & ℥. 2. rhab. satis esse possunt. Ex his fit bolus cum saccharo. Aliis cassiæ fistulæ ℥. 6. addimus ℥. 4. aut circiter rhab. Puluere hieræ picræ sic vtendum erit.

## DE MORB. INTERNIS

℥. pul. hieræ 2 o picræ recentis drach. 2. exci-  
piantur modica conferua violarum , *ad tollendum*  
*amarorem.* Aut hæ pilulæ fortiores erunt.

℥. pul. aloës 3. i. mastic. cinamo. ana ʒ. ʒ. dacrīdij  
gr. 4. (*ad eradicationem*) cum iūcco citri fiant pilu-  
læ. In crassis & viscidis humoribus , magnis quo-  
que obstructionibus, grauior ferè atque contuma-  
cior morbus est. In quibus & 21 phlebotomia , si  
cætera consentiunt, necessaria est, & potiones, quæ  
materiam incidant & attenuent , à quibus purga-  
tiones per 22 interualla, validique clysteres. Topi-  
ca ex iis, quæ incidunt & attenuant. Errhina, Apo-  
phlegmatismi, Suffumigia, Gargarismata, Frictio-  
nes, Vincula, Cucurbitulæ, Sinapismi, Setones,  
Ferrum, Ignis.

Phlebotomia, vt priùs, instituenda satis 23 am-  
plo vulnere. 24 oxymelite, aut aliis descriptis, ma-  
teria præparabitur, aut hac potione.

℥. stæchad. citrin. vnc. 2 fiat decoctio in aqua  
purissima ad quart. 3. In expressione colata dissol-  
ue mellis communis, aut mellis albi, vel sacchari  
albissima ʒ. ʒ. plus minúsve. Fiat syrupus , vtatur  
ieiunus, duabus horis ante cœnam, dosi trium vn-  
ciarum. Hæc potio putredinem arcet , extenuat,  
deterget , roborat non solum cerebrum, sed viscera  
omnia, & corpus, laudata Græcis & Arabibus. A  
qua, vsus esse potest syrupi de stæchade incomple-  
ti, id est, sine aromatibus, *detracto croco.* Atque hinc  
syrupi completi, id est, cum speciebus. Eodem mo-  
do ex acoro , (*omnibus morbis à defluxione confert,*  
*quia adstringit*) & fœniculi radice, oxymel parari  
potest, atque hinc hydromel.

21 Doloris  
enim pertina-  
cia phleboto-  
me indiget.

22 Quia  
sunt varij co-  
elctionis gra-  
dus, ita &  
purgationis,  
ac exclusionis

23 Ad crasse  
materie eua-  
cuationem.

24 Nisi vlla  
leienteria, hi-  
sterica affe-  
ctionis, aut  
melancholice  
hypochondria-  
cæ adferri pos-  
sit excusatio.

Calidiores syrupi suspecti sunt, vbi plethora, febris, cruditas in primis venis. Hinc enim augentur febres, liquefacta cruditas trahitur in corpus, fusa plenitudo apoplexias, febres, tabes, & alia mala inuehit. *Hic quoque considerandum anni tempus, regio, agri temperatura & aetas.* Purgationes 25 fiunt ex hiera

25 *Quæ humores ex toto corpore ducunt.*

26 pul. hieræ diacolo. 3. β. agarici tro. 3. 2. mastich. bdellij ana 3. β. nucis moschatae Gr. viij. cum 27 succo absynthij formentur pilulæ. Delicacioribus naturis poterunt excipi pulueres in modico cōseruæ anthos. Solent autem parare syrupos, quibus interuallis vtendum sit, quos ita conficies, vt in decocto describantur quæ attenuent, concoquant, aperiant, roborent, 28 & conuenienter purgent, qualis hic est.

26 *Pantur hæ pilulæ hor. 6. ante cibum: aut hor. totidem post cibum.*

*Pilulæ.*

27 *Ne ventriculi vim labefactent.*

28 *Ventriculū & caput.*

29 *Ad liberanda obstructa.*

30 *Ad discutiendos flatus.*

31 *Fia hæ sunt cephalica, & cerebro gratæ.*

32 *Violariū borrag. & bugloss.*

33 rad. 29 graminis, petroselini, asparagi, ana 3. β. se. 30 anisi, & fœniculi ana 3. i. 31 betonica, stœchados an. P. 2. florum 32 cardiacorum ana P. 1. passul. mundatarum (earum caro relaxat) 3. β. liquiritiæ 3. 2. polypodij querni 3. β. aga. trochisc. 3. i. β. foliorum sennæ (orientalis nostra nullius fere est momenti.) mundatarum, & in fine decoctionis positorum 3. 2. fiat decoctio in aqua purissima ad lb. i. In col. dissol. sacch. albissimi q. s. Fiat syrupus mediocriter coctus, vtatur singulis hebdomadibus 3. i. β. cum 3. 2. hydro-melitis, aut prisanæ. Erit autem calidior cum hydro-melite, frigidior verò cum prisana. Fortior.

34 polypodij querni, rad. acori, ireos, sem. carthami ana 3. i. β. sem. anisi, fœniculi, cuscutæ ana drach. 2. sebesten N. 12. Cetherac, scolopendrij, betonica, summitatum lupuli, agrimonix ana P. 1. stœchad.

# DE MORB. INTERNIS

33 Ad des ſtœ- arabic. & citrin. ana P.ß. foliorum ſennæ mundato-  
cad adyāth. rum, & in ſine decoctionis poſitorum ꝯ. 4. agar. re-  
an. ꝯ. 2. ly- center troc. ꝯ. 1.ß. tupethi gummoſi ꝯ. 1. 33 fiat deco-  
citrini ꝯ. 3. ctio ad ſb. 1. In col. diſſol. ſacch. albiſſ. & mellis albi  
2. vi atra- bene deſpumati ana ſb.ß. Fiat ſyrupus coctus ſecun-  
hatur humor dum artem. Accipiat ꝯ. 1. cum hydromelit. 34 aut  
viſcidus & ptifanæ ꝯ. 2. ſemel in 12. diebus.

34 Adhibito  
deleſtu pecu-  
liaris agri  
natura, aut  
temporis.  
35 Ha pilu-  
la ſunt cepha-  
lice, quibus  
preparata  
materia ra-  
dicitus extir-  
panda.

36 In quo  
prius infuſa  
ſint ſuprà di-  
cta.

37 Remedia  
partibus pro-  
pria, quæ  
ſumuntur ex  
indicatione  
partis.

38 Topica nō  
ſemper adhi-  
bentur præ-  
miſſa totius  
corporis va-  
cuatione, vt  
in abſceſſi-  
bus criticis.

## Pilula.

35 ꝯ. agar. recens troc. ꝯ. 2. turpeth. ꝯ. 1.ß. ſalis gem-  
mæ, & zinziberis (ad correctionem. Secus enim materiam  
ſubtilem vacuaret, relicta crassa) ana ꝯ. 1. Infunde omnia  
in vino albo, fiat levis feruor ſuper calidos cineres,  
deinde fortis expreſſio. Expreſſæ materiæ adde pul.  
hieræ diacol. drach. 3. pul. hieræ picræ ꝯ. 4. malaxen-  
tur cum vino 36 expreſſionis, fiat maſſa, capiat dra-  
ch. 1. in ſingulas doſeis.

Post purgationes imperari ſolent, quæ confir-  
mant ventericulum & viſcera, quale hoc eſt.

ꝯ. mythridatij veteris, conſeruæ bugloſſi & a-  
cori ana drach. 1. Capiat manè diei ſequentis.

ꝯ. ſpecierum electarij diambrae ꝯ. 1. pleres ar-  
chonticæ, & aromatici roſati ana ꝯ.ß. excipiantur in  
modico conſeruæ anthos, vel cum ſyrupo de corti-  
cibus citri, aut de ſtœchade, fiat trochiſcus.

## 37 Topica.

Repellentibus 38 ſtatim initio vtendum eſt. Sed  
in dolore calido, magis refrigerantibus, vt & in cor-  
poribus durioribus, æſtate, regione calidiore, iuuen-  
tute. Contrà verò temperanda res eſt in contraria  
conditione, quale hoc eſt, quod vehementer repel-  
lit & refrigerat.

℥. 39 olei rosati recentis ℥. 2. aceti albi ℥. 3. aquæ 39 *Loti sepe*  
 rosarū (*in potu nocet ob odorē, nisi sumatur aqua peculi ros.*) *in aqua ro-*  
 drach. 2. agitantur diu, & refrigerentur in aqua fri- *sarum.*  
 gidiſſima putei, aut niue, pro frontali. Aliud.

℥. olei viol. & ros. ana ℥. 1. aceti albi, succi agre-  
 stæ ana drach. 2. Diuitibus adde caphurę gra. 4. Lin-  
 teolum insuccatur postea frigidâ, vel in succis sem-  
 peruiui, centinodiæ, plantag. polygon. granatorum  
 acidiorum, vmbilici vener. portulacę, lactucę, psilij,  
 rosarum, malorum granatorum, capreolorum vitis,  
 omphacis, mespili, cucurbitulæ, cucumeris. Ex his  
 simplicibus nonnulla interdum tandiu teruntur af-  
 fusa rosacea, donec fiat crassitudo aliqua: & popu-  
 leo, oleisq; & succis cōuenientibus additis, fronti  
 & temporibus adhibentur. Flores ros. violar. nym-  
 phæ, papaueris, per se, vel cum aliis tutò quoq; ap-  
 plicantur: conseruæ recentes rosarum & violarum:  
 nodulus è rosis aceto madefactus, & naribus indi-  
 tus instar caputpurgij. Si nimium dolor & vigilię  
 vrgeant, lac muliebre cum tantillo caphuræ & opij  
 proderit. Fasciæ & anacollemata è gossipio carpto  
 circumligantur capiti, à fronte ad occipitis verticem  
 ductis capitibus, & his imbuuntur medicamentis.  
 Videndum tamen ne quid in os & oculos defluat.  
 Parabilia remedia sunt: oportet autem hæc subinde  
 renouari, quia statim incallescunt.

*Secundus ordo.*

℥. Cerati 40 Gal. diu subacti cum succo portu- 40 *Quo vte-*  
 lacę, aut simili ℥. 2. illinatur fronti, & superponan- *batur Gal.*  
 tur folia salicis. *ad fracturas.*  
 41 *Extracta*  
 ℥. mucag. sem. psilij, 41 mucag. sem. althææ, & *in aqua plā-*  
 cydoniorū ana drach. 6. agitētur cum modico aceti. *taginis, aut*  
*simili.*

## DE MORB. INTERNIS

$\mathcal{L}$ .olei rosati & cham.ana  $\mathfrak{z}$ .i.aceti drach.3. hyme pueris,eunuchis,& mulieribus conuenit:in quibus nimia refrigeratio periculosa est. Iam progresso morbo,olei cham. anethini,liliacei aliquid adii-ciendum.

*Ad frigidam cephalalgiam.*

$\mathcal{L}$ . dialthææ  $\mathfrak{z}$ . i. agitetur in mortario, primùm quidem cum oleo rosaceo,deinde,vt procedit morbus cum ol. de mastiche, de cydoniis, de spica. Et diuitibus addi possunt 42 Gr.2.moschi.Olea conueniunt cham.aneth.(in declinatione,quia odoratum) de lilio,laurinum, mastichinum, de spica, de costo: in quibus serpillum,mentha, thymum, orig. rosmarinus,maiorana,calendula, pulegium, ben, nux moschata,caryophyllum,cinamomum coxerint.

$\mathcal{L}$ .serpilli M.i.coquatur in qr.3.olei cham.& tb.ß.vini rubri. Fiat decoctio ad consumptionem vini in vase duplici:deinde fortis expressio: seruetur 43 oleum ad vsum.

$\mathcal{L}$ . caryophyl. nucis moschatæ ana  $\mathfrak{z}$ . ß.fiat decoctio in qr. 3. olei cham. & vini rubri drach. 4. ad consumptionem vini in vase duplici, vt priùs, lento igne,ac sine fumo.

$\mathcal{L}$ . terebinth. tb. i. mastich. cin. nucis moschatæ ana  $\mathfrak{z}$ .i.caryophyl.galangæ,zedoariæ,ladani an. $\mathfrak{z}$ .i.ß.succi ebuli, succi cucumeris asinini ana  $\mathfrak{z}$ . i. Puluerisatis puluerisandis, in alembico distilletur oleum secundum artem.

Laudant & oleum sambucinum,iasminum.Nec omittendum est remedium mulieris apud 44 Paulum,quo in hemicranicis vfa,mirandum in modum inclaruit.

42 Nisi cerebro sint ingrata.

43 Hoc oleo inungatur totum caput derafum, ad naturæ vim excitandam.

44 Paulus Ag. lib.3. cap.5.

Radices itaque cucumeris asinini concides in taleolas, & cum absynthij coma hydrelæo incoques. Fouebis partem hydrelæo, materiam verò modo emplastri impones.

Adhæc rarò fit frigidæ materiæ ad caput raptus, sed illîc paulatim colligi consuevit,

## EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Medico ad ægrum accedenti primùm pars affecta inuestiganda, deinde affectus: postremò ex vtrisque ineunda curatio. Partes affectæ in capitis doloribus ita distinguuntur. Si digito pressa cute doloris sensus acerbior, pili erecti, & oculorum radices, vel partes internæ molestiam non sentiunt, cutis, vel pericranium laborat: sed pericranium à frigore frequentius ob similitudinem cutis, ab æstu, sordibus, multis capitis integumentis, vt in mulieribus & similibus: dolorque in pericranio ad oculi palpebras vsque tantùm peruenit. Intra cranium dolor obtusus, arteriarum, venarum & substantiæ cerebri affectionem indicat, quòd sensu sint imbecilliore: punctorius meningum & neruorum. Sed in neruis communicatur parti, cui inseruntur: in arteriis pulsus percipitur contundens, & profundus in membranis ossium hæret. Sic deprehensa parte affecta ad affectus distinctionem & curationem primò videndum, an cum febre, an sine febre, Si cum febre inceperit & permaneat, internam partem affici significat, & futurum delirium portendit. In acutis post tertium aut quartum diem superueniens, sanguinis fluxus indicium est, modò cætera consentiant, atque hic nullo modo curandus, ne crisis impediatur. In ea tamen, quæ per vomitum futura est, admoueri medicamenta possunt ad dolorem leniendũ, nullo naturæ impedimẽto. Quòd si sine febre sequiat, vel in parte est, dextra, sinistra, superiore, inferiore: vel in toto. Dolor sæpius recurrens, statîsq; temporibus & alterutram partem occupans ad futurã vsq;, hemicrania est: in anteriore parte cephalalgia: post multũ tempus, cephalæa. Siccitas vehementem dolorem

*Partium capitis affectarum distinctio.*



## DE MORB. INTERNIS

non infert, quia non fit, confertim: nec proinde melancholia, nisi à bile flaua adusta, vel bile mixta, vel spiritu distendente. Neque humiditas, nisi ob copiam, vt pituitæ frigida, quæ noctu potissimum infestat, facileque propriis signis pituitam significanti- bus discernitur. Distentio cum grauitate & pulsû sanguinis copiam: sine grauitate, bilem demonstrat, cæteris tamen perpen- sis, vt victu præcedente, temperamento, regione, ætate, anni constitutione. A calore vehementissimi sunt dolores, sed breuiores: à frigore minus subiti & diuturniores: ab ossis carie, vermibus, scorpione, subiecto pure, angusto loco comprehenduntur. Postrema consideratio, an per consensum fiat. Cuius hæc sunt signa vniuersa. Si nulla euident causa antegressa fuerit: si frequenter repetat: si cum alterius partis affectu inuale- scat & eo sublato leuetur: denique si vel totius corporis plenitudo & caco- chymia sit, vel partis alicuius vitium præcesserit. Modus autem huius communicationis, siue consensus duplex. Nam partes inferiores vel ad caput ali- quid transmittunt, vt vaporem aut humorem: vel sola connexion- e, & quasi contagione quadam cerebrum afficiunt.

*Gal. libr. 2.  
de cõpos. me-  
dicam. xglâ  
rómus.*

*Capitû dolo-  
res à calore  
vehemētissi-  
mi: à frigore  
diuturniores.*


*Doloris capi-  
tis per cõsen-  
sum signa vni-  
uersa.*

*Doloris capi-  
tis per con-  
sensum modus  
duplex.*

Ex ventriculi tunicis externis ac sinu, fumi efferuntur ad caput per neruorum rectitudinem, & per œsophagum. Huius signa sunt, cruditas antecedens, ebrietas, cibi corruptela, dolor, nausea, oris amaritudo. Ab vtero fit post mensium retentionem, aut seminis putrescentis, aut si qua sit illuc humorum perturbatio. Tunc dolor in occipite percipitur, vel illic incipit, præsertim nulla materiæ translatione facta, propter consensum vteri cum cerebro per spinalem medullam, cui robustis vinculis connectitur. A iecore magis per venam cauam: à liene per arteriam magnam fit materiæ ad caput translatio. Sed an à bile in dextrum latus, à melancholia in sinistrum dolor decumbat, controuersum est: cum & vena caua & arteria magna à iugulo in vtrumque latus traducant ramos, vt nulla ratio adferri queat, præter rectitudinem, cur in hanc potius, quàm in alteram partem dolor inuadat, cum tamen rectitudo parum momenti habeat in iis, quæ per vias communes transferuntur. Sed dolor frequentius synciput prendit multis de causis. Nam illic panniculorum partes futuris interse- runtur, & vasa, arteria præsertim, ac materia omnis seu vapor

*Dolor capitis  
cur frequen-  
tius synciput  
occapet.*

eò peruenit, futuræ raræ, cranium tenuissimum, & fistulosum, tenuium vasorum copia. Vnde fit, vt semper ferè illic incipiat sudor. Atque hæc in vniuersum dicta sint de causis & signis doloris capitis.



## DE MORB. INTERNIS

Ut bene procedat curatio, imprimis vitandus animi motus & corporis, à polychymis alimentis abstinendum, declinandus quoque mandibularum & capitis motus, necnon clamor strepitus, tum à se magis, tum ab aliis. Non dura mandenda.

In omnibus capitis doloribus commune est, ut in principio parti repellentia admoueantur: in decremento, digerentia: in fine declinationis, roborantia.

*Vt intolerabilis dolor est*] Cornelius Celsus tantum in dolore intolerabili venam aperit. Sed citra hunc, in propositis

*Corn. Celsus c. 2. lib. 3. de Medic.* conditionibus etiam secanda est. A quacunque autem causa dolor exciteur, si vehementia urgeat, duabus de causis vena tunditur: una, quod vix dolor tantus esse queat sine materia calida: altera, quia metus est inflammationis & resolutionis spirituum. In dolore quoque à bile mittitur sanguis, non ad vacationem, sed ventilationem. In quo si phrenitidis metus sit, venæ sub lingua aperiantur: vel cucurbitulæ ad humeros, aut collum applicentur cum scarificatione: vel fiant ligaturæ & frictiones in extremis partibus, potissimum carpo & pedio. In vaporibus denique discutiendis ligatio colli, & ducta manus sursum, ut vis spiritus, caloris & sanguinis cogatur in caput, & ita vapor tenuetur, & discutiatur. Vbi cum febre dolor inuadit, liberior phlebotomia.

*Ex apho. 68 lib. 5.* Ea tamen eligatio, &c.] In diuersione non est eligenda vena partis dolentis, sed vena frontis secanda, potissimum si posterior pars capitis doleat. Sin anterior, & exigua sit quantitas materiæ, secatur, quæ est inter spatulas.

*Arteria quæ secetur in dolore capitis pulsante.* Arteriotomia.] Arteriæ sectio remedium est singulare in omni dolore pulsatile, ut Rhazes docet: sed periculosum, quia Chirurgis minus vsitatum. Debet autem arteria scindi è directo partis affectæ, & in principio ad maximam sanguinis copiam. In quo videndum, num per maiores & internas arterias vapor efferatur. Sic enim nihil conferet, ut ex capit. 8. libro 3. de locis affectis perspicuum est. Huius loco applicatur cauterium actuale in media parte capitis propè futuras.

*Sanguinis è naribus irritandi ratio.* Si ignem refugiant, applicetur potentiale, Sinapismi, Dropaces, Capitella ex aluta, inducta emplastris conuenientibus.

*Sanguinem è naribus irritamus.*] Hoc fit nares frequenter

scalpendo, fetis quoque, & folio arundinis, aut festuca, aut herbis quibusdam aculeatis, aut asperis, venas narium irritando ad hæmorrhagiam, aut sanguisugæ pinnis narium affiguntur. Sin neque his prodeat, cucurbitulæ cum scarificatione admoveantur, vt præcepimus.

*Cucurbitula.*] Cauendum, ne æger faciliè paralyti capiatur iis partibus, quæ nervos accipiunt à loco, vbi debent cucurbitulæ applicari.

*Ante Phlebotomiam leuiphar.*] Hoc fit, ne educatione sanguinis excrementa ventriculi & intestinorum in venas rapiantur. Sed horum loco, clysteribus (& tutius, propter cassiam quæ cerebrum fumis replet) ante sanguinis missionem vt possumus emollientibus & detergentibus, si sine febre: in frigidantibus, si cum febre dolor sit, præsertim cum resistit aluus. Sæpè enim vaporibus sursum latis suppressa aluo, dolor commouetur: clystere iniecto, sedatur. Sin perseveret, venam secato. Cæterùm, hæc minoratiua dantur per quadrantem horæ, aut etiam per horam ante prandium: tum vt cibi grauitate mittantur deorsum: tum vt fumos arceant, qui è cibo feruntur ad caput. Contrà fit, quum caput purgandum nobis proponimus, vt pilulis. Exhibentur enim quatuor horis post cœnam, vt medicamentorum vis simul cum alimenti vapore ducatur ad caput. Ad diminutionem verò materiæ, pilulæ leues dantur tribus horis ante cœnam.

*Rhabarbarum, Manna, &c.*] Rhab. fumosum est admodum: ob id minùs conuenit, nisi infundatur in aqua endiuia, vel violarum. Ab hiera auferenda sunt aromata, vt crocus, quia caput tentando, augent dolorem, vt Galen. docet de compositione hieræ agens. Idem fiat in syrupo de stœchade. Manna faciliè bile scit in valde biliosis. Minùs nocent odorata, cum valde laxantibus miscentur, quia non diu retinentur in corpore. Aromata adduntur, quia roborant, & tenuitate partium iuuant medicamentorum penetrationem.

*Pilulæ.*] In affectibus siccis meliùs purgabitur materia biliosa, vel potius medicamentis humidis & liquidis, quia pilulæ omnes calidæ sunt & siccæ, saltem ob aloëm, proindeque maiorem inducunt alterationem.

*Phlebotomia, vt priùs.*] In crassis & viscidis humoribus ac materia frigida, metuenda est venæ sectio. Si tamen venæ tu-

*Cucurbitula vt rectè applicetur, quid vitandum.*

*Phlebotomia cur leuipharmacum præsumendum.*

*Cassia fumis opplet cerebrum.*

*Pilulæ quando ante cœnam, quando post exhibeantur.*

*Rheum fumosum.*

*Aromata & crocum caput ferire scribit Gal. libr. 2. de cõp. medic.*

*καλὰ τὸ πικρὸν, Pilulæ siccis affectibus minus commo-*

*da.*

## DE MORB. INTERNIS

ment, & sanguis abundat, cæteraque concurrunt, poterit fieri, dato antè clystere ad diuersionem. Sin minùs, à clystere incipiendum, qui materiam discutiat, incidat, alteret, & euacuet: deinde leui medicamento vtendum, ne cruda materia agitur, vt pilulis leuioribus, de hiera simplici, agaric. troch. cum oxymelite simplici, paulatim progrediendo ad fortiora, nisi grauiora symptomata statim extremis remediis cogant vti.

*℞. Stæchados* ] Flores anthos, stæchados, chamæmeli in omnibus capitis doloribus valent, etiam in materia calida. Nam mirificè roborant cerebrum. In declinatione tamen ponuntur potius, & repressa fluxione.

*Calidiores syrupi.* ] Leuioribus ergo antè est vtendum, vt mell. ros. syrup. capill. ven. de bizantiis, acetos. simplic. & composito. Deinde de hyssopo, de prassio, de acoro, de stæchade, &c.

*℞. Graminis, petro.* ] In affectu melancholico parum conueniunt hæc diuretica, quòd humor melancholicus per vias vacuari nequeat, cùm splen nullum habeat consensum cum renibus per viam communem, nisi addantur ad incisionem & attenuationem. Sed tunc sufficient semina, anisi fœniculi, apij ad ʒ. ss.

*Corn. Celsus cap. 4. libr. I. de Medic.* *In aqua frigidissima.* ] Celsus scribit nihil æquè prodesse capiti, atque aquam frigidam: adeò, vt eum, cui caput infirmum est, iubeat per æstatem id bene largo canali quotidie aliquandiu subiicere. Obseruaui quoque quendam, cùm 40. annos laborasset hæmicrania, frustra aliis auxiliis adhibitis, consilio Medici frigidâ sæpiùs lauisse frõtem, atque inde persanatum, nisi quòd materia deriuata in œsophagum, & illic concretescens, prohibebat deglutionem. Quia tamen cerebrum frigidum est, & membrum princeps, à frigidissimis metuendum, aut cum summo iudicio vtendum. Cæterùm topica, quæ repellunt, tepida admoventur, vbi materia frigidior, & crudior: frigida, vbi materia calida & biliosa.

## ANTO. VALETII EXERCIT. I.

*Gal. lib 1. et 12. Meth.* **Q** Vanquam symptomata curationem non indicant, eam tamen nonnunquam suam ob  
vehemen-

vehementiam ad sese trahunt, aut, quæ viribus prospiciat, mitigationem efflagitant. Sed morbos imprimis, quorum soboles existunt, atq; causas eorundem præcognoscere oportet, à quibus curandi consilia (σχοπῆς ἐνδείκτικῆς, hoc est, rectas collationes nocentis morbi & iuuantis auxilij appellant) veniunt petēda. Itaque cū de capitis dolore, quod est symptoma in sensu, inquiramus, cuius causas singulas, in numerato habere sit necesse, ab omniū primis, que Græcis *προκαταρκτικὴ καὶ προκατάρχουσα*, Latinis externæ & euidētes nominātur, *Procatarcti-*  
*ca cephalalgia causa* initium ducemus, deinceps ad reliquas progressuri.

Externæ capitis doloris causæ sunt, Solis ardor qui calfaciendo, animale spiritum agitando, turbando & confundendo capiti negotium facessit; frigus ambiens, condensante & adstringente vi fuliginosa recrementa (præsertim si oppleta per Austrinos imbres capita exceperit) arctissimè retinens, necnon calorē naturalem intrò penitissimè cogēdo calfactionem, incensionemque spirituum inducens, ebrietas ex vino natura calido, vaporoso, mero, largo, vitiosus victus, ictus, casus, atque alia vnitatem soluere natà: de quibus fusiùs Hollerius ex Galeno cap. 9. lib. 3. de Loc. malè affect. & capitibus 1. 2. & 3. libr. 2. de compos. medicam. *ἡ τὸ πᾶς*.

Calidæ intēperiei simplicis sæpiùs ex Solis æstu contractæ (quam ex capite & fronte ad tactum calidioribus, oculorum ariditate, squalore & rubore, promptoq; ex frigidis iuuamine dignosces) refrigerantia & humectantia, cū assumenda, tum ad-mouenda, institui debent. Assumenda sunt, alimēta & medicamenta. Alimenta, cremor prisanæ, aquæ

# DE MORB. INTERNIS

potus, iuscula conuenientibus oleribus temperata elixæ pullorum carnes aranciorū aut limonū succo cōditæ. Reliquæ etiā res nō naturales vulgò dictæ quas liceat cum Galeno ad victus rationē referre ad refrigerationē & humectationē sint comparatæ. Medicamenta, syrup. acetos. simplex, violac. oxy-  
 facchar, & similes quibus cum tripla aqua cocta dissolutis ad caloris remissionem vti conueniet. Ex his zulapia concinnantur hac forma.

℞. syrup. acetos. simpl. & violac. ana ℥. i. β. dissol. in aqua hordei. quart. 3. f. zulapiū in treis doseis: condiatur pauc. cinam. aut santal. citrino.

Sunt & admouenda refrigerantia, fronti, tēporibus, sincipiti anteriori capitis parti, quā medicamentorū vires à pilorum radicibus ad cōmissurā coronalē pertingentes faciliē caput internum subeūt. Vt.

℞. olei ros. vel omphacini ℥. 2. aq. ros. nymphææ (adduntur aquæ maioris metu calfactionis ab oleis, quæ celeriter incallescunt) aceti albi ana ℥. β. Ex his mistis oxyrhodinum paratur ad litum frontis, temporum, sincipitis.

Vulgò linteola in oxyrhodino ex ol. rosac. ℥. 3. & aceti ℥. i. cōposito immersa iisdē partibus adhibentur: quæ subinde imbuta sæpe & sæpe renouantur. His oleis si ceræ parū in aceto lotæ, aut cerati refrigerantis Galeni immiscueris, in vsum eundē vnguentum habebis. Cui rursus si rosas, papaueris albi capita, aut similia puluerata adiunxeris, maiore apposita quantitate ceræ, ceratum compinges: quod, si videbitur, duas inter syndones, telasve raras positum fronti applicabis.

Talia refrigerantia postico capiti, à quo spinalis medullæ principiū, vnde numerosæ prodeunt nervorum in reliquum corpus disseminatorū propagi-

*Gal. in sent.  
 9 sect. 3. li. 3.  
 Epidem.*

*Id in se ipso  
 expertū Gal.  
 proficitur ca.  
 11. libri 13.  
 Meth.*

*Cautiones  
 obseruande.*

es, ne vnquam admoueris: nam sunt inimicissima. hæc dum fiunt, expedita sit alius, ne si adstrictior, aput (cuius calor instar cucurbitulæ trahit) elatis inc fumis perennis doloris necessariam consecutionem allaturis repleatur. Si corpus plethoricum & cacochymum cephalalgia istiusmodi nacta fuerit, proderit vacuare, ne huic diaria, synochus impuris, aut putris, vel alia è febris succedat.

His præsiidiis si non cesserit dolor, metusque sit ob fluxum humorum in oculos (nam nec diu hæc persistit intemperies non accessito materiæ affluxu) egri visum læsum iri, arteriæ, quæ per tempora reuertuntur, opportunè, suafore Galeno, à perito Chirurgo pertundentur, vt ex his sanguinis quantum satis sit, fundatur. At vt rarò venæ in capite eligi solent, sic rariùs multò arteriæ, quòd hæ diuissæ ægriùs conglutinentur. De dolore capitis à reliquis causis pro tatarcticis dicitur exercitat. 3. & 4.

Sequitur vt cephalalgias à causis internis cum adiuncta materia, sanguine, bile, pituita, melancholico humore, excutiamus: & primùm eam, quæ est sanguine quatuor humores cõplexo, aut sanguine sincero plethoram capitis solius, aut etiam corporis totius faciente.

Sanguineæ cephalalgia cause sunt, omnia sanguinem cumulantia. Signa, grauitas & tensio capitis, faciei rubor, calor, ægri natura, ætas, antea actæ vitæ ratio, anni tempus, regio, locus, pulsus magnitudo, vrina rubicundior, crassior, longior somnus.

Eadem ferè victus ratione, qua nuda intemperies calida, oppugnatur, vitatis maximè polychymis cibis: quia, vt cætera conferant remedia, subtra-

*Gal. sub fin.  
lib. 13. Meth.*

*Sanguinea  
cephalgia  
cause & si-  
gna.*

*Sang. cephal.  
Curatio.*



## DE MORB. INTERNIS

hendæ morbifici humoris generationi incumbendum. Vino igitur omnino interdendum. Nam præterquam quod vaporosum est & *καρπώδες*, citissimè distribuitur, in affectam partem suc-

*Gal. sub fin.  
libell. de eu-  
chym. & ca-  
cochym.*

cos transuehens. Si tamen eius vsum consuetudo, virium imbecillitas, aut morbi paruitas admiserit, oligophorum, assentiente etiam Galeno, imperabitur, à cuius potu frigida hauriatur, quæ vini vaporibus reprimendis sit satis. Mox de vacuatione & alteratione cogitandum. Vacuatio, præmisso clystère blando, aut cathartico, perficitur sanguinis missione ex cephalica è directo, nisi vel plethora consilium immutet, & axillarem secandam indicet: vel solennis alicuius vacuationis, vt mensium & hæmorrhoidum, suppressio venam ad malleolum positam pertundere iubeat: vel præpingui in corpore humeralis non apparentis loco mediana secetur: vel denique aluus satis sit fluida. Si vires, ætas, tempus, phlebotomen dehortentur, cucurbitulæ cum scarificatu scapulis & ceruici affigendæ: quæ etiam aliis post vniuersalem vacuationem, malo præsertim anteriora capitis infestante, vsui esse poterunt.

Eadem hîc alterantia, quæ in calida intemperie simplici, sunt vsurpanda: hac tamen cautione adhibita, vt si febris affuerit, iis abstineamus in statu & declinatione, quæ impensius refrigerando intercipient perspirationem illis temporibus apprimè necessariam.

*Biliosa cephalalg. causa & signa.*

Biliosæ cephalalgæ interna causa est bilis, quam inedia, ira, labor, vigiliæ, alimenta calida & sicca congegnerint. Signa, dolor acer, pungens & ero-

dens, grauitate paruus, ingēs capitis ardor, os amaricās, flauitie pallēs facies, & velox pulsus, insomnia.

Victus non ita tenuis, vt in sanguinea, præscribendus, maximè si æger sit natura biliosus. *Curatio cephal. bilios.* Naturis enim biliosis inimicissima inedia. Qualitate sit frigidus & humidus, vt in superioribus.

Mox antedens causa reuellatur clystere refrigerante, in quo cholagoga sint dissoluta. Vr.

℥. malu. violariæ, lactuc. end. ana M. i. semin. cucurb. melon. portul. ana ʒ. 2. flor. nymphææ M. ss. hord. p. 2. fiat decoct. ad lb. i. In colatura dissol. cass. ʒ. i. vel cass. & cathol. ana ʒ. ss. sacchar. & mell. viol. an. ʒ. i. ol. violacei ʒ. 2. ol. nenuphar. ʒ. i. f. clyster.

Vel potionem lenem, aut etiam paulò valentiorē imperasse proderit, præsertim si bilis turgens, & velut furiosa vrgeat. Qualis hæc.

℥. rad. oxalid. gran polypod. quern. ana ʒ. 3. lactuc. nouell. cichor. totius, summitat. lupuli, endiu. ana M. ss. tamarind. prun. damasc. ana ʒ. i. semin. melon. anisi. ana ʒ. 2. flor. violar. recent p. 2. f. decoct. ad dosim. In qua infunderhei elect. ʒ. 2. cinam. ʒ. ss. In express. dissol. syrup. laxatiui ros. pallid. ʒ. i. vel diaprun. solut. vel electar. de succo ros. ʒ. 2. & syrup. de cichor. simpl. ʒ. i. f. dosis.

Pauperibus solum diaprunum solutiuum ad ʒ. ss. vel ʒ. 3. datur in aqua cichorij, vel endiuix dissolutum. Biliosus succus si multus sit in vasis, nec dolor à purgatione mitescat, sanguis adimendus, qui refrigerationē inducendo doloris sedationem ferat. Parcè tamen detrahitur, quòd eo vacuato laxatis veluti habenis bilis incandescat ac efferueat. Itaque ad diffusionem potiùs & refrigerationē, quàm ad euacuationē, biliosis in affectibus mittitur sanguis. Plus enim còmodi ex refrigerato corpore percipi-

# DE MORB. INTERNIS

tur,quàm incommodi ex sanguinis vacuatione.

Interim topica etiam ab initio non sunt omittenda, quæ & valenter & affectus magnitudini conuenienter, reprimant, factò tamen à mitioribus ad vehementiora progressu. Vt.

℥. olei ros. vel nenuph. ʒ. 2. aqu. plantag. viol. acer. alb. ana ʒ. ʒ. misce pro litu frontis & temporum. Vel ℥. ol. ros. & nenuph. an. ʒ. ʒ. aqu. solā. ʒ. 1. populei, vel cerat. refriger. Galen. ʒ. ʒ. vel vtriusque ʒ. 2. aceti tantillum, f. vt supra.

Isthæc remedia si intolerabilis eludat dolor, ad narcotica veniendum, sed quæ neque ita sint valentia, nec diu hædere permittenda sint.

Quòd si iteranda purgatio videatur, edomanda imprimis bilis, vt trahēti facilius cedat, medicamentò. Id præstabunt zulapia è syrupis & aquis conuenientibus instituta: vel apozemata ex decocto superioris dosis: in quo syru. viol. de cicho. simpl. vel similes sint dissoluti. Dosis eadem purgando erit.

Ferè fit vt vigilie torqueant. Tum conferet frigida odorari. Vt.

℥. ol. viol. & nenuph. ana ʒ. ʒ. aqu. ros. succ. portul. depurati ana ʒ. 3. misce. Pars trahatur per nares. Vel. ℥. caphuræ. grang. 8. aut ʒ. ʒ. dissol. in aqua. ros. quam æger odoretur sape. Vel. ℥. flor. viol. ros. rub. nenuph. ana ʒ. 2. caphur. ʒ. 1. cum gummi tragacanth. in aqua. ros. dissoluto f. pom. odoriferu. Vel hæc potio hypnotica exhibeatur ℥. syrup. nenuph. & papauerini ana ʒ. 6. cum aq. decoct. lact. & portul. f. potio danda dormituro.

Materia biliosa quia facilè ob leuitatem, raritatem & tenuitatem exhalat, vix vllas sui reliquias in capite superstites facit, quæ diaphoreticis egeant.

Pituitosæ cephalalg. interna causa est pituita: ex- *Pituitos. ce-*  
terna, victus frigidus & humidus, deses vita, somnus *phal. caus. &*  
multus, curarum vacuitas, satietas assidua. Signa, *sign.*  
grauans & tensiuus dolor cum totius corporis gra-  
uitate coniunctus, magna in somnū propensio, pi-  
gritia, albicans facies & œdemato sa, frigentia tem-  
pora, oculi, nares, os humētia, nulla sitis, pulsus par-  
uus, pituitosum temperamētum, ætas, anni tempus,  
cæli constitutio, &c.

Victus sit calefaciens, tenuans & siccans, quo le-  
uantur omnia corpora, quæ frigidis scatent, lentis *Curatio ce-*  
& crassis humoribus. Potus sit vinū, non genero- *phal pituito.*  
sum quidem (nam vaporosum) sed medium. Secun- *Gal. cap. I.*  
dum guaiaci decoctū, aliquot aromatibus cōditū *lib. de atten.*  
nonnulli vino putāt præferendum: alij hydromeli *vict. ratione.*  
simplex vel ī quo thymū, pulegiū, saluia incocta sit.

Purgatio à catapotiis lenioribus incipiat, quæ &  
repurgent ventriculum, & aliqua materiæ parte ca-  
put exonerent.

℞. massæ interioris pil. ex hiera simplici & pil assaiet  
an. ʒ. 2. excipiantur syr. è stœchad. singantur pilulæ molles.  
Vel ℞. cathol. & diaphœn. an. ʒ. ʒ. oxymelit. simp. ʒ. ʒ. cum  
aq. absynth. & beton. vel salu. f. potus.

Hîc rarò sanguis mittitur. Si quid tamen phlebo-  
tomem suadeat, ea temperanda erit, parciore ducto  
sanguine, ne frigidus affectus ingrauescat. Dein pi-  
tuita, quia tenax & cōtumax, vti ferè crassa, lenta, &  
expulsioni minimè est apparatus, incîdi, tenuari &  
tergeri vult. Id consequeris zulapiorum, aut apoze-  
matum vſu.

℞. syr. è stœchade, oxymelitis simpl. vel syr. capill. vener.  
an. ʒ. 1. aquar. salu. & beton. an. ʒ. 2. vel ʒ. 3. f. zulap. pro dosib. 2.  
manè & vesperi sumendis.

*Gal. partic.*  
*10. ca. I lib.*  
*2. de compos.*  
*pharm. natæ*  
*τῆπος.*

## DE MORBIS INTERNIS

Vel apozema tale paretur. ℥. radic. quinq. aperit. ana ʒ. i. radic. ireos acor. an. ʒ. 2. cartha. ʒ. 6. fol. hislop. maiora. beton. calamenth. origan. capill. ven. borrag. & buglos. an. M. ʒ. femin. anis. fœnic. card. glycyrrh. ras. an. ʒ. 2. flor. anth. stœchad. viol. salu. an. p. i. fiat decoctio ad lb. i. In colatura dissol. syru. de bizātiis & de quinq. radic. an. ʒ. 2. vel syr. de hyssop. & oxymelit. simpl. tantundem, f. apozem. clar. conditum cinam. aut nuc. mosch. ʒ. i. pro dosib. 4.

Si febris fuerit, radice fœnic. gram. & oxalid. contentus eris, omissis calidioribus, & calidas herbas cum contrariis bene temperatis vsurpabis. Si purgans esse volueris superius apozema, addes in fine decoctionis agaricum, sennam, & id genus purgation. Vel post præparatos tantum ab apozemate humores hæc potio imperatur.

℥. agar. recens troch. ʒ. 4. vel ʒ. i. fol. sennæ mundat. ʒ. 2. infundantur in hydromelite, vel in dosi prædicti apoz. addit. zinziber. gr. ʒ. In express. dissol. diacart. ʒ. 2. syr. laxat. ros. pall. ʒ. ʒ. f. potio.

Robustioribus ægris pilulæ valentiores cum syru. aut aquis, in quibus nonnihil turpethi sit maceratū emollitæ, præscribuntur. Post vniuersalem purgationē sequitur particularis, quæ errhinis, apophlegmatis, litubus, sacculis, embrochis, cucuphis, affixis cucurbitulis perficitur, quæ omnia sunt fusissimè ab Hollerio tradita.

*Melanchol.  
cephal. sign.  
& curatio.*

Melancholica cephalalgia his proditur signis, plūbeo liuore, frigore modico, graui, obtuso, perseuerante dolore, somno leui, depresso pulsu ægri temperamento melancholico. Vitæ modus idem ferè, qui in pituitosa. Purgantia accōmodata melancholico succo hūc referēda, catholic. confect. hamech, pil. de fumaria. Eodem pertinebunt apozemata bilem atrā præparantia, & alia eiusmodi, ex aliorū af-

fectuum melancholicorum curatione petenda. Si consortij seu sympathie lege caput afficiatur, ut cum à toto corpore, aut aliqua parte vitium manat, quod ipsi capiti sit commune, primario affectui primùm, dein capiti consulatur.

*De 1 diuturnis capitis doloribus. Cap. 2.*

**I**N diuturnis capitis doloribus intemperies causa est, vel solutio continui. Intemperies, ut dictum est, sine materia, quæ ubi firmata est, ægerrimè curatur: vel cum materia. Atque hæc ferè frigidus vapor & flatus, vel materia crassa est & frigida. Flatus aliquando ex inopia caloris & materia alimentis: aliquando alimenti vitio: nonnunquam vitio pituitæ crassæ & viscidæ, quæ membranis inhærescit, unde vehemens distentio membranarum, ut inde futuræ relaxentur. Atque hic sensus primùm frigoris, quanquam aliquando agitatione materiæ & putredine calor succendatur, ubi iam febris, & aliquando inflammatio succedit. Sed sine his, quasi maleolis obtusis, acutis, feriantur, dolent. 4 Rariùs arteriarum vitio & bilis permixtæ flatibus, aut aliis de causis. Ex signis iam dictis, antecedente vitâ, temperamento cum totius corporis, tum præcipuè capitis: deinde etiam viscerum & aliis de causis requiringdum.

Iam diuturno & contumaci morbo, postquam solennia remedia fuerint celebrata, caput tondatur, aut radatur ad cutem: tum fortioribus utemur remediis, quale est oleum de castoreo, & euphorbio, quod confici oportet ex lb. 1. olei de keiri, & 3. lb. euphorbij, vel castorei, quale hoc est.

1 De cephalæa vulgò dicta, quæ est cephalalgia cõtumax, & diuturna, cû maximis cõtuncta paroxysmi, leui de causa oboritur.

2 Crassus, qui exitum non habet.

3 Quod est symptoma flatus.

4 Quod deprehenditur ex colore, habitu & actionibus principib. natural. & vital.

## DE MORB. INTERNIS

℥.olei de keiri ℥.β.ceræ ℥.i.β.liquefiant in vase duplici, deinde infperge euphorbij drach. 2. plus minufue.

5 *Humor ē capite maſti- catorij nō eſt enociuſ in,* Oppugnandus quoque morbus eſt ꝑ maſticato- riis, apophlegmatifmis, caputpurgiis, errhinis, po- nis odoratis, ſacculis, vel cucuphis.

### *Maſticatoria.*

℥.maſtichis 3.2. piperis 3.1.radicis capparis 3.β. qui ſunt an- guſto pectore & tate ob- noxiꝝ. cum aceto ſcyllitico formetur tres pilulæ, teneat in ore & mandat. Idem facit illud.

℥. ſtaphyſagriæ pulueriſatæ, condifi ana drach. 2.excipiantur melle, ſiant trochiſci, teneantur in o- re. Aliud.

℥. pyrethri, ſtaphyſagriæ ana ʒ.2. liquiritiæ ʒ.1. maſtichis 3.1. ſiant pilulæ.

### *Apophlegmatiſmi.*

℥. ſinapi 3. β. hyſſopi ꝑ.2. fiat decoctio in vino rubro cum modico melle, fiat gargarifmus.

### *Errhina.*

6 *Albo.*

7 *Fiunt hi trochiſci ex ligno aloes, ambra & moſcho.*

Errhinum caputpurgium fit ex ſucco, vel aqua maioranæ, betæ, anagallidis, cucumeris agreſtis, ad- iecto pipere, caſtoreo, euphorbio, elaterio, 6 hel- leboro, condifo, gallia 7 moſchata, pyrethro, pa- ne porcino, ſinapi, moſcho. Succu itaque tepidi & excepti volâ manus naribus attrahantur: pulueres inſufflentur in nares, aut alicui oleo commixti illi- nuntur, vt oleo de coſto, de ſpica, irino, & ſimili. Delicatis additur modicum moſchi, aut ambra, quale hoc eſt.

℥. olei de ſpica vnc. 1. elaterij drach. 1. in diuiti- bus adde moſch. gr. 2. illinantur nares interiores.

*Aliud.*

℞. succi maioranæ vnc. 2. succi betæ ʒ. i. aceti scyllitici vnc. β. misce, fiat erihinum, attrahat tepidum naribus. Vel.

℞. pipetis, castorei ana ʒ. i. hellebori, galliæ moschatæ ana ʒ. β. fiat puluis. Modicum insuffletur in nares.

*Pomum odoratum.*

℞. Cinamomi, caryophyllorum, nucis moschatæ, ligni aloës, pulu. maioranæ, ana ʒ. 2. galliæ moschatæ ʒ. i. moschi, ambræ ana gr. 2. fiat puluis omnium: deinde cum ladano & mastiche agitatis in mortario cum modico oleo de spica, de costo, de ben, fiat pomum.

*Cucupha.*

℞. sem. cumini, & fœn. baccarum lauri ana ʒ. 2. nucis moschatæ, cinamomi, caryoph. ana ʒ. i. galliæ moschatæ, mastichis, sandarachæ ana ʒ. 2. Fiat puluis omnium pro 8 Cucupha facta cum rasura scarlatæ. Extrema remedia sunt raso capillo Sinapismi, Dropaces, Phœnigmi, Cauteria, & Paracentesis, Seton, vitatis neruis. Sed de his alio loco.

*Curatio 9 sode per 10 communitatem.*

℞. aloës optimæ ʒ. i. cina. xylobalsami, asari, spicæ nardi, mastichis ana gr. 6. croci gr. 4. fiat puluis, detur cum ʒ. 3. aut 4. aquæ, aut feri lactis.

Proportio aloës est centum ad sex. In delicatioribus verò loco aloës, debemus imperare ʒ. 4. Rhabbari.

Si sit à reliquiis luis venereæ decoctum guaiaci, & accommodata topica vsurpabuntur secundum rationem. Materia vbi pertinax, emplastris mercu-

8 Præstat sine cucupha puluerē capi-  
ti inspergere.  
9 diuturni ca-  
pituli doloris.  
10 per vteri,  
ventriculi,  
hepatu sym-  
pathiam: vel  
etiam à toto  
corpore reli-  
quo, suppress-  
sis aliquando  
hemorrhoidi-  
bus mensib. ut  
mulieribus,  
aut alia va-  
cuatione, ut  
stercoris, san-  
guinis è nari-  
bus, &c.



# DE MORB. INTERNIS

rialibus & vnguentis locus erit.

A carie subiecti ossis, vel abscessu dolor certo loco designatur, cutis ab osse tandem discedit. Cutem in crucem incidito: materiam vacuato: os radito: inurito. Maior est læsio, cum secunda in lamina vitium delitescit, vel osse interiore: vbi tantum excisione ossis est opus.

## EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

*Masticatoria*] Pituitam purgant ex attrahentibus parata, vt pyrethro, staphysagria, cubebis, &c. Digerunt ex resiccantibus magis, quàm calfacientibus, vt mastiche, nuce moschata, &c. Modus vtendi est, vt sacculis reponantur, aut excipiantur ficibus, cera alba, aut vino incocta contineantur ore, aut per se fumantur. Nocent, si fuerint vlcera in ore, vel faucibus, vel pulmones oportuni vlceri, phlegmoni, fluxioni. Tunc errhina commodiora, quæ materiam deducant ad nares. Nam etiam si humor illeclus è capite, vel mungendo, vel expuendo repurgetur, fit tamen humori consuetum iter, & noctu inter dormiendum ad partes infirmas delabitur. Tempus vtendi matutinum, & ante cibum.

*Masticato-  
riis vtendi  
modus.*

*Masticato-  
ria quibus  
infesta sint.*

*Masticato-  
riis vtendi  
tempus.*

*Errhina ex  
quibus com-  
parentur.*

*Errhina*] Sicca ex acri materia fiunt, elaterio, pipere, sinapi, helleboro, melanthio, cyclamino, maiorana sicca pyrethro, hyssopo, thymo, satireia, anagallide, & similibus. Liquida ex iisdem exsiccatis, vel liquore mixtis, succo betæ, foliorum hederæ, quibus & arida permiscantur. Sicca insufflantur corniculo, vel fistula, vel inspirando trahuntur, vel excepta oleo illiuntur, vel ex aceto, aqua maioranæ, hyssopi, aquâ vitæ inuoluta linteolo raro in formâ noduli admouetur naribus. Liquida attrahuntur tepidè. Efficacissima sunt, addito scamonio, & farina excepta, vt adhæreant. Post horum vsum, si mordicatio percipiatur, lac muliebre in nares iniiciendum, vel oleum violatum. Tempus vtendi matutinum, longè à cibo: à balneo, vel aliter laxata cute. Ab imbecillioribus paulatim transeundum ad fortiora, vt euphorbium, elaterium, lacte, mucaginibus, butyro prius temperata. Nocent oculis imbecillioribus, & iam

laborantibus, atque ubi natus oportunus est vlceribus, vt aliquando in lue venerea. Tum satius gargarismatis vti, quæ ab oculis diuertunt. Sternutatoria nocent in defluxione ad pulmones: iuuant, quibus caput vaporibus repletum est, & quib. iam tenuata, incisa, & incocta est materia. Adhæc caput antè per nares, medium per choanam & palatum, posterius per nucham, neruos, & venas magis purgatur.

*Cucupha*] Puluis capiti inspersus commodior. Excutitur, & nouus manè reponitur. Cucuphæ semper eadem adhibitæ, & sudore ac pinguedine imbutæ, sæpiùs nocent. Sunt tamen loco pilei. In dolore pertinaci fots, emplastra, sinapisinus, saluatio cū mercurio, venæ particulares sectæ, cauteria, vel emplastra, quæ metallica recipiant acria, & exulcerent, mixtis tamen deterforiis, ne nimium poros obstruât, cōuenient. Et hæc quidem magis, vbi proprium est capitis vitium, & primum.

## ANTO. VALETII EXERCIT. II.

**C**Ephalæa, seu contumax & perscuerans capitis dolor, causis & signis à cephalalgia non differt, sed sola magnitudine causæ. Si tamen spiritum φυσώδη (latuosum vulgò vocant) causam habeat, splendente faciei tumore, turgido dolore, aurium tinnitu, vertigine, volatu in somnio, magis interno-scitur.

Idem remediis profligatur, quibus cephalalgia pituitosa, nisi quod valentiora requirit, vt est ferè *Cephalæa* crassa magis ac viscida materia. Prima purgatio erit *curatio*. huiusmodi.

℞. mass. inter. pil. de agar. 3. ss. massæ pil. aurear. & cocciar. ana ℥. i. emolliantur simul cum syr. de stœchad. f. pilul. molles. cap. noctu à primo somno.

Mox conuenienti apozemate præparanda materia, quale paulò antè descriptum est. Nonnulli apozematum loco decoctum guaiaci, aut salsæ parillæ vsurpant ad sudorum prouocationem. Vt.

## DE MORB. INTERNIS

℥. fals. parill. ʒ. 2. β. macerentur in aqu. fontan. ℥. 8. per 12. horas super cineres calid. Bulliant postmodum vsque ad tertiæ partis consumptionem in vase terreo, plumbato, & benè cooperulato. Fiat colatura, qua vtatur singulis matutinis hora quinta. Dosis sit ʒ. 6. Alij in ℥. 12. aqu. macerant fals. parill. ʒ. 4. vel. 6.

Efficacius decoctū habebis ex interioris guaiaci ℥. β. & corticis eiusdem ʒ. 2. ex arte maceratis & coctis. Vfus erit per dies 8. 9. 15. pro consulti medici arbitrio. Magma superioris decocti, cui addita sit falsæ parill. ʒ. 1. coquitur in ℥. 12. aquæ, vt potui detur, vini loco. Et quia subinde purgandum, poterit hæc pilularum massa concinnari, de qua alternis dieb. ʒ. 1. aut ʒ. 4. capiat.

℥. massæ inter. pilul. sine quib. & cocciat. ana ʒ. 4. agarie. recens trochisc. rhei elect. pul. an. ʒ. 2. aquæ infusionis ʒ. 1. turpethi in aqua beton. vel salu. infusi cum gr. 6. zinziber. f. massa pil. cap. vt dictum est.

Erit quoque locus clysteribus acrioribus, pituitam deorsum auertentibus. Qualis hic erit.

℥. malu. bisinal. parietar. mercur. an. M. 1. fol. centaur. paru. salu. hyssop. maioran. origan. ana M. β. sem. anis. fœnic. ana ʒ. 2. florum anth. aneth. chamæm. melil. ana p. 1. f. decoct. in hydromelit. ad ℥. 1. In colatur. dissol. hieræ picr. benedict. laxat. ana ʒ. β. vel ana ʒ. 5. mellis anthos. sacchar. rubr. ana ʒ. 10. olei chamæm. & aneth. ana ʒ. 1. β. f. clyster.

Interim toto curationis tempore nō negligenda particularia, vt errhina, apophlegmata, &c.

℥. puluer. nigell. Rom. maceratæ in aceto fortiss. per 24. hor. ac exsiccatæ ʒ. 3. succi maioran. cum pauc. vino alb. extract. ʒ. 1. Pone in phial. pro caputpurgio indendo in nares quotidie manè.

Eodem pertinebunt gargarismata, sternutamenta, suffitus, frictiones capitis cum linteo aspero. Quod si neque his, neque illis præsidii cesserit do-

lor, postremum erit remedium, cauterum ceruici, <sup>1 Aristotel.</sup>  
 vel brachio ad musculum deltoïda vocatum, quâ <sup>sectio. 3. pro-</sup>  
 vena perreptat humeralis, affigere, quò commodè <sup>blematum.</sup>  
 deriuari, ac retrahi materia possit. <sup>2 Hippocr.</sup>  
<sup>aphor. 5. li. 5.</sup>

*De dolore capitis ab ebrietate.* CAP. 3.

**E**Brietas <sup>1</sup> grauissima adfert symptomata, eaque <sup>3</sup> *Vt ex ra-*  
 partim subitanea, partim longo tempore con- *dice cyperi,*  
 tracta, quale istud est annotatum <sup>2</sup> ab Hippocra- *acoro vero,*  
 te, Si quis ebrius repentè obmutuerit, &c. & quæ à *caryophyl.*  
 Galeno annotata sunt cap. 5. lib. 5. de locis affectis, *absynth. mè-*  
 epilepsiæ, dementiæ, conuulsiones. Si dolor capitis *tha origan.*  
 solius à crapula hesternâ, motus, & crudum vinum *sit sac. ulus*  
 in stomacho restiterit, vomitus, aut malè vomenti- *ventriculo*  
 bus ieiunium, <sup>3</sup> ventriculi fatus, & illitus, qui con- *ad mouendus.*  
 coquunt, remedio sunt. Vbi vacuus <sup>4</sup> venter est, & *Vomitio*  
 tamen <sup>3</sup> vaporibus dolor commouetur, non sine *& fatus.*  
 ratione vulgò persuasum, vini noxam vini potu e- <sup>5</sup> *Hic enim*  
 lui, quia inde vapores crassi disperguntur eo mo- *exitum non*  
 do, quo dolores oculorum inde ortos scripsit Hip- *habeant, di-*  
 pocrates <sup>6</sup> meracâ potione discuti. Somnus, ine- *stentione dolo-*  
 dia, quies optima: eibi enchymi, qui facilè coquan- *rem pariunt.*  
 tur, <sup>5</sup> gallorum testes in aqua hordei cocti, pulli <sup>6</sup> *Sect. 6. li.*  
 columbarum, pisces saxatiles & molli carne. Si a- *2. Epidem.*  
 quæ potus noxius, vtatur hydroporato cum vino <sup>7</sup> *Gallorum*  
 granatorum, zulapio Alexandrino: malis & pyris *testes nō sint*  
 adstringentibus in vapore coctis. In doloris incre- *veterū: sunt*  
 mento & vigore, quiescat: in declinatione vmbro- *enim virosi*  
 so loco, si caleat, obambulet: aut calido, si frigeat. *& effecti.*  
 Ante cibum diutiùs & paulò celerius obambulan-  
 dum: à cibo lentiùs & breuiùs, idque duabus pòst,  
 aut tribus horis. Ebrietati naturali quadam pro-

## DE MORB. INTERNIS

prietate repugnant amygdalæ amaræ, brassica, cuius meminit Theophrastus quarto de historia stirpium. In principio siquidem crudum vinum concoctum, vel reiectum fuerit, vtere iis quæ æstum sedant: in declinatione balneum, itémque litus ex oleis sine calore multo digerentibus proderunt.

### EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

*Galen. cōmē.  
in Aphor. 5.  
lib. 5. Aph.*

*Vini potio  
immoderata  
qui grauis-  
sima sympto-  
mata indu-  
cat.*

κραπάλη, Hippocrati dicitur hæc affectio, nostris crapula, omnis nimirum noxa è vino contracta præsertim in cerebro, ἀπὸ τοῦ καρῆνεν πάλλειν. Nec mirum grauisissima symptomata vini immoderata potione induci. Cum enim sit temperatura calidum, substantiâ tenue, vel non admodum crassa, utroque sursum repit: tenuitate promptè omnia penetrat, & in substantiam neruorum ingreditur, ac vaporibus caput & cruditatibus replet: vnde vniuersum corpus necesse est variè affici. Sed quomodo vini noxam eiusdem potio per sanat? Nimirum quæ mala suæ substantiæ tenuis copia inuexit, eadem sua qualitate tollit calefaciendo & exsiccando. Sin minus, periculosa omnia subsequuntur.

### ANTO. VALETII EXERCIT. III.

*Cephalal. ab  
ebriet. curat.  
Paul. Ægin.  
sub finem  
cap. 4. lib. 3.*

**E**Xcitatur à temulentia cephalalgia, vini generosi & largiùs epoti vaporibus calidis caput opplentibus. Restinguitur inedia, somno multo, adstringente, frigidóque cibo, qui vaporum ascensum coërceat. Initio confert aquæ tepentis haustu vomitum ciere, si vinum incoctum adhuc in stomacho fluctuet. Quod si etiam post concoctionem caput indolescat, refrigerantibus & repellentibus, ut oxyrhodino, vtendû. Non semper tutum ad discutiendam ebrietatem vinum exhibere. Cerebrum enim si incaluerit, dolorem auget. Cornu ceruini rasura cum aqua pota naturali quadam & inexplicabili proprietate ebrietatem sedat. Creditur & hic pului-

pulvisculus ad eandem prohibendam, & ad sistendam plurimum facere.

℥. coriand. præpar. gran. oxyacanth. sem. brassic. cidon plantag. spodij ana ʒ. 2. Ex hoc pulv. dentur ʒ. 2. cum succo adstringente, vt limon. granat. aranc.

Fabulosum est, quod medici veteres de polygono coronæ instar capiti imponendo protulerunt.

*De dolore capitis à perfrictione.*

CAP. 4.

**N**on concidit facies, sed est 1 decolor, tardior mens & animæ 2 functiones, frigidis non iuvantur, sed calidis. Calefaciunt oleum rutaceum, <sup>1 Nam quæ sunt propriæ, quæ & vicinæ, et emque communi, ea primò & max. mē affici solent. Hic de humor.</sup> irinum, de spica, de terebinthina, costinum, quibus hyeme rigida, & vbi calore maiore opus est, styracem calamitam, benzoinum, euphorbium aequam vitæ, mythridatium, 3 theriacam, & similia permiscemus. Affectu perseverante, raditur caput, aut detunditur, paulo crassiora medicamenta, quàm in æstu, adhibentur: sed tonsis, & capillo paucò, aliquo tamen tectis, liquidiora. Ceratum de euphorbio, ex olei anethi ʒ. 10. tribus ceræ, vna euphorbij. 4 Sinapismus capitella, diachylum treatu, & similia conueniunt. Non est vitendum phlebotomia, cucurbitulis, remediis luis venereæ, vbi sola intemperies est. Alimenta, vinum tenue, cibus calidus. 5 balneum, motus, loci calidi habitatio, odor suavis, calidus, 6 illitus narium, auris frictio.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

De hoc dolore à frigore, lege Aurelianum primo Chron. Rarò huiusmodi dolores ex sola intemperie fiunt: & si fiant, breui materiam accumulanti, præsertim in plenitudine laborantibus, & cacochymis.

# DE MORB. INTERNIS

## ANTO. VALETII EXERCIT. III.

*Cepha'a'g.  
à frigore cu-  
ratio.*

**C**apitis dolor à frigore suis causis & signis satis innotescit. Vini subtilis & oligophori potu, moderata corporis motione, & aliis calfacientibus, ac frictionibus ex linteis calentibus, iuuatur. Caput imprimis sacculis foueatur.

℥. fufur. macr. ℥. β. milij quart 1. falis friat. 3. 1. torrefiant omnia simul in fartagine: fiant sacculi duo interpuncti, vt decet, qui alternatim manè & serò capiti admoueantur. Efficaciores erunt additis cephalic. herbar. puluerib. seminibus calid. vt. ℥. fuf. macr. mil com. fal. vt suprà: salu. maioran. ficc. contuf. ana M. β. sem. anif. fœnic. contuf. aua 3. 1. baccar. laur. iuniper. ana β. omnia simul in fartag. torrefiant: dein ex his duo, vt antè, sacculi parentur Vel. ℥. beton salu. rosmar. ana M. 1. flor. anth. stœchad. chamæ meliloti, summittat. anet. ana P. 1. f. sacculus, qui bulliat in æquis aquæ & vini partibus. Expressus capiti admoueatur, ieiuno ventriculo.

Ab his ad litus pergendum. Parabuntur lini-méta ex oleis ab Authore præscriptis, paucula cera addita. In quibus cauendum, ne sit præceps ad vehementiora trāsitus. His omnibus tentatis si superstes fuerit dolor, certissimum dabit residis materiæ purgatione excludendæ argumentum

A siccitate sola infrequens est capitis dolor: qui si accadat, vehemens animi contentio, insignis aliqua vacuatio, immodica Venus, & similia incusanda sunt. Ex depresso faciei charactere propalam explicatur. Humido victu, pleniore, qui deperditam substantiam instauret, somno liberiore, vita curis soluta percuratur. Si litu visum fuerit opus, ex olei amygdal. dulc. axung. butyr. rec. æqu. partibus compingetur, quo frons & tempora illinentur.

Cæterum si capitis dolor ab ictu ad cranium &

membranas pertigerit, curatio à chirurgia petetur.

*De vertigine. CAP. 5.*

1 *Sin per idiopathiam cerebri, siue per sympathiam.*

2 *Quod sit translata ad neruū opticū materia.*

3 *Inflammatio spiritib⁹, ab astu, & incandescente sanguine.*

4 *Modò nulla perturbatio critica excusatio possit adferri.*

*Tunc enim ad salutē hæmorrhagiam portendunt.*

5 *Vt à pulmonibus & ventriculo: quæ tamen cardiogmo distinguuntur.*

6 *Quæ cardiogmum committit, ex aph. 17. li. 4.*

7 *Cuius inordinatū motum mara-ryga sequitur.*

Δ *ἴσος* Græcis, vertigo nobis, quum caput 1 circummagi videtur. *Σχοτόδιος*, cum etiam tenebræ 2 oculis offunduntur, aut spectra 3 rubentia, quæ denuntiant 4 Maniam: aut rubore saturata, quæ Epilepsiam, ex inordinato motu spirituum & flatuum. Hæc omnia aliquādo gignuntur in capite: aliquando ex 5 inferioribus partibus corporis huiusmodi spiritus efferuntur. Quod iis ferè contingit, qui cruditates colligunt: quibus sæpius hepar calidius est: quibus ex hepate in ventrem regurgitat 6 bilis: quibus præsertim arteriosum genus intemperatum est, plenū feruido & spirituofo 7 sanguine. Itaq; Theophrastus libello de vertigine spiritum & humorem capitis ouo comparat: quod cum fustum habeat humorem, non continuum, dum crudum est, non circumagitur: dum coctum, vertitur, vnito iam, & continuo humore, & æqualiter fuso. Vide Aristotelem probl. 4. sect. 6. Si in capite primū generatur malum, iisdem remediis vtitur pro varietate materiae, quæ in dolore capitis descripta sunt. Si ab arteriis, arteriæ post aures incidantur. Sed cum sit duplex venarum genus & arteriarum, quæ caput ascendant, interiores maiores, exteriores minores, siquidem per has sit fluxio, externa remedia, arteriotomia, venarum incisio &c. cōferunt: si per illas, non conferunt, vt ex cap. 8. libr. 3. locor. mal. affect. dictum est. Nam venæ exteriores, nisi rami sint interiorum, non vacuant interiora. Si à cruditate, ea concoquatur, & temperantior vita instituatur. Si à



# DE MORB. INTERNIS

regurgitante bile, (*sæpè enim tenebricosa quædam bilis ex hepate & intestino in ventriculum regurgitat*) pilulæ hæ singulis hebdomadibus 8 deuorentur.

8 *Ad ex-  
hauriendum  
bilem ex vē-  
triculo.*

9 *Simplicis.*  
10 *Hymen  
ad crudelitatem.*

11 *Ut æstate.*

12 *Vel sac-  
char. in aqua  
rosacea disso-  
luti:*

℞. hieræ 9 picræ, rhab. elect. agar. trochiscati ana 3.ß. mastichis, spicæ, santali citrini, ros. rub. an. gr. 7. cum syrupo ros. fiant nouem pilulæ pro tribus do-  
sibus, sumendis horâ ante cibum. Aliis verò diebus.  
℞. specierum 10 aromatici rosati, 11 specierum  
trialsantali ana 3.ß. 12 sacchari rosati quantum suffi-  
cit, cum syrup. rosato fiat electarium. Reliqua fa-  
cienda sunt, vt diximus in dolore capitis, secundum  
materiæ diuersitatem.

## EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

*ſivos* turbulenta est commotio spirituum crassorum, aut flatuorum, aut solius spiritus cum multo vapore, in anterioribus cerebri ventriculis. *σχοτόſivos* duobus constat symptomaticis, *ſivw* seu vertigine, & tenebrosa oculorum offusione. Inde nomen Græcis compositum tenebricosæ vertiginis à vapore caliginoso. *σκότωμα* pro utrôque sumitur, sæpius pro vertigine. Ab utrôque differt Epilepsia, tum materia, quæ est humor vel vapor: tum symptomate, quia conuulsionem affert. Hypochyma longè alius affectus ab omnibus. Habet enim causam coniunctam in oculo, non in cerebro, nimirum aquam vel fumum. Quicquid ergo turbulentos illos spiritus procreare, vel procreatos commouere potest, siue internum sit, siue externum, vertiginis causa est. In capite primario affecto causæ sunt humores repente ac vehementer agitati, animi affectiones: omnis intemperies siue arteriarum, siue cerebri coctionem impediens, aut corrumpens: præsertim calida, humores extenuans, & in feruorem agens, aut multos vapores generans: frigida, cruditatis parens, indeque multorum & crassorum vaporum, vnde senum diuturnæ vertigines apud Hip-  
pocratem: meatuum quoque densitas & obstructio, vnde va-

*Vertiginis  
primariæ cau-  
sa quæ sint.*

*Gale. comm.  
in aph. 31. li. 3*

pores intercluduntur, & vt in fornace, per ventriculos circumaguntur: naturæ conatus in secernendis humoribus per crisim: translata ad cerebrum materia post crises imperfectas mittuntur autem ad cerebrum vapores è ventriculo per inedia, calore (alimenti inopiâ) humores noxios exagitante, acres incidente, calfaciente, & ventriculum prauis succis replente: per cruditates, caloris natiui imbecillitate, qui vapores secer- nit, secretos dissoluere nequit. Aliquando humor illic prauus aceruatur, vel genitus, vel aliunde accitus, vel cibus cor- ruptus cōtinetur. Idem fit ab aliis visceribus, hepate, liene, vtero, toto corpore, excementis retentis, hæmorrhoidibus sup- pressis. Primario caput affici conijcimus, si sensus externi sen- sim læduntur, si in nulla parte inferiore vitium præcessit. Ab impuro corpore, cerebro infirmo, si coctionis tempore, & cum à somno surgunt, vehementius vertuntur, si tenuis sit vrina pauca, aluus dura, color cutis similis humori. A ven- triculo, si nausæ, deiectionis appetentia, stomachi dolor, & simi- lia præcellerint. Curatio perficitur sublatiis causis per contra- ria sanguinis missione (si conueniat) è cephalica, vel mediana vel basilica, ex arteriis post aures, cauterio. In vaporibus à materia calida primùm digerendo, deinde vacuando, postea adstringendo, vapores prohibendo pulueribus, opiatis, simi- libus: per topica discutiendo, roborando: ieiunos reficiendo optimis alimentis, & citò nutrientibus. Nocet capitis frictio nisi post purgationem, vel aliarum partium frictionem. In ca- pite fiat panno sicco: partibus inferioribus, calido.

*Vertiginis*

*per protopa-  
the. à cerebri  
facta signa.*

*Vertiginis ex  
partium in-  
feriorū sym-  
ptōma si-  
gna.*

*Spectra rubentia.* ] Hippocrati & Aureliano *μαρμαρυγαί* di- *Hipoc. sent.*  
cuntur *λαμπρόνους πυκναί πυράδες* spectra rubra oculis ob- *33 li 3. Prog.*  
uerfiantia, è quibusde humore peccante coniecturam facimus *Cal Aureli.*  
Aliis *ἀμαρυγαί ἢ μαρμαρίνας*. Est autem facilis transitus ver- *cap. 2. & 1.*  
tiginis ad Epilepsiam, vnde & veteres paruum Epilepsiam vo- *Chronicon.*  
cauerunt.

## ANTO. VALETII EXERCIT. V.

Estigo duplex: simplex, & tenebricosa: vtrâq;  
maioris & minoris ratione distincta. Illa enim

## DE MORB. INTERNIS

leuior:hæc grauior,quòd à causa fit potentiore. Vtriùsque causæ & signa quibus inter se seiungantur, fusè repetita sunt ab Hollerio ex Gal.cap. 38. libr. tert.de loc.mal.aff. comment ad Aphor. 17. libro tert.& ad sent. 42. lib. quart. de vict. rat.in morbo acut.

Si primaria affectio, an ab intemperie cerebri calida,arterioso genere intemperato,venis feruido & spumoso sanguine plenis, an sit à frigida, considerandum.Si ab illa,reprimētium vsus, vt oxyrhodini,reuellentium,vt phlebotomiæ,& cucurbitularū longinquis primūm partibus, maioris ergò reuulsionis,vt tibijs,dein interscapulio affigendarum,indicatur.Veteres etiam arterias secuerunt,cum videlicet vapor exteriores per arterias ascenderet. Ante admotas ceruici cucurbitulas aluus blando cathartico,aut enemate subducitur, ne vapor in caput ab his affixis concedat.

Interim sumenda sunt, quæ turbulentos sistant spirituum motus,vt zulap.rosac.syr.granatorū, de acetosit.citri,cum aquis planrag.rosar.lactuc.& simil. In causa frigida purgatio ex catapotiis erit ex vsu,vt ex coccis & pilull. de agaric.æquis partibus mistis,& cū syrupo de stœchad.malaxatis.Hûc pertinebūt apophlegmatismata, & alia id genus particularia in cephalalgia pituitosa commemorata.

Commendatur maximè hic puluis.℞.sal.℥.2. flor.lauendul.hysop.menth.ana℥.1. cariophyll. nuc.moschat.cinam.elect.zinziber. albi, granor. paradisi, zedoariæ, galangæ ana℥.1. calam.arom.℥.2. granor. iuniper.℥.3. granor. pæon.℥.1. fiat puluis, de quo detur.℥.1. manè, & circa

somnum. Sunt qui vermem sericum facientem ex-  
 ficcant, in puluerem redigunt, vertici capitis verti-  
 gini & conuulsioni obnoxiiis inspergunt, cuius mi-  
 rabiles effectus esse volunt. Hoc puluere Carol.  
 Quint. Imperator frequentissimè utebatur.

Si fiat per ventriculi consensum, purgabitur hu-  
 mor, qui os ventriculi lancinat, pilul. de hiera, ag-  
 grægatiuis, & similibus syrupo de absynthio ex-  
 ceptis. Prohibebitur aditu ad cerebrum vapor aniso  
 condito, ex cochleari à pastu dato, puluisculis reprimen-  
 tibus è coriandr. ros. cinamomo.

Interea roborabitur ventriculus sumptis tabellis  
 diarhod. Abbat. aromatic. rosati.

Quod si bilis ab hepate in ventriculum confluat,  
 medendum hepati diluto rhei in decocto hepatico  
 vel aquis hepaticis, syrup. de cichor. de endiuia, ta-  
 bellis diatrasantal. cerato santalino.

## De Phrenitide.

## CAP. 6.

**P**hreniticos ita 1 curabis. Vitibus integris 2  
 sanguinem detrahes è 3 cephalica (nisi ple-  
 nitudo 4 adsit, alioqui enim oporteret 5 priùs  
 secare iecorariam) angusto 6 foramine, vt vul-  
 nus celerius coalescat. Quod etiam fideliter liga-  
 bis, aut 7 pice obduces, ne temeritate phreniti-  
 ci dissoluatur, & ita prorumpat sanguis. Obseruan-  
 dum tempus, quo minùs furere videatur. Ministris  
 quoq; opus est, qui phreniticum contineant: alio-  
 qui periculum, ne agitatione corporis vena phlebo-  
 tomum eludat, aut amplior adigatur plaga, vel lo-

6 Ne ampla fiat spirituum dissipatio. 7 Vel linamento ex aloë, albumine cui  
 & pilis leporum confecto.

1 Si modò  
 phrenitis cu-  
 ratione pos-  
 sit respere,  
 vt nec repèd  
 phrenitidis  
 paroxysmus  
 ex diuturna  
 generatione  
 oboriatur:  
 nec phreniti-  
 cis sit tremu-  
 lus, aut etiam  
 fanaticus, cū  
 alius extremē  
 tis biliosa  
 tinctura ex-  
 pertibus, &  
 impedimento  
 partium, qua-  
 rum officio vi-  
 ta carere ne-  
 quit.

2 Sine villo  
 infirmitatis  
 metus.  
 3 Ad causæ  
 coniunctæ re-  
 motionem, &  
 antecedentis  
 auersionem.  
 4 Vniuersi  
 scilicet corpo-  
 ris, ad vasu-  
 5 Nisi etiam  
 symptoma  
 prohibeatur.

## DE MORB. INTERNIS

cus turpiter laceretur. Detrahatur pro viribus, vitato animi deliquio. Paulus in iis, qui nitium corpus agitant, venam in fronte, alij venam nasi, Diodorus venam sub lingua diuidit. Nonnulli sanguifugas fronti, temporibus, naso, caluariæ infigunt. Sunt, qui auriculas scarificent. Sed hæc omnia non nisi progressu morbo & vacuato corpore tempestiua sunt.

De aëre, vbi collocentur, iam olim disputatum est. Antiqui ferè tales agrotos in tenebris continebant, tum quia in luce spiritus agitati furorem exasperarent: tenebras quoque ad somnum & quietem conducere existimabant. Asclepiades phreniticos in lumine esse habendos dixit, quia tenebræ terreant, quia lucido loco sensus occupantur, atque interim mens quiescat. In tenebris verò quietis sensibus, mēs alris cogitationibus & visis sese exagitat.

Et propterea idem dicebat nulla re magis phreniticos reuocari, quàm harmonia & Musica, vt constat ex Athenæo. Sed hoc ferè Græcis & Latinis placuit, vt qui luce 8 offenditur, habeatur in tenebris, aut mediocri luce collocetur: quem tenebræ lædunt, in luce collocato: qui vtroque pariter offenditur, mediocri luci habeatur. Et si vires valent, lucido magis: si infirmæ, magis tenebroso iuuatur. Hæc & alia plura apud Celsum & Aurelium de morbis acutis.

Fuit & alia controuerfia de tondendis, 9 aut radendis phreniticiis. Asclepiades radi noluit, nec etiã tondi, quia videlicet raso capillo aut detōso copiosior materia in caput attollitur, vnde capilli fruticāt magis, & seges detonsa vberius prouenit. Itaque

8 Spirituum  
dissipatione,  
Et humoris  
biliosi orgas-  
mo.

9 Ad arcen-  
dam materiã  
infringẽ am  
et digerendã

cum oporteat materiam è capite reuelli, non in caput attrahi, non erunt tondendi. Hoc verò reliquis omnibus Medicis placuit. Tondendi phrenitici (*ab initio*) radendi etiam, nisi prohibeat frigus, remissionis tempore, longius à cibo. Sic enim remedia commodius adhibentur, caput leuatur onere, & fumi facilius digeruntur. Missio sanguine moliusculis 10 clysteribus (*Cauendo à calidis, vt hiera, benedicta*) vtemur: interim etiam acriusculis, & maximè, si phlebotomia omissa est, qualis hic est.

10 *Ad resolutionem bilis.*

*Talis autem*

*clyster impet-*

*rari poterit*

*℥. deco lact.*

*plantag. nen-*

*nuph. pariet-*

*aria, althæa*

*℥b. 1. In qua*

*dissolue. ca-*

*tholici 3. 6.*

*mell. ros. colat*

*ti, sacch. alb.*

*ana 3. 1. olei*

*viol. 3. 3. sal.*

*côm. 3. 2. fiat*

*clyster.*

11 *Hæc pur-*

*gatio aptè*

*præscribetur*

*℥. fol. endi-*

*scario. scab.*

*acetos. flor.*

*trium cordia*

*ana p. 1. 1. a-*

*marind. pass.*

*mund. polyp.*

*queru. an. 3.*

*3 sem. acetos.*

*melon. cucur.*

*an. 3. 1. f. de-*

*coct. in qua*

*infunde rhei*

*elect. 3. 1. fun-*

*tal. cur. 3. 1.*

℥. decoctionis furfurum ℥b. 3. In qua dissolue cathol. 3. 6. sacch. rub. mellis ros. colati ana 3. 1. ol. violati 3. 3. salis cômunis 3. 2. Imperandæ etiam 11 purgationes leues (*& in pauca quantitate, ne calfaciant & agitent humores*) quales descriptæ sunt in dolore capitis ab humore bilioso, aut hæ.

℥. succi granatorum acidorū & dulcium ana 3. 1. 3. sacchari in aqua endiuixæ dissol. 3. 6. fiat potus. vel

℥. succi ros. 3. 2. sacchari similiter dissol. 3. 6. leuiter ferueant in calidis cineribus. Opulentos adhibitis ministris continebis, aut etiam vinculis colligabis, vt pauperes. Vincula enim motum retinent, & materiam è capite reuellunt.

### Topica.

Vitandus assiduus refrigerantium vsus, ne in Lethargum commutetur morbus: deinde quia constringunt poros, vnde fumi in capite retinentur. Licebit vti iis, quæ in capitis dolore calido descripta sunt. Primum quidem repellentibus: deinde iis erit admiscendum aliquid chamæmelini olei.

*Inexpres. dissol. cathol. vel cass. 3. 8. syr. ros. pall. lax. 3. 8. fiat potio.*

## DE MORB. INTERNIS

Apij succus, aut alius fortioris, vt calament. & origani, ad resoluendum addi poterit, sed non nisi declinante morbo. Licebit etiam vti in declinatione 12 oleo, in quo serpillum, & alia eiusmodi coxerint, vt concilietur somnus. Hordeata parentur ex aqua decocti quatuor seminum frigidorum. Perfundatur caput & facies, abluantur pedes & manus, excipiat quoque vapor hoc modo.

12 *Ad digerendum.*

℥. violarum, hordei excorticati, capitum papaueris albi, rad. 13 mandragoræ ana M. 1. fiat decoctio in aqua purissima. Vbi refrixerit facies ægri, inde abluantur pedes quoque & manus. Deinde sponsa immersa in his, id est, in decocto, subinde naribus admoueat.

13 *Mascula.*

Iuscula cum capite vno papaueris albi coquantur, multa lactuca alterentur, vel hoc nodulo.

℥. quatuor sem. frigidorum maiorum, papauer. albi ana 3. s. fiat nodulus, qui imponatur in iusculis. Utatur cichorio & lactuca elixis, & modico saccharo violato conspersis.

### Frontalia.

℥. ol. ros. 3. 1. aceti 3. 2. populeonis (*ad somnum: sed recens esse debet, quia antiquum calfacit*) 3. 2. misce pro frontali. Oleum, in quo viua torpedo extincta sit, ac deinde coxerit, in quo lactuca coxerit, folia aut capita papaueris recentis, oleum violatum, de nenuphare, de papauere, de mādragora, de cucurbita.

Vel ℥. olei rosarum, nympheæ & papaueris alb. aceti, aq. stillatitiæ solan. & betonicæ ana 3. s. mista agitetur pro embrocha frontis & syncipit. Item ℥. vnguenti populei & rosacei aceto lotorū ana 6. 3. s.

feminis papaueris alb. & psylij contusorū, ceræ ana  
 ℥.β. malaxentur, & cōcorporentur in cerati formā,  
 quod inductum linteo fronti circundetur. Aut.

℥.olei de mandrag. vel de aliquo alio ex suprà  
 dictis ℥. 2. populeonis ℥.β. aceti ℥. 2. Agitentur &  
 misceantur pro frontali. Aliud fortius.

℥. 14 opij, croci ana ℥. i. distemperentur in vini 14 *Succi pa-*  
 albi, & aquæ ros. ana ℥. i. cum linteolo in eo made- *paueris ni-*  
 facto fiat frontale. *gri. Ceterum*  
*hæc adhiben-*

Chelidonij terrestris manipuli 2. vel 3. coquuntur,  
 lana vel stuppis excipiuntur, & raso capiti, empla- *tur, quæ sym-*  
 stri modo, vtiliter imponuntur. Ad id quoque fa- *ptomatum*  
 cient odoratus rerum frigidarum. Nec desunt, qui *summa sunt*  
 caphuram è collo ad cor suspensam commendent. *omnia.*

Conciliato somno, & experrecto ægro, facies  
 abluatur decocto cham. aut anethi. Non vtendum  
 somniferis, quæ intrò sumuntur, nisi vires valeant:  
 alioqui horum vsu languidus calor extinguitur.

*Potio ad somnum.*

℥. syrup. de nenuph. syrup. de papau. ana ℥. 6. de-  
 cocti lactuc. β. 2. fiat potus, detur horâ somni. Alia.

℥. lactucarum P. i. 15 dactylos N. 3. caput vnum 15 *Dactyli*  
 papaueris albi: fiat decoctio ad ℥. 4. In quibus disso. *phreneticis*  
 syrup. 16 ros. ℥. i. β. misce, detur horâ somni. *non exhiben-*  
*di, quod va-*

Vel. ℥. lactuc. nouell. M. i. florum violar. nenuph. *poribus ca-*  
 ana p. i. feminis papau. alb. sem. melonum ana ℥. 2. *put oppleat.*  
 fiat decoct. pro vna dosi: in colat. dissol. syrupi de 16 *De siccis*  
 papau. ℥. i. vel eiusdem syrupi, & diacodij sine spe- *valgò dicti.*

ciebus ana ℥. 6. vel syrup. ros. sicc. & de nenuphare  
 ana tantundem, fiat zulapium clarum: condiat  
 pauculo santalo citrino, vel cinamom. crassius con-  
 quassato.



## DE MORB. INTERNIS

℞. ros. violarum, absynthij an. ℥. β. opij gr. i. simul mixta leuiter bulliant, colentur cum ℥ 4. iusculi pulli, sorbeantur. Quinetiam quoniam phreniticis ab immodica illa vigilia certa impendet virium prostratio, commodum erit, aliis remediis non respondentibus, tandem hoc vnguentum præcipere, quod ad omnem ἀγρυπνίαν, seu ex febribus, melancholia, aut dolore obortam mirificè confert. ℞. succi mandragor. violar. seminis hyoscyam. capitum virid. papau. ana ℥. 12. cicutæ, solani, radic. lactuc. ceræ ana ℥. 6. mastich. ℥. 1. opij ℥. 2. omnes herbæ, semina, & radices oleo viol. vel communi diebus 12. infunde deinde ad prunas coque, donec herbæ coquantur. Postea cola. Colatis tritum opium immisce. Postremò ceram & mastichem adiunge. Ad idem olea crocinum, hederaceum, mandragorinum, populneum plurimum facient. Sic autem populneum parabitur. In vini lb. 4. olei, si vis. ros. lb. 3. oculorum populi verè collectorum libræ tres diebus 7. mace- rentur: quotidie agitentur: leuibus prunis postea coquantur ad vini consumptionem. Capitis dolores abigit efficaciter. Nimiùm sopitos his remediis ita excitabis.

℞. succi rad. fœnug. ℥. 2. β. aceti albi, in quo nux moschata coxerit, ℥. 1. β. cum spongia ex aqua hyssopi expressa, & rursus madefacta in suprâ dicto succo, fiat errhinum, attrahatur naribus. In eundem vsum pulegium, aut hyssopus teritur, & ex aceto naribus admouetur. Porro quæ adhuc in meningibus superest crassior, aut impactior materia, ea digerentibus est vacuanda. Vacuabitur partim sump- ptus, vt rho, myrobalan. & catapotiis conuenienti-

bus: partim ad motis capiti temperatè calidis, ut oleo rosaceo cum chamæmelino: fotu ex decocto maluæ betonice, fœnicul. alth. lini, fœnug floribus chamæm. aneth. anthos, sambuc. cum spongia, vel cum linteo: vel eidem capiti applicitis, columbis, catulis, lapis, aut similibus animalculis viuis per spinam sectis, & exenteratis. Sed hæc nunquam nisi in fine vigoris & declinatione morbi tentanda sunt, alioquin plus attraherent, quàm digerent.

## EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Mania & melancholia, deliria sunt sine febre: phrenitis & παραφροσύνη cum febre. Hæ duæ species distinguuntur continuitatè. Nam παραφροσύνη symptoma est in statu febrium ardentium, cum quibus incandescit, & remittitur. Phrenitis verò morbus est continuus, febrem & mentis perturbationem inducens. Hippocrati tamen interdum phrenitici dicuntur, quibus cunque mens oblæsa est. Causa duplex: una à bile naturali, id est, tenuiore sanguine ad cerebri meningas affluente, & in illis inflammationem, vel etiam in cerebro, ob exitum è vasis, angusto loco coarctationem, & prohibitam transpirationem procreante, vel feruente duntaxat, vnde Hippocrati deliria securiora cum risu. Altera à bile non naturali, id est, acri & adusta, quæ quò acrior est, & adusta magis, eò sæuiora & periculosiora accidentia inuehit. Signa pathognomonica sunt, febris, delirium, continuitas. Curatur primum clysmate molliente & alterante, si & per morbi sæuitiam, & ægri morositatatem liceat: sectione cephalicæ, aut eius loco, cucurbitulis humeris & natibus cum scarificatione ad motis, aut sectione venæ sub lingua, materia fluente: in statu, venæ frontis: Topicis initio repellentibus, deinde admixtis paulatim resoluentibus, purgatione bilis, potionibus cordi accommodatis in virium imbecillitate, sed in bile adusta humectantibus & melancholico humori propriis, aluo perpetuò humectata, urinæ prouocatione (si retenta sit) per admota non calfacientia.

Phrenitidis  
causa duplex.

Hipp. aphor.  
53. li. 6. Aph.

Phrenitidis  
signa patho-  
gnomonica.

## DE MORB. INTERNIS

Cæterum de venæ sectione in phrenitide non levis est dubitatio. Etenim Asclepiades medicos eos trucidare affirmabat, qui phreniticis sanguinem detrahi imperarent, quod phrenitis non nisi intenta & vigente febreprehendat: sanguis autem remissa febre mitti debeat. Et quidem rarò sanguinem mittimus, quia ferè priùs missus fuit, & iam viribus deiectis incidit phrenitis. Quod si quando sanguis ducatur, animi deliquium vitandum.

*Narcoticis* *Oleum de papauere, de mandragora.*] His cum iudicio vtendum, ne cerebro naturâ frigido noxa inferatur, idque in minima dosi, & in principio, aut vigiliis. Temperari possunt mulieris lacte puellam lactantis, quod frigidiusculum est. Possumus quoque pannos succis intingere, vel aquis in hyeme, & ad mouere fronti: qui remouendi sunt, vbi incaluerint, & sæpiùs repetendi. Potest etiam è tritici farina sola cum succo & oleo violarum fieri cataplasma, & fronti non dormientium applicari.

*Syrupi de papa.*] His quoque non vtetur nisi coacti, & firmis viribus. Cum enim frigidissimi sint, de caloris natui extinctione periculum imminet. Ad virium robur & conseruationem addantur syrupus violatus, pulueres cordiales, vt de gemmis, diamargariton frigidum, aquæ buglossi, borraginis, & in bile adusta, puluerum loco, confectio alkermes in minima dosi pro imbecillitate virium, & extrà ventris fluxum.

*Opii vsus* *Opj.*] Vñs opij in pueris, mulieribus, mollioribus, periculosus est: in robustioribus minùs: assuetis, vt quarundam regionum incolis, nullo modo, etiamsi per os sumatur. Gulielmus Rondeletius primariæ notæ medicus, & in Monpessulensi Schola Regius Professor retulit mihi vidisse se ab Hispano in summo æstu opij semunciam sine noxa deuoratam. In dolore capitis opium, non croco, qui molestiam & grauitatem inducit, sed nuce moschata, corrigi debet.

## ANTO. VALETII EXERCIT. VI.

**P**hrenitis membranarum cerebrum obuelantiù, atque adeò cerebri ipsius, inflammatio, vel ex-

quisita est, & cerebri, meningumque eius propria, vel spuria, cerebro septo transverso inflammato consentiente, & ex nervis, qui in ipsum sparguntur, vitium concipiente. In illa magna & rara est respiratio: in hac inæqualis, à contractione præcordiorum & incendio magno. Vtriusque distinctiones, causæ & signa habentur cap. 3. libr. 5. de loc. malè affect. libro 2. de caus. sympt. comment. ad sent. 1. sect. 1. Prorrh. 1.

*Paul. Æg.  
cap. 6. libr. 3.*

Morbus hic, quia acutissimus, celerem petit curationem. Iniicitur clyster è decoct. remollient. additis seminib. frigidis: in quo sint dissolut. cathol. & diapr. an. ʒ. 3. mel. ros. & saccha. alb. an. ʒ. 1. butyri recentis (non enim tam citò, atque olea, inflammatur) ʒ. 3. vel ole. violac. & buty. rec. an. ʒ. 1. β.

*phrenitidis  
curatio.*

Clystere reiecto, materiæ affluxus, qui tumori & inflammationi incrementum suggerit, reuellendus, aperta cephalica, vel, suadente Actio, media, ut celerius subueniatur, angusto tamen facto foramine, metu nimix spirituum exolutionis, qui in hoc affectu præ sanguinis tenuitate facilè dissipantur.

Conuenient deinde repellentia, quæ suo occursum humorem propulsent, eiusque feruorem cõtemperent: quanquam in statu, vbi meatuum reseratione, & humoris discussione maximè est opus, eorum vsus sit penitus abrogandus.

Purgationum etsi Græci authores non meminerint, fortasse quòd existimarint humores motos inflammationem augere: tamen cum bilis ad furorem in phrenitide multum faciat, & in magnis morbis non solum sanguinis missione, verum purgatione uti sit rectissimum, hinc purgante medicamento,

*Gal. libr. 4.  
Meth.*

# DE MORB. INTERNIS

minùs tamē calido, medicari licebit, priusquam ad ea quæ alterant, discutiunt, & vapores transpirare faciūt, veniatur. Sic itaque purgabis. ℞. expression. ꝑ. 2. rhei elect. in decoct. ꝑ. 3. β. 1. tamarindor. & cicho. infus. cū ꝑ. 1. cinam. in qua dissol. cathol. & syr. viol. an. ꝑ. 3. 1. f. potio. Pauperibus semunciam diapr. solut. aut eiusd. diap. & electarij de succo ros. an. ꝑ. 3. 2. in aqua hordei dissolues, nisi calidiora hæc exhibere febris vehementia vetet.

Longiùs progressio affectu, & comoda erit deriuatio, & à parte laborante vacuatio. Alterum affixis cum scarificatu interscapulio cucurbitulis: alterum sectione rectæ in fronte venæ, stricto priùs, vt appareat, collo, consequimur. Quod si consistente morbo spes sit alicuius crism consequuturæ evacuationis, nihil moliendum, ne naturæ motum interturbemus. Contrà verò si natura nihil tentando fatiscat, aliqua oneris parte leuanda, clystere, vel cathartico exhibito.

Mox ad discutientia linimenta & fomenta progrediendum: quæ quamuis calida, materiam foras euocando refrigerant. Parabitur ex moderatè calidis, vt chamæm. melil. aneth. beton. stech. maioran. feminib. anis. fœn. & similibus, decoctum, in quo immersa sponsia capiti applicanda. Litus ex ol. chamæm. liliac. aneth. Hûc referuntur exenterata, vt loquuntur, viua animalcula.

Præterea quia in phrenitide superat calidus humor, & proinde in ea affectione est <sup>nulla à quâ</sup> ~~αἰκνῆσις~~ est quoque <sup>ἡ ἐν τῇ φρενίτιδι</sup> ~~αἰκνῆσις~~ ob vitiatam cerebri temperaturam, occurrunt duo grauissima symptomata, somnus difficilis & vrinæ retentio, quæ opem medi-

dici requirunt. Somnus conciliabitur hypnoticis  
portionib. ab Autore imperatis, vel hordeato cui  
femina refrigerant. pap. alb. lact. vel portulacæ sint  
addita. Subducetur vrina pubis & perinæ fotu, ex  
malua, bisin. pariet. cham. & mel. in aqua & vino  
albo coctis.

De 1 Apoplexia.

CAP. 7.

**A** Poplecticum 2 ita curato. Hominem agi-  
tato, concutito, 3 fricato. Sæpe enim similes  
apoplecticis concidunt ex leui obstructione, quæ  
agitatione corporis discutitur. Ea obstructio à  
crassis vaporibus esse potest, vel quia pauca mate-  
ria est, quæ obstruit. Similes quoque apoplecticis  
4 sunt, qui apoplectici & cataleptici veriùs dicuntur,  
ex plenitudine totius corporis, vel capitis, vnde  
viæ spiritales intercipiuntur. Quibus vena brachij  
interna quidem, si totius corporis plenitudo est,  
cephalica, si tantum capitis, statim 5 aperienda est.  
Hoc enim remedium sæpè satis est. Eiusmodi hi-  
storia est apud Aëtium, capite de catalepsi. Iuuenis  
quidam multi sanguinis derepètè mutus factus est.  
Tres dies integros ita iacuit: quarto die multo  
profluuiò sanguinis è narib. liberatus est. Αφασία  
Græci affectum eum vocant. In apoplexia, quam  
frigidus & crassus humor excitat, priuatione mo-  
tus & sensus, ac propè extincta rectrice anima, ho-  
minem 6 loco lucido & tepido collocato, ac cor-  
pus vehementius concutito. Tum 7 multa frictio  
conuenit, vnctio ex oleo calente, & maximè earum

1 Demotus  
& sensus vñ  
uñsi corporis  
priuatione:  
quæ sit quum  
spiritus ani-  
malis è cere-  
bro exitu pro-  
hibetur, &  
vitalis aditu  
è corde ad ce-  
rebrum.  
2 Si modo a-  
poplexia for-  
tis non sit, sed  
debilis. tñ  
enim insana-  
bilis valida  
apoplexia.  
3 Dara fri-  
ctione, vincit  
is quoq. dolo-  
rificus, vt con-  
creti humores  
fundantur, ac  
spiritus ani-  
malis exitum  
habeat, vita-  
lis aditum.  
4 Ac præfir-  
tim n, quib. re-  
uore & cras-  
sore sunt col-  
lo, quib. vita-  
lis spiritus a-  
ditu ad cere-  
brum prohibe-  
tur.

5 Nam aphoniam sine febre vena sectio soluit. sect. 5 lib. 2. Epid.  
6 Vt splendore lucis materia foras euocetur. 7. Ad excitandam na-  
turam vim, liberanda obstructa, Et preparandam materiam.

# DE MORB. INTERNIS

8 *Vt effæta  
vires nō sint,  
vt à venere.*  
9 *Vt clystere  
acri, cuius de  
scriptionem  
paulō pōst es  
habiturus.*  
10 *Si solius  
sit cerebri  
symptoma.*  
11 *Effæctis à  
venere viri-  
bus, phlebo-  
tomia loco ad  
monēdo sunt  
cū scarificatu  
cucurbitula,  
natisque per-  
fertim, cerui-  
ci et scapulū.*  
32 *Propter  
earum angus-  
tiam.*  
13 *Quæ natu-  
ram excitet,  
et humor s  
fundat.*

partium, quæ magis refrixerint. Plantarum pedis pruritus, aquæ vitæ cū nuce moschata in nares in-  
iectio, sinapi vulgare illitum, vellicatio barbæ &  
pubis, salori iniectus. In phlebotomia, quæ vel ho-  
minē liberat, vel occidit, ita te gerito. Si nihil 8 re-  
pugnat, præparato prius 9 corpore, & 10 in tempo-  
re venam cephalicam incidito: parum detrahito.  
Post aliquot horas, si perseveret malum, alteram  
cephalicam vulnerato, nec ita multum sanguinis  
detrahito. Hæc verò repugnant, quòd aliquando  
immodica venere, aut alia quavis spirituū inanitione  
virtus corporis exhausta est. Hinc 11 scarificatione,  
cucurbitulis, sanguifugis toto corpore fixis conten-  
tus esto, quemadmodum in obesis corporibus, mol-  
lioribus, & debilioribus, in quibus venæ 12 vel non  
apparēt, vel non ferūt phlebotomū. Preparatur cor-  
pus, subducto prius ventre, totius corporis foru ex  
ol. calido, chamæmelino, anethino, aut simili, as-  
pera 13 frictione, cōcussione corporis & ambulatu,  
vt sanguis crassior & frigore cōgelatus recalescat,  
attenuetur, & melius effluat, oportetq; iustū vulnus  
infligere: alioqui subsistet sanguis quanquā nō vni-  
uersim sed intervallis detrahendus sanguis est. Occa-  
sio est in remissione, aut quo tēpore nō ingrauescit  
malū. Remissio intelligitur liberiore, quā antea,  
respiratione, pulsu meliore, & vbi partis alicuius tor-  
por cœpit egelari. Alioqui si, quod sæpe fit, aliter ve-  
nam aperias, aut agrum præcipitabis, aut nihil iu-  
uabis, exitu materiæ negato. A phlebotomia spes  
salutis, si pulsus, respiratio, faciei color, partium fri-  
gus, mens, motus, sensus, omnia, aut ex his aliqua, in  
melius conuertantur. Alioqui, si non accreuit ma-

lum, ex altera cephalica iteranda sectio est. Quòd si 14 *Vel olei  
de absynth.  
& mentha  
ana 3.iii.*  
ne tum quidem proficiatur, desperatur æger. Secta  
venâ, quiescat æger, atque interim stomacho & vis-  
ceribus consulamus hoc modo.

℥.ol. 14 de spica 3.3. mastich. 3.1. liquefiant in  
15 vase duplici: & cum cyperi, macis, cina. an. 3.2.  
coralli rub 3.1 misceantur, cum rasura scarlatæ, aut  
gossipio applicentur calida. Poterit etiam aliquid  
symp. 16 rosati deuorari. Visceribus sic.

℥.summitatum absynthij M.1. sem. carui, cumi-  
ni ana 3.ß. fiat decoctio in olei & 17 vini an. quan-  
tum sufficit. Inde foueatur regio 18 hepatis & lie-  
nis. Post hæc clyster acris iniiciendus est, ex deco-  
ctionis 19 capitalis 1b.1. adiecta sem. carui, cumini,  
baccarum lauri 3.ß. Deinde in decoctione dissolue  
pul. hieræ picræ, & diacolocynth. an 3.3. mellis 20  
anthosati, sacchari rub. ana 3.1. salis 3.2. 21 olei  
anethini 3.3. Sæpè fit, 22 ut resistat clyster, aut per  
os reuomatur: tum fiat tale suppositorium.

℥.pul. hieræ diacolocynt. 3.2. castorei, sem. carui  
& rutæ ana 3.2. sal. gemmæ 3.1. cum melle, q. s. fiat  
suppositorium bene longum. Quòd si nec hoc mor-  
do alius quicquam reddit, cucurbitulis vtendum  
est, ex libello de cucurbitula. Reddito clystere ali-  
quantisper quiescat æger. Postero die.

℥.pul. hieræ 23 diacolocynt. 3.2. theriacæ 24  
veteris 3.1. dissol. in aquæ vitæ & calendulæ an. 3.1.  
cum cochleari, aut siphone infundatur in gulam.  
Antidotus hiera Pachij Antiochi à Scribonio Lar-  
go descripta multos olim apoplecticos Romæ li-  
berauit. Hieræ Logadij conuenientior fuerit, si à  
melancholico succo & crassa materia sit affectus.



## DE MORB. INTERNIS

Interim quoque vtendum est remediis, quæ Apoplecticum excitant. Oleum vitrioli plurimum commendatur. Quòd si deest, dissoluantur  $\mathfrak{z}$ .2. vitrioli in  $\mathfrak{z}$ .1. olei de spica, de costo, de castoreo, de scylla, aut simili, hoc modo.

$\mathcal{L}$ . scyll. concisæ in taleolas  $\mathfrak{z}$ .2. castorei  $\mathfrak{z}$   $\beta$ . vitrioli  $\mathfrak{z}$ .3. fiat decoctio in olei anethini & vini ana  $\mathfrak{lb}$ . $\beta$ . ad cõsumptionem vini. Nares & palatum hoc oleo illinantur. Sunt & alia, quæ apud Græcos & Arabas inuenias. Potio.

$\mathcal{L}$ . cast.  $\mathfrak{d}$ .4. mastich. sem. rutæ, fantali citrini, nucis moschatæ an.  $\mathfrak{d}$ . $\beta$ . ponantur in manica Hipp. & colentur quater. Cum aquæ vitæ & calendulæ ana  $\mathfrak{z}$ .1.  $\beta$ . f. potio, infundatur in gulâ. Aqua destillata è nucibus moschatis auribus, palato, naribus ebibita, omnium est remediorum accommodatissimum. Quòd si fiat, cum aqua vitæ destillatio, multò erit efficacior. Hoc præsidium Senectéssem Episcopum horas iam 20. iacentem excitauit.

25 Calami  
aromatici.  
26 Aut a-  
quæ vitæ, aut  
meliss. phylli.

$\mathcal{L}$ . conf. iris, 25 acori ana  $\mathfrak{z}$ . $\beta$ . conf. salu.  $\mathfrak{z}$ .2. diu agentur in mortario, ex 26 aquæ saluiæ  $\mathfrak{z}$ .2. Fiat fortis expressio cum supradicta aqua vitæ. Traiiciatur per manicam Hippocratis, fiat potus.

$\mathcal{L}$ . capillorum hominis minutim concisorum  $\mathfrak{z}$ . $\beta$ . cast.  $\mathfrak{d}$ .2. helleb.  $\mathfrak{d}$ .1. incorporentur in opopanace, fiat suffumig. Vel parabitur puluis in nares immittendus.  $\mathcal{L}$ . hellebo. condisi, albi piperis an.  $\mathfrak{z}$ .1. f. puluis. Caputpurgis fortioribus, illitionibus palati

27 Horum  
materia des-  
cripta est in  
cephalalgia.  
frigida.

ex pulueribus, masticatoriis, 27 apophlegmatismis vtendum. Sed priùs suffumigiis & vaporibus materia incidenda. Radédum quoque caput est, fouendúmque ex oleo calente, in quo pulegium, serpillú,

alia quoque eiusmodi coxerint. Deinde dropacibus, sinapismis, 28 sartagine Rhazæ vtendum est. Cucurbitulæ quoque & sanguisugæ, iam bene purgato corpore, conueniunt.

28 *Vt eadē  
iī sartagine  
excitetur so-  
pita cerebri  
us.*

℥.olei rutacei ℥.3. picis nigræ lb.1. liquefiant in vase duplici: deinde adde pyrethri, sinapi, piperis albi ana ℥.3. Misce, extende in aluta, calidum appone, renoua priusquam refrigescat.

℥.ficus pingues q. l. leuiter incoque: deinde cū duplo sem. sinapi contunde ad formam emplastri.

Appone capiti post forum conuenientem. Aliud.

29 *Id empla-  
strum ab ace-  
to & croco no-  
men habet.  
Hic verò ad  
incidendum*

℥.29 oxycræci vel emplastri de Vigo ℥.3. fortiter agitetur in mortario cum oleo laurino. Deinde addantur gra. sinapi, pyrethri, staphysagriæ, piperis albi, euphorbij ana ℥.2. misce.

*& foras eno-  
candum præ-  
scribitur.  
30 Vt quæ  
fortis existit.*

Rhazes sartagine calefieri, dum candeat, interdum laudat, & de proximo admoueri capiti. His remediis per longiora interualla vtendum est, aut breuiora, vt res patitur.

Apoplexia secundo aut tertio die iugulat, aliquādo 30 primo. Vt ergò celerior est, aut minus celer, ita erunt interualla remediorum aut longiora, aut breuiora.

℥.succu rosarum, mellis albi ana ℥.3. fiat syrupus secundum artem: loco mellis potest substitui saccharum.

*Syrupus me-  
linus.*

Quædam apoplexia fit à multitudine humorum, quam plethoram vocant, & ea dicitur, ἀπόληψις, i. interceptio arteriarum & venarum. Eam sanat subita & diligens sanguinis detractio. Potest autem esse repletio humorum, & tamen erit inanitio spiritum, vt in iis, qui venere immodica statim à

# DE MORB. INTERNIS

cibo vtuntur. Nam in coitu multus spiritus vitalis effunditur.

## EIVSDEM HOLLERII SCOLIA.

In apoplexia homo repentè concidit sine motu & sensu. Sic à nobis obseruatum, in frigida & Austrina aëris constitutione Medicum quendam doctissimum sexagenarium, ultimo Ianuarij die, Lutetia à cœna concidisse mortuum, Ruelium Septembri periisse quarto die, sicut & Bibliopolam quendum eodem die, via Iacobæa Pictorem quoque mense Aprili, anno 1545. interiisse stertenti apoplexiæ: eodem mense figulum in suburbio Iacobæo leui apoplexia Paralyticum altera parte euasisse, utrūque vinosum & macilentū, vt inde intelligas vim ambientis in suscipiente preparato. Eadem ferè constitutione temporis videre licuit Medicum apoplexia paulò ante cœnam correptum interiisse repentè. Mulieribus quibusdam quo tempore fœtus in vtero animatur atque mouetur, vt 40. die, & in fœminis 3. aut 4. mense fiunt apoplexiæ leues, vt in Domina Ezelim à nobis est obseruatum. Acutissima apoplexia mox iugulat, & spiritum adimit: fortis violentum trahit: tertio loco est, quæ non violentum quidem & intentum, sed inæqualem, inordinatum & intermittentem, desinitque in paralyfim. Vnde animaduersione dignum illud videtur, quod scribit Galenus comm. in aphor. 51. lib. 6. Quicūque sani capitis dolore derepente capiūtur, & statim muti fiunt, & stertunt, in septem diebus pereunt, nisi febris apprehendat. Quæ sententia etiam scripta est 2. de morb. Interpretatur enim de apoplectis, qui apoplexiæ forti laborent. Sed hi ferè primo, secundo, aut tertio die pereunt. Hinc quoque perspicuum est, ex difficultate respirationis de magnitudine morbi coniiciendum esse. Quæ nota etiam distinguitur à caro & catalepsi, in quibus libera manet respiratio. Apoplexiæ nomine non semper in hac significatione Hippocrates est vsus. Fiunt apoplexiæ, vel quia spiritus animalis, qui per neruos descendit, non conficitur à cerebro, ob intemperiem totius substantiæ ipsius: vel quia intercipitur, idque vel à pituitoso humore crasso & viscido, confertim cerebrum irrigante quales sunt senibus familiares & hyeme, vt scribitur li. 3.

*Apoplexia  
muti repen-  
tè suffocati.*

*Apoplexia  
qua nota à  
caro & cata-  
lepsi distin-  
guitur.*

Apho. mulieribus minùs molestæ ob menstruam purgationem: vel ab humore melancholico, periculosa, & quæ hominem occupant à quadragesimo anno vsque ad sexagesimum, sicuti docetur Apho. 57. libr. 6. vel à sanguinis eruptione & plenitudine, aut crassis vaporibus cum humore vias spirituum intercludentibus, vt in ebriis quibusdam. Omnium facilis dignotio ex propriis cuiusque humoris signis. Si qua à sola intemperie, non nisi longa temporis progressionem induci potest. Nullæ vnquam, vel difficulter curantur. Si qua tamen curationis spes, ea fiet primùm clysteribus acerbis, ab imbecillioribus initio sumpto, id est, qui fortiter trahentia non recipiunt, vt colocynthidem, quia priùs inaniendum, quàm à partibus remotis trahendum: suppositoriis, dum clysteres parantur, sanguinis missione, præsertim cum venæ tument, & distenduntur, ligaturis fortissimis & dolorificis, frictionibus asperis extremarum partium, hæmorrhoidum inflatarum apertione, potionibus excalfacientibus & extenuantibus, pilulis dissolutis in aquis sæpiùs repetitis, sinapi ori imposito, & dissoluto in oxymelite, vel benedictâ, vel diaphœnico, vel sinapi dissoluto aquâ vitæ, & naribus illito, sale in os iniecto, frictione palati: sternutatoriis post vniuersalia remedia appositis naribus, vt rutâ, castoreo, galbano, euphorbio: sinapismis, dropace, cauterio, & si paroxysmo liberentur, cocta materia, & educta.

*Apoplexia  
curatio quibus  
perficitur.*

*Hominem concutito, fricato.* ] Collum commouendum, fricandum, & contrectandum duriùs, qua parte venæ sunt & arteriæ. His enim prohibetur congelatio, sanguis incallescit ac tenuatur, meliùs fluit, & præparatur ad venæ sectionem.

*Venæ brachij interna.* ] Magna inter omnes dissensio de venæ sectione in apoplexia. Arabes initio eligunt saphenam, vel malleoli. Sed cum exigua sit, & valde remota, nec sanguinis satis, nec sat citò inde reuelli potest, poplitis vena commodior, quia amplior, & tutior. Deinde cephalica ytriùsque brachij, ad vtrâque partem exonerandam: postea ad deriuationem, venæ iugulares, quæ valde tument. Angusto tamen foramine, metu hæmorrhagiæ, sectio facienda, & cohibendus sanguis medicamento Galeni ex pilis leporis, aloë, thure, & albumine oui, conuenienti ligaturâ asseribus

*De venâ in  
apoplexia  
seccanda magna  
dissensio.*

## DE MORB. INTERNIS

utrinque ad collum applicatis supra iugulares, à claviculis ad aures, & à sternò ad mentum, ne prohibeatur libera respiratio. Quod in cane sumus experti exectis etiam pilis. Venas linguæ aperire non licet, contracto ore. Ex venulis nasi nihil iuuatur æger ob paucitatem sanguinis. Venæ frontis à iugularibus oriuntur, nec tam conspicuæ sunt. Haly Abbas cap. 22. libr. 5. suæ Praxeos non omnino phlebotomen reuocat, nisi hac forsitan conditione, ut apoplectici facies non rubeat, non luescat, aut viridis & repleta non appareat. Eadem occasione Rhazes sanguinem detrahit è iugularibus, vel cephalicis illico, deinde è pedibus, & extremo naso. Sternutatoria quoque reicienda, cum sit humor in corpore cerebri, non in ventriculis.

*Cucurbitulis* ] Vbi sectio venæ non conuenit, illius loco cucurbitulis utendum. Quæ si adhærere possint prope iugulares, & quasi sub mento, melius erit, quàm in humeris aut dorso. In hypochondriis nocent, impediendo motum musculorum abdominis in respirando, nisi extra paroxysmum. Lococucurbitularum multæ sanguisugæ, cornicula applicabuntur cum scarificis. Cucurbitulæ hypochondriis non affigendæ in accessionibus apoplecticis.

*Theriaca veteris* ] Minus conuenit tum propter adstringentia, quæ multa recipit, tum ob vim opij non omnino consumptam vetustate. Hæc omnia humorum cerebri corpus irrigantem altius impingunt. Horum loco detur 3. i. coctiarum dissolutarum in aqua vitæ: vel castorei 3. i. aut ij. tum piperis, zinziberis & euphorbij momentum. Expurgato tamen cerebro conuenire possunt. Caterum apoplexiæ & omnium affectionum frigidarum febris remedium est, ut constat ex aphor. 51. libr. 6. & sent. 5. 2. Prorrhetic. de Numeni filio. Sed oportet febrem neque leuiorem esse, quàm quæ possit morbum tollere, neque grauiorem, ut quæ agrum interimat.

### ANTO. VALETH EXERCIT. VI.

*Apoplexiæ  
magnitudo  
uide.*

**A**poplexiæ magnitudinem respirationis nota indicat, quæ quò maior est, eò morbum

grauiore, magisque periculosum esse ostendit. Hinc est, quod Galen. quatuor fecerit epilepsiae gradus cap. 10. libr. 3. de loc. mal. affect. comment. ad aphor. 42. libr. 2. Quibus ex locis omnia, quæ ad huius dignotionem affectus attinent, elici possunt.

Curabilis apoplexia est, in qua non omnino intercipitur respiratio. Fit verò, qualiscunque sit, vel à sanguine in cerebrum repente influente, unde viæ cordis & cerebri communes occluduntur: aut ab affectione calida, quæ Galeno *φλεγμονώδης Αἰγίσις* appellatur: aut à pituitoso humore, vel melancholico, cerebri ventriculos obstruente.

Sanguineæ apoplexiæ præsentissimum remedium est cephalica secta, nisi periculum minùsürgens clysterem ex decoct. cephalico priùs iniicere permittat. Optimum totum corpus concutere & agitare, ne sanguis sensim congeletur & concreascit. Mittendi sanguinis is sit modus. Non multus semel & vniuersim, vt plethora exigit, sed paucior & sensim trahatur. A quo si nec sensus redit, nec motus, spes in angusto. Frictiones cum panno asperiore, adhibito etiam sale in aceto dissoluto, & ligaturæ fortes partium extremarum ante sectionem, & post vtilis.

His artibus postquam sanguinis auersio & vacuatio est procurata, intemperies à calido sanguine in capite relicta sumptis refrigerantibus, vt diamar-gar. frigid. confer. ros. viol. nenupharis, & syrup. ac-commodatis, emendatur.

Pituitosa si sit apoplexia, meritò phlebotomia su-

*Galen. cap. 4. lib. de curat. per sang. miss.*

*Sanguineæ apoplexiæ curatio.*

# DE MORB. INTERNIS

1 Lethargus  
afflictio est  
ce ebri à ce  
leri & repē-  
tina obliuio-  
ne nomen ha-  
bens: aut, est  
delirium in-  
termisſionis  
expers, cum  
febre, ſopore,  
& celerit obli-  
uione contin-  
ētī, & phre-  
nitide ſaſe  
ſu. codit, ſed  
ad mañ O-  
mnis enī fri-  
gida intum-  
peries calida  
ſuccedēs ma-  
lo eſſe ſolet.  
Cuius morbi  
cauſa eſt in-  
temperies ce-  
rebrī frigi-  
da, hum. da,  
pituitoſa,  
qua memo-  
riam magis,  
quā facul-  
tates reliquas  
laedit. t. uis  
ſigna ſunt in-  
expugnabili  
dormiendi neceſſitas. frequens oſcitatio, aperta mādibulae, magna, ra-  
ra ſpiratio, pulſus lent, rari, languidi, manū tremor, faciei decoloratio, pendulae  
genae, excrementorum alui liquidorum aut ſi. corum, non aegri ſponte excretio, uri-  
nae tumentorum ſimilis, quae magnā in venis ſpirituum perturbationem ſignificāt.  
2 Quibus diſtinguitur ab apoplexia, epilepſia, caro, catalepiſi, & comate.

ſpecta eſt: præſertim verò, ſi magna præceſſit inani-  
tio, propter quam excrementa frigida in cerebro col-  
lecta ſint, vt in ſanguinis profuſionibus, immodico  
venereorum uſu, &c.

Tum acrior imperabitur clyſter: qualis hic eſt. ℞  
hyſſop. origan. calamenth. cētaur. minor. ſalu. an. M.  
1 bacc. laur. ſemin. anif. rut. ſeſel. an. p. i. agaric. pāno  
lineo inuoluti ʒ. ʒ. f. decoct. in aq. ad lb. i. vel ad lb. i.  
ſ. (maior enim eſſe debet quantitas clyſteris in hoc  
affectu, & ſimilibus, in quib. ſenſus torpet, aut abo-  
letur.) In colatura diſſol. benediētē laxat. hier. diaco-  
locy. th. vel hierē Logad. an. ʒ. ſ. ſacch. rub. mell. an-  
thoſ. an. ʒ. i. ſucc. mercur. ʒ. 2. olei aneth. ʒ. 3. f. clyſt.

Conferet nares oleo ſaluiaē arte chymica factā,  
aut nardino, irino, coſtino, addito, ſi velis, aqua vi-  
tæ, itēque caput, & corpus vniuerſum, cūm ad a-  
poplecticum excitandum, tum ad humorum con-  
gelationem prohibendam, inungere. Sunt qui cau-  
terium ad futuras affigunt.

Liberato acceſſione apoplectica ægro, præparabi-  
tur materia zulapiis, apozematis, itēque purgabi-  
tur, vt in pituitoſa cephalalgia.

## De 1 Lethargo C A P. 8.

**L**ethargi 2 ſigna colliges ex Aëtio, Prædictioni-  
bus coacis Hipp. lib. 4. Galeni de cauſis pulſuū,  
ſed pleniffimè ex Aureliano, lib. 2. acutorum, cap. i.

Lethargum cognitum ita 3 curabis. Initio 4 materiam repelles: deinde ægrum 5 excitabis: tum materiam vacuabis: postremò confirmabis caput: accidētia corriges: & in primis rationē 6 vitę institues.

Loco itaque lucido & tepido collocabis: materiam repelles oxyrhodino. Hoc autem minùs acetì recipiat, quàm in phreneticis. Deinde oxyrhodinũ parandum erit ex oleo rosaceo, chamæmelino, adiecta minori parte acetì. Exempli gratiâ.

℥.ol.rof.& chamæm.ana ʒ.i.ß.aceti ʒ.ii. oportetque affundi in eam partem capitis, vbi iunctura est coronalis. Tum clysteribus acribus, & suppositoriis vtendū est, qualia in apoplexia descripta sunt. Postea verò frictionibus, vinculis, vellicationibus: partim, vt his materia reuellatur: partim, vt inde æger excitetur. Excitatur quoque hac potione.

℞. mythridatii ꝓ. i. dissol. in aquæ vitæ & calendulæ an. ꝓ. ß. Similiter theriaca vti licet. Sed tutius post clysters & vacuationes, & hoc quoq; excitat.

℞. 7 castorei, lapidis gagatis, cornu cerui, abrotoni, capillorum hominis ana ℥. i. Excipiantur pice humida : fiat fumus, qui adhibeatur naribus. Interim proderit scyllam conquassatam cum oleo irino, aut simili occipiti admouere. Statim initio, si corpus sanguineum est, & tolerant vires, è cephalica sanguis detrahendus est. In lethargo, clysteribus & glandulis acribus potius, quàm pharmacis purgantibus vtendum est. Vbi tamen diuturna passio est, & vires tolerant, vtimur primùm syrupis incidentibus, quales antea descripti sunt.

*simplici, et el origanato, cibo media materia, qualitate humido, consistentia secco.*

7 Hoc suffumigium in manibus conueniat, qui epilepsia corripiti solent.

3 Si non sit  
inſanabilis,  
ut qui ſuper-  
uenit phreni-  
tidi, & in  
quo excre-  
menta non  
ſſōre agriſe-  
runiū, ut à  
delirio tam  
et. à reſolu-  
tione ſcūis  
ſphycterus.

4 Qua af-  
flit a crudi-  
tate humorū.

5 Nematrices  
cerebri f. aul  
tas opprima-  
tur. Erit au-

tē lethargi-  
cū excitā us-  
q̃ studio, cui  
se se add. xe-  
rit, clangore  
tubarum, si-  
miles: tinni-  
tu auri &  
argenti, si a-  
uarum, &c.

6 Quaeque  
pugnet cum  
morbo, & na-  
tura studeat.  
Sed hic vino  
abstinendum,  
utendumque  
hytromelue



# DE MORB. INTERNIS

Horum loco oxymel concinnari poterit ex iis, quibus neruosum genus inuetur. Decoctū apij, fœnic. capill. vener. Aëtio probatur. Deinde ex hieris, picra, diacoloc. & Agarico purgamus. Postea cucurbitulas ceruicis initio, vt ad primam, vel secundam vertebam, ac deinde scapulis, metaphreno, lumbis, & cruribus cum multo igne affigimus, ex quibus ad purgationem localem veniendum est, per errhina, diamassemata, illitiones palati & capitis, dropaces, sinapismos, phœnigmos.

Pulegium itaque, thymum, origanum, aliaque id 8 genus cocta aceto, naribus ita admouebis, vt calidus vapor ad cerebrum perueniat, ex quo nares inunges hoc modo.

℥. ol. irini ℥ 1. aceti scyllit. ℥. 3. β. castorei ℥. 2. 9 misce. Vel. ℥. olei irin. nardini, de costo an. ℥. 3. β. medullæ scyllæ tritæ cum acet. scyllit. ℥. 3. 3. castor. euphorb. ana ℥. 2. f. linimentum. Postea etiam errhin. supra descriptis vti licebit. Palatum illines sinapi trito ex aceto & melle commixto: dūmque hæc fiunt, per interualla clysteres iniicies. Caput æstate rades: hyeme 10 detondes: fouebis que primū 11 decocto serpil. saturiæ. puleg. orig. coctorum in oleo & aceto. Deinde inunges & fouebis ol. de scyll. 12 prius descripto, oleo philosophor. de gagate, serapino, de piperib. de euphorb. quæ à Mels. describuntur. Alioqui irino, sampsuc. id est, de maiorana, aut ex rosmarino comparato, vel hoc cerato.

℥. ol. laurini ℥. 4. ceræ tantundem. Liquefiant in vase duplici, fortiterque agitetur cum succo apij & rutæ, quibus adde castorei puluerati ℥. 1. Hinc ad dropacem prius 13 descriptum transeundum est,

8 *Vi hyssop. calaminth. stæch. calam. aromaticus.*

9 *Vel. succi radicū fœnic. 3. in aceti scyllit in quo nucis moscha*

10 *Ne frigoris vi humor & vapor exitu prohibeatur.*

11 *Huius hæc erit formul. 4. ser. pill. M. I. co-*

12 *quatur in tb. 1. olei chamæ. & tb. 3. vi-*

13 *ni, ad eius cōsumptionē. Nec negligēdum mulieris illius remediū, cuius descripta est à Paul. Aeg. historia, cap. de lethargo.*

12 *Cap. de apoplexia.*

13 *Idem.*

ex quo ad sinapismum. Sīnapismo autem sic vtendum est, vt simul atque pars rubuerit, reuellatur, parsque oleo calido foueatur. Quòd si dolor vehemens inde excitatus est, leniendus erit rosaceo, meliloti, chamæm. aut maluæ decocto, aut oleo violaceo.

Oportet autem sinapismum subigi ex aqua, vt vult Oribasius, non ex aceto, vt recentiores ferè Medici, & olim Archigenes. Aëtius ex aqua, vbi præmaduerint ficus sicca Credidit enim Oribasius vim sinapisini aceto dissolui. Id quod experiētiā didicit. Huic rei vtile est diacopregias Aureliani: aliorum diascyllatum, ex caprino stercore, aceto, vel posca subacto.

Sunt & 14 Phœnigmi, qui rubrificant, ex nasturtij semine, sinapi, helenij radice, columbarum agrestium stercore, scylla in mortario trita & illita, aliorum tunica, lacte tithymali, cantharidum puluere, vrtica, atramento sutorio, euphorbio. Hæc autem tandiu inhæreant, dum pars rubescat. Si quæ ampullæ excitatæ sunt, compungantur. Ampullas attoller, quod sequitur.

14 Phœnig-  
mi & sin-  
apismu mini-  
mè vtendum  
in lethargo,  
quòd contor-  
tus cum fe-  
bre sit, quæ  
hæc calida  
respuit.

℥. sinapi, piperis, euphorbij ana ʒ. i. Incorpo-  
rentur melle anacardino, & in parte sinantur, dum  
ampullæ tumeant. Mel anacardinum ita fieri oportet. Anacardos septem diebus in aceto macera-  
bis prius contritos: tum in eodem coques, dum ter-  
tia pars aceti consumpta sit. Refrigerari fines.  
Quod supernatabit oleosum, mel est anacardinum  
Albucasis in aqua macerat & coquit. Alij mel ana-  
cardinum appellant, in quo anacardi fuerint con-  
diti. Oportet autem, quemadmodum in apoplexia

Mel Ana-  
cardinum.

15 *Fotu, li* dixi, dum hæc fiunt, stomacho & visceribus 15  
*tu, conditu,* consulere.

*Et pulveri-*  
*bui cardiu-*  
*cu.*

## EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Lethargus, Caros, Arabibus Subeth, Catoche, Cataphora, Coma, affectiones sunt somniculosæ, in quibus somnus artius, quàm pro naturæ lege, hominem complectitur, ob idque inter morbos, aut morborum symptomata numeratur. Sed neque de nominum distinctione, neque de causis satis constat inter Medicos. In Lethargo æger perpetuò in somnum labitur, obliuiosus, stupidus, crebrò oscitans. Sæpè ore hianti persistit, velut os claudere oblitus. Urinam reddit iumentorum lotio similem: sumptam matulam quandoque se tenere non meminit, argumentum læsæ potissimum memoriæ, & posterioris ventriculi, aut potius substantiæ cerebri. Lethargi causa ex comm. I. in Protrhet sent. I. causa est intemperies frigida & humida cum pituita cerebrum madefaciente, & tumorem frigidum efficiente, quæ incallescens & semper putrescens febrem lentam inducit. Aliquando succedit phrenitidi, feбри continenti, & similibus, ob cerebrum impensius refrigeratum, vel immodicam vacuationem, & natiui caloris imbecillitatem.

*Lethargi*  
*signa.* In Κάτω. siue sopore profundo, somnus altior, quàm in superiore, oculi perpetuò clausi, omnis sensus atque motionis priuatio, excepta respiratione, quæ illæsa manet. Vnde perspicuum, cum lethargo conuenire materiâ, crassoque & viscido humore procreari, licet etiam & à crassiore vapore per cōsensum, vel à toto corpore, vt in vigore & accessionibus febrium à pituita, vel ventriculo, hypochondriis, intestinis, medicamentis calidis, aut laxantibus, putredine à vermibus, vt in pueris. Differre aut primum loco, quia fit in anteriore cerebri parte, non vetriculo. Sic enim epilepsiâ potius inferret. Deinde, materiæ putredine. Neq; enim humorem habet putrescentē, neque cum febre. Postremò, quia sequitur aliquem morbum, sæpius febrē pituitosam & spuriam, vehementiorē tamen febre lethargica, cuius velut symptoma est. Succedit quoq; comitiali morbo, cerebri cōpressioni, fracto cranio, oblesis meningibus, vehementiori in tēporibus ictui. In Catalepsi æger exiguum quid aliquando loquitur, aliquando penitus motus &

*Lethargus*  
*& carus in*  
*quibus con-*  
*ueniunt, &*  
*disident.*

sensus sopiuntur. Ab utrôque differt siccitate. Fit enim (si Galeno credimus) à vehementi refrigeratione, cum quadam *Gal. cōment. in aph. 3. lib. 2. Apho.*  
 siccitate. Deinde loco à Caro, quia fit in occipite. Sed certior distinctio, & patognomonicum signum est, quòd ægri oculos apertos habeant, atque in eo permaneant habitu, quo correpti sunt, tensione nimirum inducta à siccitate, præcipuè in mûsculis oculorum, qui in superioribus affectibus humore dissoluti concidunt, & eisdem claudunt. Catoche idem significat. Scribit enim Paulus, affectum, qui veteribus *Paul. Æginet. cap. 10. lib. 3.*  
*κατοχος* dicebatur, recentioribus Catalepsim, siue *καλοχην*, veluti detentionem & deprehensionem, & *καλόχους* ἢ *κατεχο-μίσους*, quasi dicas occupatos, detentôsque nominari. Alij distinguunt, Catochem esse *ἄγρυπνον καῶμα*, soporem vigilantem, cum æger somno premi videtur, & tamen vigilat, sed nec loqui, nec membrum vllum mouere potest, vt scribit Galenus Commentariorum 2. in libr. Prorrh. Cuius affectus contrariæ sunt causæ, biliosus humor, & pituitosus. Cataphoram Galenus 13. Methodi sumpsisse videtur, tanquam genus omnium soporum sine febre. Rursus Coma omnem Cataphoram significat, diuiditurque inuigilans, & non vigilans, passim apud Galenum. Sed remota omni nominum ambiguitate, de qua toties ille ipse celeriter ad passionem veniendum esse iubet, ne rerum cognitionem, de quibus perpetuò agendum, præripiat, Medico ægrum sopore correptum cernenti primò considerandum, an respiratio læsa sit. Sic enim, erit apoplexia. Sin libera appareat, proximum, an oculos clausos habeat, an apertos. Clausi lethargum, vel caron indicant. Quod vt distinguatur, videndum deinde, an sit febris, nec superuenerit alteri morbo. Sic enim erit lethargus: in quo etiam tremorem manuum, vultum discolorum, turgidum, pulsus tardos, debiles, & cætera, quæ notat Hippocrates. At si sine febre, & post alium morbum aut accessionem febris spurix, caroticus æger est. Sin oculos apertos habeat, & rigidum sit corpus, catalepsim iudicamus. Cuius causa (vt dicitur) vel sanguis est, vel melancholia. Si partim vigilet, partim dormiat, *ἄγρυπνον καῶμα*. De humore exuperante deinde iudicandum ex propriis cuiusque signis. Curatio perficitur, primùm sanguinis missione (si venæ tumeant) è cephalica: deinde vena frontis.

## DE MORB. INTERNIS

Alioqui periculosa sanguinis missio in tanta frigiditate. Clysteribus primùm tenuantibus & alterantibus pituitam, postea trahentibus, & acutis glandibus, frictione vehementi, ligaturis extremorum, auulsione barbæ, capillorum capitis, pudendorum, suffitu ex fœtidis, vinctione sinapi facta in palato, aut benedicta, aut hiera picra. Post hæc omnia, sternutamentis. In principio repellentia admouenda sunt sincipiti, licet magis in occipite sit affectus. Est enim rarius, & multis futuris peruium.

*Excitatur quoque.*] Longè lepidiùs, non sine tamen medica ratione, Opimum illum auarum apud Horatium Medicus fidelis è somno profundo reuocauit: qui

*Horatius  
satyr. 3. li. 2.*

Quondam lethargo grandi est oppressus: vt hæres  
Iam circùm loculos & clauas lætus, ouansque  
Curreret. Hunc Medicus multùm celer, atque fidelis  
Excitat hoc pacto: mensam poni iubet, atque  
Effundi faccos nummorum, accedere plures  
Ad numerandum. Hominem sic erigit, addit & illud:  
Ni tua custodis, auidus iam hoc auferet hæres.  
Mén' uiuo? Vt uiuas igitur, vigila.

Non dissimili techna alter vinosus excitatus fuit, cùm audiisset vasa sua vinaria vehementiùs commoueri, atque inde vinum ebibi. Non inutile etiam sonitu tubarum & musica noctu aut interdiu ægrum aliquo, aut per cubiculum ambulantem circumducere. Cæterùm notandum, quod admonet Hippocrates 3. de morbis. cum multum liquidumque per aluum deiicit lethargicus, pusillam vitæ spem esse.

*Lethargicus  
pusilla vitæ  
spes à liqui-  
diore, aluo.*

*Castorei*] Mirificè prodest neruosis affectibus, etiam in potu sumptum. Mesue à granis tribus ad quatuor dabat ex oxymelite, idque post vacationes.

*Postea cucurbitula*] In statu cum multo igne & scarificatione affigendæ sunt occipiti, non solùm ad sanguinem, sed vt inde etiam calor natiuus excitetur, & materia reuellatur. In principio humeris, ad diuersionem & euacuationem.

ANTO.

**L**ethargus continuus est præter naturam sopor,  
 cum febre lenta & obliuione, vitio cerebri ge-  
 nitus: principe scilicet animæ parte à pituita labe-  
 factata, & sensu, motuque oppresso. Pituitosus ille  
 humor, Galeno teste, in cerebro putret, cum febre,  
 & citra febrem, quamuis plerumque lenta febris  
 adsit. Arabes œdematodem esse inflammationem  
 arbitratur. Nonnunquam hoc malum oritur à va-  
 poribus crassis & frigidis è visceribus & præcor-  
 diis sublatis, interdum à sola intemperie cerebri fri-  
 gida & humida, quam medicamentorum impensè  
 refrigerantium vsus, vti accidit in phrenitide, in-  
 uexerit. Lethargi signa satis sese produnt. Cogni-  
 to affectu eiusque causis, indicantia (seruato sem-  
 per contrarietatis scopo generalissimo) per facile est  
 reperire, etiam si medicinam huic morbo facere nõ  
 æquè sit facile, cum propter affecti loci præstan-  
 tiam inter lethales morbos ab antiquis Medicis nu-  
 meretur. Recta victus ratione, quæ pituitæ gene-  
 rationi aduersetur, præscripta, ex cibis tenuant. in-  
 cidentib. còctu facilibus, hydromelitis, vel vini alb.  
 oligophori potu, & rebus non naturalibus debi-  
 to modo adhibitis, de auxiliis etiam atque etiam  
 cogitandum est. Primùm omni ratione à somno  
 excitatus æger, vt antè in apoplexia, vacuabitur ve-  
 næ sectione, nisi adsint quæ mimonem sanguinis  
 impendant, crudus videlicet humor, pueris ætas,  
 anni tempus, in quo sit vel extremus calor, vel fri-  
 gus, vbi ad acriora enemata veniendum præcipit  
 Paulus. Vel hac acriuscula purgabitur portione.

*Galen. com-  
 mēt. ad sentē  
 I. Protrrb. I.  
 lib. 3. de loc.  
 aff. et lib. de  
 diff. sympt.*

*Lethargi  
 curatio.*

*Hippoc. lib.  
 de vict. rat.  
 in acut. &  
 Gale. comm.*

*ad sentē. I. I.  
 sect. 3. lib. I.  
 Epidem.*

*Hippoc. lib.  
 2 de vi. orb.  
 Gal. cap. 21.  
 lib. 3. Meth.*

*Paul. Agri-  
 cap. 9. lib. 3.*

# DE MORB. INTERNIS

1 Caros à no  
minexápn,  
hoc est caput,  
nomē habēs,  
affect⁹ est ca-  
pitis, in quo  
egrit nec sen-  
tiūt, nec mo-  
uētse, seruata  
tamē respira-  
tione libera.  
Gal. li. 4. de  
loc. malēaffe.  
& Comm. in  
21 sent. f. iij.  
di de articul.  
vnā iij sensu  
& motu ra-  
tione etiā &  
memoriā ladi-  
scribit. Hic  
anteriores ce-  
rebri partes  
magis affi-  
ciūtur. Hu-  
ius mali cau-  
sa materia est  
frigida cor-  
ruptionis ex  
pers. Fit etiā  
à causis ex-  
ternis, vt im-  
modico refri-  
geratiū vsu,

℥. hieræ diacolocynth. 3. 2. dissol. in aqu. beton. & ca-  
lendul. addit. syrup. de stœchad. 3. 3. f. potio. Vel ℥. expres-  
sionem 3. 3. myrobal. cepul. in aqu. salu. infusar. rhei elect. in  
ead. aqu. infus. 3. 1. 3. in qua dissol. cathol. & syrup. de bizantiis  
ana 3. 3. f. potus. Vel ℥. folic. fenn. mund. 3. 2. agar. recens  
troch. 3. 4. infundantur in hydrom. cum gr. 3. zinziber. In ex-  
pressionē dissol. electar. diacath. 3. 2. hieræ simpl. 3. 1. syrup.  
capill. ven. 3. 3. f. potio.

Conferent reliqua quæ reuellunt, tum etiam cu-  
curbitulæ occipitio admotē, & initio litus frontis  
& temporum ex oxyrhodino, in quo duæ tan-  
tūm aceti partes, pro 7. olei, adiiciantur. Oleum  
chamæm. admiscetur, vel aqua beton.

Postremò digerendus humor sumptis & admo-  
tis. Sūptis, vt electa. lētificante Gal. diamb. aromat.  
ros. ther. mythrid. cōseru. anth. calendul. ex quibus  
opiat. vel condita parabuntur. ℥. conseru. anth. &  
calendul. ana 3. 2. conser. ros. 3. 1. puluer. electar. arō.  
ros. 3. 1. acor. condit. 3. 4. cum syru. de stœch. f. opiat.  
vel cū sacch. conditū. Admota crūt, litus, vnguent.  
fotus ex oleis digerent. & discutientib. vitatis tamē,  
propter febrem, calidiorib. Galenus tamen sinapif-  
mo materiam in alto reconditā trahere non refor-  
midat. Iisdē fermē remediis (excepta phlebotome)  
omnes soporosa affectiones percurantur.

## De I Caro. CAP. 9.

**C**aros cum lethargo 2 conuenit, 3 sed maior ac  
profundior sopor est. Stimulati non excitantur:  
interrogati non respondent.

ebrietate, ictu, casu, contusione, arteriarum carotidum & musculorum temporalium  
vel à depresso cranio, dum quis inter serrandum grauius opprimit.

2 Materia, in generatione, non in corruptione: quod caros febrem minimè habeat  
symptomaticam. 3 Tunc enim motrix cerebri facultas materia frigida & humida  
copia oppressa iacet, si que imaginandi facultatis paralysis.

Eadem curatio, quæ lethargi, nisi quòd magis incidentibus & attenuantibus vtendum est.

Est & quoddam genus delirij inter phrenitidem & lethargum ex bile & pituita. Veteres 4 typhomaniam aut typhoniam appellârunt. In qua affectione si superat bilis, coma peculiariter appellatur: si pituita, catochos.

Fit & Coma 5 vbi à calidioribus & humidioribus vaporibus ex reliquo corpore sublatis caput repletur.

Catalepsis nomen ambiguum est. Nam aliquando subita, vocis amputatio, sensus & motus priuatio intelligitur, quam 6 aphoniam Hippoc. vocauit, Græci etiam 7 *ὑπόληψιν*.

Ea interim fit plenitudine sanguinis, quæ vias spiritus animalis intercipit. Sed quæ peculiariter catalepsis dicitur, à melancholico succo aut vapore posteriorius cerebrum obturante & siccante fit. Derepente muti fiunt: neque concidunt: sed in eodem habitu permanent: apertis oculis, si prius aperti essent: stantes, si starent: sedentes, si sederent: ex quo vulgus credit non dolere, aut ita mortuos viuere: sed (vt loquuntur) raptos.

Consentientibus conditionibus, cephalicam secato, si facies rubet, repleta appareat, lineescat, &c. Clysteres molliores primùm, dein acriores iniiciendi. Vbi calor est in capite, refrigerantibus: vbi frigus, calefacientibus oleis & litubus vtor.

A purgatione totius corporis commodum erit caput, & totum denique corpus oleo anethino, iasmino, sesamino, aut similibus inungere vel calentes pelles recens detractas inducere.

4 De hac vide Galem. comment. in sent. 1. sect. 1.

Priori Prorrhetic.

5 Coma Hippoc. in Coac. animaduert.

fit à resolutione, perfrigeratione & opprobriatione cerebri.

6 Aphonie nomen apoplexiam, eorum, cateraque cum sepo re coniunctas complectitur affectiones.

7 Hæc secunda apoplexia species existit.



# DE MORB. INTERNIS

Vrinæ quia crassescunt vt plurimùm, imperanda quæ tenuent, & vrinas moueant. In tremore castoreum ad ʒ. i. è mulla exhibendum.

## EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

*Ea interim.*] An ab intemperie sola fiat Catalepsis, an cum humore: & si cum humore, quânam ille sit, non facile est diiudicare. Galenus enim videtur ab intemperie frigida sicca fieri censuisse. Sed cum repentinè inuadat & desinat, intemperies autem sicca repentinè induci nequeat, aut tolli, necessariò confiteri cogimur aliquem subesse humorem. Aëtius præter sanguinem, atram bilem ponit. At si ita res habent, cur non omnes melancholici incidunt in catalepsim, præsertim si fiat in ventriculis? Nisi dicamus in catalepsi non ventres, vt in melancholia, sed venas & arterias, quæ in cerebri meningibus disseminatæ sunt, eo humore repentinè & affatim impleri, inflatas distendi: inde sequi rigorem totius corporis instar corporum frigore concrefcentium. Fit etiam à sanguine multo & copioso venas inflante, & tensas retinente, sicuti quum humores in conuulsione neruos contrahunt. Eodem ergo modo fit catalepsis, quo apoplexia, nimirum substantiâ cerebri irrigata per defluxionem, vel sanguine, vel melancholico humore.

Secretarius Vasco in febris declinatione, & alui profluvio, vrinis bene coctis, certam valetudinis spem præbentibus, catalepsi deprehensus vno die obiit Anno 1552. Augusto mense. Aperto cadauere pulmones & hepat corrupta inuenta sunt, serum quasi rufum cerebro posteriore contentum, & sanguis concretus in maiore vena, quæ medium caput perreptat.

## ANTO. VALETII EXERCIT. IX.

**C**Aros capitis est grauitas, quam inexpugnabilis dormiendi necessitas consequitur. Distinguitur hoc nomine à lethargo, quod lethargus posteriorem cerebri vëtriculum, caros anteriores eiuf-

*Aëtius ca. 4.  
Tetrabihl.  
2. Serm. 2.*

*Catalepsis  
quâ fiat.*

dem cerebri ventriculos obfideat. Differt etiam ab apoplexia: nam hæc (si neruorum sit obstructio, & affectus cerebri proprius) cerebrum omne occupans, in paralyfim, quum soluitur, degenerat: at illud finitum bona valetudo magna ex parte excipit. Somniculosus eius generis affectibus catoche & catalepsis adscribuntur, quas Gal. appellatione cataphoræ complexus est cap. 12. lib. 13. Meth. Easdem distinxit Paul. Ægineta cap. 10. lib. 3.

*1 Paralyfis symptoma est facultati animalis, & sensu & motu priuatur. Quum enim corpori totus motus & sensus perditur, dicitur apoplexia. Pars primario affecta est cerebrum ipsum, aut spinalis medulla principium, vel dimidia tantum c. 9 pars.*

Caros vel est primarius cerebri affectus, & causam habet frigidam humidam intemperiem, solam, vel cum materia, qualis infantibus in frigido præfertim & humido aëre diu educatis, necnon iis, qui ædificia recens gypso inducta inhabitant, sæpe accidit, & hic lethargi remediis curatur: alius ex consensu subiectæ partis alicuius, vt ventriculi, materiam aut multitudinem vires opprimentem, aut frigiditate humida stupefacientem transmittētis: qui purgantibus cedit, vel etiam alexipharmacis, in illa expellenda materia, si deleteria fuerit, agentibus, profligatur.

*Paralytica remedia.*

C A P. 10.

**P**aralyfis de qua hîc agimus, familiaris 2 apoplexiæ, resolutio est dimidij corporis, non totius, quarundam partium, non omnium, à crasso & frigido humore, à quo neruosum 3 genus remouetur, atque resouetur.

*Causa paralyseos triplex: obstructionis, compressio, & diuisio. Fit autem, quando animalis spiritus tota sua substantia ad priorem eam,*

In his clystere primùm vtendum est, molli quidem, si diutiùs fæces alui substiterint: deinde etiam acriori.

*à qua suscipitur actio, perreptare nequit.*

*2 Etenim succedit paralyfis.*

*3 Ac præsertim spinalis medulla nerui.*

# DE MORB. INTERNIS

4 *Nec solum partes quæ mouendi vim amiserūt, sed radix neruorum, quæ partibus illis vim sentiendi impertit.*  
5 *Vt chama. anethino.*

Partes 4 resolutæ oleo 5 moderato, sed calente, fouendæ sunt.

De phlebotomia non conuenit inter Græcos & Arabes.

Detrahendus quidem sanguis est mediocriter ex cephalica partis integræ, authoribus Græcis. Frigidum enim eorum corpus, frigidus quoque morbus. Itaque larga sanguinis missione languidum calorem extingui metuunt.

Rhazes, & qui hunc sequuntur, ex utrâque cephalica ad tres aut quatuor libras: postridie etiam ex venis 6 linguæ sanguinem detrahunt. Græcis tutiùs adhærebis.

Instituendus 7 victus. Primùm quidem leuiter incîdat, attenuet, & detergeat. Potus sit hydromel ex sexcupla aqua, in qua modicum stæchados, aut acori (*vulgaris: adstringit & neruis robur addit*) aut ireos Florentiæ coxerit: gratiâ exempli, horum & similium ʒ. i. in lb. 2. aquæ, quale est.

ʒ. rad. ireos Florentinæ ʒ. i. coquatur in lb. 2. aquæ, dum dimidium libræ consumptum sit. In col. dissolu. mellis communis quartarium vnum: despumetur, fiat hydromel despumat. Vel etiam parabitur hydromel ex radicis acori & saluiæ decocto. Poterit & cinamomum & mastix & cario-phyllum in aqua concoqui, atque inde hydromel parari. Loco etiam mellis saccharo (*Candum magis exsiccat*) vtetur, si febris 8 suspicio est, modicôque cinamomi, aut rerum eiusmodi vti oportebit. Quale est.

ʒ. aquæ coctæ lb. i. coletur per manicam Hippocratis cum sacchari ʒ. 3. & ʒ. 2. 9 cinamomi.

6 *Ad amotionem causa coniuncta.*

7 *De duçda enim cibi asueri pars altera.*

8 *Aut si æger sit tibi dum sit.*

9 *Leuiter sci licet confusi: alioqui enim catarrhum mouet.*

Vtatur afflis carnibus, quæ caryoph. cinam. & lardo configantur: vel lardum, quo figuntur, aspergemus, pul. cinamomi, nucis moschatae, & caryophyllorum.

Vtatur granis 10 pini conditis, & canella tritis. Abstineant aqua, & vino, & longiore 11 somno.

Materia potionibus 12 incidenda, ut hydromelite (*oxymel noxium, ob acetum* : ) aceto tamen cum caryophyllis & rebus capitalibus cōcto uti nihil prohibet, maximè verò in viscida materia : quæ nonnunquam oxymel cum decocto guaiaci parare suadet) in quo stæchas, cæteraque eiusmodi coxerint, ut est serpillum, pulegium, & similia. Deinde purgandum hac potione.

℥. pul. hieræ diacolocynt. 3. 2. mastichis, bdellij ana ʒ. 1. nucis moschatae, spicæ, rosarum ana ʒ. 1. omnia incorporentur modico conferuæ borraginis. Vel hac veterum potione.

℥. polyp. quern. 3. ʒ. sem. anisi & apij ana 3. ʒ. fiat decoctio ad 3. 3. quæ coletur per manicam Hippocra. cum 3. 1. mellis albi, cinamomi, 3. ʒ. In col. dissol. pul. hieræ diacolo. ʒ. 4. pul. hieræ picræ 13 ʒ. 2. fiat potus.

Possumus uti & pilulis alephanginis, imperialibus, assaferet, de agarico, fœtidis, cocciis. Aliis quoque suprâ descriptis. cap. de sôda phlegmatica: ubi etiam syrups descripti sunt, qui plurimum conferent, si per intervalla paralyticis imperentur.

Dum hæc fiunt, oleo calente, sed temperie non ita calida resolutæ partes fouendæ sunt. Stomacho etiam & visceribus, ut prius, consulendum est.

Conferuæ quoque instituendæ sunt, iuæ, anthos,

10 His absti  
nēdū est, quod  
oleosa sint, et  
p̄grua, ob id.

q; καρηβαρη  
κα, id est, ca-  
put grauātia

11 Qui mate  
riā intrō co-  
git, cerebrum  
que opplet  
humoribus.

12 Ut hydro.  
conditis Ce-  
phalicis, aq.  
melissæ.

13 Aut 3. 2.  
hieræ picræ  
in hydromeli  
ie origanato  
dissoluantur.

14 Ut his  
quarū hæc sit  
descriptio ℥.  
agar. troc. 3.  
2. turpethi  
gūmofi 3. 1.  
ʒ. sal. gemm.  
zinziberis

an. ʒ. 1. In-  
fundatur in  
vino albo. In  
expressione  
dissolue pul-  
uer. hieræ. pi.

cr. 3. 1. diaco-  
locynth. 3. 2.  
f. massa, ad  
3. 1. viciā in  
singulis doses.

## DE MORB. INTERNIS

saluiæ, stœchados (*quæ duæ principatum obtinent*) enul-  
læ, gentianæ, acori, ireos, zinziber conditum, con-  
dita nux molchata, theriaca, mythridatium. Dosis  
conseruarum ad ʒ. i. aut 2. quas vtiliter commisce-  
bis cerebro leporis asso, quod peculiari natura con-  
uenire scribunt paralyticis.

ʒ. conf. iuæ, conf. anth. & salu. an. ʒ. i. cerebri le-  
poris recenter assi. ʒ. β. cinamomi, nucis moschatae.  
an. ʒ. i. cū saccharo in aqua iuæ dissoluto fiat elect,  
secundum artem, vel conditum. Huius 15 detur ʒ. i.

15 *Vt eius  
antidoti a-  
nathymiasis  
crassos vapo-  
res emendet,  
et ad cerebrū  
translata, ip-  
sum recreet,  
materiamq;  
ad exclusionē  
præparet.*

Theriaca & mythridatium, vt & alia omnia re-  
media fortiora, 16 magis conuenient post purga-  
tiones. Dosis ʒ. 2. vel ʒ. i. quæ interim commiscebis  
conseruis, aliquando dissolutis in hydromelite, in  
aqua vel decocto iuæ, calendulæ, rosmarini, salu.  
stœcha. aqua vitæ, aut vitis.

16 *Quæ sint  
analogæ cere-  
bro et morbo.*

Post hæc cucurbitulæ locis affectis sine scarifi-  
catione aptandæ 17 sunt, ac deinde collocandæ,  
sed maximè radicibus 18 neruorum.

17 *Vt sopi-  
tam naturā  
excitent.*

Probant quoque vomitiones semel in hebdo-  
mada (*quæ tamen à cibo in paralyfi linguæ noxiæ*) stuphas  
siccas, & balnea. Stuphæ parari debent ex decocto  
herbarum conuenientium, maioranæ, saluiæ, origa-  
ni, calamenthi, calendulæ, sarmentorum vitis, pule-  
gij, serpilli, stœchados, & 19 rerum eiusmodi.

18 *Quæ sen-  
tiendi facul-  
tatē paraly-  
ticis membris  
imperitunt.*

Collocabitur resolutū corpus loco bene cōclu-  
so, ne fumus decocti euanescat. In decoctum silices  
candentes iniiciemus, vt fumus fiat. Ex iisdē rebus  
balnea cōparentur. Probant quoq; balneum ex de-  
coctione vulpis integrę cū herbis suprā memoratis,  
inūctiones, primū molles seu leues, deinde acres.

19 *Vt radicū  
ireos, betoni-  
ebul foliorū  
lauri, bacca-  
rum laur. &  
iuniperi.*

Partes itaque primùm fouendæ oleo cham. de meliloto, anethino, amygdalarum dulcium, de lilio, hyperico, iasmino, de 20 keyri, de nucibus, de *De violis luteis.* sem lini, de maiorana, de galbano, nardino, cannabino, raphanino, ricinino, de costo, de spica, laurino, de cucumere asinino, sinapino, de pipere, de euphorbio, de pyrethro. Oportetque à leuioribus ad fortiora progredi. Flocci lanæ in his oleis inungendi sunt, & ex his fouentur 21 partes affectæ, postea *21 Ut excutatur natura vis & materia vincatur.* etiam conteguntur.

Olea componuntur ex olei quatuor, aut quinque partibus, aquæ iuæ, aut succi conuenientis parte vna, & aliorum quorundam medicamentorum decima, vel duodecima, quale hoc est.

℞. ol. de Iasmino ℔. i. aquæ saluæ, aut succi iuæ, vel vini, in quo iua coxerit, ℥. 3. castorei, pyrethri, euphorbij, piperis, benzoini, assæ fœtidæ, opopanax, galbani, gagatis lapidis, horum vnus ℥. i. fiat decoctio ad aquæ, succi, aut vini consumptionem. Olea composita. Oleum de scylla (*vel oleum antiquissimum, in quo sit decocta scylla: valde enim incêdit*) prius descriptum. Aliud.

℞. terebinthinæ 22 ℔. 2. laterum antiquorum, *22 Venete.* aut (*ut vult. Albucaſis*) recentium in oleo iasmino extinctorum, macis, styracis ana ℥. i. benzoini ℥. 3. fiat distillatio in alembico vitreo. Tres humores fluent, quorum tertius erit optimus. Oleum de lateribus lege apud Mesuem.

Balsamum & oleum 23 balsaminum mirè commendantur, sed rariora sunt, & tantùm Principum. *23 Cuiusmodi est capite de paralyſi apud Guid. Caul.* Sed his respondere volunt, quod sequitur.

℞. 24 thuris albiſſ. mast. ana ℥. 2. ligni aloës ℥. i. *24 Vel iſind. terebint.*

# DE MORB. INTERNIS

*Veneta Et ab caryoph. galangæ, cinamomi, zedoariæ, nucis mos-*  
*ietinae an. 3.* chatæ, cubebæ, ana 3. 6. myrrhæ, aloës, ladani,  
*1. thur. alb.* farcocollæ, castorei ana 3. 6. baccarum lauri, nucleo-  
*ladan. an. 3.* rum pini an. 3. 6. ireos, aristolochiæ rotundæ, dictā-  
*3. nard. indi-* ni, consolidæ maioris ana 3. 1. gummi elenij opopa-  
*ca 3. 2. radic.* naxis, benzoini ana 3. 2. succi iuæ, succi herbæ para-  
*valerian. an-* lysis an. 3. 3. terebinthinæ 25 ad pōdus omniū. Om-  
*geli, ireos, a-* nia concorporabis, distillabis in alembico vitreo.  
*cer. azari,*  
*cyperi, cala-*

*aro. an. 3. 1.* Extillabit aqua primum: deinde veluti oleosum  
*mastich. 3. 2.* quid: postremò quasi mel.

*galang. ca-* Probaturn & oleum vulpinum descriptum à Me-  
*ryophyl. cas-* suæo, & hoc quoque.  
*sia ana 3. 3.*

*nuc. myrrisic.* 2. vnguenti de bdellio 3. 3. liquefiat in vase du-  
*3. 4. maci 3.* plici cum olei de terebinthina, de scylla, aut similis  
*1. 8. agallochi* 3. 3. Ex affata vulpe, vel alioqui cum oleo cocta, in-  
*3. 2. gummi* farcta priùs betonica, saluia, calendula, iua arthriti-  
*elen. 3. 6. a-* ca, primula veris, moschata, pinguedo elicitur, è  
*loës hepatic.* qua cum emplastris mollitoriis vnguenta confi-  
*myrrha ana* ciuntur. Poterunt & eadem emplastra conuenien-  
*3. 8. castorei* tia aqua vitæ, & saluiæ succo subigi.  
*3. 10. styrac.*  
*calam. laferis*

*an. 3. 1. sang.* Optimum erit corpora paralytica inungi ad 26  
*dracon. 3. 8.* ignem sarmentorum vitium.

*flor. lauendu-* Alius mollis perpetuò seruari debet clysteri-  
*la 3. 4. ole.* bus, aut pharmacis lenibus, aut suppositoriis.

*nucis vnguē.* Modus operationis medicamentorum, & eo-  
*lib. 8. repo-* rum, quæ partibus affectis apponuntur.

*namur in a-* Vnctionum, dropacum, phænigmorum, sina-  
*lembico.* pismorum, vt pars in ruborem attollatur, non exul-  
*25 Vt ad lib.* ceretur. Et cucurbitularum brevis mora esse de-  
*1. 8.* bet, ne quod attractum est, dissoluatur.

Sunt, qui certum experimentum dicant, si pars  
 affecta decocto maioris tithymali foueatur: dein-

de folia eius integra parti superponantur.

Errhinis & Apophlegmatismis, vt priùs, vtédum est. Apophlegmatismis 27 cum nodulo, aut bacculo ori appposito, vt diximus. Paralyticis, & neruorū doloribus laborantibus vinum prorsus fugiendum est. Porus sit illis mulsa, aqua mellita, quæ sit ex partibus octo aquæ, duabus vel tribus mellis albi, vel sacchari. Coquantur omnia simul. Colentur per manicam Hippocratis cum 3. 2. cinamomi, vel decoctum acori conditi.

*Pilula Coccia Rhaζa, & Mesuai.*

℞. pul. hieræ picræ 3. 2. interioris colocynthidos 3. 1. dacridij, 3. 1. vel gr. 6. turpethi gummosi, stæchad. ana 3. 1. cum succo fœniculi fiant pilulæ pro duabus dosibus.

*Coccia Nicolai, ex Galeno.*

℞. aloës, absynthij, pulpæ colocynth. squammonij an. 3. 1. mastichis 3. 1. cum succo fœniculi fiant pilulæ.

℞. aloës, scammonij, colocynthidos, agarici, bdellij, gummi arabici, ana 3. 1. & gr. 5. cum succo absynthij fiant pilulæ coccia. Eiusmodi pilulæ & caput purgant, & varios humores detrahunt, nec stomachum lædunt.

#### ESVSDM HOLLERII SCHOLIA.

In stupore, seruato motu, aut leuiter læso, sensus amittitur, aut debiliior redditur. In paralyfi utrôque priuatur pars ægra, illæsis tamen sensibus interioribus. Non enim, vt in apoplexia, vitium est in cerebri substantia. Si id accadat omnibus



## DE MORB. INTERNIS

partibus infra ceruicem, meninges, aut spinalis medulla in exortu affecta est. Altera corporis parte resoluta, dimidia tantum pars spinalis medullæ afficitur, aut meningum. Si qua verò pars sola (nam partes omnes motu voluntario præditæ, præcipuè quæ proprium neruum & peculiarem habent, huic malo obnoxia sunt) siue in capite, siue infra ceruicem labore, in illius particulæ neruo, vel eius exortu morbosa est affectio. In ἀπρωσία, vocales nerui, per quartam vertebra exortiti: in ἀπρωσία, respiratorij patiuntur. Sic oculorum resolutio, ad neruos, qui à secunda coniugatione è caluaria emerſi, in oculi musculos disperguntur, referenda est: palpebrarum, ad neruum tertiæ coniugationis per foramen ossis orbitæ transeuntis: labiorum, ad latum musculum, neruos è primis vertebriſ, & ramos è tertia coniugatione: linguæ denique (quod fit præcipuè in balbis post apoplexiam) ad neruum è tertia, aut septima coniugatione in linguam perreptantem. Eodem modo resoluta manu, in principio ceruicis, vel quinta vertebra affectio subsistit. Sensus tamen aliquis quandoque relinquitur, primæque brachij partes illæse seruantur. Minore noxa laborant ob læsionem in septimam, aut octauam, sed maximum inde thoraci infertur nocumentum. In resolutione parui digiti, & media parte annularis, afficitur neruus in cavitæte olicranij, siue cubiti, in aliis verò tribus (cæteris illæsis) vulnerata est, aut affecta spinalis medulla, circa principium neruorum brachij. Per defluxionem omnes digiti patiuntur, aut per concussionem. In sectione non est necessarium, quod nerui brachij in principio iungantur, & supra cubitum separentur. Cruribus resolutis, aut pedibus (in quibus facilius curatur hic morbus, quàm in manibus, ob sicciorē & robustiorē neruorum, quos habent, naturam) in vertebriſ lumborum, aut inguinibus consistit affectio. Sua etiam est ano, vesicæ, pudendo resolutio. Si descendat intestinum rectum, muscoli suspendentes malè habent, qui sunt in ipsius lateribus. Si excrementa retineri non possunt per aliquod tempus, sphincter resolutus. In resolutione musculi vesicæ, & quum pudendum erigi non potest, existente seminis flatulenti multitudine (quod sæpè contingit ob violentiorē contrectationē, natationē in aqua frigida, refrigerationē circa perinæum, compressiōnem, equitationē longam, & corporis extenuationē) nerui

*Paralyſis  
vitio neruo-  
rum quæ fiat.*

ab offe sacro, vesicæ incerti ac pudendo sunt in vitio.

Parte affecta hoc modo diligenter obseruata, ad causas veniendum. Continens siue coniuncta necessariò in neruo est, per quem spiritus, tanquam radius, in partes inferiores diffunditur: eaque vel intemperies sola, vel cum humore.

Trallianus aliquando fieri scribit ab intemperie sicca & calida sine materia. Vix tamen credendum. A calore quidem fieri posse perspicuum est, emolliendo neruos, humores pituitosos liquando, & aditum humorum deflusioni patefaciendo. Quod vinum sua tenuitate facit calori iuncta, vt Galenus docet. Sed quum subitò & confertim Paralyfis hominem corripit, dubitandum non est substantiam neruorum humore per defluxionem imbui, vnde molliores redditi extenduntur, & relaxantur, sicuti & tendones. Quo fit, vt ob plenitudinem & obstructionem spiritu non transeunte, vel quia lenissima contractione est opus neruo ad mouendam partem, membrum concidat, & immobile permaneat.

Sed à quo humore id fiat, non minùs difficile est iudicare. Doctissimis tamen viris non sine ratione videtur, neque à melancholia, neque à bile extra venas excitari paralyfim. Non à melancholia, quia neruos siccatur potius & cogit, quàm emolliat, vt in elephanticis, quorum membra aridiora facta non resoluuntur, sed imbecillius sentiunt: neque à bile. Cùm enim siccandi vim habeat, & acrimoniam adiunctam, conuulsionem potius inducit, neruos contrahendo & conuellendo. Ergo vel à sanguine solùm (nisi per accidens) vel pituita fieri potest, eaque vel crassa, vel tenui. A sanguine rariùs. Inde tamen oritur, cùm tenuior est sanguis, & multitudine sua viam spirituum intercipit, aut humiditate eosdem extinguit, aut neruos molliendo dissoluit. Idem fit à pituita tenuiore, sed multa, à cerebro defluente, & in neruorum substantiam penetrante. Frequentiùs autem à crassa, neruo tenaciter inhaerente. Quæ omnia ex humorum in corpore exuberantium propriis notis, ac victu antecedente faciliè discernuntur.

Causæ antecedentes sunt, quæcunque neruos contunde-  
re, comprimere, emollire possunt, casus, ictus, contusio, somnus in spelunca, domus recens polita, lunæ radius, exercitium à cibo, vel somnus. Sed frequentissimè Lutetiæ noua è

*Alexand.*

*Trall. cap. 16  
lib. 1.*

*Gal. cõn. in  
aphor. 5. li. 5.*

*Paralyfis*

*qua fit ex  
materia con-  
trouersum.*

*Paralyfis fit  
frequentius  
à crassa ma-  
teria.*

*Paralyseos  
causæ antece-  
dentes.*

## DE MORB. INTERNIS

*Paralysis et gypso politura & hunc morbum, & alios frigidos inducit.*  
*aliq morbi fri* Arelatæ grauiſſima viſa eſt ex leui vulnere, illæſo cranio, ſed  
*gidi Lutetia* ſanie per meatus futuræ ſagittalis ingreſſa ſenſim ad tenuem  
*frequentes.* meningem, quæ cerebri ſubſtantiam obuoluit, neruôs, ve-  
 nas & arterias ſuſtentat. Vnde primùm eiſdem partis re-  
 ſolutio, ex qua mors conſequuta eſt: ſectio cranio pus in-  
 uentum. Quod F. Valeriola, vir Philoſophiæ & Medicinæ pe-  
 ritus annotauit: cuius obſeruaciones propediem in lucem exi-  
 turas audio.

Curatio perficitur primùm purgato ventriculo, & intelli-  
 nis, vel pilulis leuioribus, vel clyſteribus: ſyrupis attenuanti-  
 bus, aperientibus, digerentibus; deinde pilulis paulò for-  
 tioribus. Poſt purgationem, uſu theriacæ per aliquod tem-  
 pus, inunctione leuiori ad valentiorē progrediendo: repe-  
 tita purgatione (morbus enim contumax eſt, & diuturnus)  
 opiat, gargarismatis, maſticatoriis, pulueribus, diætā in  
 corpore humidiorē, vnguentis, emplaſtris, linimentis, bal-  
 neis, cucurbitulis frequenter adhibitis, exulceratione facta,  
 aquis diſtillatis, victu tenui. In particulari paralyſi topica  
 adhibenda ſunt eo tantum loco, vbi affecti nerui, vel muſcu-  
 li eſt origo.

*Phlebotomia.*] In plethora, & ſanguinea reſolutione, contu-  
 ſione, ictu, aut caſu, de ſectione venæ nulla dubitatio, deflu-  
 xionis præſertim imminente periculo: liberior quoque, ſi fe-  
 bris iuncta ſit, ſed in omnibus ad exiguam quantitatem. Venæ  
 linguæ, ſi ipſa reſoluatur, aperiri debent, præcedente tamen  
 purgatione, & deriuatione.

*Acori.*] Vulgarem intellige, cuius radix leuiter adſtrin-  
 gendo, & reſiccando, neruis relaxatis addit robur. Iris quoque  
 recens pituitam purgat, & ſeroſos humores: ſicca, pituitam at-  
 tenuat, & incidit.

*Partes primùm oleo, &c.*] Olea calida, parùm exſiccantia non  
 conueniunt, vt de lilio. Cum enim nerui conſtitutio frigida ſit  
 & ſicca, ab ea indicatione ſumpta, emollientibus non eſt vtē-  
 dum. Admiſcenda etiam tandem erunt, quæ leui adſtrictione  
 & temperato calore partem affectam roborant. Foueantur  
 partes oleo: deinde pellibus agnorum pinguium, aut vulpis,  
 odore conuenienti imbutis ad ignem inuoluantur. Sequenti-  
 bus ſæpè uſus ſum proſperuino cum ſucceſſu.

℥. vini rub. ℥. 1. olei lumbricorum ℥. 2. aquæ *Hollerij ex-*  
vitæ ℥. 2. corniculorum cerui magis spongiosorum *perimenia ad*  
℥. 3. pulueris chamemeli ℥. 1. salis ℥. 3. mastiches ℥. 6. *paralysis.*  
bulliant omnia duplici vase ad vini consumptionem. Probè misceantur.

Ciconia implumis, sed viua, tandiu coquatur, dum carnes ab ossibus recedant, in mortario teratur: rursus in oleo coquito: coctam sacco fortiter colato, & abiectis reliquiis, Cera, colophonie, seui, olei laurini ℥. 2. olei mastichini, medullæ cerui, adipis vrsi ana ℥. 1. galbani, terebinthinæ ana ℥. 4. coniungantur. Emplastra molliora, diachylon, resumptium, &c. soluta in oleo cham. vel nardino: postea quæ discutiunt, vt acopa: postremò attrahentia, & roborantia, vt metasyncritica.

## ANTO. VALETII EXERCIT. X.

**A** Nimalis facultatis symptoma est paralysis, in qua motrix & sensitiua facultates sunt læsæ. *Gal. cap. 6. lib. 1. de loc. mal. aff. & cap. 10. li. 3. itémque cap. 5. lib. 1. de caus. sympt.*  
Læsionis causæ intemperies, morbus in cõpõsitio-  
ne, vnitas soluta. Vel enim nerui immodice refrige-  
rantur & humectantur: vel resolutio humore crasso  
in eorum principum incumbente replentur, vt post  
apoplexiam: vel fit obstructio circa colli vertebrae,  
aut partes inferiores: vel denique ab externa aliqua  
causa, vt duri corporis compressione, laqueo, per-  
cussione, luxatione, fractura, vulnere, afficiuntur.

Paralysis alia particularis, quæ partem tantum *Paralysis duplex.*  
aliquam, vt brachium, linguam,prehendit: alia ab-  
solutè dicta paralysis, quæ dimidiati est corporis,  
dextri, vel sinistri, ex obstructione in spinalis me-  
dullæ processu facta.

# DE MORB. INTERNIS

*Paralyf.  
curatio.*

Curatio vt optimè progrediatur, victus calfaciens, siccans, & pituitæ generationem prohibens deligendus. Vinum perinitia noxium, quia tenuitate sua partes neruofas facilè permeat & implet: quanquam declinante morbo discutiendo & desiccando miuificè prodest.

Si plenitudo adest, sanguis ducitur, sed mediocri quantitatē, ne corpus nimium perfrigeretur. Si cacochymia prægrauat, purgatio præfertur.

℞. aquar. maioran. & betonic. ana ℥. i. f. infunde agar. rec. troch. ʒ. 2. In colatur. dissol. diaph. ʒ. 2. syrup. laxat. ros. pall. ʒ. 6. f. dos. Vel his pilulis vtor. ℞. specier. hieræ picræ dupl. aloë ʒ. ʒ. massæ interioris pil. de agar. & sine quibus ana ʒ. i. Excipiantur melle rosato, vel aqua salu. f. pil. moll. à primo somno exhibendæ.

Pars primariò affecta, vt summa ceruix, totaque spinalis medulla, oleis calentibus & calefacientibus, vt aneth. chamæm. & simil. quibus lanæ floccus madesiat, fouenda. Interim pituitosus humor quia denuò purgandus, præparatione eget. vt ℞. radic. pæon. mar. rusc. asparag. ana ʒ. 6. passul. munda. ʒ. i. summitat. hyssop. betonic. iuæ arthrit. primul. ver. ana M. i. femin. quat. calid. maior. ana ʒ. 2. flor. stœchad. anth. & cardiac. ana p. i. f. decoct. ad lb. i. In colatur. dissol. syrup. de duab. radicib. de bizantiis & de stœch. ana ʒ. 2. F. apozema in quat. doseis, quod condiatur ʒ. i. cinam. vel electar. aromati. ros. Sumat æger quatuor sequentibus matutinis: postea purgetur, vt antè. Nec omittenda sunt toto morbi tempore enemata, si aluum contigerit adstrictiorem esse.

His artibus perpurgato diligenter toto corpore, affecta pars subinde fouebitur hoc decocto.

℞. maioran.

℥. maioran. beton. salu. mentastr. primul. ver. iux̄ arthrit. ana. M. i. thym. epith. flor. stœchad. & anth. ana p. i. f. decoct. in aqua, addita sub fin. tertia vini albi parte, pro fotu ceruic. cum spongia. A fomento sequatur litus.

℥. olei costini, vulpin. & chamæm. an. ʒ. i. cum vnguento Martiato; vel Aregon. f. linimētum. Fortius hoc erit vnguentum. ℥. olei costini & rutacei an. quart. i. suc. rut. salu. ana. ʒ. 2. Bulliant ad succorum consumptionem: adde adip. anser. & œsyp. ana ʒ. i. ammoniaci in aq. vitæ dissoluti ʒ. i. castorei, euphorb. ana ʒ. i. cum cera f. vnguent.

Oleis, linimentis, vnguentis cōmodè superimponitur vulpina pellis suffumigata, vel (vt loquuntur) <sup>1 Quo instar risus canini facies conuel-</sup> sinapizata ex thur. mastich. myrrh. caryoph. cinam. nuc. mosch. lign. aloës, cyper. saluiæ, æquis singulorum partibus.

Roborabuntur vires conferuis, iux̄ arthrit. salu. enul. camp. anth. stœch. mythridatio: vt si mythrid. & duarum ex illis ana semidrachmam sumptis, & <sup>2 Nam ubi- cunque mus- culi conge- neres in op- p sitis parti- bus numero sunt p. res, magnitudine</sup> bolū confeceris, quem post primū des somnum.

Si contumacior est paralytis, & longior, prode- rit guaiaci decoctum vel per se, vel cum radice Cy- <sup>3 Probore, al- terius partis resolutio con- uulsionem fa- cit alterius.</sup> naræ, aut Salsæ Parillæ propinare. Si paralytis acci- derit ex lapsu, arcenda, vel etiam, si iam adfit, cu- randa, phlegmone. Si particularis sit, non alia sunt remedia, præter forsan errhina & apophlegmatif- <sup>4 Et vtrum conuulsio pars sua conuulsio- nis causam contineat in se, repletionē, aut inanitionem.</sup> mata, instituenda.

De conuulsione canina. CAP. II.

**S**pasmus 1 caninus subita est contractio, vel tempore facta 2 resolutio musculorum masti- catoriorum, & eorum, qui peculiariter lati appel- lantur.

Animaduertendum itaque, vtrum resolutio 3 sit, an 4 conuulsio.

# DE MORB. INTERNIS

In resolutione pars affecta, laxa, mollis, à sana trahitur. In conuulsione, dura & contenta trahit sanam. In paralyfi siue resolutione saluatio multa: in conuulsione, non ita. In materia frigida, efficiente causa huius passionis, si nihil repugnat, sanguis mittitur, sed moderatè. Primùm quidem è 5 cephalica: deinde è venis sub 6 lingua. A sanguinis missione, incidendum, 7 & attenuandum hoc modo.

5 E directo  
partis cõsul-  
sa.

6 Si tamen  
lingua intus  
muerit.

7 Quod cras-  
sa materia.

8 Ex deco-  
cto capitali,  
hierapicra,  
& diacolo-  
cynthide.

9 Hoc reme-  
dium præpa-  
ratur conue-  
nienter viri-  
que cõulsio-  
ni.

10 Quod fo-  
lium deside-  
retur, substi-  
tui potest ci-  
namomum.

11 Præstite-  
rit tam. è dis-  
solui in syru-  
po de stœch.

12 Vt dia-  
carthamo,  
diaphænico.

℥.acori, & stœchados ana. M.ß. fiat decoct. in q. 5. aquæ purissimæ. Colaturæ addatur mellis communis lb.ß. plus, minúsve, fiat melicratum despumatum, aromatizatum cum 3. i. nucis moschatae. Quod si res vrgeat (acuta enim hæc, & tarda aliquando passio est) clysteres acres 8 iniicies.

Purgabis ex hiera Pachij, ex descriptione Scribonij, cuius hæc est descriptio.

9 ℥.pulpæ colocynt. 3. 4. opopanax & sagapeni ana 3. i. & gra. 7. marrubij. stœc. agaric. chamædryos ana 3. 4. petroselinij, aristolochiæ rotundæ, piperis albi ana 3. 2. cinamomi, spicæ nardi, myrrhæ electæ, 10 folij, croci ana 3.ß. & gra. 4. Opopanax, & sagapenum in mortario tundantur, cum affusione modici mellis liquidi, aut syrup. de stœchade Reliqua puluerata misceantur, cum mell. q. s. fiat electarium.

℥.suprà dicti elect. 3. 2.ß. castorei 3.ß. dissoluantur omnia in suprà dict. 11 melicrato, q. s. fiat potus. Vide Scribonium largum. Alioqui alia conuenienti potione 12 purgabimus. Partes affectæ, & tota ceruix oleo aut vnguento inducenda sunt, qualis hoc est.

℥. 13 rad. althææ ʒ. i. sem. fœnugræci conquaf- 13 *Hoc lini-*  
 fati ʒ. β. fiat decoctio, in olei cōuenientis q̄r. 3. aquæ *nemum con-*  
 faluæ quart. i. Fiat fortis expressio. Inungatur lo- *uulsiōni tan-*  
 cus, & tota ceruix. Deinde cum lana insuccata in *tum, quæ per*  
 hoc oleo, partes affectæ & ceruix muniantur. *se fit, conue-*  
*nit, non item*

Postea verò licebit vti oleo de cucumere asini- *ei quæ ex e-*  
 no, de scylla: & in his liquefacere duodecimam *uētū. Fit au-*  
 partem ammoniaci, bdellij, opopanacis, galbani. *tem per se cō-*  
 Post hæc apophlegmatismis, caputpurgiis, 14 & *uulsiō, quam*  
 aliis, quæ caput partim euacuant, partim corro- *purs cōuulsi-*  
 borant, vtendum erit. *sue conuulsiō*  
*nis causam in*

Nodulo itaque foliis lauri pleno, & in decocto *se continet.*  
 conuenienti madefacto, palatum illinendum erit, *14 Si modo*  
 quale hoc est. *peculiaris æ-*

℥. nucis moschatæ, pyrethri ana ʒ. 2. sinapi, pi- *gri natura est*  
 peris ana ʒ. i. decoquantur omnia in mulsæ ʒ. 4. Ex *affectio non*  
 eadem mulsæ poterunt fieri caputpurgia. Probatur *te auocet.*  
 hoc caputpurgium.

℥. 15 anagall. panis porcini, nucis Indicæ, nu- 15 *Et eius*  
 cis moschatæ, cucumeris asinini, piperis, acori, py- *quidem, quæ*  
 rethri ana 16 ʒ. β. Conquassata omnia bulliant in *carules est*  
 olei de keiry lb. 2. aquæ maioranæ q̄r. 3. vel in sola *floris.*  
 aqua maioranæ. *16 Duplo*

Vfus tempore resupinetur æger, & stomacho *minoris dosi*  
 vacuo, quinque aut sex guttæ naribus instillantur: *sunt hi pul-*  
 aut sæpius nares interiores inungantur. Oleum ve- *ueres præ-*  
 rò vnctioni occipitij, colli, regionis sub mento, & *scribendi.*  
 affectæ parris conuenit. *17 Vt mate-*

Teneat in ore acorum 17 conditum, zinziber *ria euocetur;*  
 conditum, nucem moschatam. Frictiones quo- *et suauis a-*  
 que auertendæ materiæ conueniunt. Sic etiam cu- *nathymias*  
 carbitulæ, quæ primæ, & secundæ vertebræ cerui- *reris aroma-*  
*ticarum caput*  
*recreetur.*



# DE MORB. INTERNIS

18 *Modo à* cis 18 admouendæ sunt.

*resolutione* Inueterato atque contumaci morbo Rhazes  
*partis oppo-* probat 19 cauteria post aures, & in ceruice.  
*sitæ per acci-*  
*dēs non fiat*

*conuulsio.* Dropaces quoque simplici 20 vtendum erit ex  
picis ꝑ. 4. olei liliorum ꝑ. 1. liquefactis & extensis  
19 *Pyrotica* in aluta.

*potentialia,* Castoreum quoque teneatur sub lingua. Hinc  
*praesertim* ad sinapismos, & phœnigmos deueniendum est.  
*quæ fiunt ex*

*capitulo.* Victus instituaturs incidens, & attenuans, qui in  
20 *Ad con-* media materia temperetur. Cibus sit liquidus.  
*uulsionem ex*

*euctu, vt ma-* Quæ topica admouebuntur, 21 conferuentur  
*teria euoce-* calida. Nam refrigerata vehementer nocent.

*tur, pars con-* Loco tepido, lucido, stragulis quoque mollibus  
*seruetur, ca-* decumbat. Madefactionibus capitis abstinendum  
*lor excitetur.* est, quia caput replent.

21 *Vel lana*  
*succida car-*  
*pta,*

## EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Quæ ad huius morbi exactam cognitionem pertinent,  
sequentis capitis scholiis explicabuntur.

## ANTO. VALETII EXERCIT. XI.

**O**ris distorsione seu conuulsione affligitur, cui  
os ad alterum latus contorquetur, & oculum,  
ad quem illud conuellitur, occludere nequit. Expi-  
rante ægro flatus ab altera tantum parte prorumpit  
& efflatur. Fit, vt plurimum, ex nerui muscu-  
lum mouentis repletionem, à qua nerui eiusdem bre-  
uitas, & eius, quam mouet, partis contractio. Cu-  
ratio ex cap. de paralyfi repetenda. Priuatim tamen  
hîc ægri ceruicis vertebrarum, necnon faciei &  
frontis inunctione frequentiori ex costino oleo  
vtimur. Porro de oris conuulsione, quæ paulatim,

non subitò inuadit, qualis est, quæ phrenitidi perniciosæ, aliisq; acutis morbis, morte iam imminente, superuenit, hîc non agitur: talis enim insanabilis.

*De 1 conuulsione. CAP. 12.*

**C**onuulsis eadem ferè ratio vitæ 2 instituen-  
da est, vt etiam phlebotomiæ: siquidē à pleni-  
tudine crudorum humorum contracta est.

Iniriò ceruicem, & vicinos musculos laxante 3 &  
emolliente oleo, eoque tepido fouebis, lanâque in  
eo immersa conteges. Atque, vt calor conseruetur  
in parte, vesicam ex dimidio plenam oleo tepente  
superpones, aut eiusmodi sacculos.

℥. sem. lini leuiter 4 conquassati M. ss. furfuris  
5 frixi, florum cham. & anthos ana P. i. salis com-  
munis torrefacti, & puluerati 6 ℥. ss. fiat sacculus,  
aut plures eiusmodi sacculi, qui subinde recalfecti  
calorem in parte retineant. Leues 7 sint sacculi, &  
ea omnia, quæ læsis partibus, atque dolentibus su-  
perponuntur. Clysterum quoque mollium vsus est,  
vt huius antiquorum.

℥. rad. althææ ℥. 2. sem. leni. & fœnugr. an. ℥. ss.  
fiat decoctio in aqua ad ℔. ss. cui adde olei com-  
munis ℔. ss. fiat clyster, tepidus iniiciatur.

Articuli corporis linteis calentibus fouendi sunt.

Materia hyssopi decocto in mulla, & 8 rebus e-  
iusmodi incidenda est.

Deinde 9 purganda vt priùs, in spasmo canino,  
& soda phlegmatica, aut agarici, aut diaphœnici

candam partem. 6 Vel ℥. i. 7 Ne suo pondere naturam opprimant. 8 Vt hy-  
dro me'nte organato, decoct. stachados, betonica. 9 Vt electario, bolo, pilul.  
syr upo solenni, cephalico phlegmagogo, ac commodatè materia morbifica, partibus  
affectis, & viribus agri.

# DE MORB. INTERNIS

10 *Vel so-*  
*lum taxoni-*  
*num adipem*  
*misc cum*  
*oleo rosaceo,*  
*Et hapsus eo*  
*imbuetur, vt*  
*hec*

*℥.olei de co-*  
*sto ℔. β. adi-*  
*pus Taxonis*  
*℥. i. β. Misce,*  
*illinatuf af-*  
*fectæ partes.*  
*11 Vt lauro,*  
*angelica, bac-*  
*cis lauri.*

12 *Ne exitū*  
*habeat farci-*  
*men.*

13 *Ad inci-*  
*dendum ma-*  
*gis.*

14 *Vt simili*  
*calore recre-*  
*tur. Noster*  
*enim natus*  
*calor simili*  
*gaudet ca-*  
*lore.*

15 *Vt ane-*  
*mo simplici,*  
*Iliac. aut*  
*chamame-*  
*lino.*

3.3. in conueniente multa dissolutis.

Molliter fricetur ceruix, spina, spatulæ cum vnctionibus conuenientibus, quales sunt.

℥.olei terebinthinæ, olei lumbricorum an. ℥. 2. a-xungia humanæ ℥. 1. simul misce, liquefiant simul.

℥.olei de costo, cum quarta parte pinguedinis castoris, lutræ, melis, 10 quem Taxonem, aut Blerel-lum vulgò vocant.

℥.vulpem bene pinguem, corio detractò, & ex-teratam, confixam caryophyllis, infarctam in hoc modo, & assatam.

℥.rad. althææ & liliorum an. ℥. β. rad. acori, ireos ana. ℥. 2. chamæpyth. herbæ costi, maioranæ, calen-dulæ an. P. 2. florum anthos, meliloti & chamæ. an. P. 1 styracis, ladani pinguis. mastichis, castorei an. ℥. 3. Omnia in mortario contundantur cum oleo de vermibus.

Malaxentur, farciatur vulpes, & 12 benè consua-tur, assetur cum aspersione aque vitæ. Quod distil-latur pingue, excipiatuf subiecto vase, in quod in-fusum sit 13 acetum.

Deinde vulpes in aqua coquatur: quod super-natabit pingue, tum in aqua, tum in aceto, vsui referuetur.

Vtilissimum est post vnctionem pellibus hædo-rū, agnorum, luporum, vulpium, arietum, recens ex-tractis, atque etiam dum calidis 14 pattes inunctas contegere. Quòd si pelles iam refrixerint, immer-gendæ sunt 15 oleo calido, vt recalescant. Aliud.

℥.vini rubri ℔. β. ol. liliorū ℔. 2. rasuræ mollioris partis, & magis spongiosæ cornu cerui ℥. 1. salis. ℥. 1. florum cham. ℥. 6. mastichis. ℥. β. bulliant omnia

in vase duplici ad vini consumptionem. Hinc ad 16  
unctiones calidiores transeundum est, de quibus  
suprà.

16 Cuiusmo-  
di balsamum  
facilius, ab  
Aurelio pro-  
positum est.  
de paralyti.

Balneum quoque commendatur ab antiquis, ad  
umbilicum ex hydrelæo, cuius modus est ex æquis  
partibus aquæ & olei. Perseuerante malo, olei bal-  
neum conuenit calidum, & domicilio calido, quod  
ita præparabis. Quintam partem olei calfacies, &  
quatuor 17 partibus non calfactis commiscebis.  
Alioqui ex decocti fœnugræci in aquæ tribus parti-  
bus, & olei tertia parte balneum præparabis, quo  
totum corpus immergatur.

17 Simplex  
enim oleum  
omni est ca-  
loris impa-  
tiens.

Sed balnei modum esse oportet, ne 18 vires re-  
soluantur. Itaque solis 19 irrigationibus vtendum  
erit, vbi vires non 20 sinunt.

18 Corporis  
nimirum rari-  
tate.

A balneo tempestiua est 21 unctio ex suprà di-  
ctis oleis, aut in quo ruta, conisa, rosamarinus, arte-  
misia, fœli cum modico cinamomi coxerint, qui-  
bus aliquando decima, aut duodecima pars casto-  
rei adicienda est.

19 Particu-  
laribus.

20 Multis  
enim effææ  
linguent pe-  
culiari natu-  
ra, corporis

Veteres omnes & recentiores Medici castoreum  
propinant è mulsâ. Dosis castorei à ʒ. 2. ad ʒ. 2.

raritate, spi-  
rituum oppres-  
sione.

Cucurbitulæ partibus affectis, sed cum 22 scarifi-  
catione, admouendæ: sed iam progressò morbo, &  
benè purgato corpore.

21 Vi ex oleo  
irino cum ca-  
storeo.

Aurelianus in accessione, leuibus: in dimissio-  
ne, cum scarificatione vitur, occipitio & collo de-  
fixis.

22 Sublato  
tamen omni  
fluxionis me-  
tu.

Remedium Hippocratis 23 est aqua frigida, in  
iuuene bene carnosâ, & ætate media.

23 Aphor.

Paulus, Celsus, Aurelianus, tota denique poste-  
ritas 24 reprobauit. De excitanda febre non con-  
suo.

24 Sed foli-

## DE MORB. INTERNIS

uenit. Qui prouocant, vtuntur authoritate Hippocratis, Apnor. 70. lib. 5.

Herophilus quoque febriculam laudauit: Asclepiades simpliciter febrem. Auicennas & Arabes febrem prouocari nolunt, nisi diariam.

Cum melle castoreum, aut sagapenum, aut opopanax auellanae magnitudine febrem excitare scripsit Celsus: sed hoc non caret periculo.

Caterum ex Gal. sic habeto. In morbis frigidis, quos humor crassus, contumax & multus generauit, febris satis vehemens excitari potest. Leuis enim nocet, nec prodest, exemplo filij Numeni: cui, cum apoplexia correptus esset, febris accessit mediocris: quæ cum noceret, & per infirmitatem caloris non prodesset, mors sequuta est. Oportet enim febrem fuisse magnam, quæ talem humorem calfaceret, incideret, concoqueret, & discuteret. Itaque vt est materia, ita febris consilium temperandum est, sitque non minor, quàm quæ profit, neque maior, quam quæ lædat.

## EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

In paralyfi resoluuntur nerui, & languidiores humore flaccescunt, ita vt concidant in partem sanam: in conuulsione, contorquentur muscoli simul cum neruis & tendonibus, contrahunturque præter voluntatem ad suum principium, & partem sanam secum in angustum adducunt. Exempli gratiâ. Conuulsis temporalibus musculis, contrahuntur dentes, ac strident resolutis, hiatus fit oris. Proinde si *παραμ* vneruorum distentionem, vt Celsus, interpretari velis, ambigua vox erit cum paralyfi, cum distētio & contractionem, & extensionem significet. Hinc quoque perspicuum, paralyfim à siccitate vix, aut nunquam fieri. Siccitatis enim ea est natura, vt absumpta

pororum humiditate corpus contrahat, nunquam relaxet, nisi fortasse per accidens, ut si ob siccitatem nervi spiritu privati non turgant, neque dilatentur, sed flaccescant. At si paulò diuturnior sit, & intemperantior siccitas, haud dubiè, ut æstus chordas citharæ impensius resiccatas tendit ac rumpit, sic nervos eadem, aut similis in corpore siccitas, præsertim calori iuncta, flectet, contrahet, & tandem etiam disrumpet, non autem relaxabit. Humiditas tamen utrúnque efficit. Nam & tendit solidam substantiam penetrando ac dilatando, ut pluvioso tempore eadem chordæ instantur: & relaxat leniendo, ut si quis corium resiccatum pinguedine oblinat, vel humore imbuat. Quare tam convulsionis, quàm paralyseos humiditas causa esse potest. Sed in illa nervos contrahit ob plenitudinem: in hac relaxat ob madorem. Siccitas autem nunquam efficit paralysem, nisi *κατὰ συμβεβηκός*. Inde etiam efficitur, humorem in paralyti tenuiorem esse debere, quia in solidā substantiam nervorum penetrat: in convulsione verò crassiorem, quia tantum replet.

Duplex alia difficultas. Vna, quòd cum in convulsione affectio sit sæpius in nervis, quàm in musculi corpore, nihilominus musculi, non nervi, morbus esse dicatur. Altera, quia definitur per motum, cum tamen pars læsa ita immobilis rigeat, ut in contrarium nullo modo flecti possit. Hoc fit, ut dicam verbo (non enim argumenta soluere, nostri est instituti) tonico motu, de quo Galenus libr. i. de Musculorum motu. Illud verò, quia musculus proprium est motionis instrumentum. Quomodo autem ad proprium cuiusque particulæ organum morbus referri debeat, Galenus copiosè docet de morborum & symptomatum causis. Nobis satis fuerit morbi huius notionem primum animo completi; deinde partem affectam nosse: tertio affectionis causam: postremò curationis summam. Quæ omnia breuiter sic habeto.

Cum vel corpus, vel illius membrum aliquod repentè contortum & inflexum apparuerit, perinde ac si in naturali situ esset, rigidum tamen est, nec ab eo situ potest dimoueri, etiamsi eò vi inflectere coneris, quòd, cum secundum naturam habebat, pro arbitrio dirigebatur, convulsionem esse, suspicandum est musculorum, vel plurium, vel alicuius, qui ad sua ipsorum

## DE MORB. INTERNIS

principia contracti, partem simul, cui inferuntur, adducunt, immobilēque reddunt, ita, ut vel recta, vel inflexa, vel contorta videatur. Hoc tamen obseruato, ne id articulorum ossium vitio fiat. In his enim sæpè vel callus gignitur, vel delapsus humor intra cavitatem prohibet liberam in iuncturis motionē. Quod intelligetur, si nec repentē, nec affatim, nec post febrē ardentem affectio inciderit: si luxatio fuerit in particula læsa, non rectē curata: si contusio, aut aliquid simile antecefferit. Tunc enim muscoli primariò non afficiuntur, sed flecti ossa in iuncturis nequeunt, licet ipsi quoque tandem trahantur in cōsensum. Cùm enim diu manent immoti, otio propriam mouendi vim tandem amittunt.

Partis affectæ dignotio est huiusmodi. Si totum corpus subitò conuellitur, ut in epilepsia, neruorum principium patitur. Si caput antrorsum curuatur, & mentum annectitur pectori, duo muscoli anteriores caput flectentes laborāt, estque ἐμπροσθέντος. Si in dorsum & scapulas contorquetur, ex duodecim musculis caput extendentibus in posteriore parte colli, vel aliqui, vel omnes afficiuntur, diciturque affectio hæc ὀπισθέντος. Quādo ceruix recta & immobilis manet, in neutram partem curuata, utriusque muscoli & anteriores & posteriores τέτανον efficiunt. Si oculus contorquetur, στραβισμός erit, musculis, qui ipsum mouent, conuulsis: si mandibula, τρισμός temporalibus contractis, vel neruis è secunda & tertia coniugatione. Si labra & nares, & pars contracta sanam ad se adducit, in vitio est latus musculus, ex quo muscoli narium, superciliariorum, & labiorum fiunt, vel nerui à primis vertebris & ramis tertiæ coniugationis, Græcis κωνικὸς σπασμὸς nominatur. Si utraq̃ue pars, dextra scilicet, & sinistra lædatur, muscoli utriusque contracti, Sardonium risum faciunt, maxillares nimirum in latera, os & labra deducentes, ita ut ægri perpetuò ridere videantur. Idem iudicium de cæteris partibus. Semper enim affectio ad musculum authorem illius motus, qui læsus est, referri debet.

*Sardonius  
risus.*

*Conuulsio à  
siccitate &  
inanitione  
lethalis.*

Fit autem hic affectus neruis, vel musculis aut exsiccatis, vel calefactis, ut à vulnere, & post largam sanguinis missionem, febres ardentes, meningum inflammationes, vel cerebri. Atque sic lethalis est. Aut congelatis: ut ob refrigerationem humorum, vel sudorem refrigeratum,

vel ventum frigidiorem : aut inflatis : vt à pituita viscida (nam rarò fit à sanguine) vel post morbum non satis exsiccatum, vel sanie collecta in aliqua parte capitis, vt meningibus, ob vulnus: vel à flatibus medicamenti, vel agitatione materiæ, vt post hellebori potionem. Ab ebrietate, crapula, suppressa vacuatione consueta, exercitatione intermissa, phlegmone, dolore, consensu vteri, morsu, puncto neruo, aut tendone, affecto ore ventriculi ab æruginosa & biliosa materia, vermibus, fungis, ab ictu feræ venenatæ, & similibus.

Hippocrates hæc omnia ad duas causas reduxit, inanitionem & repletionem. Tertiam recentiores addiderunt per condolentiam, affectumque vocant non proportionatum ad materiam, cum mouetur cerebrum in sese, vt expellat, quod noxium sentit, vt dolente neruo ob puncturam, aut alicuius animalis venenosi morsum. Sed hanc Galenus ad inanitionem: alij, quia materia venenosa est, licet pauca, ad plenitudinem referunt. Hellebori quoque potio ad vtrâmq; causam reduci potest. Ex antecedente vita, vel morbo, vel habitu corporis omnia faciliè discernuntur.

Attamen Galenus comment. in aph. 2. lib. 5. dicit conuulsiones fieri ex vulneribus, ratione inflammationis ipsa sequentis, & ad neruofas partes pertingentis.

In curatione toruræ oris superiore capite descripto vtendum clystere, deinde coquentibus pituitam: in plenitudine sine cruditate, sectione venarum linguæ, gargarisinatis digerentibus, formulis in ore retentis aqua vitæ formatis, quibus nihil præstantius, inunctionibus, sacculis, suffumigiis, emplastro ex gummis calfacientibus.

Ab inanitione non curatur: sed prohibendum ne fiat, sublata causa, vt in febre ardentissima & phrenitide, si à nimia siccitate periculum immineat conuulsionis, spinam inungendo, ne nerui exsiccantur, vel irrigatione ex refrigerantibus ob febrem, & humectantibus, ob neruorum siccitatem.

A vomitu, aut immodica vacuatione curari potest, humiditatem reparando per humectantia, & quæ hecticis profunt.

Si à punctura fiat, vulneri latiori reddito & aperto oleum

*Hippo aph.*  
39. lib. 4. &  
*Gal. Cömen.*  
1. in *Prorrh.*  
*sent.* 27.



## DE MORB. INTERNIS

de terebinthina imponendum, vel de euphorbio, cum emplastro de Galbano, sedandus dolor, vulnus ad cicatricem non ducendum, nisi post multum tempus. Extremum remedium est, tendonem vel neruum ictum abscindere in parte supra puncturam.

A venenosi animalis morfu, cucurbitula cum multo igne suprâ partem affigenda, vel cauterium, vel antipharmacum. Intrò sumenda theriaca cum herbæ decoctione, quæ sit veneno accommodata, theriaca etiam vulneri imposita prodest.

A sanguine, sæpiùs repetenda est venæ sectio, & oleis mediis vtendum. A pituita, curatur coctione materiæ & eductione, vt de Paralyfi dictum est, additis malacticis ad inunctiones, balneis, & similibus.

In conuulsionibus capitis & humorum refrigeratione, calidioribus vtendum, partes lana succida inuoluendo, cucurbitulis, sectione quâdoque illius venæ, quæ supra primam dorsi vertebra[m] apparet.

A meningum punctura, aperiendum cranium trepano, aut alio instrumento, vt materia transpiret, aut epipasticis trahenda, nisi subsit plenitudo.

A ventriculo, tutiùs clysteribus acribus, aut pilulis vtimur, quàm vomitu, ne os ventriculi contactu veneni lædatur. Cōueniunt etiam spinæ inunctiones.

*Vnctione conuenienti*] Sequens medicamen excellentissimum est in resolutione linguæ, oculi, labiorum, risu Sardonio, tremore capitis & totius corporis, ac omni capitis percussione inflatis præcordiis, & similibus.

℞. cinamomi, croci nardi, costi, styracis rub. opopanacis, myrrhæ, melanopiperis, seminis rutæ, succi abrotoni ana ʒ. 9. dauci ʒ. 4. ꝑ. moschi, benzoini ana ʒ. i. mellis q. f.

Pinguetini anserum syluestrium quos vocant Otidas, & Phalacrocoracum (vulgò Cormoranos nominant) plurimum tribuunt leniendis doloribus Sortilegi. Paranda autem est eo modo, quo Gattinaria ex Nicolao Forentino decet de anseri vulgari, capite de Spasmo. Sumatur anser pinguis, & euisceretur: dein alûrus (catrum vocant) minutim incisus in anseris ventrem cum lardo, thure & myrrha recondatur, suatur anseris venter, veru ad coquendum configatur. Interim

vero vas aceto albo femiplenum supponatur, cum pinguedo vera ab anseri liquefcens decidere cœperit, quæ aceto super-  
natans referuabitur. Alius subinde anser in eodem aceto in-  
coquatur, indèque pinguedo plurima enatabit: ex qua cum  
priori mixta parabitur litus. Idem artificium in Otide, pha-  
lacrocorace, & aliis. Oleum de enula, irinum, de ligno sancto,  
crocinum Mesuæi, lumbricorum, a ungia humana, de styra-  
ce, de euphoibio, de castoreo, piperibus, philoſophorum, de  
costo, cum parte illius pinguedinis, aut mellis, & modico ca-  
storei, piperis, euphorbij conueniunt.

[*Cucurbitula.*] Cauendum, ne tendonibus affigantur, sed  
musculi principio, aut medio, ad iuuandum eiusdem actio-  
nem. Quibusdam locis commodè adhiberi non possunt, vt  
labris, supercilliis, digitis, vbi sanguisugæ: aut earum loco, vt  
in palpebris, & lingua, scarificatus erit ex vsu.

[*Aque per fusio, febr.*] Hæc duo remedia à veteribus  
multum commendantur. Periculosa tamen sunt, vt ratio &  
experientia demonstrant. Timendum enim in perfusione  
frigida, ne materia magis inde refrigerata, altius impinga-  
tur. Si tamen spes certa subsit calorem à frigore, quasi antipe-  
ristasi quadam, intrò posse cogi, vt in principio, æstate me-  
dia, iuvene bene carnosio, non omnino negligendum. Fe-  
brem quidem Hippocrates dixit morbis à crassa pituita me-  
deri, rigore & calore: quia rigor materiam commouet,  
exagitat & purgat: calor coquit, tenuat, incidit, resoluit.  
Sed cum, si vehementior sit, tollat ægrum, minor verò co-  
quendo morbo non sit satis, longè tutius est eam vitare,  
nisi sponte superueniat. Difficile enim fuerit in medio con-  
sistere.

*Hipp. apho.  
26. lib. 2.*

## ANŦO. VALETII EXERCIT. XII.

**C**onuulsio deprauatus est motus, quo fit partis  
cuius instrumentariæ, aut plurium, suam versus  
originem præter voluntatem contractio. Atque ea  
quidem vel per se, vel per consensum. Per se, ex re-  
pletione aut inanitione nerui, vt est comment. 1. in

*Gal. cõm. in  
sent. 4. sect.  
1. lib. 3. Epid.*

sent. 27. prioris Prorrhæ. Per consensum, vel ab humore tenui, acri & æruginoso, ventriculū lancinante, vt cap. vlt. lib. 12. Meth. vel à potu frigidæ, vt cap. 5. lib. 9. Meth. vel à crapula, vt lib. 3. de Temper. & aph. 5. lib. 5. vel à diaphragmatis, aut vteri inflammatione, vt comm. in sect. 2. lib. 3. Epid. vel ex maligna assumpti medicamenti qualitate, vt apho. 25. lib. 7. & aph. 1. lib. 5. aut à forti frigore, & humoris crassi sanguinem congelantis copia, vt commen. in sent. 27. lib. 3. Prognosticon: vel à vulnere, ratione consequentis inflammationis, quæ in neruofas partes irrepperit, vt comm. in aph. 2. lib. 5. vel denique

*Gal. comm. ad apho. 57. lib. 4.* ab ictu, morsu, &c. De his fusiùs Hollerius. Conuulsiones, quæ ab initio inuadunt, ferè omnes à repletionē originem ducunt, & communem habent, vti antè dictum est, cum paralyfi curationem. Aduertendum tamen linimenta iis, quæ fieri debent in paralyfi, hac in re contraria esse, quòd propter contractionem vehementiorem emollientia esse oporteat, & fomenta minimè adstringentia.

*Gal. cōm. in sent. 24. & 57. sect. 2. lib. 1. Epid.*

Adhæc cōuulsionibus opportunissimi sunt pueri, præcipuè dentitionis tempore, ob neruosi generis imbecillitatem, & voracitatem. Sed hæ immixtis clysmatis, foru ceruic. ex oleo iasmino, aut lumbricorum, calente, non omisso interim ventriculi litu ex oleo stomachico, faciliè sanescunt.

*De angyglossis, seu mogilalis. C. A. P. 13.*

**A** Ngyglossi difficulter pronunciant. L, R, K, atque in loquendo reſtitantes loquelam præcipitant. Gal. comment. 2. lib. 1. Epidem. τραυλῆς appellat, qui ex musculorum linguæ vitio balbutiunt.

Nascitur enim id vitij, aut quia breuior lingua, vel quòd imbecillior ab intemperie humida, vnde & mollior, vt in quadam paralyfi: nonnunquam ex intemperie sicca, frigore, ira concitatore, calore. At sæpiùs hic nascitur morbus ab adstrictione membranae linguae subiacentis.

Purgandum corpus: parciùs viuendum, vt minor sit copia sanguinis: refrænantibus sanguinem alimentis, frictionibus reuellendum.

Albucasis parte 2. incisionem secundum latum instituit, & ab arteria, quæ illic est, sectione cauet, hæmorrhagiæ metu. Colluit statim aqua ros. aceto, aq. frigid. vitata posca. Sed in mediam incisionem inducit linamentum, ne rursus pars ligamenti reliquo ligamento consuescat. In hæmorrhagia lenticulari cauterio inurit.

Quòd si breuioribus neruis, qui ad motum in palatum & dentes feruntur, id acciderit, res incurabilis, vt quum breuior lingua. Aliquando ficcioribus iisdem, nec ita sese extendentibus accidere potest.

#### EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Eo morbo laborans Episcopus Senensis, frater domini de Beaujour, cum medicos impostores ad curationem adhibuisset, consumpta grandi pecunia nihil profecisset, ac tandem me vocasset, aperto malò, & variis cõmemoratis causis, quas medici suspicarentur: cùmque vnicam causam esse adstrictionem membranae, quæ sub lingua est, vnde prohiberetur motus linguae, qui ad primores dentes extēditur, indicâssem, necnō vnicū esse remediū scriptū à Celso, Paulo Æg. Aëtio, & recentioribus medicis, cognitum etiā vulgo, vt membrana illa succideretur, miratus quod affirmarem eam causam vnicam & curationē ab omnibus scriptā medicis, ignoratam ab iis, qui

*Episcopus Senensis magnus.*

## DE MORB. INTERNIS

bus sese commiserat, omnino sese consiliis nostris submisit. Monui, nam peregrè proficiscebatur, ut experto chirurgovteretur: qui volfella prehenfas membranas (filum vulgus appellat) succideret, ne altiore plaga hæmorrhagia moueretur.

*Corn. Cels.  
cap. 12. li. 7.*

Quamquam scribit Celsus nouisse quendam, qui succisa ea membranâ nihilo melius sit loquutus. Adeò (inquit) in medicina etiam, ubi perpetuum est, quod fieri debet, non tamen perpetuum est, id quod sequi conuenit. Sed & priusquam ad incisionem veniretur, suasi totius corporis & linguæ resiccationi incumbere. Ille autem interceptus negotiis de morte fratris cæsi, & inde contra homicidam commota causa, abiit. Adhæc quibusdam incisum est filum, sed mansit intermedius callus, non caro mollis: vnde nihil effectum fuit. Quod chirurgis diligenter considerandum.

## ANTO. VALETII EXERCIT. XIII.

**D**E angiglossis seu mogilalis tractatio quamquâ chirurgica est tota, committere tamen non potui, ut hoc loco supprimeretur, cum & manuscripto exemplari appicta sit, & historia non vulgari locupletata.

*De incubo.*

*CAP. 14.*

*1 Ex Paulo  
Agin cap.  
15. lib. 3.*

**I**ncubus, qui ἐφιάλης, ὀπιβόλη, 1 à Themisone Ἰπνιγελίον dicitur, neque deus, neque semideus, neque Cupido, quod veteres crediderunt, neque dæmon, quod Theologi existimant, neque incubans vetula, sed vapor quidam crassus, qui partim vias spiritus animalis intercipit, vnde & loquendi, & respirandi difficultas: partim animæ offunditur, vnde phantasia, & spectrum quoddam, quale 2 frequens est in somniis.

*2 Prasertim  
melancholicis  
& pueris.*

Sed idèò incurfare, atque etiam opprimere thoracem,

racem, constringere collum, præcidere vocem, apparet, quia his maximè partibus labor est. Pueros & <sup>3</sup> *Vbi materia exiit non habet.* obesa corpora aliquando suffocat: alioqui epilepsiam denuntiat.

Incubus enim epilepsia quædam nocturna est. Multos olim Romæ, quod scriptum reliquit Syssimachus, vno anno confecit. Itaque qui incubo opprimitur, statim excitandus est. Postea videndum, <sup>4</sup> *Neque humida, neque* ne affectio eiusmodi redeat.

Imperanda est sobria vita, cæna frugalis, vitæ ratio è media <sup>4</sup> *materia, frequens ablutio extremorum. Sæpe etiam peccandum caput est ex ebore, in* <sup>5</sup> *posteriorem partem ducto peccine.*

Melicratum plus minúsve dilutum pro <sup>6</sup> *ratio-* ne, in quo radix fœniculi, asparagi, petroselini, graminis, acetosæ, cichorij, endiuix, radicis capparis, hyssopus, buglossum, borrago, endiuia, summitates <sup>5</sup> *Occiput* lupuli, fumaria, <sup>6</sup> *versus.* <sup>7</sup> *Temperamentum et cæter.* <sup>8</sup> *Verum scolopendrium.* <sup>9</sup> *Phyllitis* <sup>10</sup> *Matthioli.* <sup>11</sup> *deco-* pillus veneris, cuscuta, passulæ mundatæ ab arillis, pruna, sebesten, flores anthos, violarum, borraginis, decoxerint. Quale hoc erit.

℞. rad. fœniculi, radicis graminis ana ℥. β. summatum lupuli P. 2. hyssopi, trium florum cardiacorum, passularum, glycyrrhizæ ana P. 1. fiat decoctio ad lib. 1. β. in col. dissol. 9 mellis albi, sacchari albissimi ana ℥. 2. fiat melicratum. <sup>9</sup> *Vel potius syrup. violacei & capill.*

Deinde purgandum corpus hoc modo.

℞. cassiæ, vel cathol. ℥. 10. dissolue in sero lactis caprini, vel alteriùs, cū ℥. 1. syrupi. violati fiat potus.

Pro rationæ materiæ licebit uti fortioribus, quæ partim in capite de epilepsia, partim in capite de melancholia dicentur.

# DE MORB. INTERNIS

Nec omittenda phlebotomia, si res 10 exigat.

Clysteres quoque & frictiones ex usu sunt, quia fumos reuellunt. Errhina quoque & apophlegmatismi ex leuiori 11 materia. Cucurbitulæ in cruribus & omoplatis, pulueres quoque, maximè à cibo, qui fumos prohibeant 12 & morbo conueniant. Qualis hic est.

℥. 13 coriandri præparati ʒ. 2. specierum diarmarg. frigidi, & diarodon Abbatis an. ʒ. 1. sem. nigri pœoniae ʒ. 2. coralli rub. ʒ. ʒ. macis, cinamomi an. ʒ. 1. cū modico sacchari rosati, fiat mixtura, vtatur post pastum cochlearis dimidio.

Bibere quoque medio 14 pastu, non in fine, hoc adiuuat.

Cucuphæ quoque parādē sunt ex floribus anthos, stœchados, & cæteris rebus capitalibus, vt priùs.

Dropax quoque 15 simplex tum hypochondriis tum etiam capiti commodè aptari potest. Calidus applicatur, & ne pertinaciùs inhæreat, linteolum rariùs, & vehementer attritum 16 interponendum est. Componatur dropax ex quinque partibus picis, & vna olei de spica, vel mastiche.

## EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Επιάλις ἀπὸ τῆ ἐφάμεται, quod qui eo affectu laborant, noctu quiddā sibi incumbere existiment, à quo inuadantur & opprimantur cum difficili respiratione, immobilitate, ac voce præpedita, vt propè suffocari videantur. Vnde & à Themisone, epistolarū li. 11. (teste Aureliano) πνιγλίον ἀπὸ τῆ πνιγέται. Ex veteribus etiā nonnulli ἐπιβολὴν nominarūt, quod Aurelian⁹ quoque refert. De parte primariò affecta non omnium idem iudicium. Interpretes Arabū priorem cerebri ventriculum, vel spinalis medullæ exortum vapore crasso, aut etiam humore,

10 Vt si venæ sint sanguine distentæ. II Vt mastiche, salvia, maiorana.

12 Vt puluis ex corallo, saccharo ros.

℥ margaritis confectus.

13 Vel hunc præscribes.

℥ coriand. præpar. ʒ. 2.

corall. rubr. margar. ele-

ctarum an.

ʒ. ʒ. rasuræ eboris. oss. de

corde cervi ana ʒ. 1. cina-

momī grā. 6 sacch. ros.

ʒ. 4. f. puluis subtilis. vsa-

tur à pastu cochlearis di-

midio.

14 Vt iactis cibi fundamētis.

15 Ex pice.

16 Inter picē & cutem.

Aureliū initio cap. 3. lib.

1. Chronion.

qui tamen facile dissoluatur, oppleri aiunt. Posidonius non humore, sed crasso & frigido vapore spiritus animales per nervos ferri prohibente. Vtrunque minus probabile. Alioqui enim inde necesse esset vel epilepsiam, vel apoplexiam, vel carum generari, aut saltem respirationi tantam noxam non inferri, aut thoraci: à quo cum totius mali origo ducatur, grauiusque ceteris laboret, in eius venis summam plenitudinem esse consentaneum est. Quod & symptomata indicant, pondus nimirum thoracem opprimens, & difficilis motus eiusdem inter dormiendum, vel inchoata coctione, ex fumis nimirum & flatibus, qui tum excitantur, pulmones & septum transversum prementibus, præsertim cum non tam libera sit respiratio per somnum, quam inter vigilandum. Quod autem in eo læditur imaginatio, quæ est in prioribus ventriculis, id fit per consensum, ut in melancholia hypochondriaca. Fumi enim ex crassiore sanguine sursum lati timorem animo ineunt, variæque imaginationem afficiunt, ut docet Galenus de locis affectis: atque hinc fit, ut quidam Dæmonem esse putent. Si diu tamen perseveret, frequentiusque repetat, cerebro fit essentialis, degeneratque in apoplexiam, vel epilepsiam, vel melancholiam.

*Ephialtæque  
sequatur sym-  
ptomata.*

*Galen. cap. 4  
lib. 3. de loc.  
mal. aff.*

Causæ antecedentes sunt, crapulæ & cruditates, pessima vitæ ratio, multitudo crassi sanguinis, suppressi menses, aut hæmorrhoides, & similia. Summa curationis (mutandæ tamen pro causarum varietate) est huiusmodi.

*Ephialtis  
causa.*

Clyster discutiens flatus & euacuans in paroxysmo, sanguinis missio in plenitudine è basilica, vel mediana, præsertim si sanguis crassior appareat, & sine pituita, pituitæ coctio, euacuatio, opiatæ quibus flatus discutientia misceantur, pulveres flatus discutientes, vñctiones pectoris, sacculi cordi applicati, parciore cœna, vel nulla, cibi minimè flatuosi, decubitus in latus.

Quod Theologi existimant. ] Non omninò certè contemnenda est veterum Theologorum authoritas, omniumque gentium communis ille consensus de incubo & succubo, cui etiam attestatur experientia. Memini enim me in primitivæ Ecclesiæ historiis legisse Cathecumenos huiusmodi dæmonum ludibriis vexari solitos, qui deinde cœnæ sumptione liberabantur. Multa quoque sunt apud D. Augustinum

*Theologi ve-  
teres quid de  
incubis &  
succubis sen-  
serint.*



## DE MORB. INTERNIS

de incubis & succubis lib. 15. de Ciuitate Dei, vt hinc ferè cogamur fateri incubum alium dēmonis arte induci, alium corporis morbum esse. Nisi quòd summa Christi luce nobis affulgente, ab his tenebris nunc non est metuendum. In Gentilitus illis ceremoniis multa huiusmodi deliramenta reperiuntur de Sympythiis, & Pythone, spiritu diuinatore occupatis, sed multò lepidiora in Hebræorum Rabbinis. Scribunt enim huiusmodi phātasmatata ex semine Adam procreata fuisse centum illis & triginta annis, quibus ab vxore abstinuit, postquam Cāin fratrem interfecit. Pro singulari remedio iubent circulos septem circū sepulchrum fieri, ne cadauer intro-mittendum subeant, eoque ad nocendum vtantur. Alcinous in dogmate Platonis retulit ad vaticinia, oracula, somnia, &c. Sed & in veterum Medicorum libris multa remedia reperiuntur ad Sympythos, & dāmone occupatos, & incubos, vt apud Aētuarium & Alexandrum. Qualis est illa Hippocrat. antidotus territis lemurbus & dēmonio occupatis, lunaticis cum spuma tauri, quæ in codice manuscripto sic legitur.

℥. nuces cupressi 50. Caricarum pinguium sine nucleis, pass. mund. ab arillis an. 3. 12. (fortasse 3. 12.) ladani, styracis opt. myrrh. asphalti, bdelij, radicis asphodeli, enulæ an. 3. 7. cardamoni 3. 5. sabinae 3. 4. folij, costi, spicæ, ros. baccarum iuniperi ana 3. 3. schœn. cas. lentisci an. 3. 2. croci, cyperi, lybistic. ana 3. 1. vini optimi & mellis q. s. Nuces cupressi fractæ triduo macerentur in vino optimo: coque lento igne ad vini consumptionem aliquā, & cola. Tum in vini lb. 2. carnes ficuum tritas diu contere vino, & additis mellis lb. 12. iterum coque ad mellis consistudinem, & sacculo excola: tum adde passulas, & dactylorum carnem, & in mortario diu contere. Hinc styracem, ladanum, terebinthinam cum modico melle diu terendo in mortario misce, ex quo pulueres coniunge sedulò, & vitro repone. Da 3. 2.

vel 3.3. in catarrhis, fluxionibus, mulierum morbis à frigore & flatu.

Non iniucundum est, quod medicus quidam scribit contigisse nuper apud Aruernos in Cœnobio quodam. Cùm enim Pharmacopola, quem secum habebat, inter dormiendum incubo laborasset, qui in eodem cubiculo erant, accusauit. Se enim ab illis noctu propè iugulatum fuisse, constricto collo. Quod cum socij audacter negarēt, totamque in eum culpam reicerent, qui noctem insomnem furore quodam percitus duxisset, iussus deinde est solus, lautè cœna sumpta, exhibitis etiam flatuosis alimentis, dormire cubiculo vndique optimè clauso. Rediit paroxysmus, dæmonem esse iurauit, cuius etiam faciem & gestus mirificè depingebat. Neque vnquam illi aliter persuaderi potuit, nisi vbi curationem initio consilio adeptus est.

*Pharmacopola incubo concept.*

# ANTO. VALETII EXERCIT. XIII.

**I**ncubus, symptoma facultatis animalis obstructionem cerebri meatuum consequens, ab elato vapore crasso spiritui viam præcludente ortum habet. Hinc musculis edendæ respirationi & voci dictis illata noxa vocis interceptionem, aut eius incertæ, indiscretæque efformationem, difficilem cum tremore motum, suffocationem imaginabundam, clamandique desiderium inducit.

Putatur nonnullis proprius ventriculi & diaphragmatis affectus, quod supinis dormientibus crassiores per sæpè cibi os ventriculi & diaphragma premant, vnde efflatio & respiratio præpediatur.

Magna huius affectus habēda ratio, quia grauioribus morbos, epilepsiam (vnde epilepsia nocturna appellatur) apoplexiam, maniam denique prænuntiat. Crassioribus naturis, vt etiam pueris, familiaris

*Incubus quibus maxime familiaris.*

# DE MORB. INTERNIS

est, ob meatuum angustiam: itémque literarum studiosis, quibus minuitur concoctio, & quorum cerebrum studiorum assiduitate debilitatur.

*Incubi cura-  
tio,*

Iuuatur victu tenui, non flatulento, eupepto, non vaporoso. Potus sit vinum album, tenue, subadstringens & dilutum, vel hydromeli. Vapores vt inhibeatúr, vacuandi sunt humores, è quibus susci- tantur, catapotis, aut potionibus hieram recipien- tibus: qui si lentí sint, sic præparabuntur.

*1 Vniuersi,  
eæque typica,  
cum mentis est  
sensuum obia-  
sione.*

*2 Nam quæ  
vicina sunt,  
quæque com-  
munia (vt su-  
pra cõmemo-  
ratum est) ea  
primum ma-  
ximèque af-  
ficerent.*

*3 Doloris vi,  
& labefacta  
tu, seu resolu-  
ta instrumẽ-  
torũ spermã-  
ticorum reten-  
tione facul-  
tate.*

*4 Cum septi-  
mestres sunt.*

*5 Galen. cõ-  
mẽ. ad aph. 5  
sect. 1. lib. 6.*

*ῥῶν ἐπιδήμι.*

*6 Ob impuri-  
tatem ex sy-  
næthrisimo.*

*℥. hyssop. passul. mund. ana M. i. f. decoct. ad quart. 3. In-  
colatura dissol. oxymel. simpl. vel composit. vel scyllit. 3. 4. f.  
zulap. clar. pro dosib. 3.*

Mox purgetur. Post purgationẽ, atq; etiam venæ sectionem (si plenitudinis notæ eam præceperint celebrandam) ventriculo sumptis & admotis pro- spiciendum: caput quoque roborandum, prius ta- men vaporibus, si qui in cerebro constiterint, dis- cussis.

## De epilepsia. CAP. 15.

**E**pilepsia conuulsio est 1 corporis. Nascitur, vbi humor crassus & frigidus offarcit anteriores ventriculos cerebri, ex quo vniuersus motus, & ve- luti raptus totius corporis. Contorta 2 facies, in- uoluntaria 3 seminis effusio, & interim affectio, quæ apoplexiæ proxima est.

Pueros ferè vexat, quo tempore dentire 4 inci- piunt, vnde puerilis 5 morbus ab antiquis appella- tus. Vt etiam lunaticus, quia interlunio nati ob- noxij huic morbo existimantur, vt & qui concepti sunt fluentibus 6 mensibus.

7 Perseuerat hic morbus ad 8 annos pubertatis, soluique consuevit in masculis, cum semen emittere incipiunt. In mulieribus, quum primum effluunt menses: quos annos si superat, desperata 9 res est.

Nascitur aliquando consensu 10 stomachi, aut aliarum partium corporis. Aliquando spiritu quodam 11 virulento ex partibus inferioribus sublato in caput. Sæpè etiam primarius 12 cerebri affectus est.

Quos vexat paroxysmus, sic habeto. Corpus, quod rapitur, loco lucido & 13 mediocriter calido collocato. 14 Sublimiori capite, ex quo membra 15 supernè deorsum confricari debent.

Dentes, quos sæpè 16 constringunt, vnde etiam imminet 17 suffocatio, vel manibus, vel quauis alia ratione 18 diducendi sunt.

Ex quo hac formula, & lingua, & palatum illinenda 19 sunt.

℞. theriacæ vel mythridatij ℥. 4. dissolu. in ꝑ. i. succi rutæ, cum penna, vel linteolo extremitati baculi alligato, palatum & lingua affricentur. Tum.

℞. benzoini, mumix, picis nigræ ana ℥. i. vniantur cum succo rutæ, fiat suffumigium pro naribus: aut eadem simul liquefacta naso interiori inungantur. Vomitus, si fieri potest, excitetur oleo ex penna illito interiori parti oris. Alioqui perseuerante paroxysmo.

porali muscoli, qui primum affici solet ob cerebri affinitatem. 17 A suppressione excrementi fuliginosi: vnde salua à spiritus prohibitione crassescit. 18 ut exitum habeat fuligo, & cerebrum aëri inspiratione recreetur. 19 Ad correctionem presentis symptomatis.

7 Aph. 45. li. 2. Et 7. li. 5  
8 Si achorum capiti copia morbi occasio nē non tollat.  
9 Quod impressa maneat maligna in cerebro quidam, que natura beneficio non potuerit emendari.  
10 ut in picrocholo dyu.  
11 Ut à corruptione seminis in mulieribus hysterica.  
12 Apituita, & melancholico humore.  
13 ut foras excutetur humor.  
14 ut recreetur humor.  
15 ut nativus excutetur calor.  
16 Ex conuulsione tem-

# DE MORB. INTERNIS

℥. cast. ʒ. 2. benzoini ʒ. 1. diss. in oxymelitis scyllitici ʒ. 1. ʒ. cum cochleari distractis dentibus ingeneratur in gulam.

Dydimus Medicus extracto sanguine è pedis pollice labra epileptici inungebat. Orpheus & Archelaus contaminabant faciem ex quacunque parte corporis ducto sanguine. Atque ita statim exurgere epilepticos testati sunt. Pueris autem, sublato paroxysmo, remediis iam præscriptis prohibenda est mali generatio ac labes, abstinentiâ vini, vsu frequenti pulueris confecti ex pœoniæ radice & semine. visco quern. puluer. contrà vermes, & saccharo cando: quibus etiam soluentia misceri possunt. vt. ℥. rad. & sem. pœoniæ an. ʒ. 2. sem. contrà verm. ʒ. 2. rhei elect. ʒ. 2. iacchar. ʒ. 2. f. puluis subtiliss. Detur ex cochleari semel aut bis in hebdomade, sereno cœlo, declinante luna, cum iusculo. Post paroxysmum clyster iniiciendus, qualis hic veterum.

℥. decocti aristolochiæ, centaurij minoris, vel calamenthi lb. 1. in quo dissol. pul. hieræ picræ, pul. hieræ diacoloc. ana ʒ. 3. olei cham. ʒ. 3. sacch. rubri, mellis communis ana ʒ. 2. salis ʒ. 3. Post clysterem refouendi sunt cibus boni succi. Ex quo melicratum imperandum est ex hyssopi decocto, stœchados, calamenthi, aut syrupus acetosus, oxymel simplex, oxymel scylliticum.

Deinde purgandum erit cum hiera picra, & hiera diacol. Hæc enim purgatio maximè probatur antiquis.

Nec omittenda phlebotomia, 20 si omnia consentiunt.

His verò, quibus inueteratur Epilepsia, ad cau-

20 Si magnitudo causæ hoc pestu-  
let, materia  
orgasmi, ce-  
rebræ oppres-  
sio, hypochō-  
driorum ob-  
structio.

tionem, venam 21 è malleolo diuides veris initio. 21 Ad maiorem reuulsiorem, vt fiat humor xanthoppros, qui erat à xanthoppros.  
 Iam progresso vere, melicrato hyssopi, aut simili rem reuulsiorem, vt fiat humor xanthoppros, qui erat à xanthoppros.  
 præparabis, & vt prius, purgabis. Aut, vt veteres voluerunt, amplissimam colocynthida cauabis, reiectis seminibus, & inferiore materia: tum vndique 22 induces pasta. Deinde cauatam colocynthida, passo, aut alioqui vino dulci implebis, adiectis 22 Ne exhalat humor:  
 quatuor foliis rutæ, & 23 obolo cinamomi, efferuebit vinum in calidis cineribus: deinde per noctem 23 vt granis.  
 sinetur in colocynthide. Postridie per linteum bene 10. vel 3 lb.  
 mundum percolabitur, & bibetur. 24 Ex cephalicis.

Post purgationem reficiendum corpus est. Post 25 vt pil. ex hier. pira.  
 tres dies, inde cucurbitulæ in hypochondriis affigendæ: deinde scapulis cum scarificatione. Aliquot Quinetiam in epilepsia à pituita inueterata hac præsertim veteribus solennia fuere remedia. vt.  
 diebus interiectis, iterum purgandi sunt, ex eoque cucurbitulæ occipitio affigendæ: caput radendum ℥. ther. veter. mythridentij, an partem equal. rad. enule-campar. lb.  
 est, aut certè detundendum. lb. saluia, stachados, betton. ana 3. lb.

Comparanda 24 cucupha, & per interualla Temperentur per noctem  
 25 purgandum, vt etiam Autumno ad helleborum vinum maluatico: deinde fiat aqua stillatitia, manè utatur. Aliud ex Aëtio. cap. 16. Tetrabibl. 2. Sermon. 2. ℥. veratr. nigr. castorei, scam. an. 3. 2. opopanax. cumini thebaici siue regij, centaur. nitr. sulph. viui, abroton. ammoniaci thymiamatis, sem. rutæ sylvestr. ana 3. I. confusa & cribrata excipiantur mulsæ origanata. f. pil. ad magnitud. fabæ Egyptiæ.  
 veniendum sit. Hoc modo veteres helleborum propinabant.

℥. fibrarum radicis hellebori 3. 2. distemperentur in 3. 1. melicrati: deinde siccentur in umbra, & puluerisentur: tum adiecto eodem pondere piperis, modico melli misceantur, vel è mulsæ propinentur. Galenus libro primo de compositione medicam.  $\chi\tau\omicron\pi\gamma\varsigma$  plurimum commendat hieram

# DE MORB. INTERNIS

diacolocynthidos, quæ helleborum recipit. Tentatis itaque lenioribus remediis, non est metuendus  
 26 vsus hellebori. Post hæc sternutatoriis, quæ pul-  
 uerem 27 rad. pœoniæ recipiant, & masticatoriis  
 vtendum erit.

26 Cum de-  
 lectu præscri-  
 ptu.

27 vt vene-  
 nata aura ex  
 hauriatur.

28 Ratione  
 vsus veneris,  
 nō spermatis.

29 Cum tan-  
 tū agit  
 de vi cerebri  
 restituenda.

30 vide Rha-  
 zem lib. 9.  
 ad Almanf.  
 cap. de Epi-  
 lepsia.

Sanguisugæ etiam fronti, & per ambitum ca-  
 pitis, affigendæ sunt. Fuerunt in veteri Medicina, qui  
 eunuchismum, id est, castrationem 28 maximè pro-  
 bauerint.

## Formula sternutatorij.

℥. pyrethri, pul. rad. pœoniæ ana ʒ. 2. nucis  
 moschatæ ʒ. 1. hellebori nigri puluerisati ʒ. ʒ. fiat  
 puluis, qui insuffletur in nares. Eadem quoq; , præ-  
 ter helleborum, mastiche incorporata masticato-  
 rium efficiunt. Vsus conferuæ acori, aut stœchad.  
 theriacæ, mythrifatij, maximè conuenit, idque 29  
 iam purgato corpore. Electarium quoque Rhazæ,  
 cuius 30 hæc est descriptio.

℥. pyrethri, seseleos, stœchados ana ʒ. 10. agarici  
 ʒ. 5. cordumeni recentis & acuti, assæ optimæ, aristo-  
 lochiæ rotundæ ana ʒ. 1. ʒ. excipiantur omnia melle  
 scyllitico. Detur auellanæ magnitudine ieiunis.

Galenus in libello de consilio in comitialibus  
 cōquassatam scyllam in vase melliteo, id est, in quo  
 antea mel repositum fuerit, aut alioqui coctum, re-  
 condit: vas pelle inducit, & fideliter occludit: tum  
 meridiano soli obuertit, prohibetque Aquilonibus:  
 subinde aliter atque aliter obuertit, vt omni ex par-  
 te radij solis vas calfaciāt. Scyllam colligit sub cane,  
 quo tempore mel scylliticum præparatur, sinit-  
 que quadraginta 31 diebus. Postremo aperto vase, li-  
 quor, qui è scylla desudauit, excipitur, & melle ad-

31 Toto tem-  
 pore canicu-  
 læ.

dito dulcatur. Dosis paruulis ʒ. ʒ. aliis, ʒ. 2. Materia reliqua scyllæ cum melle subigitur, atque eodem modo, sed non tam vtiliter epilepticis imperatur. Alij succum scyllæ pari mellis ponderi commiscēt, vt fiat mel scylliticum. Efficacissimum istud erit electarium.

℞. ossis caluariæ humanæ ʒ. 1. feminis pæoniæ mascul. radic. eiusdem pæon. an. ʒ. 2. saluæ. hyssop. rut. sicc. ana ʒ. 1. florum rub. anagall. & borrag. ana p. 1. feminis atriplic. ʒ. 1. vngul. asini tusæ, talisuiilli an. ʒ. 2. raturæ eboris, cornu. ceru. corall. rubr. an. ʒ. 2. diamargarit. frigid. & calid. an. ʒ. 1. f. puluis ex omnib⁹. Deinde incorporentur in confervæ anth. & borraginis an. ʒ. 1. f. melliscum aceto scyllitico ad crassitudinem cocti ʒ. 2. theriacæ & mythridatij ana ʒ. 2. Pueros verò clementiùs habere oportet.

In primis vitæ ratio nutritici 32 instituenda est, quæ generet lac vtile, ac paulò calidius, & siccus, quàm temperatum sit. Pueri corpus molliter 33 fricandum est, & inungendum, tum etiam caput detonsum ex oleo anethino, rutaceo, de maiorana, irino, adiecto pulueris momento, cyperi, aut ireos, Cucupha quoque comparanda.

℞. cyperi, ireos florentiæ ana ʒ. 2. sem. seseleos, & pæoniæ ana ʒ. 1. capill. ven. florum anthos, & chamæm. ana ʒ. 1. macis, cinamomi ana-gra. 8. Fiat puluis pro cucupha. Sedes pueri 34 inungatur melle, & succo rutæ, vel salis granum immittatur podici.

Paretur electarium ex butyro, & saccharo, quo etiam nutrix papillas mammaram illinat.

Comparetur mel passulatum hoc modo.

℞. aga. trochiscat. ʒ. ʒ. infundatur in aquæ th. ʒ. ʒ.

32 Condian-  
tur tuscula-  
na hyssopo,  
salvia, & si-  
milibus.

33 vt si al cor-  
pus videretur  
pietor.

34 Vt ei fe-  
ratur alius.  
Qui enim  
crassiores  
sunt, alio  
quoque ad-  
structione, et  
vt plurimum  
sunt epile-  
ptici.



## DE MORB. INTERNIS

agaricum detrahatur in eadem infusione : detracto agarico, passulæ bene pingues distemperentur, dum turgiant : turgidæ in noua aqua coquantur: ad extremum coctæ exprimantur in aqua, in qua coxerint. Expressio cum aqua rursus coquatur ad mellis crassitudinem. Paulò adultiores, vt qui secundum, aut tertium annum superant, passulis, prunis, ficibus eo modo maceratis vti possunt.

Iisq̃ue electariis, & passulato melli puluis pæoniæ & hyssopi adiici potest. Purgentur ex 3. 3. cassiæ, ex manna, & penidiis præparatis, vt antè dictum est.

35 *Cassiano  
admodū pro-  
batur ad cu-  
rationē epi-  
lepsie, quod  
resoluat.*

Radix pæoniæ in taleolas discisa, & ita transfixa, filo suspendatur è collo.

Syrupus acetosus, melicratum, absynthij decoctum, cicerum rubrorū, vomitus iisdem cōueniunt.

### EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

• Caducum, à cadendo, Comitiale, à Romanorum Comitiiis, Lunaticum, quod motu lunæ commoueat, vel interlunio natos corripiat, vulgò hunc affectum vocant, Apicenna puerorum matrem, nominibus impositis, habita ratione, vel symptomatum, vel loci, vel causæ efficientis, vel eorum, qui eo frequentius solent corripì, vt pueri. Apud Græcos tamen ferè semper à magnitudine nomen accepit. *επιληψία* enim dicitur, quod sensum atque mentem pariter apprehendat, Antiquioribus *ἱερὰ νόσος*, id est, sacer morbus, quod eius magnitudinem, vt ait Galenus, designarent: *ἱερὸν* enim magnitudinem significat. Quamquam significationem etiam aliam alij afferunt, vel quod diuinus sit morbus, & à diis immissus in vindictam: vel quod sacram occupet animam, vel in capite fiat, tanquam animæ loco sacratio. Ob eandem causam Hippocrati *Ἡρακλεία νόσος*, nominatur: non quod Hercules, vt ait Galenus, eo morbo laborârit, sed vt eo nomine τὸ δυσκα-

*Gal. cōment.  
6. m. lib. 6.  
Hippid sent. 7.*

ταμάχτην designaret : licet , authore Aristotele , reuera Hercules epilepticus fuerit, veteribus Elephantiasim quan- *Aretæus ad-*  
doque dici, quòd nullo remedio superari queat. Ab omnibus *dit.*

morbis frigidis capitis distinguitur potissimum vehementi *Aristot. ini-*  
& inaequali corporis concussione, & spumâ in ore collecta. *tio sect. 30.*

Quæ tamen nota in leuiori morbo non apparet, vt eo, qui ex *Problem.*

citatur ob tenuiorem materiam, & fumû acrem. Facile enim  
& citò soluitur. Est autem conuulsio omnium partium cor-  
poris non perpetua , sed per interualla , cum mentis & sensus  
oblatione. De cuius causis, generationis modo, ac loco non  
eadem est omnium sententia. Veterum enim propè omnium  
communis consensus est, ab humore crasso, viscoso, & ferè *Epilepsia*  
semper frigido procreari, obstruente ( vt quibusdam placet ) *causa.*

medium ventriculum cerebri, vel (vt aliis) posteriorem, vel v-  
trumque, vel modò vnum, modò alterum, vel etiam primum:  
atque ita fieri, vt interceptis viis, spiritui ad neruos non pateat  
aditus. Addunt nonnulli, non sine probabili ratione, quando-  
que id contingere ob angustiam meatus à posteriore cerebro  
ad spinam, vel imperforatam, aut strictiorem lacunam ad pa-  
latum, aut ad nares. Et certè Galenus de vsu partium scribit  
optimè comparatû esse à natura, vt per decliues cerebri mea-  
tus: tum per palatum in os, tum per corpus narium, orificiis  
perspicuis ac magnis, pituita, aut alia cerebri excrementa ex-  
cernantur, ne animal frequenter corripiatur epilepsia : vide-  
mûsque per illam viam expurgari materiam, quæ epilepsiam  
excitauit, ac spumam ex ore educi. In cōtrarium tamen mul-  
ta à doctis afferuntur.

Primum ab intemperie fieri non posse videtur, sine va- *Epilepsiam*  
pore aut humore. Citiùs enim interiturum est animal, quàm *à sola nō fieri*  
ad tantam perueniat intemperiem. Hoc enim modo corpus *intemperie.*  
non conuelleretur : sed ab omni prorsus actione desisteret.  
Licet Hippocrati duæ conuulsionis causæ sint, plenitudo &  
inanitio. Quod de particulari intelligendum videtur. Hæc  
autem & vniuersa est, & mentem sensûsque omnes oblaedit.  
Nam sine mentis læsione conuulsio, etiamsi totius sit cor-  
poris, epilepsia non est. Neque ab humore crasso. Cita enim  
solutio, materiæ & paucitatem & tenuitatem indicat, quòd  
crassa difficilè moueantur. Idem demonstrant oscitatio, ster-

## DE MORB. INTERNIS

nutatio, spumæ per os exitus, tenuioris materiæ indicia. Fit enim spuma, cum frequenti inspiratione & expiratione, violentoque motu aqua tenuis agitur, & spiritu, aut substantia quadam vaporosa comprehenditur. Accidit quoque frequentius ingeniosis hominibus, ob tenuem cerebri substantiam valde sensilem, victus rationem vaporosam, flatus, vinum fumosum, & similia. Adde omnem epilepsiam per consensum à tenui substantia oriri, ut vaporibus bilis flauæ & porraceæ, eorundem agitatione & acrimonia, fumis, odoratis, aëre, vel vento per nares concepto. Videtur ergo causa esse pituita tenuis, spumosa, bilis flaua, atra tenuior, aut eius ichor, vapor acris, odor ob cerebri exactiorem sensum. Neque etiam fit obstructione spirituum transitum impediēte. Oporteret enim vel motum in vniuersum prohiberi, vel minui, quantitate spirituum, qui transeunt, non sufficiente ad partes inferiores mouendas. Sed vehementior, quàm antè, apparet concussio, & motus inæqualitas. Probabilius multò, cerebrum in seipsum contrahi, ut expellat, quod noxium est, sicuti in sternutatione, quæ veluti parua quædam epilepsia est, ut rectè dixit Auicenna. Sed in hac excutitur, quod est in anteriore parte cerebri iuxta narium foramina. In illa, quia in posteriore parte materia subsistit, difficilior materiæ dissipatio, unde pars affecta, & generationis locus intelligi possunt.

*Auicenna  
sen. i. libr. 3.  
Tract. 5.  
cap. 8.*

Cognoscimus à pituita fieri, si æger frequenter expuere solet, si somnus longior, & profundior, si ingenium stupidius, ex victus ratione, excrementis, actionibus, colore, & similibus. Contraria sunt in biliosis. De ea, quæ per consensum fit, dicetur sequenti capite.

A dextra parte incipiens cum tinnitu aurium, clamore, stridore dentium, eiectione seminis, vehemēti concussione: & quæ ab ineunte ætate consenuit, aut hæreditaria est, grauissima, & quæ vix curari vnquam possit.

Contrà, breuitas paroxysmi, accidentium paucitas, recordatio, verecundia, & si sine spuma fiat, facilèque rutæ, vel hyssopi, aut similibus odoratu recedat, hæc omnia morbi faciliatem indicant. Soluitur aliquando, mutata ætate, victus

ratione, & superueniente quartana: in grauidis, edito fœtu, mensium profluuiio.

In pueris, quos hic morbus frequentius corripit, nutrici imprimis prospiciendū. Vtatur nutrix incidente & attenuante victu, vt lac subtilius, & calidius efficiatur, vt nuper diximus. Fiant sacculi apponendi capiti è cypero, iride Florentina, capill. ven. Ex iisdem cum oleo anethino, rutaceo, irino, aut amaracino calidis inungatur caput, non abluatur. Sed prius detergentibus melle & aphronito cum tepida leniter eluatur, siccetur.

Quæcunque potu inuant epilepticos, facultatis sunt incidentis. Interim tamen quæ vires roborent non omittenda. Cruditās vitetur.

*Gal. lib. 10.  
de simpl. me-  
dicam. fac.*

Conueniunt in maioribus natu, & à sanguine, clyisma, sanguinis missio è cephalica, prouocatio hæmorrhoidum, mentium: in pituitosis, oxymel scyll. syrup. de pomis comp. pil. ante cibum, syrupi concoquentes, purgato à pituita & cruditare ventriculo, prouocatio vomitus (licet Galenus contra Erasist. vomitionibus, interdicit, quia manifestè caput replent) repetita purgatio, pilulæ addito castoreo, theriaca, mythri. (uisi metus sit à calidis) opiata, diæta, caput purgia cum succo sampsuchi, pyrethro, zinzibere, radice pœonia, suffumigia, cauteria. Nocent Cassia, Catholicon, radix, vel succus api, quo tamen Galenus vitur in consilio epileptico.

A tota proprietate valent, & huic affectui maximè accommodata sunt, scylla, enula campana, syrupus de pomis, pilulæ de euphorbio, pœonia radix & semen luna decrefcente collectum, viscus quern. maximè verò eius radix, feseli, coagulum leporis, cinis cuculi, cranium hominis, ossa humana nescientibus data potui (valent etiam in arthritide) cornu alces, aqua gallitrici, theriacalis, agar. trochisc. semen palmæ Christi, vngula asini, vesica apri, talus suillus, cor talpe, flos anagallidis rub. corallus, smaragdus, hyssopus, inquinatio oris è sanguine ægri, splen equi, cerebrum cameli, & mustellæ, lapis pulli hyrundinis, oleum phil. de gagate. Non video tamen cur Gagatinum oleum epilepsiam tollat, cum scripserit Aretæus in principio capitis imperfecti de comitali morbo rerū graueolentium, vt Gagatis lapidis odoratum, homines nonnullos

## DE MORB. INTERNIS

prosternere, & epilepsiæ præcípites dare: nisi fœtore suo iam accessione conflictatum agrum excitet: vel (quod scribunt, rei Chymisticæ professores) quia epilepticam materiam oleum istiusmodi attenuat, digerit, siccât. Ex Euonymo cap. de oleis è metall. laterib. succino & gagate. Balsamum, ol. de piperibus de cucumere asinino naribus inditum, vtil.

Cæterum lapidem pulli hyrundinis sic comparabis. Dissec-  
tis ex prima fœtura hyrundinum pullis ante plenilunium, in  
ventriculis eorum lapillos duos inuenies, alterum versicolor-  
rem, alterum unicolore. Hos, priusquàm terram contigant,  
in cerui aluta colligato. Brachio & collo gestati epilepticis

*Dioscor. cap. medentur, attestante Dioscoride.*

*49. lib. 2.*

*Pueros (ape v. xat)]* Pueris familiaris duabus de causis: vna,  
ob multitudinem humoris & vaporum, vnde etiam in illis  
somnia multus, & profundus, vt scribit Aristot. de somno &  
vigilia: alterâ, ob vermium putrescentium tetrum vaporem ad  
cerebrum ascendentem, aut eorundem viuorum, sed mate-  
riam commouentium. Auicenna scribit, ab epilepsiâ ferè tu-  
tos esse, quibus in capite sunt vlcera, apostemata, fluxus na-  
rium. Nutrici imperandus aqua potus, vt etiam Aristot. præ-  
cepit, vel hydromel, victus attenuans, abstinencia à coïtu, ne  
lac corrumpatur, aut eius materia alteretur, purgatio humoris  
peccantis, exercitium, electaria, lac asininum, in quo cocta  
sint, vel infusa, quæ affectui conueniunt. Pueris verò puluis  
cum melle aut lacte, cauterium in posteriore parte capitis,  
præsertim si sint obesoires, puluis inspersus capiti. Grandiori-  
bus, clysteres leuiter purgantes & attenuantes, syrupi, potio  
purgans, bolus. In vermibus, quæ necant vermes, vnguenta ex  
amaris admota non ori ventriculi, sed vmbilico. Mythrida-  
tium & theriacam, tanquam fortiora, Galenus vituperat loco  
superiùs citato.

*Scapulis cum scarifica.]* Petrus Merenda scribit in co-  
mitiali morbo admodum vehementi, exiguo interuallo  
sæpiùs repetente, nec aliis remediis cedente, se quàm plu-  
rimos per admota collo propè scapulas rubrificantia me-  
dicamenta, donec vesicæ excitarentur, breui temporis  
spatio ad pristinum rationis vsum frequenter perduxisse,  
& ab accessionibus liberâsse, qui deinde decenti cura-  
tione,

*Aristot. sub  
finem libelli  
de somno &  
vigilia.*

tione, ad integram sanitatem perducti fuerunt. Sed hoc faciendum esse post purgationem, nisi morbus urgeat. Sed neque hæc, neque setones, neque cauteria conueniunt circa caput, nisi morbus cerebro sit essentialis, vt fiat diuersio à cerebro.

## ANTO. VALETII EXERCIT. XV.

**E**pilepsia morbus est quodammodo apoplexiæ proximus, cum idem locus in utrôq; patiatur, & idem humor in causa sit. Verum apoplexia ob omnimodam carentiam illius, quæ ad neruos defluit, potentiæ, epilepsia propter motum vitiosum generatur. In hac enim cerebrum (si primarius sit, & per cerebri essentiam affectus) materiam sua vel crassitie medium & postremum cerebri ventriculos obstruentem, vel maligna qualitate obludentem, excutere nititur: vnde omnium sensuum & facultatum animalium offensio, saltuosorum motuum, atque conuulsionis corporis totius consequutio affertur.

*Gal. cōment.  
ad aphor. 45.  
lib. 2.*

*Galen cap. 5  
lib. 3. de loc.  
nat. affect.*

Epilepsia aliàs grauior, interdum mitior. In qua stertor, dentium stridor, partium faciei peruersio, corporis totius iactatio vehemens, spuma multa, seminis effusio, & in ipso casu acclamatio, ea grauis admodum censetur, & ferè incurabilis. Statim enim iugulat & accessionum continuatione, & symptomatum vehementia. Vbi verò vel multa, vel plurima ex signis commemoratis absunt, leuior existimanda.

*Paul Aeg.  
cap. 13. lib. 3.*

In curatione duo tempora maximè obseruanda, epilepsiæ curatio. paroxysmi vnum, intermissionis alterum. In priori videndum, vt quàm citissimè paroxysmus soluatur: quod fiet, si corpus primùm colligatur, membra extendantur, iniiciantur primùm vincula dolorifica

## DE MORB. INTERNIS

in articulis brachij, & crurum: theriaca, mythrid. confectio hieræ simplic. sinap. in os indantur: in aures & nares oleum rosmarin. aut anisi, aut saluiæ arte chymica factum immittatur: eodem futuræ coronalis & lambdoides inungantur. Huc pertinebunt & artuum frictiones, ut in apoplexia, & clysteres, cum in ipsa accessione, tum extra accessionem iniiciendi. Qualis hic est.

℞. radic. fœnic. ireos, pœon. ana ℥. 2. rutæ, absynth. salu. beton. hyssop. maioran. ana M. ℞. flor. stœchad. vtriûsque & beton. ana p. i. f. decoct. & col. ad ℔b. i. In qua dissolue confect. hier. & diaphœnic. ana ℥. ℞. sacchar. rubr. ℥. i. vel ℥. 10. ol. chamæ. & rut. ana ℥. i. ℞. sal. gemm. ℥. 2. f. clyster.

In intermissionis tempore providendum ne repetat paroxysmus. Id commodissimè fiet victu calfaciente & exsiccante, purgantibus medicamentis, sed apparatus prius cum syrup. accommodatis & cephalicis aquis materia, vel hoc apozemate.

℞. radic. scyll. præparat. angelicæ, enul. camp. pœon. mar. acor. radic. ireos. Florent. ana ℥. i. polypod. quern. femin. cartham. passul. mund. glycyrrhiz. ras. ana ℥. 6. beton. hyssop. thym. chamædr. chamæpyth. visci querni, melissophyll. ana M. i. feminis feseleos, pœon. mar. ana ℥. ℞. femin. anis. fœnic. ana ℥. 2. flor. anth. genist. cardiacor. ana p. i. ℞. salu. maiora. ana M. ℞. f. decoc. ad ℔b. i. In colatura diss. syr. de hyssop. de bizantiis, & oxymelitis simpl. ana ℥. i. F. apoz. clar. conditum cinam. ut dec. pro dosib. 3.

Ex huiusmodi decocto licebit syrupum solutivum, magistralem vulgò dictum, conficere. Ut si in quartar. 3. colaturæ superioris infundantur turpethi bene gummo. ℥. ℞. cum tantillo zinzib. folicul. fenn. mundator. ℥. 2. agar. ℥. i. cinam. parum: & expressione post leuiusculam ebullitionem facta, addatur syr. laxa. ros. pall. ℥. 2. sacch. q. s. Huius syrupi ℥. i. ℞. vel ℥. 2. dabitur bis in mense cum aq. bugloss. vel beto. Que dosis

aluū si seigniū moueret, diaphœn. ʒ. 2. addi possent. Sed & post instituti apozematis vsū sic purgabitur.

℥. rad. & semin. pœon. mar. sem. fœn. an. ʒ. 2. fol. hyssō. beton. capill. ven. an. M. i. flor. cardia. p. i. f. decoct. ad dos. In colatura infund. agar. troch. ʒ. 4. fol. senn. mund. ʒ. 2. cinam. parū. In expressione diss. hier. simpl. ʒ. 2. syr. capill. ven. ʒ. ʒ. f. potio.

A purgatione si missione sanguinis opus videatur, secabitur malleoli vena, vt ex lib. Gal. de cur. rat. per sang. mission. præcepit Autor. Mox verò robur capiti conciliandū est sumptis & admotis. Sumuntur electar. conseru. opiat. condita, quæ non modò vires reficiant, sed etiā morbi causam oppugnēt. Vt.

℥. conseru. bugloss. borrag. anthos ana ʒ. i. ʒ. confect. alkerm. ʒ. 2. electar. lxt. Gale. & de gemm. ana ʒ. ʒ. pulu. radic. pœon. aristoloch. ana ʒ. i. rasur. ebor. corn. ceru. corall. ana ʒ. 2. cum syrup. de hyssop. f. opiata.

Hanc dicebat Syluius sibi omnium ad epilepticos confectionum instar esse. Dabat ad nucis auelanæ magnitudinem manè, aut vesperi dormituro. Huius loco hæ tabellæ vsui erunt. ℥. myrrh. elect. corall. rub. rasur. corn. ceru. & ebor. ana ʒ. ʒ. semin. pœon. mar. visc. quern. & cran hum. interioris ana ʒ. i. cum sacchar. in aq. bugloss. dissolut. f. tabell. pond. ʒ. 2. Ager cap. vnam manè, aut serò.

Interim errhina & apophlegmatismata ad pituitæ deriuationē: sacculi, suffitus, lixiuia, litus ex oleis conuenientib. ad confirmationē capitis conferent.

His omnibus ex arte administratis si perstiterit affectus, oportunum erit guaiaci decoctū, vel radic. Cynaræ, vel Sals. Parillæ (addit. radic. pœon. angelicæ, & al. cephalicis) bis in die, mane & vesperi, dare: quod præterquam quod incîdit, tenuat, exsiccat, malignam quoq; qualitātē, quæ hîc suspitione nō



# DE MORB. INTERNIS

caret, abigit. Dein iterāda purgatio. Postremò his si remediis æger non leuetur, ad cauteria cōfugiendū carneæ brachij parti, vel extremo occipiti, vel post aures, admouēda, aperto diu vlcere, recidiuæ metu.

Cæterum, si infans fuerit qui ægrotat, quāquam nihil moliendum videatur, quòd ætate ad biliosiorē sicciorēq; statum transeunte, & victu moderatiore adhibito, sua plerunque spōte morbus euanescat, proderit tamen puero certā vitæ legem nutritrici præscripsisse, vini & veneris vsurā subduxisse, imò & catharticum exhibere. Quinetiam puero aliquid syr. laxat. ros. pallid. cum pulte poterit exhiberi. Mox infantuli caput hoc inungetur linimento.

℥. ol. irini & aneth. ana ʒ. β. radic. acor. fol. absynth. & rut. puluerat. ana ʒ. β. cum cera pauca f. linim.

Nec omittenda sunt τὰ φυσικὰ βοηθήματα, quæ appellant amuleta, diligenter ab Autore è veterum monumentis petita. Hunc nodulum Syluius præscribebat, cuius vaporem demissis in sinum naribus epilepsiæ obnoxius inspiraret.

℥. semin. pœon. & radic. visc. quern. corall. rub. ana ʒ. 2. f. nodul. aut saccul. collo gestandus, &c.

*De epilepsia per consensum à stomacho. CAP. 16.*

**S**anguis è 1 poplite, vel malleolo trahatur, aut eodem 2 loco fiat scarificatio: sæpè repetita purgatio ex his 3 pilulis.

℥. pul. hieræ pictæ ʒ. 2. agar. trochis. rhe. electi ana ʒ. i. mastichis, santal. citrini, macis, ros. ana. Gra. 6. cum succo citri fiant pilulæ: 4 aut idem puluis incorporetur in ʒ. β. catholici, vt fiat bolus.

Aut omnia dissoluantur in sero caprino, vel decocto cicerum rubrorum. Inungatur stomachus

Paul. Æg.  
cap. 13. lib. 3.

1 Ad reuocandum cursum, & prohibendā generationem.

2 Si non detur secāliuēnam occasio.

3 Cum cephalicis, tum stomachicis.

4 Hinc quoque spectant catapotia ex rheo & aloë confecta.

cum olei mastich.  $\zeta$ . i. coralli rubri, & pul. rad. pœoniae ana  $\mathfrak{d}$ . 2 Corallus, radix pœoniae, Iaspis viridis, è collo suspendantur, vt contingant stomachum.

Cæterum materiæ morbi habenda 5 ratio est. *5 Vt materiæ morbificæ generatio prohibeatur, tollaturque collectio.*

Quibusdam enim 6 gracilibus & iracundis in ieiunio influit in stomachum admodum sensilem sanies biliosa. Quibus panis per se, si non sitiunt, alioqui ex vino albo tenui, diluto, austeriusculo, aut vino granatorum remedio est. *6 Quibus lae sunt venæ.*

Aliquando crapula in causa est. Nonnunquam humor crassus, & frigidus. His supradicti syrupi 7 incidentes conueniunt, eadem quoque 8 purgatio, & vomitus. Quod si ex spiritu venenoso, qui ex parte aliqua in caput attollitur, præliganda 9 pars est, Cucurbitula affigenda loco. *7 Vt oxymel. simplex & syliticum. 8 Ex hiera utrâque. 9 Vt aditus ad cerebrum prohibeatur spiritus ille venenosus.*

Locus 10 theriaca, mythridatio, contrita anagallide ruffa inducendus est: vicinia in vesicam attollenda ex sinapi, pipere euphorbio, incorporatis theriacâ, vel melle anacardino. *10 Vnde tollitur aura venenata.*

Quod si locus præligari non potest, vt matrix, renes, cucurbitulis vtédum erit cum scarificatione. Postea purgandum 11 est, si fuerit opus: & emplastrum, vt prius, ad regionem partis 12 apponenda. *11 Pilulis iâ prescriptis. 12 Et, si hysterica sit mulier, hysterica erunt prescribenda remedia.*

## EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Epilepsia aliquando fit in cerebro tantum, sine vlla partium subiectarum concussione, sed soliùs capitis. Quod Epilepsia si rarum est, à me tamen annotatum & obseruatum in sacerdotè quodam annos 30. nato. Illud Medicis visum est contingere maligna aliqua materiâ in dextro ventriculo contenta, præsertim cum in dextram partem caderet. *Epilepsia si ne partium inferiorum concussio in Sacerdote, obseruata.*

# DE MORB. INTERNIS

tum propter auram ex aliqua parte ad cerebrum sublatam. Florentis ætatis nobili Scoto, Iacobo de Flamin, pilo rufo, è sura dextra, veluti gutta crampa (vt vulgò appellant) incipiebat: inde totius corporis concussio cum spuma. Soluebatur vomitionibus biliosis, eoque affectu corripiebatur declinante luna ad interlunium. Monachus De Chantecler Parisiensis, annorum 30. corpore nigro & piloso, è malè curato lie- ne in febre continua vapor quidam mensuris interuallis cum tumultu exiliebat. Qui vbi ad sinistram mammam peruenerat, modò pronus, modò supinus concidebat sine sensu & motu. Postea confriticatis aceto temporibus, oculos aperiebat, manu locum dolentem ostendens, & *phewes*, non loquens. Liberatus paroxysmo noctem consequentem insomnem ducebat. Carnotensi adolescenti è minimo digito sinistro ad regionem cordis perueniebat: vnde palpitatio. Hinc ad caput, vnde casus. Aurà ascendere manus. conuellebatur. Alteri Scoto annorum 20. incipiebat à tremore dextri brachij, ad mam- mam progrediendo: vnde conuulsio sine sensu, memoria, & voce. Reuocabatur cibo & potu, quæ non sentiens quoque deglutiebat. Multis fit primum tremor & conuulsio brachij, deinde capitis concussio. Anno 1555. Martij 8. die, in adoles- cente Picardo annos nato 15. à torpore manus dextræ initio accepto, contrahebantur tres primi digiti: index vi extende- batur. Ita cadebat obtorto obliquè brachio, & corpore infle- xo. In alia, ab articulo humeri mali initium: deinde tremor totius brachij: ex quo adstrictio dentium & casus. Multis à crapula, aliis à venere, aliquando à tumoribus commouen- tur conuulsiones epileptiæ. Sæpissimè ab vtero, vel ob im- prægnationem, vel retentionem aut corruptionem sperma- tis, vel secundinæ. Ab inedia etiam huic morbo inimicissima, vt quæ inter ea, quæ caput replent excellat: vt inde quoque brachia, manúsque vehementem tensionem sentiant, & im- becillior stomachus grauiter offendatur, vt scribit Gale- nus.

Varia est horum omnium curatio. Ligatio suprà locum, sanguinis missio è vena proxima, cauterium, vel vesica- torium in parte affecta, ita vt vulnus diu relinquatur aper- tum, oxyrhodinum capiti affusum, frictiones in paroxysmo, fumigia, succus rutæ vel trifolij naribus impositus, vel, vt

*Scoti epilepti  
ei historia.*

*Monacho pa-  
risiensis epile-  
pticus.*

*Carnotensis  
adolescent,  
epilepticus.*

*Scotus alter  
epileptic.*

*Picardus a-  
dolescent epi-  
leptic.*

*Gal. cap. 5.  
lib. 1. de loc.  
aff. & cap. 7.  
ib. 3.*

vult Apuleius, succus anagallidis rubr. cum melle, vel ireos, vomitiones ventriculo pleno ( alioqui noxiæ, vt Gal. docet) sternutatoria post purgationem: in ieiunis, vel ira melicratum, vel mica panis vino intincta: in ventriculo affecto, leuia medicamenta (nam à fortioribus semper læditur) pilulæ, opiatæ, pulueres à pastu, emplastra, sacculi, tryphera persica in vteri affectibus, pessaria,eductio eius, quod retinetur, corroboratio vteri: in grauidis, emplastrum pro matrice, vnctio, sacculus, &c.

*Agarici.*] Non ita magna vis purgandi inest agarico, nisi in magna dosi. Huic affectui mirum in modum conuenit. Ventriculo tamen infirmo, colicis doloribus opportunis, nausea- bundis initio morborum phlegmaticorum non exhibendus. Propterea Auicenna in quartanæ phlegmaticæ curatione gradatim peruenit ad agaricum, cui suffragatur experientia.

## ANTO. VALETII EXERCIT. XVI.

**E**pilepsiam esse per cōsensum à ventriculo, mor- *Epilepsia ex consens. vtri- curatio.*  
dicatio, nausea, cibi inordinati appetētia, osten-  
dunt. Eius curatio traditur à Gal. cap. 5. lib. 5. de loc.  
mal. affect. cum historiam de Grammatico recitat.  
Humor vitiosus, qui ventriculo continetur, hac po-  
tione excluditur.

℥. hieræ simpl. & diaphœn. an. 3. 2. syrup. de absynth. vel  
ment. 3. i. vel 3. 6. aquar. beto. & hyss. an. 3. i. 1. f. potio.

Vel si vomitus satis esse videatur, cōcitabitur ex pē-  
na oleo illita, & in œsophagum immissa, vel vom-  
itorio. Subinde etiam idem ventriculus repurgādus.  
Roborabitur assumptis, electar. aromatic. ros. dia-  
rhod. triasantalo: admotis, vt litu ex oleo nucis mos-  
chata, mastich. cydon. &c. Quod si sit epilepsia à

*Epilepsia à ve-  
nenosi vapo-  
ris ad cerebr.  
ascensu cura-  
tio.*

venenata aura ad cerebrū conscendēte, fortis supra  
transmittētem partem ligatura, eaque altior paulo,  
ad vaporis ascensum inhibendum, conueniet, & le-  
pidium emplastri modo parti adhibitum, quò virus

1 *Quæ deli-* exhalare commodè queat. At si caput iam obfessum  
*r. ñ est febris* fit, emplustra ex alto trahentia, aut ruptoria, ad co-  
*expers cum* ronalem futuram admouenda. Interim cardiaca,  
*tristitia &* cùm sumpta, tum applicita iuuabunt.

*De 1 Melancholia. C. AP. 17.*

**M**elancholia nonnunquam vitio cerebri 2 &  
*2 Suo tēpera* capitis, quod cùm calidius fit, sanguinem 3  
*mētē imutati* adurit, atque eo adusto fumi melancholici animum  
*3 Non pitui-* exagitant. Eiusmodi enim facie ferè sunt admodum  
*tam. Sanguis* rubente, rubore quidem saturato, & tandem liues-  
*enim materia* cente. Quibus etiam aliquando adnascuntur 4 pu-  
*est humoris* stulæ. Deinde etiam, qui flauo sunt 5 colore, quibus  
*melācholici,* caput calidius, bilem adurit.  
*tūc venenata*

*qualitate af-* Alij verò 6 vitio lienis, aut 7 hepatis, melancho-  
*fecti. 4 Hu-* licum sanguinem toto corpore 8 colligunt.  
*moris sangui*

*nei soboles* Tertium genus melancholiæ est, quæ hypochon-  
*per adustionē* driaca dicitur. Horum omnium signa & phantaf-  
*5 Quorū suf-* mata ex libello de 10 melancholia Aëtius trāstulit;  
*fusio stabilis* quædam etiam Aurelianus annotauit in Chronicis.  
*est ex natura-*

*lis vitio c. o-* Itaque initio mali repellētibz vtendum est, oxy-  
*nomie.* rhodino, aut mixta materia media, vt chamæmeli-  
*6 Persyna-* no, & quæ de Soda dicta sunt: multò magis, si non  
*thrismum seu* interperies sola adsit, sed & aliqua obstructionis  
*collectionem.* suspitio comiteretur. 11 Phlebotomiam omnes ferè  
*7 Pergene-* imperant, atque in primo genere 12 cephalicam: in  
*rationem.* 13 secundo ac 14 tertio, mediam præferunt.

*8 Et idisse-* guine venas,  
*tas habet san-* cum habitu corporis extenuato, squalido & sicco. 9 Ex melancholici humoris  
*guine venas,* in hypochondriis synathrismo. Hæc verò melancholia ruelus & flatus cūm dis-  
*cum habitu corporis extenuato, squalido & sicco.* ssesia habet coniunctos. 10 Quilibet Galeno tribuitur. 11 Ad declinatio-  
*in hypochondriis synathrismo.* nem causa antecedentis, amotionem coniuncta, temperamenti restitutionem, & su-  
*Hæc verò melancholia ruelus & flatus cūm dis-* perstitis materia præparationem. 12 Melancholia scilicet, quæ localem habet  
*sisesia habet coniunctos.* in cerebro generationem. 13 Melancholia totius corporis, & hypochondriaca.  
*Quilibet Galeno tribuitur.* 14 Medianam vulgè dictam, quæ aquè vacuatur à capite, ac è toto corpore, ad

Hippocrates in libello de virginibus scripsit vir-  
gines interim fieri melancholicas, resistente men-  
strua purgatione: idque multo magis, si vruntur a-  
moribus. Idem quoque viduis accidere consuevit,  
dum curis & mœrore animum conficiunt. In his  
enim ex vehementi animi motu cerebrum laborat,  
atque ideò infirmatur. Refluit ab utero ad cor san-  
guis vitiosus, atque ita animam corrumpit. His vena  
malleoli 15 aperienda est, aut idem locus per inter-  
ualla, repetita scarificatione vulnerandus. Probatur  
etiam vena 16 quæ inter annularem & minimum,  
vel medium & annularem digitum excurrit. Perse-  
uerante malo vena in fronte diuiditur. Oportet au-  
tem latum 17 vulnus inferre venæ, &, si quidē san-  
guis crassus est, semel ac plurimum detrahère: si mi-  
nùs crassus fluat, depletis vnciis duabus, abstinendū.

generationē  
prohibendam  
et corrigēdū  
symptōma.

15 Vt fiant  
menstruales,  
et fiat humor  
καλάρρπος.  
qui erat  
ανάρρπος.

16 Prestite-  
rit medianā,  
aut basilicā  
pertundere.

17 Vt exitū  
habeat cras-  
sor sanguis.

18 Hæc ad  
generationē  
melancholicā

18 Alimenta è media 19 materia instituēda sunt.  
Panis triticeus bene coctus: vinum album, tenue,  
odoriferum. Omnino cruditas 20 vitanda est, &  
potus sine 21 cibo, vel in fine pastus.

humorū pro-  
hibendā per-  
tinēt. Cū hæc  
verò victus  
ratio, lactis,

Clysteribus per interualla vtendum est: primū  
quidem lenioribus, qualis hic est.

asinini vsus  
(si minùs ob-  
murmurēt hy-

℞. fursurum hordei M. i. summitatum anethi,  
chamæmel. meliloti. an. M. ss. semin. rutæ, & fœnic.  
ana ʒ. 2. Fiat decoctio ad lb. i. In colatura dissolue  
mellis anthosati, sacchari rubri an. ʒ. ss. ol. 22 ʒ. 3. Po-  
stea verò decoctioni adiiciemus polypodij ʒ. i. atq;  
aliquādo dissoluemus cassiæ, 23 aut cathol. ʒ. 6. aut  
hieræ 24 picræ vnc. ss. vel diaphœnici, vel diapruni

pochondria)  
mirifice con-  
fert. Itē bal-  
neum aque

dulcis egeli-  
dæ, diuturn<sup>9</sup>  
syrupū viola-  
cæ vsus vere

nono. 19 Neque imbecilli, neque forti. Dicuntur autem media, quæ sunt succi sa-  
tis alibilibus: vt pipiones, perdices, vitulina caro. 20 Quòd obstructions pariat.  
21 Id in omni melancholiæ genere. 22 Vt olei violacei. 23 Vel vtriusque ʒ. ss.  
24 Inopiata, non in puluere.

# DE MORB. INTERNIS

25 *Vsuclyste* tantundem. Ex quo materia 25 purganda est. Sed  
*rum melacho* præparanda prius leuioribus 26 quidem remediis,  
*lica collectis* quæ in epilepsia diximus, & capite de Incubo : cum  
 26 *Vi decocto* his etiam.  
*pul. scopol.* 27. succi borrag. succi buglossi, depuratorum ana  
*borrag radi-* lib. 2. succi pomorum odoriferorum (curtipendula  
*cularum, ape-* vocant) lib. 3. folliculorum sennæ 3. 4. sem. anisi &  
*riem. ñ. cum* fœniculi an. 3. 2. Senna distemperetur diem integrū  
*syrupo capill.* in succis: deinde leuiter bulliat, & cum sacchari lib.  
*ven. de bisan* 1. β. fiat syrupus clarificatus, & aromatizatus. Dosis  
*tius, oxymel.* 3. 2. 27 cum aqua buglossi, borraginis, lupulorum,  
*scyllitico, mo* fumariæ, cuscutæ, aut sero lactis. Melancholia leui-  
*do in tyso-* ter, & per interualla purgari debet. Itaque folliculo-  
*chondrii nō* rum sennæ 28 3. β. 3. 6. 3. 1. in iusculo galli decrepi-  
*sit sinathris-* ti, gallinæ, pulli, aut alterius carnis, vel piscium, de-  
 27 *Vel 3. 3.* coquimus. Deinde sorbetur iusculum. Alioqui fo-  
 28 *In singa* liorum sennæ 3. β. sem. 29 anisi, cinamom. an. 3. β.  
*las doses.* florum anthos & borraginis, florum violarum an.  
 29 *Vi discuti-* P. 1. fiat infusio, vel decoctio in sero caprino. Aliquā-  
*tiatur flatus,* quos senna do semunciam 30 cassiæ, aut catholici adijcimus.  
*quos senna* Galenus & reliqui Medici probant purgationem ex  
*excitat.* 30 *Vi. 27.* pul. hieræ picr. 3. 1. pul. epithymi 3. 2. Sed hæc purga-  
*cass. recens* tio æstate non conuenit, potiùsque vt edum erit cas-  
*extracta 3. β* sa, aut cath. dissol. in sero lactis. Vbi cholera & pi-  
*f. bolus. De-* tuita salsa exuperârît, confectio hamech ad 3. 1. uti-  
*tur, et super.* liter præscribetur. Decoctum, in quo medicamenta  
*habet dilutū* dissoluuntur, hoc modo melius fit.  
 3. 3. foliorum 27. summitatum absynthij & fumariæ an. P. 1.  
*sennæ in deco* trium florum cordialium an. P. β. Fiat decoctio, aut  
*cto prunorū* infusio suprâ calidos cineres. In col. expressa dissol-  
*damaſcenorū* ue 31 medicamenta.  
*infusorū, &*  
*ebulitorum.*  
 31 *Vi tryphe*  
*râ persicâ, si*  
*fit contumaciior humor.* Vel infusa de in decocto conuenienti, aut caprino sero, folic.  
 senna 3. 1. β. dissolue catholicum cum dupla senna & rheo.

Vbi vigiliæ vrgent, potius hoc imperare licet.

℥. triphetæ Perficę vnc. ſ. ſpecierum hieræ picr.  
Galen. 3. 6. epith. pul. foliorum ſennæ ana ʒ. 4. cum  
modico ſacchari violati fiat mixtura. Doſis ad ʒ. ſ.  
diſſolutam in ſero caprino. Ad ſomnum verò con-  
ciliandum ſequentia imperabis.

℥. chamæmel. anethi, violar. ana. M. i. flor. alb.  
nymphææ, calic. papau. ana M. i. folior. ſalicis vitis,  
malu. ana p. i. f. decoctio, qua abluantur manus,  
pedes, &c.

Ex philonio ad lenticulæ magnitudinem, ca-  
phuræ pauculo & albumine oui fit elychnium in  
nares iunmittendum ad ſomnum. Pulueres quoque  
ſubinde imperandi ſunt, & condita. vt.

℥. pul. elect. lætificantis ʒ. 3. ſacchari roſati, &  
violati ana ʒ. ſ. dentur ʒ. 4. in cochleari cum mo-  
dico vino albo odorifero. Aliud.

℥. elect. lætificantis 32 & diamargarit. ana ʒ. 2.  
ſe. citri, melonum, cucumeris, citrulorum ana ʒ. ſ.  
ſacch. roſati, quod ſufficit, fiat mixtura: aut, ſi vis,  
incorporentur in conf. borraginis, bugloſſi, roſ. an.  
ʒ. ſ. Fiat conditum. Pleręſarchontica ſerò & mane  
cum vino, confectio akermes, diamargarit. calid.  
Theriaca, aromaticum Galeni, è citro, diagalanga,  
diacuminum (preſertim in hypochondriaca) dian-  
thos, electarium de gemmis, è moſcho, cum aqua  
bugloſſ. & vino odoro proderunt.

33 Balnea temperata per interualla conue-  
niunt.

Cucurbitulæ leues in hypochondriis, quæ diſcu-  
tiāt flatuſ: atq; vbi dolor eſt, cum 34 ſcarificatione.  
Vbi verò pertinax morb⁹ eſt, ſecādæ 35 venæ capitis

32 Rhazes  
lib. 5. Conti-  
nentu, & lib.  
9. ad Alm.ã-  
forem.

33 Confectio  
alkermes cũ  
quadrupla  
borraginis cõ  
ſerua ſit tibi  
omnis inſtar  
conditi. Vt  
℥. cõſect. al-  
kermes ʒ. i.  
ſ. cõſer. bor-  
rag. ʒ. 3 f. mĩ  
ſtura. Detur  
ad magnitu-  
dinem nucis  
anellanæ.

34 Hæſca-  
rificatio mu-  
tilis.

35 Reſta  
frontis, aut  
vena puppi,  
quæ in occi-  
piti eſt.



# DE MORB. INTERNIS

36 *Hæc potissimum locum habent in melancholia, quæ localem habet in cerebro generationem.*  
 37 *Ut hamorroidi, menstruum, si suppressi sint.*  
 37 *Ut æquali medicaminum excessu contrarius naturæ excessus abigatur.*  
 38 *Purgationibus ex helleboro albo, aut nigro.*  
 40 *Albi quidem, si purgandum sit cum symptomate: nigri, si cum synatroismo.*  
 41 *Ex helleboro albo.*  
*Ceterum non datur hellebori substantia, sed tantum dilutum, idque ad 2. Neque hic quidem omnibus: ut nec pueris, nec senibus.*

& sanguisugæ affigendæ. Aperiendæ infernæ purgationes, vis pharmacorum augenda 38 est, imperandæque hiera diacol. quæ epithymum, aut fennæ puluerem, deinde etiam quæ helleborum recipiat.

Helleborismis 39 quoque utendum est. Nec enim frustra dictum est ab antiquis indigere helleboro, qui mente non ita constarent. Itaque sic imperabis.

℥. pul. hieræ diacol. 3. 4 pul. epithymi, & foliorum fennæ an. 3. 2. Excipiantur modico melle. Deinde in sero caprino dissoluantur. Fiat potus.

℥. ramentorum 40 helleb. 3. 1. Fiat infusio per tres dies in aquæ pluuiæ 3. 4. deinde lento igne decoque ad tertias. Col. addantur mellis optimi despumati 3. 2. Huius mellis cochleari puluerem hieræ diacol. miscebimus. Reliquum mel seruabimus, & per interualla cochleare dabimus, dissolutum in pingui iusculo, ut incitetur 41 vomitus. Alius helleborismus.

Raphanus acerrimus in taleolas diuidatur. Ramentorum hellebori 3. 3. Taleolæ configuntur: transfixas sub dio per noctem collocabis. Postridie ramenta detrahes, & ita diligenter, ut nihil remaneat hellebori. Ex quo taleolas in oxymelite tribus horis macerabis: maceratas comedes, & oxymel superbibes.

Post horas aliquot vomitum ciebis. Quod si venter flatuosus est, fouebis 42 oleo, in quo rutæ, anethi, dauci, cumini, & similium semina coxerint. Eadem semina in puluerem redacta, adiecto piperis & cina. momento, melle anthosato exci-

42 *Aut decocto stomachico.*

pies, & ita exhibebis.

Dropax 43 calidus proximè descriptus breui-  
bus interuallis ventriculo affigetur, & toti meta-  
phreno.

43 *Explic.*  
*naual. 3. 4.*  
*olei rutace*  
*3. I.*

# EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Melancholia differt à phrenitide, quia sine febre est, & furore à mania, quia cum metu & tristitia. Fitque vel ab intemperie frigida & sicca, & humore melancholico eiusdem temperiei, siue cerebro primariò affecto, siue à toto corpore, siue ab hypochondriis. Quæ postrema flatuosa magis est. Atque hæc est vulgaris omnium ferè sententia. Quæ tamen ita accipienda nobis haud quaquam videtur, quasi nulla melancholia cum febre sit, aut ab intemperie frigida semper oriatur. Experientia enim constat in febre hominem melancholicum sæpè reddi, aut post febrem, vel alium morbum. Dico timidum, tristem, sine furore, multa falsa, ridicula, & ab omni ratione aliena animo mouentem, læsa imaginatrice, & ratiocinatrice facultate. Quæ propria sunt melancholiæ symptomata, neque phrenitidi veræ, neque mania, neque *παράφρεση* communia. In febre ardente Burgundus quidam Lutetiæ ad ædem S. Iuliani multis clarissimis Medicis astantibus mortuum se affirmabat simul cum fratre ibi decumbente. Postea phantasia mutata declamabat: præcabaturque Medicos, ne ampliùs animæ impedimento essent, quò minùs è purgatorio euolaret ad Deum. Aliquando imitabatur moribundum, quasi efflaret animam: monebat, vt spectarent expiratum: postea summo timore, & omnium desperatione corripiebatur. Tandem opportunis remediis adhibitis, & hæmorrhoidum profluvio liberatus est. Alius itidem se mortuum, & sine animo putabat, ob idque cibum omnem reformidabat, quòd mortuos edere negaret. Tandem optimo consilio effectum cadauer, mensæ accumbens, cuius exemplo cibum sumpsit. Quidam, ex Aëtio, neque omninò caput se habere putauit, ad quem ecogitasse dicitur Philotimus supra reliquam curationem plumbeum pileum, à quo grauatus habere se caput intelli-

*Melancholia*  
*à phrenitide*  
*& mania*  
*distincta.*

*Melancholia*  
*omnis non fe-*  
*bris expers.*

*Burgundus*  
*ex ardēte fe-*  
*bre melācho-*  
*licus.*

*Aëtii serm.*  
*2. Tetrab. 2.*  
*cap. 9.*

# INSTIT. CHIRVRGIC.

*Artemidorus* geret. *Artemidorus Grammaticus* cū in littore viso *Croco-*  
*Grammat.* dilo expauisset, quod facillè fit & maximè melancholicis,  
*melancholicus* omnium literarum oblitus, putauit tota vita alterum crus  
 & manum sibi exempta. Multa similia quotidie experimur  
 ex quibus intelligi potest melancholiam sæpè fieri, vel ca-  
 lore resoluta, vel calidiore cerebro, aut corpore colligente  
 melancholiam, non adurente tamen: alioqui in Maniam  
 degeneraret. Humor enim hic, vel à partis intemperie ge-  
 neratur, vel relinquitur post inflammationes, vel crassior in  
 obliquitate venarum inclusus, ac torpidus malignam ali-  
 quam qualitatem contrahit, & vapore atro (est enim maxi-  
 mè vaporosus) spiritus vitales, & animales inficit, vnde me-  
 tus, tristitia, palpitatio cordis, inflatio carotidum, pulsa-  
 tio in multis corporis partibus, alius dura, macies corpo-  
 re refrigerato, & cogitationes somniantibus similes con-  
 sequuntur. Qui si in cerebro obstructionem fecerit, epi-  
 lepsiam: si in mentem iepat, vt ait Hippocr. id est, cerebri

*Humoris*  
*melancholiam*  
*committentis*  
*vnde sit ge-*  
*neratio.*

*Hippoc. sub*  
*finem sect. 7.*  
*& post. libr.*  
*6. Epid.*

*Melancholie*  
*duo perpetua,*  
*& pathogno-*  
*monica signa*

& spirituum temperamentum mutet, melancholiam pro-  
 creabit. Ob idque ab vno horum duorum morborum in  
 alterum facilis est mutatio. Sunt tamen duo perpetua, &  
*pathognomonica signa*, metus & tristitia sine causa. Quæ à  
 solo humore melancholico pendent, siue per se, siue aliis  
 mixto, superante tamen, vt neque de materia, neque de  
 parte affecta dubitare possimus. Sanguis enim, cū mo-  
 bilis sit, suauis, & lucidus, hominem potius in spem erigit,  
 ac lætitiā & comitatem inducit bilis: acrimonia, calore &  
 mobilitate, præcipitem hominem efficit, & ad sæuitiam, non  
 metum prouocat. Adustra, *σφοδρὰ καὶ σπινώδης* Melancholia,  
 colore atro timorem ac tristitiā: firmitate & crassitie,  
 in opinione suscepta, quantumuis ridicula, constantiā affert.

A toto corpore fieri intelligimus ex causis præceden-  
 tibus, signis melancholici sanguinis in toto corpore ap-  
 parentibus, victus ratione, missione sanguinis crassi, tem-  
 pore anni, regione, ætate declinante, temperamento,  
 mensibus aut hæmorrhoidibus suppressis, varicibus cu-  
 ratis, corpore gracili, nigro, hirsuto, venarum latitudine,  
 distentione ob flatum, sanguinis copia, curis, laboribus,  
 victus ratione tenui, sordida. A cerebro verò, si mœror  
 & tristitia perseuerarint, sine tali corporis constitutione.

Conueniunt clyster (nam in omnibus aluus adstricta est & flatibus distenta) sanguinis missio, syrupi, purgatio, cremor hordei, veratrum, opiata, epithemata, inunctiones, forus, topica, balneum, lotiones capitis & pedum, cauteria, trepanum, masticatoria, sternutatoria, errhina embrochæ. Humida lætificandi vim habentia, & spleni propria. Valer ad melancholicos cum metu, & anxietate electarium sequens mihi v-sitatum.

℞. emblic. ʒ. 10. ros. ʒ. 6. caryophyll. nardi, cyperi, <sup>Electarium</sup>  
 afari, mastichis, myrobalanorum an. ʒ. 3. cinamomi, <sup>ad melācho-</sup>  
 zedoariæ, an. ʒ. 2. nucis mosc. macis, cardamomi, <sup>licos Authos</sup>  
 phuræ, moschiana ʒ. 1. syrupi rosa. vel mellis ros. q. <sup>v-sitatum.</sup>  
 f. fiat elect. Dosis ʒ. 3. cum liquore conuenienti.

*Tertium genus*] Hypochondriaca melancholia non fit à suc- <sup>Melancholia</sup>  
 co frigido, sed fumis malignis & acrioribus ad cerebrum elat- <sup>lia hypoc.</sup>  
 tis, quando scilicet venæ mesaraicæ inter ventriculum & he-  
 par ardore quodam efferuescunt, & obstructione aliqua la-  
 borant, vnde humores crudi & melancholici illuc conclusi  
 flatus multos procreant, & ad caput elati melancholica sym-  
 ptomata ac difficultatem anhelitus inducunt. Percipitur  
 rugitus, & veluti murmur quoddam (est enim hoc signum  
 maximè proprium) circa hypochondria, modòque incipit  
 ab hepate, modò à liene, cum humor ille inter lienem &  
 ventriculum subsistit in venis. His enim duobus locis fieri  
 potest, vel ab intemperie, vel ab obstructione, vel ab vtrò-  
 que. Contingit frigidus ventriculo existente, & calido  
 hepate. Inde sequuntur cruditates, refrigeratio corpo-  
 ris & sanguinis, macies, sudor, plurimum sputum, sed im-  
 primis, vt dixi, perpetui rugitus circa hypochondria, &  
 somnia turbulenta cum metu, & tristitia. Quibus duobus  
 signis collegimus morbi essentiam in nobilissima mulie- <sup>Mulier me-</sup>  
 re, quam Medicinalij frustra curauerant, vt imbecillitate sto- <sup>lancholica ex</sup>  
 machi laborantem. Summa erat macies, vehemens extre- <sup>frigidior</sup>  
 marum partium frigus, sibilus auris sinistra, somnia turbu- <sup>ventriculo,</sup>  
 lenta. Curatio absoluta fuit minoratiuo ex Catol. & dia- <sup>& hepate</sup>  
 phœn. syrupis & apozematibus melancholiam ad expul- <sup>calidior.</sup>  
 sionem præparantibus, fotibus hypochondriorum, vnctio-

# DE MORB. INTERNIS

nibus, pharmaco ex hiera diacoloc. Poteſt etiam fieri hypochondriaca melancholia à partibus inferioribus ventris, quæ calida intemperie laborant, vel effuſa bile atra per meſenterium, & partes ventris, magno inteſtinorum calore aduſcente chylum. In cruditate optimum, arctius ventriculum ligari, vt ſtatus impediatur, & melior fiat coctio.

*Hellebori.*] In hoc duo cauenda. Primum, ne detur in ſubſtantia, ſed vel in decoctione, vel infuſione, idque poſt vniuerſalem purgationem. Alioqui conuulſionem affert, vel iugulat. Deinde, ne miſceatur myrobalanis, aut adſtringentibus, ne diutius retineatur in corpore. Ex hieris accommodatæ ſunt tantum huic affectui, quæ veratrum, aut colocynthidem recipiunt: ſed in conſtitutione humida tantum, & pituitoſa, quia nimis exſiccant. Hieræ Logadij, qua utebatur Ptolomæus Rex ad omnia vitia melancholica, probatur Alexandro.

Datur ad 3.3. vel 4. cum calida. Melancholicis, elephanticiſ, morpheæ, impetigini, veneniſ, nephriticis, lethargicis, iſchiadicis & epilepticis auxiliatur. Huius deſcriptionem hunc in modum Nicol. Myreſus concinnauit.

*Nicolaus  
Myreſus  
Section 23.*

℥. agaric. elater. ſal ammoniac. abſynth. ammoniaci, foſſior. indicorum. hellebor. nigr. ſcyllæ toſtæ, dacidij, myrrhæ, zinziberiſ ana 3. 6. aloës ſlauæ, euphorb. ana 3. 8. polij herb. caſiæ, chamædr. centaur. hyperic. bdell. marrub. ana 3. 5. piperiſ alb. cinam. opopanac. ſagapen. piperiſ long. croc. petroſ. Macedonic. ana 3. 4. caſtor. pip. nig. ariſtoloſch. rotundæ 3. 3. ſeminis colocynth. polypod. ana 3. 8. ſpicæ nardi & grani cni-  
dij ana 3. 6. Hæc trita in pollinem madefacito cum melle Attico deſpumato ſufficienti. Opopanacem, ſagapenum ſolue in mortario cum melle, & probè conſectam reconde in vaſe, & vtere.

## ANTO. VALETII EXERCIT. XVII.

**M**elancholia morbus deprauata eſt imaginatio, quæ cerebri intemperiem humori melancholico congenerem ſequitur. Hic enim humor ater animæ domicilium obtenebrans, terrorem in-

cutit,

cutit, alienasque cogitationes absqueevidenti causa  
menti iniicit: vbi inter cætera animi pathemata, me-  
tus, mœstitia, odiûmque hominum prævalent. Tri- *Flippo, apho.*  
plicis melancholiæ, primariæ scilicet, seu cerebri *23. lib. 6.*  
propriæ, hypochondriacæ, & totius vitio corporis  
factæ, causæ signaque quibus inter se distinguun-  
tur, desumpta sunt ex Galeno li. 3. de loc. mal. affect.

Curatio perficitur enematis, zulapiis, aut apoze- *Melancholiae curatio.*  
matis, contumaceum humorem apparantibus, pur-  
gationibus, blandis primùm, dein valentioribus,  
sanguinis missione, balneo, spirituum recreatione.

Enemata ex decocto remollientium, & discutientium flatus, qui hîc sæpè colliguntur, cum lactis sero, dissolutis melanagogis, comparantur. Zulapia ex syr. de lupul. fumaria de bizant. cum stillatitiis liquoribus bugloss. cichor. &c. Vel hoc apozema præscribitur.

*Z.* radic. aper. & polypod. quern. ana ℥. 6. cortic. radic.  
cappar. thamarisc. fraxin. ana ℥. ss. afari, acor. ana ℥. 2. cichor.  
tot. quinq. capill. borrag. summit. lupul. fumar. thym. e-  
pithym. melissophyll. ana M. i. femin. anis. fœnic. melon.  
cucum. acetos. citr. glycyrrhiz. ras. ana ℥. 2. flor. cardiac. genist.  
& epithym. ana p. i. f. decoct. ad lb̄. i. In colatur. dissolu. syr.  
de lupul. de fumar. & de bizant. ana ℥. i. f. apozem. clar. & cond.  
vt decet, pro dosib. 3.

Mox purgatio subsequetur, ex catholico, dia-phœnico, confect. hamech, & aliis id genus melancholicum succum tra<sup>h</sup>entibus, instituenda, vel.

℥. polyp. quer. passul. mūd. glycyrrhiz. ras. ana ʒ. 2. summitat.  
lupul. adhianth. agrin. scolop. ana M. i. folicul. semæ mund. ʒ.  
2. femin. anif. & fœn. ana ʒ. i. flor. borrag. & bugloss. ana p. i.  
f. decoct. in sero lactis ad dof. 1. colatura dissolue expressio-  
nem ʒ. i. β. rhei elect. infusi, vt decet, cathol. & syr. viol. ana ʒ.  
β. f. potio.

## DE MORB. INTERNIS

Pauperibus folia fennæ ad ʒ. 2. vel 3. infunduntur in hydromelite, aut conuenienti decocto: quibus expreffis adduntur ʒ. 2. β. confection. hamech. oxymelit. simpl. ʒ. 1. fyr. laxat ros. pall. drach. 6. Vel catapotia de fumaria, Inda, exhibentur: quāquam liquida medicamenta in hoc affectu præferenda. Subinde repetentur, hæc purgantia, ob humoris pertinaciam, qui non nisi fenſim educi poteſt.

*Gal. cap. 4.  
lib. 3. de loc.  
mal. aff.*

*Hipp. aph.  
21. lib. 6.*

Quod ad phlebotomiam attinet, eam Galen. non deſiderat in melancholia, quæ primaria cerebri eſt affectio: quamuis ad præcautionem, & propter plenitudinem mitti ſanguis non incommodè poteſt. In aliis melancholiæ generibus magis conferet venæ ſectio, præſertim ſi melancholicum ſit corpus totum, ſed iis cautionibus adhibitis, quas ibidem Gal. præcipit obſeruandas. Citandæ hæmorrhoides, ſi eò natura vergat. Hinc illud Hippocratis. Maniacis, ſue melancholicis, ſi varices ſuperueniant, ſit mania ſolutio. In mulieribus reſtantes menſes ſi mali huius occaſioni ſint, malleoli vena pertundenda. Ex melancholia verò hypochondriaca quia lienis labes & ventriculo ſæpiùs inuritur, conſulendum eſt his potiſſimum partibus fomentis litubus, ſcutis vulgò appellatis, ex lienis & ventriculi affectuum curatione repetendis. Recreabuntur vires electariis, conſeruis conditis, ab Authore imperatis.

Balnea aquæ dulcis, in quibus refrigerantia & humectantia incocta ſint, mirificè profunt, moliendo perſpirationem: quæ prohibita bilioſos facit melancholicos, per aduſtorum fuliginoforum

excrementorum retentionem. Itaque his frequentibus, victuque humido & euchymo se multos perfanasse melancholicos professus est Galenus.

Maniaci melancholicis similiter curantur, nisi forte maniae causa à melancholia euariet, ut ferè fit ab acribus & mordacibus succis, feruidiore sanguine & bile: & tum ut phrenitici curantur.

De 1 Catarrho.

C A P. 18.

**C**atarrhus nomen generale 2 defluxus, aut destillatio est. Nam κατάρρεω verbum id sonat. Peculiariter fluxio est à capite in fauces. Catarrhus verò alius pituitosus, tumque distentio est, faciei pallor, frigiditas capitis, ad somnum inclinatio, piger motus, 3 hebes anima, & sensus. Voxque 4 per nares obmurmurat, intercepta via. Adde 5 temperamentum, locum, anni 6 constitutionem, rationem vitæ. Urinæ quoque crudiores sunt.

Alius calidus est, ferè à pituita falsa, aut alioqui acri humore. Hic totius capitis 7 dolor est. Rubent 8 oculi, interiores partes oris 9 exulcerantur. Adde & cætera externa, & urinas magis coloratas. Catarrhus aliquando per venas & arterias diffluit in corpus. Hic ferè ceruicis, scapularum, membrorum & luborum 10 dolor est.

Catarrhus, 11 ubi levis est & frigidus, foci 12 capitis, sed sine frictione ex linteis calentibus, ut

1 Proprie & catachresticas usurpato.

2 Fluxus humoris à capite in totum corpus aut aliquam corporis partem.

3 Ingenij tarditas.

4 Quod vocalis materia non habeat liberum exitum faucibus interceptis.

5 Frigidum & humidum

6 Frigidæ, humidæ, æquiloniam.

7 Ab humorum acrimonia & meatuum obstructione.

8 Suffusione subtili, mi humoris & caloris secundum meningis.

9 Serosi humoris acrimonia.

10 Et paraplegiam inducit. 11 Generatione causa, & symptmate. 12 Vesiculis ex milio, surfure & sale.



# DE MORB. INTERNIS

calor in profundum 13 subeat, leui gargarismo, caputpurgiis curari potest. Ita tamen fouebis caput, vt nullo modo frices. Nam in catarrhis frictio-  
ne capitis non est vtendum. Leuis medicina.

13 *Aque humorens cō- coquit.*

14 *Gargari- smus ad flu- xum in aspe- ram arteriā, aut nares pro- hibendum.*

14 ℞. rosarum M. i. fiat decoctio in aqua & mo- dico aceti, vnde leuiter colluat os, vel vtatur mo- dico conseruæ rosarum, vel syrupi de rosis siccis.

15 *Vel maio- ranæ succus per nares è volamans educatur.*

Caputpurgium.  
℞. seminis nigellæ romanæ ʒ. 2. seminis anisi ʒ. 1. conquassata frigantur in sartagine, cum leui aspersione aquæ maioranæ. Fiat nodulus: 15 ap- plicetur naribus. Quòd si resistat venter, 16 se- munciam cassiæ quarta parte 17 horæ ante cibum imperabis.

16 *Ne sup- pressa aluo, augeatur ca- pitis sympto- mata.*

Intereà proderit sacculos capiti instituere, qui ad exhauriendam materiam vitium facientem sint accommodati. Qualis hic est.

17 *Ne in al- imentū ver- tatur.*

℞. milij, aut auenæ conquassat. & torrefact. M. i. furfuris macri frixi p. 1. salis torrefacti & puluerati ʒ. 1. f. sacculus capitis commissuræ admouendus.

18 *Vt si quis in sole iter fecerit.*

Vbi verò 18 calidus est, sed leuis, balneum aque dulcis sat esse potest, vbi corpus non fuerit neque plethoricum, neque cacochymum, aut inunctio ca- pitis, aut frontis, è rosaceo, è caseo molli & recen- ti, è cauliculis lactucarum subactis, è posca, Saccu- lus è rosis. Quòd si purgatio imperanda est, quia resistit aluus cassiam, 19 mannam imperato.

19 *Modo non sit ager πικρόχολος δύνω.*

20 *Genera- tione, causa Et sympto- mate.*

Vbi verò 20 vehementior catarrhus est, 21 ma- iora remedia ex vsu sunt. Quòd si ex vehementia catarrhi, quod sæpè fit, 22 præsens suffocatio immi-

21 *Quali- tate contra- ria & uten- di assiduita- te.*

22 *Materia in pulmones prolapsa.*

net, clysteribus 23 acriusculis statim vtendum. In quibus hieræ picræ semuncia dissoluta sit.

24 Quod si corpus 25 sanguineum & bene carnosum est, vena in brachio angusto 26 foramine aperienda est.

Cucurbitulæ magnæ scapulis & brachiis affigendę. Totus thorax ex oleo de liliis, de lino, amygdulcium. Chamæ. butyro recenti, 27 cocta radice althęæ cum axungia gallinæ, vel simili, vel butyro malaxata 28 inungendus est. Gagarismata 29 quæ reprimant fluxionē, caputpurgia, frictiones & vincula, quæ eandem diuertant, imperanda sunt. Vbi verò 30 nullum tale accidens interturbat curationem, catharri, frugalis 31 vita imprimis imperanda, cœna nulla, aut pauca, declinatio 32 à ventis, solis & lunæ 33 radiis, abstinencia à 34 vino & rebus vaporosis, à 35 somno diurno, qui etiam noctu breuior esse debet. Vtantur hordeato, auenato, vbi resiccandum est. Conuenit 36 orizogala, amygdalogala cū sacch. ros. vbi retinēda defluxio, incrassanda, & coquenda. Aqua frigida ore colluta in calidis: subtepidam in frigidis fluxionibus, conuenit.

Secunda mensa carne cydoniorum piris acriusculis & coctis, post etiam coriandro vti oportet, vt confirmetur venter, & fumi prohibeantur. In frigido, vino quidem vti licet, verum modico. In pastu medio non frigido, sed refracto, aqua sub-

modi ex syrupo myrtulorum cum decocto plantag. hordei. 30 Vt cum suffocatio non est in re, sed solum catharri curationis est habenda ratio.

31 Vt ossa vitæ portio ducatur. 32 Quia humores fundunt.

33 Quæ reprimunt. 34 Ratione fluxionis, non materiæ. 35 Qui corrumpit, non con. o. q. ut. 36 Si non adsit capitis dolor.

# DE MORB. INTERNIS

37 *Ne incitetur catarrhus.*

38 *Quatuor hæc sunt corporis plethoræ, generatio ab hepate calidiore & sanguine subtili. 3. mo, prolapsus in partem cuius officio vita carere nequit, febris cômuni.*

tepida, aut pane tosto. Clysterum vsus, sed 37 mollium probandus est. Phlebotomia à Græcis ferè ommissa est & Arabibus, nisi vbi ea adsunt, 38 quæ Mesuæus annotauit in capite de catarrho.

Purgationes initio leuiore, qualis est cassia ad 3. i. aut 3. x. imperata, ac per interualla vsurpata, cui aliquando in fluxione calida addere licet elect. de succo ros. 3. 2. Iam progressu morbo, vbi signa coctionis apparent, poterit catholicum imperari ad 3. 6. adiecta infusione 3. 2. agarici, & 3. 3. rhab. Nunquam etiam in his catarrhis imperamus rhab. infusi 3. 4. puluerisati verò 3. 2. qui dissol. in hac decoctione.

℥. passul. hordei ana P. i. trium florum cordialiū, liquiritiæ rasæ ana 3. 2. fiat decoct. pro vna dosi, in qua dissol. rhab. & c. vt dictum est. Post hæc etiam iam benè maturato morbo, 39 fortioribus vti licebit, qualia in Gatinaria. Peculiariora verò remedia alia 40 continentur ore, alia 41 deuorantur: nōnulla 42 naribus applicantur: eaque aut retinēt, aut leniunt & concoquunt, aut repurgant. Retinent, vt.

39 *Vt diacarthamo.*  
40 *Ad infringendum.*  
41 *Ad leniendum.*  
42 *Ad detinendum & cerebrum refrigerandum.*

℥. ros. hordei, agrimonie ana P. i. sem. plantag. pap. albi, portul. ana 3. i. fiat decoctio ad 3. 4. In col. dissol. diamori 3. i. vini granatorum 3. 3. Aliud.

℥. aquæ. hordei non excorticati 3. 3. dianuci 3. i. Aliud.

℥. zulaipij rosarum. 3. 3. syrupi myrtillorum 3. i. Aliud.

℥. aquæ rosarum 3. 3. caphuræ 3. i. Aliud,

℥. corticum papaueris albi. rosarū siccarum an. P. 2. boli armenæ 3. 2. fiat decoctio. Hæc ore continemus, & inde os leuiter colluimus. Alioqui fiunt

pilulæ, quæ in ore continentur.

℥. boli armenæ lotæ cum aqua ros. terræ sigillatæ lotæ cum decocto papaueris ana ℥. i. elect. diatragacanthi frigidi cum oui albumine dissolu. ℥. β. cum modico syrup. ros. de siccis fiant pilulæ ad magnitudinem lupini.

Vel. ℥. succi rosarum ℥. β. bol. armenæ tantundem, fiant pilulæ tres horâ decubitus capiendæ. Mirificæ sunt facultatis ad acriores fluxiones retinendas. Conserua rosacea cum mastiche, bolo Armena, terra sigillata ad id instituti apprimè confeter. Vel etiam trochisci eiusmodi.

℥. anisorum, coriandri præparati ana ℥. β. macis, cinamomi, spicæ, ireos, coralli rubri ana ℥. i. semin. papau. albi, in vino cocto macerati ana ℥. i. gummi tragacanthi, mastichis ana ℥. i. omnia incorporentur in succi liquiritiæ ℥. i. cum leui affusione syrupi myrtillorum. Fiant trochisci pondere ℥. β.

Possumus uti solo tragacantho, terra sigillata, & in frigido catarrho spica. Vbi leniendum est, glycyrrhizæ succus maximè conuenit, aut decoctio pectoralis, ut decoctio pectoralis Rhazæ.

℥. iuiubas N. xx. sebesten xxx. passul. enucleat. ℥. i. viol. siccarum ℥. β. liquiritiæ rasæ. ℥. 5. caricæ 10. Fiat decoctio in tribus libris aquæ, dum redeat ad vnam. Adde, si vis, semen bombacis, capillorû ven. & alia, quæ incidunt, aut repurgant.

*Decoctio pectoralis ex Rhazæ.*

Post initia, utendum est elect. diaireos, commiscendumque est diatragacanthum ad ℥. i. Quale hoc est.

℥. diatragac. frigidi ℥. i. diaireos simplic. ℥. β. fiat pul. Teneat in ore. Verum, ut minuitur catarrhus

## DE MORB. INTERNIS

& maturatur, plus diaireos miscendum erit. Retinendum est, cum fluxio vehementior & periculiosior. Aut etiam ubi levis est. Sed hîc ferè sine purgatione corporis, illîc post purgationem. Utuntur suffumigiis, quale hoc est.

℞. olib. sandaracæ ana ʒ. 2. fiat decoctio in vino adstringente excipiaturn fumus. In frigida.

℞. ligni aloës, costi ana ʒ. 2. galliæ moschatæ ʒ. ʒ. olibani, sandaracæ ana ʒ. 1. cum styrace liquida fiant pilulæ, & super prunas suffumigium. In calida, suffumigia fiunt hoc modo.

℞. santali citrini ʒ. ʒ. ros. violarum ana P. 2. fiat decoctio in aqua, & inde suffumigium. Utendû quoque pomis odoratis est, ut prius Cucuphis & aliis rebus roborantibus cerebrum. Ligatione in duobus digitis manus dextræ, stuphis siccis, postremò etiam cauterio hoc modo. Radatur caput in syncipite medio, qua parte futura coronalis est, fricetur locus calente linteo. Sinapismus, aut phenigmus applicetur: vesicæ excitentur & diu contineantur, ut fluant. Caules itaque ad ignem tabefactos axungia porcina inunges, & superpones loco. Quibus si nihil proficitur, cauterio utendum erit.

### EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Nulla ferè corporis humani ægritudo est, quæ non defluxione humoris alicuius è capite aut excitari, aut incrementum accipere possit. Atque id generalius sumpto nomine: κατάρροσ Græcis appellatur. Propriè tamen cum in nares defluxio fit, κέρυζα, in fauces, βράγχος: in gurgulionem, σαφυλή & κίων, dicitur. Causas omnium, signa, & remedia persequi, longius esset, quàm pro instituto. Hoc admonuisse satis fuerit, distillatio-

nem eiusmodi, non solum, ut multi scribunt, à cerebri intemperie frigida & humida, aut ab omnibus, quæ replent caput ossa intemperiginem habere. Nam sæpè calidius cerebrum plus vaporis frigida ce-  
 attrahit, qui deinde, ut in aëre pluvia, superueniente frigore rebri nō fieri.  
 concrefcit, atque exprimitur: calore & siccitate, veluti quodam naturæ circuitu tandem absumitur. In omnibus tamen  
 catarrhis capitis repletionem esse certum est, quæ hanc de-  
 fluxionem parit, idque à vaporibus alimenti, humorum, vis-  
 cerum vitio, caloris capitis imbecillitate, quia non conficit a-  
 limentum, aut vapores non dissoluit, defectis alimenti pro-  
 prii, atque inopia, ut in ventriculo. Sed duo perpetua ferè sunt  
 huius mali seminaria, calidius hepar, ventriculus frigidior,  
 adiuncto partium mittentium robore, cum imbecillitate  
 recipientis: quibus additur, pulmo, uterus, lien, &c. Aër dein-  
 de externus, frigidus quidem, aut exprimendo, aut calorem  
 intrò cogendo: calidus verò & austrinus, caput replendo,  
 & humores liquando, ac dissoluendo. Frequentiùs tamen  
 materia cerebro conclusa per æstus in superficiem per frigora,  
 in medium corpus, & partem imbecilliore delabatur. Cutis  
 quoque densitas & alui astrictio plurimùm accelerant catarrhum.

*Catarrhi  
 duo perpetua  
 seminaria.*

In calido, venæ sectio aliquando conuenit, diuersio per  
 clysteres, leuis purgatio, gargarismata ad astringendum, Er-  
 rhina ad diuertendum, suffumigia ex ligno aloës, benzoino,  
 styrace, olibano, gallia moschata, sandaraca, carioph. lauro,  
 baccis iuniperi: in calido, vapor humidus ex aqua ros. viol.  
 santal. caphura, facellationes, formulæ in ore, incrassantia, al-  
 terantia: in frigido, magis constringentia, & calida, pilulæ,  
 theriaca, cucuphæ, sacculus siccans, inspirationes incidentes,  
 poma odorata, exulceratio in interiore brachio, seton synci-  
 pite medio, qua parte coronalis pilus raditur frictio, sinapif-  
 mus, phænigmus, vesicatorium, cauterium, frictiones vicina-  
 rum partium & capiti consentientium, meliores, quàm capi-  
 tis, nisi bene puro corpore: ordo à cruribus ad spinâ, brachia,  
 ceruicem, iugulares, post aures, occiput, synciput, frictio capi-  
 tis cum spongia.

Vapor non modò prohibendus in fine pastus, sed dum fit  
 concoctio. Tum enim eleuatur plurimus, ut ex ructibus appa-  
 ret. Quo tempore fluxio excitatur, magis stipticis vtendum, ut

## DE MORB. INTERNIS

vesperi: manè verò lenientibus, coquentibus, expurgantibus rhoracem. Galenus sub finem 6. Epid. scribit catarrhum, asthma, conuulsionem sanari febre, vt inde intelligamus calidis & siccis potius in hoc affectu esse vtendum. Assuescendum emungendis naribus potius, quàm expuitioni: quia per nares crassa & tenuia expurgantur sine damno reliquarum partium: per os tenuia tantùm, & cum periculo pulmonum, ac ventriculi. Adde quòd consuetudine facta expuitioni, per somnum, & occupato animo, materia in inferiores partes ab ore delabitur.

Cibi parcitas præsertim vesperi, panis sicci esus, declinatio nocturni aëris & radiorum lunæ, potus paucus, præsertim materia existente cruda, quo tempore sitis quoque minor est. Supinus decubitus oculis confert, sed catarrho noxius. Pilulæ Mesuæ de cynoglossa valde nobis probatæ, sed quarum non vna est apud omnes descriptio: conserua quoque rosarum cum mastiche, bolo Armena, syrupo myrtillosum, terra sigillata, & quod sequitur.

*℞.* anisi, coriandri ana ʒ. β. macis, cinamomi, ireos Florent. coralli rubri, spice nardi, ros. rub. ana ʒ. i. mastiches ʒ. 2. gummi drag. malaxati cum aqua ros. ʒ. i. omnia incorporentur cum succo glycyrrhizæ. Fiat trochisci ponderis ʒ. i. teneat sub lingua.

Ad destillationem vuæ & faucium, suffumigium.

*℞.* styracis. liquid. ficuum pinguium, florum amygd. semin. hyoscyami ana ʒ. 4. cum ficu & styrace diu terendo incorporentur. Fiant trochisci. Ter in die, manè, in meridie, & vesperi fiat suffumigium. Deinde interpositis tribus diebus idem fiat.

## ANTO. VALETII EXERCIT. XVIII.

*Gal. lib. 3. de caus. sympt.* **C**atarrhus propriè dictus defluxio à capite ad partes subiectas perhibetur, éstque symptoma de genere immodicè excretorum. Vt enim se habet in leienteria ventriculus, ita & cerebrum in distillationibus. Catarrhi causæ efficientes vel sunt à cerebro ipso, vel ab inferioribus partibus. A cerebro

quidem, ob eius intēperiem calidam, aut frigidam. *Catarrhi*  
 Calida ex euentu catarrhum ciet, plus scilicet attra- *causæ effi-*  
 hendo, quàm concoquere, & in halitum digerere *cientes.*  
 possit. Frigida per se catarrhi causa est, quia ali-  
 mentum ad cerebrum delatum, non conficitur, nec  
 per halitum diffilatur. Huic quoque causæ famu-  
 lantur partis raritas, quæ promptè pituitam susci-  
 pit, magnitudo viarum in cerebro, cerebri situs, ad  
 quem vapores facilè conscendunt. Itaque scriptum  
 reliquit Hippocrates, cerebrum tanquam magnam  
 glandulā esse, & caput, ὡς περ σιλύαν τῷ σώματι  
 incūbere: ideóq; εἰς ζαν τῶν ἀνθρώπων νοσημάτων  
 esse. Cū autē à partibus inferioribus oritur, & effi-  
 cientis intrinseci rationem habet, vel vētricus in-  
 temperatus, vel calidum iecur reperitur. Extrinsecæ *Catarrhi*  
 causæ sunt, aëris calidi intemperies, salforum, & (ut *externæ cau-*  
 loquuntur) excoriantium catarrhorum parens: vel *sa.*  
 frigida, crassorum soboles: affectiones animi spiri-  
 tus refrigerantes, aut etiā resoluentes: ocium, à quo  
 excrementorum congeries, & spirituum torpor: vi-  
 gilia, quæ eosdē spiritus absorbēt: somnus nimius,  
 qui refrigerat, maximéque pomeridianus à pastu,  
 quia tunc violento motu calor ad interiora retra-  
 hitur, ac spiritus crassiores & frigidiores fiunt: im-  
 modica venus: denique inanitio & repletio.

Signa calidi catarrhi sumenda sunt ex faciei & *Signa calidi*  
 oculorum calore, rubore, tenui materiæ consisten- *& frigidi*  
 tia. Item ex odore, quum in nares fertur, putido: ex *catarrhi die*  
 sapore, cum in fauces, acri, salso, erodente, siti: ex *stincta.*  
 subita generatione, visus, atque auditus minore  
 læsione, cum in ventriculum. Frigidi contraria sunt  
 signa.



## DE MORB. INTERNIS

*Catharri  
curatio.*

In curatione res imprimis non naturales optimè sint compositæ. Esus largior, potus parcius imperetur, quòd ex humidis vapores faciliùs succrescant. Somnus breuior, iis præsertim, quibus hepar est præcalidum: talibus enim per somnum repletur caput. Iisdem inedia longior malo est: quia cibo & potu non refrigeratum hepar vehementiùs incalescit, vnde omnia vrit. Obesos abstemios esse oportet. Fugienda quæ caput calfaciunt, opplent, balnea, lotiones capitis, integumenta nimia, &c.

*Gal. lib. 5. et  
13. Method.*

Considerata fluxionis natura, quæ est à parte vna ad aliam expulsio, indicatio prima sistendam fluxionem suadebit. Atque interim ad duos terminos respiciendum, vnde scilicet fluxio oritur, & in quem desinit. Prior, qui membrum mandans appellatur, duas exhibet indicationes, vt excrementum auferamus, quod expellitur, & vitium, ex quo excrementa progignuntur emendemus. Recipiens quoque pars geminam præbet indicationem, vt eam roboremus, ne recipiat, & id quod fluit aliò trahamus.

Vacuabitur materia, eadèmq; opera sistetur fluxio, sanguinis missione, nisi humores planè sint crassi, & à sanguinis natura plurimùm distantes: vbi reuulsione per ligaturas, frictiones & clysteres, materiæ præparatione, & per conuenientia medicamenta expurgatione contenti sumus.

Si tenuis & calida sit, syrupis adstringentibus & incrassantibus apparatus: vt iuiub. nenupharino, de portul. papauer. qui in tussendi labore grauiore dantur è cochleari. Sedata fluxione purgatio præscribatur.

℥. fol. oxalid. scariol. portul. ana M.℞. polypod. quern. contus. glycyrrhiz. ras. passul. mund. ana ʒ. ʒ. ialu. beton. ialuię vitę, flor. viol. ana M.℞. f. decoct. vt est artis ad ʒ. ʒ. In col. fiat leuis ebullitio ʒ. 2. folic. fennę orient. & ʒ. ℞. semin. anis. in qua colata infunde ihei elect. ʒ. 1. cinam. gra. 4. In expressione dissol. syrup. de cichor. compos. cum rhab. ʒ. 1. f. potus.

Si crassior sit materia, præparabitur & purgabitur vt in pituitosa cephalalgia.

Non omittenda interea, quę vaporum ascensum ad cerebrum inhibent, vt pulueres, opiata, conferuę, electaria. vt.

℥. conferuę rosar. siccę ʒ. ℞. coriand. præparati ʒ. 1. anis. cond. ʒ. ℞. puluer. ros. sicc. ʒ. 1. bol. armen. purgatę ʒ. 4. puluer. electa. diaireos simplic. ʒ. 1. diarragacanth. frigid. ʒ. 1. sacch. ros. q. s. vt ʒ. ʒ. f. puluis. Post pastus singulis detur ē cochleari.

Ex iisdem & conferua rosar. antiqua in eundem vsum opiata concinnari potest.

Remedia particularia vt errhina, apoph. & similia, non nisi consideratē vsurpanda, quod sæpius humores liquando & dissoluendo catarrhos commoueant.

De 1 ophthalmia.

CAP. 19.

1 Humid. nō autem sicca.

**O**phthalmia, inflamatio est eius tunicę, quę corneę adnascitur. Coniunctiuam 2 vocant. <sup>2 Quod cōne</sup> Hęc producitur à pericranio, à quo vasa deducun- <sup>3 Cuius ge-</sup> tur in oculum, per frontem mediam & tempora. <sup>4</sup> Itaque ferē superficialis inflamatio est cum ru- <sup>5</sup> bore, dolore, tensione, quę vt augentur, ita affe- <sup>6</sup> ctus magnus est. Exiguus, vt minuuntur. In exigua <sup>7</sup> inflammatione, maioribus 4 remediis non est <sup>8</sup> opus. Sed rosarum succo, oui liquore tenui, aqua <sup>9</sup> ros. aut plantaginis, lacte mulieris, vel asinę curari

2 Quod cōne

3 Cuius ge-

4

5

6

7

8

9

# DE MORB. INTERNIS

potest. Oportet hos succos instillare oculis, eosdem contegere panniculo lineo, iisdem liquoribus infuccato. Postea verò iam declinante malo, santalinos citrinos, modicum maceris, aut spicæ in aqua rosacea feruefacta 5 adhibebimus.

Vbi verò 6 grauius malum est. 7 phlebotomia, arteriotomia, cucurbitula, sanguisulæ, scarificatio, purgatio, cauterium, paracenthesis, fortiora collyria, & localia 8 remedia instituenda sunt.

Phlebotomia, vbi 9 cætera cõsentiunt, vt ætas, vires, tempus, regio, & si dolor vrget vehementius, ac rubor & tensio maior est, subducta sponte sua, vel molliori clystere aluo, Cephalicâ aperito eiusedem lateris 10 amplo vulnere, & quantum tolerant vires, 11 sanguinem educito: tum si fuerit opus, paululum recreatis viribus, & leui pharmaco purgato corpore. Hippoc. de locis in homine metuit, ne fortiori pharmaco humores corporis agitati confluant in oculos. Quod consilium multis è recentioribus Medicis probatum est.

Itaque si biliosus sanguis est, quem ferè dolor acerbior sequitur, rhab. cassia, manna, catholico, electario de succo rosarum, hiera picra ventrem subduces. Dissolue æstate in fero lactis, decocto violarum & hordei. Reliquis temporibus, in decocto pectorali. Fortiores sunt pilulæ aureæ, pilulæ lucis, hiera diacolocynthidos. Si pituita, ex hiera picra, pilulis elephang. agarico mixtis formentur pilulæ. Diaphænicon quoque ex vsu est, pilulæ fœtidæ, & coccia.

In melancholicis, hiera Ruffi, hiera diaco. addito epithymo, aut foliis fennæ. Per interualla, clysteres

5 Ad humoris cõcocti digestionem.

6 Per eandem generationem affluxus causa, & symptomatum vehementia.

7 Ad generationem prohibendâ, materia cursum reuocandum, causamq; cõiunctâ amouendam.

8 Cuiusmodi sunt frõctalia vulgò dicta.

9 Vt si morbi species, magnitudo, causa èt symptomata desideret, & ex affluxu materia ab orgasmo magna sit ophthalmia.

10 Vt calor contra naturâ euanescat

11 Sæpè ad lipothymiam vsque.

& suppositoria loco purgationum esse possunt.

Alioqui reuocandæ sunt purgationes. Iam bene purgato corpore, 12 cucurbitulæ scapulis, & initio 12 *Ad reuocandum fluxum.*  
 13 ceruicis figendæ sunt, vbi & 14 scarificatio con- 13 *Quinetiæ occipiti Et toto capiti sunt cornicula affigenda.*  
 uenit, si quidem locus admixta cucurbitula vehementer intumescit, atque vbi grauitas est capitis. Perseuerante malo, vena frontis, vel quæ in syncipite apparet, quæ post aures, quæ in temporibus, in quibus ea eligenda est, quæ tumet, rubet, pulsat magis ceteris. Reliquias inflammationis vacuat ea, quæ ad maiorem angulum est. Loco phlebotomiæ non- 14 *Ut fiat reuulsio Et euacuatio maniffesta materia in oculū fluentis.*  
 nunquam hirudines inducuntur. Cartilago quoque auriculæ scarificatur. Quæ vena ad pollicem vergit, mediæ ramus est, quæ initio secta plurimum diuer- 15 *Quod minus dissipetur spiritus.*  
 tit, & viribus 15 minùs detrahit, quàm secta cephalica. Arteriotomia locum habet, vbi calidus & spirituosus sanguis est. Huius rationem describit Galenus ad finem lib. 14. Methodi medendi, & Mesuæus cap. de ophthalmia. Cauteria tamen ad coronalem futuram, vt priùs post aures in occipitio, è regione oculi laborantis in ceruicis initio imprimi possunt. Vt in syncipite medio, qua parte coronalis, raditur capillus, & cauterium applicatur. Eidem frictiones, sinapismi, phœnigmi, vesicationes institui poterunt.

Paracenthesis fit hoc modo. Prehendes digitis cutem cum carne, quæ initio ceruicis est ad cauum occipitij: tum acum traductam filo serico satis crasso transiges. Et ita locum peruium ad triginta aut quadraginta dies permittes, per interualla sublato, ac deinde reposito filo. Topicis vero hoc modo vtendum est 17 Initio quidem reprimendum: 18 *17 Cum materia fluit, & tantum pars calet, & rubet.*  
 18 *Cum materia pars alia fluxit.*

# DE MORB. INTERNIS

augmento, aliquid coquentium & reprimentium miscendum est. Vt verò procedit morbus, hæc augenda sunt, & minuenda, quæ reprimunt. Postremò roboranda pars est. Fouentur itaque 19 oculi ex decocto violarum, rosarum, sem. psilij, papa, albi, corticis radice mādregoræ, foliis: populi, salicis, rubi, myrti & similium, distincta ratione ex natura humoris, qui fluit.

In augmento, decocto maluarum, althææ, cydoniorum, adiecta modica quantitate eorum, quæ reprimunt.

Procedente morbo, flores chamæmeli, anethi, meliloti miscendi sunt. Postremò etiam fœnugraci decocto vtendum. Vbi reprimendum, ex aqua communi, aqua rosarum, aut plantaginis, decoctio fit.

In augmento, lacte, postea etiam vino diluto.

Itaque vbi topicis vtendum est, fouendus locus decoctione frigida, aut tepida, si leuæ adsunt, & pertinaciùs inhæret pituita, tum 20 medicamentum oculis instillandum. Postea gossipium madefactum in liquore conuenienti linteolo lineo inuoluitur: linteolum similiter insuccatur, & ita oculo insternuntur: tum ita alligantur fasciâ, vt ne oculus grauetur, aut doleat. Oportet enim quæ oculis adhibentur, læuia esse, mollia, præterea sine morfu, sine emplastica & viscida natura, quæ pertinaciùs inhæreat, & celerius indurescat.

Quater in 21 die remedia innouantur, aut etiam sæpiùs, si vrget dolor. Quòd si per 22 exteriores partes, quod sæpè fit, fluxio est, frons & tempora reprimente emplastro inducenda sunt.

Conue-

19 *Id fluxionis initio.*

20 *Si calida sit materia.*

21 *Imò decies*  
22 *Vt secundum perierant tunicam.*

Conueniunt itaque initio 23 aqua rosarum, oui 23 *Ad reprimendum.*  
 liquor tenuis, lac muliebri, aut asinæ. Succus rosarum, conserua rosarum, cum oui albumine, mucago sem. psilii, & similia. Vel hæc composita.

℞. succi mororum agrestium reficcati ℥. 4. (plus, minúsue) quas cum oui albumine commiscebis, & siccabis rursus. Vfus tempore, 3. 2. pulueris in lacte muliebri & aqua rosacea dissolues. Vteris autem, vt suprà dictum est, scilicet, instillâdo cum gossipio insuccato. Oui albumen agitarum, & despumatum cum decocto papaueris albi, aut aqua rosarum, vtile est. Aliud.

℞. mucaginis sem. psilij, seminis cydoniorum, extractæ in aqua papaueris ana ℥. 1. liquoris tenuis oui 3. 6. caphuræ Gr. 8. croci Gr. 4. Vbi dolor vrget vehemērius, vtendum est opio. Sed ab eius vfu, *24 Vt corrigatur in: epe-ries, quâ induxerit opium.*  
 oculus decocto meliloti tepido, aut simili 24 fouē-  
 dus est.

*Collyrium album Rhaſæ.*

℞. gummi arabici, tragacanthi, amydi an. 3. 1. cerusæ lotæ 3. 1. β. opij Gr. 7. Cum oui albumine fiat collyrium. Vfus tempore 3. 2. in lacte muliebri dissolue. Crescente morbo.

℞. cerusæ plumbi lotæ cum aqua rosarum, & persiccata 3. 2. caphuræ 3. β. cum oui albumine fiat collyrium. Vfus tempore dissolue in lacte.

Toto reliquo tempore morbi licebit vti sies, id est, collyrio albo cum opio, si vehemens dolor est: imminuta dosi opij, si non tam vehemens: omninò sublato opio, si leuis est.

Sed addere oportet in 25 augmento sarcocollæ *25 In quo par cura digerendi ac repellendi esse debet.*  
 nutritæ in lacte mulieris 3. 1. Et vt procedit mor-

# DE MORB. INTERNIS

bus, in declinatione augenda sarcocollæ dosis est, ac tandem sola sarcocolla nutrita in lacte, & vino, vel aqua fœniculi dissoluta vtendum est.

26 *Vbi tantū repellendum.*  
27 *Vbi modicè digerendū.*  
28 *Ex lacte muliebri, vel asinæ.*

Mucago psilij 26 initio: 27 cydoniorum, in augmento: lini aut althææ, in statu: fœnugræci, in declinatione conuenit. Sed ab vna ad alteram paulatim transeundum est. In declinatione.

℞. sarcocollæ 28 nutritæ ℥. 3. β. croci, spicæ, ana ℥. 3. aloës 3. β. Aloë lauetur in aqua fœniculi. Huius pulueris 3. 2. in aqua fœniculi dissolue, aut aqua rosarum, si quid ruboris & caloris superest. Aliud.

Ouum crudum coctum, & ita induratum, calidum per se, vel è lacte muliebri, subactum applicabis.

*Puluis citrinus, quo vtendum est in augmento & statu.*

℞. sarcocollæ 3. 5. aloës lotæ in aqua rosarum drach. i. tragacanthi 3. β. opij. ℥. β. vel Gr. 6. Quo tempore ouum crudum integrum sine testa per se, vel cum lacte muliebri, exceptum gossipio apponi potest. Roborando oculo vinum 29 adstringens dilutum aqua fœniculi, in qua spica, aut stæchas coxerit, competit.

29 *Aut collyrium ex quarta aquæ rosarū parte, vna vini & paucocomastiche confectum.*

*Anacollemata, siue Frontalia.*

℞. mannæ thuris, mastichis ana 3. 2. agitentur ex oui albumine. Aliud.

℞. farinæ fabacæ M. i. cum oui albumine fiat emplastrum. Aliud.

℞. emplastr. contra rupturam 3. 2. subigantur cum oleo rosaceo, & fiat anacollema. Aliud.

℞. myrrhæ, thuris ana 3. 2. farinæ volatilis. M. β.

cum oui albumine fiat frontale. Aliud.

℥. boli armenæ ℥. i. aquæ ros. ℥. 3. aceti ℥. cum duobus albuminibus ouorum, fiat frontale.

Sic etiam ex farina fabacea aut filiginea cum oui albumine & modico croco frontale compingi poterit laeta vel linteo excipendum.

Balneum in declinatione imperari potest. 30 Er- 30 Propter  
rhina quoque, gargarismi & masticatoria. Neque oculorum &  
omittendæ sunt frictiones initio ductæ supernè narium sym-  
deorsum ad diuertendum. Vide Aëtium. pacheiam in  
ophthalmia  
nunquã tuto  
errhina pre-  
scribuntur.

## EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Morborum oculi ut infinita propè multitudo est, ita in illis distinguendis maxima confusio, præsertim iis, qui ad ophthalmiam similitudine quadam accedunt, & inflammationem annexam habent, quales sunt, *τάραξις, φήμωσις, χήμωσις*, & *ὀφθαλμία* propriè dicta. Montanus vir alioquì doctissimus quanquam cæteris accuratiùs hæc distinxisse epistola quadam videtur, à veterum tamen sententia, ut Galeni & Pauli Æginetæ, longè discedit. Scribit enim *χήμωσιν* palpebrarum inflammationem esse, licet aliquando partes cæteras in consensum trahat. At Paulus Æginetæ *χήμωσιν* appellari ait, ὅταν ὑπὸ φλεγμονῆς ἰσχυρᾶς ἀμφοτέρω τὰ βλέφαρα ἐκτραπῇ, ὥς μόλις ὑπ' αὐτῶν τὴν ὀφθαλμὸν καλύπτειν. καὶ τὸ λευκὸν τοῦ ὀφθαλμοῦ μετεωρότερον τῷ μέλανι γένηται, καὶ ἐρυθρὸν, καὶ πολυμάρως ὑπερλαμβάνει τῷ μέλανι. Id est, cum utraq; palpebræ ex vehementi inflammatione inuersæ fuerint, ut vix oculi ab ipsis contegantur, & album oculi nigro sublimius euaserit, rubrumque etiam magna ex parte nigrum occupari.

Vidius quoque (ut doctissimè Ioannes Gottæus annotauit) negligentius eis τὸ κατ' ἰντρέϊον legit *χήμωσιν* ἀντὶ τῆς φημώσεως. Sed his prætermisiss omnia facillimè sic distinguuntur. Si leuis quædam inflammatio, & veluti phlegmones principium sinè



## DE MORB. INTERNIS

discrimine partes oculi inuadens primo intuitu appareat, cum rubore quidem, sed exiguo, quem dolor mitis consequatur, *τάραξις* erit duntaxat, id est, oculi perturbatio. Hæc enim certissima signa sunt, quod hic affectus, neque phlegmone sit confirmata, neque vnus magis, quam alterius partis proprius, neque vehementem dolorem habeat, aut tumorem.

Quibus si adicias à causâ externa excitatum fuisse, vt sole, fumo, puluere, oleo, radiis lunæ, vino, esu, cæparum, erucæ, aliorum, sinapi, ictu, quæ omnia ab ægro diligenter exquirenda, tum nulla in iudicando dubitatio esse poterit. Paulus à manifesta tantum causâ fieri vult. Experientia tamen constat non rarò ab interna excitari, præcipuè vitio ventriculi, & post egregiam potationem, neque tamen propriè esse ophthalmiam, licet aliquando in corpore cacochymo, & si negligatur, in eam faciliè degeneret. Si verò palpebræ tantum inflammationem patiantur, atque in sese concidant, vt oculus aperiri nequeat, *φίμωσις* erit, id est, præclusio quædam, & quasi ligatio eorum, quæ secundum naturam aperta & reclusa esse debent, siue cicatrice, aut carnis incremento partes coalescant vt labra vteri: siue inflammatione, vt palpebræ oculorum. Contrà, si oculus apertus maneat, nec claudi possit, albo nimirum oculi in tumorem sublato, atque eminente, nigro verò subsidente, & veluti hiatus quendam efficiente, *χήμωσις* est. In qua præter ruborem & inflammationem, pathognomonicum signum est, palpebrarum, vt ait Paulus, *ἐντροπή*, id est, conuersio, quia adduci non possunt. At si coniunctiua tunica, siue adnata phlegmone laboret, cum tumore, tensione, dolore, calore & rubore, ophthalmiam esse non dubitandum. Ergo *τάραξις* (quam ophthalmiam non veram vulgò appellant) affectio est omnium oculi partium externarum communis: *φίμωσις*, palpebrarum: *χήμωσις*, albi oculorum: ophthalmia, adnatæ membranæ propria.

Sæpè omnes inter se vel plures commiscuntur.

*Ophthalmia sanguinea si-  
gna.* Fiunt ophthalmiæ, vt cæteræ inflammationes, à sanguine, bile, pituita, melancholia, flatu. Sed frequentius à sanguine, aut bile.

Sanguineæ signa sunt, tumor maximus in loco rubor, tēsis, lachrymæ crassiusculæ, quæ faciliè exsiccantur, sordes molles

in oculorum angulis. Quibus adde redundantis sanguinis in corpore indicia.

Bilioſa, tumor moderatus, in ſuperficie, color ſubpalpidus. dolor acris & mordax, lachrymæ vel nullæ, vel parvæ, falſæ. amaræ, ſtatim concreſcentes, ſordes in angulis ſiccæ & aſperæ vigilæ, excrementa bilioſa, corpus gracile, quandoque febris tertiana, ſi materia fuerit in ventriculo.

*Ophth. bilioſa ſigna.*

A pituita, tumor maior, ſed laxis, color albus, lachrymæ plurimæ, tenues, incipidæ: ſordes vel nullæ, vel molliuſculæ, corpus pituitolum, &c. A ſtatu rara eſt, tenſionemque habet ſine gravitate.

*Ophthal. pituitoſa ſigna.*

Per deſuxionem fieri intelligimus, cum repente inuadit, nec præceſſerunt lachrymæ, ſordes, eroſiones à quolibet aëris exceſſu. Per eſſentiam verò ex contrariis ſignis, & ſi dolor ad interiores capitis partes non perueniat, à quibus adnata membrana naſcitur. Humidior autem efficitur ob materiæ multitudinem, tenuitatem, loci affecti raritatem, caliditatem aëris, virtutis expultricis robur, & retentricis imbecillitatem. Sicca quam Græci *ξηροφθαλμια* vocant, contrariis cauſis conſtat, periculoſiorque eſt ob materiæ acrimoniam, qua ſæpe vlcus inducit.

*Ophthalmia per eſſentiam facta, ab ea, quæ per deſuxionem, ſi deſtincta.*

Sedato capitis dolore, ſi adſit, conueniunt ſanguinis miſſio ſæpiùs repetita, cucurbitulæ cum ſcarificatione, clyſter, topica repellentia, colliria anodyna, purgatio, balnea, meri potio, emplaſtra. In taraxi, ſubducto ægro à cauſa externa abluatur oculus tepidâ primùm, deinde frigidâ abſtinentia à cibo, ſomnus. Perpetuò & ſubinde imponenda medicamenta, quia eluuntur nouo humore, & lachrymis affluentibus. Nonnulli è recentioribus Hippocratis autoritate moti fortiores purgationes nō probāt, quòd ſic cōmotus humor deſuat in oculū: alij contra. Vidi contumaces ophthalmias non potuiſſe curari ſine fortium catapotiorum uſu, hyera diacolocynth. & ſimilibus id genus vehementioribus medicamentis. Sed omnia pro humoris quantitate & qualitate temperanda.

*Hipp. lib. de locis in homine.*

*Aetius ſerm. 3. Tetrab. 2.*

*Ampio foramine.* ] Tum vt craſſior ſanguis exeat, tum vt maturiùs animi deliquium ſequatur. Quod plurimum conſerre oſtenditur hiſtoria adoleſcentis, de ſanguinis miſſione, 6. Epidimion, 13. Methodi, 2. ad Glauco. Aëtius è fronte, & angulo maiore. Sed hoc poſt ſectionem cephalicæ, perſeuerante

## DE MORB. INTERNIS

dolore. Tunc enim primùm vena frontis, ac tandem, quæ est in maiore angulo ad nares, secari potest. Cæterum ramus medię initio diuertit, & minus detrahit viribus, quàm cephalica.

*Oportet hos succos instillare oculis.* ] Satius erit plurimùm diluere oui liquore optimè confracto, vt nihil habeat viscidum, & lacte mulieris iuenculæ, deinde etiam fœnugræci decocto. Aut rosas, myrtos, rubos, & similia cum fœnugræco, chamæmelo, seminibus lini, & similibus in aqua simplici aut plantaginis incoquere. Deinde pannis mollibus ad oculi magnitudinem complicatis, insuccatis & admotis partes vicinas fovere, Æstate quidem frigidis, Hyeme verò calidis, sæpiùs innouatis. Lenta Galenus laudat, quia aspera oculum offendunt. Periculosa tamen sunt, si nimis corpulenta & viscidæ: quia frequenter loco adherent, aut exsiccantur, aut putrescunt sed tum maximè si pustula aliqua subsit. Narcotica, si acrior dolor sit & humor, effluxum prohibent, acrimoniam retundunt, & oculi sensum hebetiorem reddunt. Sed his neque in principio, neque ante purgationem est vtendum, idque necessitate cogente, vt docet Gal. commen. in Aph. 31. libr. 6. vbi addit etiam tunicas indurari, & adstringi. Vitriolum humidioribus oculis nonnulli inspergunt, alij tritum oui albumine insperguntur; idque aqua calida coquunt dum concreuerit tum exprimunt, & liquorem oculis infundunt. Ab acrimonia tamen cauendum. Cernisa Veneta ( Galenus Rhodiacam vsurpabat ) optima est dissoluta in lacte decoctionis foliorum capiti seminis papaueris: pulicula è semine papaueris albi, & hyoscyami, decoctum foliorum papaueris, capiti seminis, & inde fatus. In fœnugræco bene loto, & macerato magna vis inest. Bene purgatur, multum abluitur, maceratur per diem in aqua purissima, in fictili bene coquitur abiecta aqua, alia infunditur, coquitur puro igne, idque ter faciendum affusa semper aqua noua, vt omnis amaritudo eluatur. Coquitur verò ad liquidi mellis spissitudinem aperto vase. Sine expressione colatur linteo. Colatura seruetur vsui ad tertium diem ad summum.

*Narcoticis  
quando sit vt  
dum ex Ga-  
len.*

## ANTO. VALETII EXERCIT. XIX.

**C**um adnata oculi membrana, quæ natura alba est, ob sanguinis affluxum cruenta apparet, ex oculis lachrymæ resudant, & in canthis maioribus sordes quædam colliguntur, ægrum ophthalmia infestari certum est. Hujus causæ externæ, internæ. Externæ, fumus, Sol, corporis motus, casus, percussio, &c. Internæ, plenitudo, humorum acrimonia, distentio à crassis & viscidis succis, aut à spiritu flatulento. Eò confluit humor aut à pericranio, vel à cerebro: & tum dolor capitis interior est, sterutatio frequens, curandi maior difficultas. Expectatam opem requirit hic affectus, quòd, negliger si curetur, facile in suffusionem, pupillæ dilationem, nonnunquã in tabem, seu corrugationem desinat. Itaque antequam ullus topicis oculorum remediis sit locus, toti corpori atque capiti sectione vene humeralis patienti oculo è directo oppositæ, aut eius, quæ in extrema manu pollicis est vicina, prospicitur: deinde purgatione. Educendus humor si biliosus, ut sæpius esse consuevit, ita vacuetur.

*Ophthalmia  
causa ex Galen. cap. 22.  
lib. 3. Meth.*

*Ophthalmia  
curatio.*

*Rhaz. cap.  
15. libr. 9. ad  
Almansorè.*

℞. express. 3. 3. myrobal. citr. in aq. cich. bugloss. vel borrag. infusar. rhei elect. seorsim similiter infus. 3. 2. cinam. 3. 1. In qu. dissol. cathol. & syr. acetos. simp. Lana 3. 3. f. porio.

Pauperibus electar. de succo ros. syr. laxat. ros. pallid. diluuntur aquis suprà dictis. Si permista sit pituita multa, pilulæ è hiera simplic. coctiæ, de agar. lucis, vtiliter præscribuntur.

Mox topica veniunt vsurpanda. Ac quidem initiis phlegmones collyria ex repellentibus & anodynis oculo imponenda: cataplasmata ex adstrin-

# DE MORB. INTERNIS

gentibus, quæ vias contrahant, per quas fluit mæ-  
ria fronti & temporibus aptanda. Vt.

℥. mucag. sem. psilij in aqu. plantag. aut rosar. extractæ ʒ. i.  
ß. cum albumine oui in lacte muliebri. agitato, vel cum aqu.  
ros. q. s. f. collyr. vel. ℥. trochisc. albor. Rhazæ ʒ. i. ß. pompho-  
lyg. lotæ, sacchar. cand. ana ʒ ß. aquar. plantag. & rosar. ana ʒ  
i. mucag. superioris ʒ. 2. f. collyr. addita pauca caphura, si vr-  
geat dolor.

Fronti imponitur cataplasma ex bol. arm. terr.  
sigill. mastich. ana q. s. except. albumine oui. In in-  
cremento quia non modò repellendi, sed etiam di-  
gerendi, cura incumbit, superioribus mucaginibus  
& aquis adiicientur aquæ fœnic. euphras. verben.  
chelidon. maioris: mucagines lini, althææ, fœnugr.  
Et, si simul detergendum sit, proderit nonnihil sy-  
rupi ros. siccarum immiscere. In statu præualebunt  
digerentia. Vt

℥. aqu. euphras. fœnic. & chelidonæ ana ʒ. i. aloës lotæ in  
vino albo ʒ. i. ß. tuth. præparat. ʒ. ß. sacchar. cand. ʒ. 2. syrup.  
ros. siccar. ʒ. ß. f. collyrium.

In declinatione vacuabitur materia reliqua ex  
oculo fomento & decocto seminis fœnugr. meli-  
loti, aquæ calendulæ cum spongia, aut linteolò  
molli.

## De 1. debilitate visus. CAP. 20.

Μῦσας Græci vocant, qui à primo naturæ  
mortu non nisi admota oculis cernunt: eaque  
2 exertis propè oculis, palpebris constrictis, atque  
conniuentibus. Id quod efficit 3 tunicarum oculi  
raritas, tenuitas humoris, subtilitas spiritus visorij,  
qui priusquam angulum faciat, dissoluitur atque  
cuanescit.

1 Quæ sit fe-  
bris expers,  
cuius causa  
vel in cerebri  
vitio consi-  
stat, vel spi-  
ritus anima-  
lis, vel tuni-  
carum & hu-  
morum oculi.

2 Propter  
spiritus vi-  
sorij paucita-  
tem, tenuita-  
tem, & tuni-  
cæ raritatem.  
3 Præsertim  
corneæ, &  
venæ.

Sunt, qui eo nomine vespertinam etiam 4 aciem  
appellant, cum interdiu obscure: noctu & sine lu-  
cerna, acutiùs videant. Rara affectio hominibus ab  
eadem causa, nisi quod illíc infirmitas maior est:  
híc luce quidem diffluit spiritus, nocte cogitur, at-  
que temperatur. Contrà verò Nyctalopes interdiu  
vident, & caligant ad lucernam: quanquam & hoc  
nomen nocturnæ cæcitatís ad Myopas etiam trans-  
ferant, vt Octavius.

Amaurōsim verò & Amblyōpiam, hebetudi-  
nem, atque obscuritatem visus ita distinguūt: quòd  
illius multæ causæ notæ sunt: huius nulla 6 causa  
manifesta. Quia cum pupilla pura sit, neque vitium  
vllum appareat in oculis, videndi tamen libertas in-  
tercepta est. Huius tamen 7 coniectura quadā cu-  
rationem admolimur, medicamentis, quæ ὀξυδωρ-  
χῆν, ἢ ὀξυδωρικὰ φάρμακα appellantur, quia vi-  
delicet, cum nullum accidens manifestum insit o-  
culis, acuunt tamen visum, atque instaurant.

Causæ tamen vtriusque mali, vel in humoribus  
oculi, vel in natura visorij spiritus, vel in tunicarum  
habitu recondita est: vel quia interceptus est, aut re-  
solutus nervus opticus. Summatim in iis, quæ na-  
tura ad legitimam videndi facultatem instituit, spi-  
ritus neque 8 crassior, neque tenuior esse debet, sed  
aëria tum naturâ, tum substantiâ, tum qualitate mo-  
deratus, iusta etiam quantitate, quæ omnia pēdent  
à natura sanguinis & pituitæ, in quibus substantia  
est spiritus. Temperatus enim sanguis eundem spi-  
ritū gignit: intēperatus verò vitiosum reddit. Sub-  
tilior spiritus obscuro loco meliùs habet, vt in ve-  
spertina acie. Tenebris enim colligitur, crassescit, &

4 Quòd am-  
biente aere  
crassiore ani-  
mali spiri-  
tus cogatur.

5 Quia spi-  
ritus eorum  
visorius cras-  
sior est, non  
aerem.

6 Vnde hac  
à recentiori-  
bus gutta se-  
rena dicta,  
quod nullo,  
quod in oculo  
cerni possit;  
vitio, vidēdi  
facultas a-  
mittitur.

7 Vt cum  
clauso altero  
oculo, pupilla  
nō dilatatur:  
vnde nervus  
optici obstru-  
ctionis fit si-  
gnificatio.

8 Aut impu-  
rior, vt scili-  
cet contiguū  
arrē illustra-  
re non possit.

# DE MORB. INTERNIS

frigidior redditur. Idem efficit, ut minima 9 cernamus, & pingamus calamo: sed tantum ea, quæ in proximo sunt. Contrà verò crassior spiritus, ut in senibus, remotiùs posita intueri potest, tantum cernit maiuscula, eadèmq; calamo pingit. Ex quo inuenta est ratio Opticorum in specularibus, ut conuexa, minores: concava, maiores: plana, æquales formas & literas repræsentent. Ut enim oculares radij maiorem minorèmq; angulum describant, ita formæ oculis proponuntur.

Curatio 10 Nyctalopis & debilitatis visus.

Hæc vitia magna ex parte ab humorum vel vaporum crassitie excitantur: multò maximè, si dementè orta sunt, & 11 grauitas sentitur in radice oculorum.

Aperiatur itaque primùm cephalica, si res postulat. Alioqui, si 12 cacochymum corpus est, purgetur hoc modo.

℞. pul. hieræ picræ Gal. ʒ. 2. pul. diacol. 3. s. camsto. ʒ. ʒ. sem. fœniculi, nucis moschat. an. Gr. 6. cum succo rutæ formentur pilulæ. Possunt & pil. cocciis, pilul. lucis, elephanginis, mixto agaric. purgari. In glaucis oculis, quique venas plenas & amplas habent, mitioribus pharmacis uti oportet. Mollis tenetur alius pilulis factis ex aloës ʒ. 1. terebinth. ʒ. 2 vel ex cassia. Alioqui 13 polypodio, cnico, mercuriali, multa borragine, iusculo concoctis. Tum 14 errhinis, apophlegmatismis, sternutatoriis utendum erit.

Cucurbitula occipitio fixa cum scarificatione ea vi obstructiones liberat, ut ea ipsa etiam dum hærente aliquando visus restitutus sit.

9 Galen. ea.  
1. libr. 1. de  
symptom. de  
caus.

10 Id est,  
cecitatis no-  
cturnæ, desi-  
derata ratio-  
ne THEOPHRA-  
STAS in spi-  
ritu animali.  
11 Quæ si-  
gnū est par-  
tis ab humo-  
rū copia op-  
pressæ.

12 Et si hu-  
mor crassius à  
concoctione  
segregatus  
videatur.

13 Si pilulis  
stomachicis  
uti non licet:  
ut in hamor-  
rhoides ha-  
bentibus.

14 Errhinis  
minimè uten-  
dum, nisi su-  
blato omni  
inflammatio-  
nis metu.

Constructio colli ita spiritum impellit in oculos, ut inde ampliatis viis & spiritu liberiore, visus reddatur, aut certe acuat. Post hæc extrahendus sanguis ex angulis oculorum: Rhazes etiam è fronte, Meisæus è naribus sanguinem educit.

*Topica.*

Infinita propè describuntur, quæ ex variis authoribus colligi possunt. Tradunt capras nō minùs noctu cernere, quàm interdiu. Et ideo caprinum iecur, si vescatur, restituere vespertinam aciem iis, quos Nyctalopas vocant. Idem iecur assum & cum sale comestum iuuat, aut sanie, quæ inde effluit, dum assatur, oculos illinunt. Alij vaporem elixati iecoris oculis excipi iubent.

Sunt qui hirci potiùs, quàm capræ, & hirci montani iecur imperant. Nonnulli configunt caryophyllis: alij irrorant aqua fœniculi: hocque remedium commune faciunt Myopibus, qui tantùm noctu vident, Octavius & Herophilus, quod 15 non probat Aëtius. In senectutis magis, quàm oculorum vitio succum mali granati optimo melli æqualiter commiscebis: aliquot dies insolabis, aut calidis cineribus coques. Conuenit pictoribus, lectoribus, & scriptoribus.

Alij granatum acidum, deposita duriore testa, cōtundunt: melli miscent: concoquūt, ac tandem vehementer exprimūt, eidem remedio, fœtori oris, firmandis dentibus, gingiuis, ozænis, quando carnes quædam adnascuntur dentibus. Herbæ cōueniunt, fœniculus, ruta, chelidonia, euphrasia, verbena, asparagus, beronica, chamædrys, raphan<sup>9</sup>, balsamita, pimpin. caryophyllata, apiū, maiorana, marrubium;

*15 Nec est  
probandum.  
Non enim  
myopibus col-  
lyria oculos  
uñ sunt præ-  
scribenda, sed  
incrassantia.*



## DE MORB. INTERNIS

parietaria, hyperici flores, meliloti, rosmarini. Aromata, macis, cinamomum, nux moschata, lignum aloës, spica, fantali. Conferuæ, enulæ, acori. Horum omnium vsus est, vel quia eduntur, vel quia musto feruent, aut in puluerem redacta sicca collyria faciunt. Aut cum melle commiscantur, & eorundem succus: aut in alembico distillantur. Redditur aqua efficacior, si quid mellis liquidioris commisceas, dum distillantur. Atque hac etiam fortior, cum mel scylliticum in alembicum coniicitur. Laudata est olim lactuca syluestris. Cuius rei argumentum, quod Ælianus scribit, Accipitrem tinnunculum (*Quercelam vocant*) acerrimo lactucæ syluaticæ succo oculos illinire, atque ita laborantem aciem instaurare. Quod deinde Medici secuti sunt. Atque hinc oculorum medicina Hieracia, quasi Accipitraria, vocata est.

16 Præsertim  
Narbonēsis,  
quod thymū  
redolet.

*Aqua, quam scribunt restituisse visum  
cæco nouem annorum.*

℥. succi apij, fœniculi, verbenæ, chamædryos, pimpinellæ, caryophyllatæ, saluiæ, chelidonæ, rutæ, centinodiæ, morsus gallinæ, caryophyllorum, farinæ volatilis, ana ℥. i. piperis crassiusculè triti, nucis moschata, ligni aloës ana ℥. 3. Omnia immergantur in vrina pueri incorrupti, & sexta parte vini maluatici. Bulliant breui tempore: tum exprime, & percola. Repone vase vitreo bene obturato. Horâ somni singulas guttas singulis oculis instilla.

Dum efferuescit mustum, euphrasia iniicitur. Vinum repurgatum asseruatur singulari remedio.

Eiusdem herbæ pulvis forbili ouo inspergitur, aut inde sal oxydorcicum paratur.

℞. salis communis ℥. i. euphrasie siccae ℥. 2. macis, cinamomi ana ʒ. i. misce.

Flores rosmarini amphorâ vitrea concluduntur: quæ duplicato linteo cerato obtegatur in arena, vt mos Chymicis. Liquor redditur efficacissimus oculorum claritati. Accipiter (*Emerillon vulgò*) vnguento fusino decoquitur: vinum absynthites, aut rhodinum, antimonium, ruthia in aqua fœniculi extincta. Pica auis in testaceo vase cremata, & in cinerem redacta, vehementer laudatum remedium à Practicis.

℞. Sileris montani, maioranæ, euphrasie, rutæ, chelidonie, summitatum fœnic. ana ℥. 3. zinzib. spicæ nardi, piperis longi, caryoph. ruthiæ extinctæ & nutritæ, sarco. nutritæ in lacte asinæ, ligni aloës ana ℥. i. fellis aquilæ aut accipitris, balsami ana ℥. ʒ. mel-  
lis ros. ℥. i. conquassanda conquassentur, liquabilia liquefiant, misceantur: & Æstate quidem, quadraginta diebus insolentur, semper agitando & obuertendo vas. Hyeme in cineribus moderatè calidis, simpliciter macerentur. Reponantur vase vitreo ad vsum. De esu viperarum alio loco. Vt vis medicamento penetraret, aqua tepida è gossipio, vel molli linteolo fouebis oculos. Frequens vsus trypheræ minoris, chebuli conditi, mythridatij & theriacæ: sed magis Hyeme commendatur. His autem vti oportet iam bene purgato corpore, vt etiam sinapismis & cauteriis. Rationem vitæ, & reliqua remedia localia ex aliis colligito.

# DE MORB. INTERNIS

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

*Αμβλυπία, & Αμαύρωσις* morbosæ sunt oculorum affectiones, cum visus vel hebetior est, vel omnino sublatus, sine tamen ullo oculi manifestò affectu, aut vitio, in partibus oculi, quæ sub aspectum cadunt, nobis apparente, solâque causarum intensiōe & remissionē differunt: quòd illa imbecilliores: hæc vehementiores, & iam confirmatas causas habeat. *Μυωπία*, vel *μυωπίασις* est, cum visus non omnino quidem sublatus, aut hebes & obtusus, ut in superioribus, sed diminutus, ita ut propius admota, etiâ minima, æger cernat, & exactè distinguat: ad remota tamen, & paulò longius distita penitus illi caligent oculi. Malum à natura sæpè contractum, quo laborantes Budæus Lusciosos, & Lusciosos, & Nusciosos vocat, quales ferè, cum paulò diutius legerint, aut oculos aliquò coniectos habuerint, exhausto spiritu tenuiore cœcutiunt, aut limis, semiclusisq; oculis volitantia quædam in aëre corpuscula sese intueri putant. In *Nyctalopē* visus itidem diminutus est, sed symptomata diversa, quòd interdiu videant, Sole occidente obscurius, noctu nihil, quasi *ὁ τῆς νυκτὸς ἀλαδς*, id est, noctu nihil videns. Atque hæc sunt affectiones, quæ visum solent intercipere, nullo manifestò affectu in oculo apparente, sed pupillâ planè pura, atque incolumi, si adicias quosdam, qui noctu melius vident, quàm interdiu, quod rarissimè contingit. Duæ priores affectiones ferè sunt in nervis opticis, aut cerebro: posteriores in humoribus, tunicis, sed frequentius in spiritibus. Verùm & locum affectum, & causas affectus remota penitus nominum ambiguitate & confusione, quòd non omnes (ut in cæteris ferè paulò difficilioribus) in eadem significatione usurpent, ita distinguere licebit, & quasi typo, ut Aristoteles loquitur, depingere. Si æger vel nihil omnino videt, vel diminutè, sed semper æqualiter, & vno oculo clauso, alterius pupilla non dilatatur, nullo, scilicet, irruente in eam spiritu, signum est spiritum transire non posse ad oculum per nervos opticos, aut si transeat aliquis, non sufficere tamen ad oculum illustrandum. Idque fiet vel vitio cerebri, vel meningum, vel nervi optici.

Hæc enim sunt ad spiritum vel generandum, vel de-

*Spiritus visorio ad oculos deducendo quæ necessaria instrumenta.*

ducendum necessaria. Si vitio cerebri spiritum non suppeditatis, aut corrūpentis, ut post insignem euacuationem, longum morbum, mœriorem in senectute, in ceteris etiam sensibus lē-  
 sio aliqua percipietur. Nam cū omnes sensus inde prodeant, tanquam riui, quomodo vni morbum, quo afficitur, communicare poterit, ceteris integris manentibus? Ergo si simul cum visu ceteri quoque sensus afficiantur, & grauitas capitis percipiatur (additis semper causis antecedentibus & externis, obseruatīsque diligenter partium, quæ cum cerebro consentiunt, affectibus) de cerebro læso coniecturam certissimā habemus: si quidem quæ generali illo axiomate, tanquam fundamento firmissimo, nititur, membrum esse sanum, cuius actio sana est: læsum, cuius actio læsa. Si in meningibus, ad oculorum radices percipietur dolor, aut grauitas: sin minùs, in neruo erit, vel resolutio, vel obstructio, vel contortio. In contortione vident obliquè: in obstructione, si perfecta sit, nihil: sin minùs, parum, sed eodem semper modo sapiūsque repente, & vno impetu incidit ab humore, aut spiritu, ut post excrementa alui retenta, cruditates, in solationem, capitis ardorem (quod in pistore vidimus iuxta furnum ignitum repente cæco facto) ictum, casum, concubitum, & similia, quæ caput replere aut humores commouere possunt. Resolutio fit in neruis per inanitionē, aut repletionem, de qua satis in superioribus. Hæc omnia in vniuersum causæ sunt & signa ἀμβλυωπίας, καὶ τῆς ἀμαυρώσεως. In spiritibus affectiones ex eorūdem naturali cō-  
 stitutione deprehenduntur. Debet enim moderati esse in subtilitate, crassitie, fulgore, obscuritate. Paucitatē & multitudinem adderem, nisi quia vix vnquā sat multi esse possunt. Qui multos subtiles & lucidos habent, atque in vnum eoactos, nullo aliunde impedimento accedente, hi omnium vident acutissimè. Ceteri sunt præter naturam. Quorum variæ differentię constitui possunt. Sed præcipuè, quæque occurrūt frequētius, sunt huiusmodi. Subtilis, paucus, lucidus: crassus paucus: crassus multus. Quia enim subtilis, paucus & lucidus, subtilitate faciliè diffluit, paucitate resoluitur, ac luce maiore offenditur, inde hæc symptomata consequi necesse est, ut ita affecti remota intueri nequeant, propinqua exactè discernant, obscuriore paulò aëre oblectētur, nec diutiùs legere, aut oculos in rem aliquam intentiùs defixos habere possint. Quibus

*Spiritus vi-  
 sorij propr. &  
 differentia.*

# DE MORB. INTERNIS

*Visio absoluta  
ta qui fiat.*

*Myopibus  
ab ortu quod  
maximè con-  
ferat.*

si accedat pupillæ amplitudo paulò maior, parùm aberunt à cæcitate. Vt enim visio absoluta fiat, in firmum & densum conum spiritus coire necesse est, qui pupillæ amplitudine diffunduntur ferè in meatu. Quo fit, ut ita laborantibus nullum (si ab ortu contractum sit malum) præstantius remedium afferri possit, ocularibus ad oculi formam cauis, & circumferentiâ densioribus, quò spiritus in centrum, tanquam pupillam, cogantur, & confertim prodeant. Quod in multis feliciter sumus experti. Atque hæc est causa propria *μωωπίας*. Si verò pauci sint spiritus & crassi, paucitate hebetior visus est, crassitie obscurior, ob idque egent lumine externo, ut illustrentur. Hinc fit, ut interdiu satis acutè cernant, occidente sole obscurius, noctu nihil, aut parum. Quod de *Nyctalope* diximus. In quibus verò multi sunt spiritus & crassi, ij longius posita melius circumspectiunt, quia opus est multa luce, proindeque interuallo longiore ad illustrationem. Crassities autem omnis aliquando à crassiore sanguine, aut alimento originem habet, sæpè à vaporibus, aut humiditate cerebri. Et si ad maiorem angulum fiat fluxio, è syncipite: ad minorem, è venis post aures, & quæ in temporibus. Vnde etiâ efficitur, in his noctu obtusiorè esse oculorû aciem duabus de causis: tum quia, sufficienti lumine destituuntur spiritus: tum quia eo tempore lunæ influxu humor accrescit. Cui consentaneum est, quod in plenilunio habent deterius. Quòd si qui noctu videant clariùs, quàm interdiu, vna ex duabus causis contingere poterit. aut quia igneos habent oculos, ut experientia in quibusdam animalibus obseruare licet: aut quia subtiliores spiritus, qui crassescunt nocturno aëre, & coguntur, nec dissipantur. Quibus omnibus fidem facit experientia & curatio, quæ singulis causis ingeniosè accommodata nunquam fallit: sed longior ac difficilior, quàm ut breui annotatione comprehendì queat. Sunt & aliæ causæ imbecillitatis visus, in crystallino humore, rhagoide, humore, qui crystallino prætenditur, ut infringat vim splendoris externi, & madefaciat crystallinum, cicatrix inducta corneæ, & similia. Sed hæc omnia iustum commentarium desiderarent.

Οξυδορκῆ, &c. Huiusmodi sunt collyria quædam apud Gal. 4. τῶν κατὰ τὸ πρῶτον. Similia sunt sequentia. Viperas quidam fimo sepeliunt: gignuntur vermes, inde aqua distillatur mirabilis. Ab aliis viperinus adeps, cum viperis, theriaca & rebus ocularibus distillatur. Viperarum capita cremantur ollâ. Cinis cum cremore lupinorum subigitur, & illinitur temporibus. Vina factitia, rebus convenientibus cum melle coctis & racemato. Mel anthosatum distillatum cum suis floribus & cacuminibus rosmarini. Hyrundinis cerebrum ex melle tritum, vel ex uuium serpentis ex melle quoque tritum. Nux moschata condita diuitibus, aliis ex vino manè & hora somni odorata, inspirata. In Nictalope hepar hircinum affato, & cremorem fluentem illinito: ipsum verò hepar edendum præbeto. Columbinum sanguinem illinito: aut fel capræ hepar caprinum coquito: obuclato capite, & in ollam aduerso, fumus oculis excipiat: ipsum verò hepar assidue edendum præbeto. Aut idem hepar concisum pipere longo, & sale gemmæ conspersum in carbonibus affato: excipiat fumus. Ex hoc citò auxilium percipitur. Succus recens stercoreis asini, fel vulturis illitum, vel cum succo porri, commixto melle. Peucedani succus cum succo fœniculi. Anagallidis succus tertio quoque die oculis iniectus idem præstat, & pannum iam factum in oculo consumit. Pulli hyrundinis acu ex ære in nido excæcantur, signantur, vt internosci possint. Tertio die capita præciduntur: incenduntur, puluis cum balsamo in oculum instillatur. Vasa ænea ocularibus medicamentis probata. Apodes (vulgò Martinets vocant) vescuntur chelidonia. Cinis vsus est: aqua hyeme. Aquæ potus. Argumento, quòd qui aquam bibunt, acutius vident, vt scripsit Arist. in Probl. inspirationes, quàm fatus meliores. Sed ante masticaanda sunt ocularia medicamenta. Lingere oculos catelli lingua, vel pueri. Scarificatio auricularum, & perforatio, Barbarorum more. Parum bibendum in humidioribus oculis & excrementitiis. Emunitioni assuescendum sine vi. Vapor è decoctione rutæ, marrubij, fœniculi, euphrasie, chelidonia, ligni aloës, croci, coctorum in aqua & vino. Ex his cum melle distillatio. Decubitus, cum legit æger, & caput erectum, non demissum. Butyri magna vis. Illitum mollit, lenit, polit, laxat, resoluit, coquit: ideóque

*Hydrapeta  
acutius vi-  
dent.*

## DE MORB. INTERNIS

hebetudini, præsertim à siccitate, prodest: cicatrices & albugines exerit, declinationem calidarum fluxionum iuuat: soluitur: & linteolo inde madefacto fit fodus. Caput mundum & pedes.

*Hieracia.* ] ἀπο τῆς ἱεράκας, id est, Accipitre. Apud Galenum 4. τῶν κατὰ τόπους cap. 7. & Cornelium Celsum, reperitur Hieracis collyrium, ad obscurum visum & scabras affectiones. Inde etiam nomen herbæ, quam rustici corrupto vocabulo ichoream luteam vocant, à florum colore, in pratis frequentem. Accipitres aiunt scalpendo eam, succoque oculos tingendo, obscuritati visus mederi, ob idque vocant ἱεράκιον

*Cornel. Cels.  
cap. 6. lib. 6.*

## ANTO. VALETII EXERCIT. XX.

*Galen. init.  
lib. 1. de caus.  
symp.*

**O**Mnis visionis imbecillitas, si oculo propria existat, aut est à primarij eius instrumenti, humoris videlicet crystallini, morbo aut à vitio facultatis, vel à partium, humori crystallino inseruientiũ affectu. Causæ sunt, spiritus crassior vel tenuior. paucior vel vberior, interceptus in optico neruo: humores quoque oculi crassiores, aut tenuiores, tunica eodem modo affectæ. Aliàs verò accidit hæc affectio ex subiectarum partium, vt pote ventriculi, consensu: interdum à toto corpore atrophia defecto. Quæ per idiopatheiam oculi fit, operosiorrem curationem requirit, vt quæ per consensum, leuiorem.

Victus tenuet & siccet, vt causam coniunctam oppugnando, & antecedentem prohibendo proffit, vapor aditu ad caput prohibeatur. Hinc blando aliquo cathartico exhibitò, vt pilul. stomachic. catholic. vel simili, materiam apparato zulapiis è syru. de hyssop. stæchad. oxymelite vtróque, aquis fœnic.

beton. euphrasæ, & aliis id genus ocularibus, con-  
cinnatis: & subinde purgato.

℞. pilul. elephang. 3. i. agar. trochif. 3. i. excipiantur aq. eu-  
phrasæ, fœnic. vel chelidon. f. pil. molles.

Efficaciores erunt additis aliquot dacrydij gra-  
nis, aut trochisc. alhandal. Vel, cùm materia fuerit  
radicitus extirpanda, cocciis, vel fœtidis vtêris. Si  
æger catapotia abhorreat, potio imperetur.

℞. agar. trochif. 3. i. β. rhei elect. 3. 4. macerentur seorsim in  
aqu. fœnic. & beton. vel hyssop. In express. dissol. diaphœnic.  
3. 2. syr. è stœch. 3. β. f. potio.

Quod ad particularia attinet remedia, infinita fe-  
rè ex Aëtio, Paul. Æg. Trallian. Rhaze. Gattinaria,  
Arculano, ab Hollerio recensentur, in quibus tota  
curationis momenta sunt.

*De Catarrhacta. C A P. 21.*

**C**atarrhacta præcipitem 1 decubitum humo-  
Cris significat: hocque nomen positum à Practi-  
cis, quia suffusionẽ existimarent fieri defluxu aquæ  
in oculos, vnde & aquam descendentem in oculum  
appellant. Galenus 2. de symptom. causis, & 7. de  
placitis Hippoc. & Plato. suffusionis causam facit  
crassitudinem 2 tenuis humoris, qui pupillæ me-  
tum intercipit, ne possit communicare radius exter-  
nus cum crySTALLINO humore. Tenuis is humor al-  
bugineus à quibusdam Medicis est inter rhagoi-  
dem & crySTALLINUM humorem, quo crySTALLINUS  
humor, præcipuum instrumentum visus, partim  
fouetur, partim minuitur, vt lux refringatur, nec læ-  
dat crySTALLINUM.

1 Ex cere-  
bro per nervũ  
opticũ, vel  
inter corneã  
& rhagoi-  
de membranas,  
ad pupillæ fo-  
ramen.  
2 Concre-  
scit humor a-  
queus, senio,  
aut febre, aut  
epilepsia, aut  
melancholia,  
aut gravi ali  
quo affectu,  
qui aut præ-  
cessit, aut co-  
mixtus est.



## DE MORB. INTERNIS

Pupillæ foramen via est spiritus animalis, aut etiam radiorum, qui à rebus externis ad videndi

3 *Dum fu-*  
*gax est.*

4 *Dum con-*  
*firmata, &*  
*τὴν σκῆτις οὐν-*  
*cupatur.*

5 *Vt in vo-*  
*mituris vom-*  
*itione critica,*  
*ut in cardiog-*  
*mo.*

6 *Vt ex epi-*  
*leptia & me-*  
*lancholia.*

7 *Aut etiam*  
*pulmonū, ex*

*Hippocrate*  
*lib. 3. Progn.*

8 *Nisi ope*  
*chirurgica de*  
*turbetur, si*  
*modò curatio*

*nē possit re-*  
*cipere, Paul.*  
*Æg. lib. 6.*

9 *Vt si epi-*  
*leptia, melā-*  
*cholia, car-*  
*diogmos, pul-*  
*monis itē af-*  
*fectio præces-*  
*serit.*

10 *Quæ me-*  
*lancholicis cō-*  
*tingit ex me-*  
*lancholia de-*  
*cubitu.*

facultatem importantur. Præclusa itaque viâ, quia, videlicet, humor ille albugineus longè crassior se- ipso factus est, suffusio fit, quæ 3 *ὑπόχρους* & 4 *ὑπόχρουμα* dicitur à Græcis. Nascitur hoc vitium sæpè consortio 5 stomachi: sæpè etiam primario 6 vitio cerebri. Atque priusquam ad curationem accedas, id ipsum diligenter distinguendum. Distin- gues autem ex cap. 1. lib. 4. de locis affectis. Quod si vitio 7 stomachi, vomitu, purgatione ex hiera picra, frugaliore vita & integra concoctione, con- sensu Græcorum & Arabum curari debet. Oportet- que & vomitum & purgationem ex hiera sapiùs renocari.

In alia verò, quæ primario cerebri affectu fit, natura suffusionis primùm consideranda est. Nam vel incipit, vel ad statum progreditur, vel omni- no confirmata est. Et hæc 8 quidem desperata est.

Itaque pupillam primùm aspicio. Colorem suf- fusionis, concretionem, motum, magnitudinem di- stinguo. Si quid 9 præcessit, aut adest, interroga- to. Ætatis, temporis, conditionis totius oculi ratio- nem habeto. Desperata suffusio est, quæ pupillæ fi- guram commutavit. Pura atque pellucida tum pu- pillâ, tum suffusio.

Suffusionis color cæruleus, aut auri similis, aut ferri nitentis, aut aquæ maris, curabilis est. Quæ verò grandinem refert, aut gipsum, 10 quæ nigra est, in summa, quæ sine splendore cernitur, in- curabilis est, ferèque confirmata ad candorem

vergit in sine splendore.

Concretionem ita distingues. Oculo incolumi ipſius oculi  
 claſo, ſuffuſum digito appri- véxpwais ſi-  
 mes: ſi humor ille gnificatur.  
 tenuis conſiſtit, neque ampliatur, quia minimùm 12 Hæc de-  
 concreuit, ſperatio eſt  
 ſed ſtatim, ut priùs, coit, ex magnitu-  
 desperata nondum dine cauſe &  
 res eſt. Si verò dilatatur quidem, ſed non diſſolui- adynamia cu-  
 tur, maturitas eſt, ut puncti- ranti.  
 one, id eſt, acu vacuari  
 poſſit.

Catarrhaſta, quæ locum mutat, 13 Quod ſit  
 incurabilis, hoc perfecta con-  
 eſt, quæ hæc atque illæ conuertitur. Quæ verò con- cretio.  
 preſſa dilatatur, non etiam commutat locum, me- 14 Gal. li. 4.  
 lior eſt. de loc. affectis

Exigua faciliùs, magna difficiliùs curatur.

Interrogabis autem, num præceſſerit grauis ali- catarrhaſtæ  
 quis morbus, acerbior capitis dolor, vel ictus. Tum medicina in-  
 enim, ut etiam ſi adſunt, peior ſuffuſio eſt. Ætate ſituenda, in  
 media faciliùs curatur. Prima & extrema, diffi- qua nulla de-  
 ciliùs. Cælo ſereno & tranquillo, atque etiam tem- ſideretur ra-  
 perato commodiùs curatur. tio, neque con-  
 cretionis, ne-

Addunt Aſtologi decreſcente luna: coëunte que magnitu-  
 verò, aut eadem plena, atque ubi vel in ariete, vel ditas, neque  
 aliis eiufmodi ſignis, curationes differunt. Nec omit- loci & mo-  
 tendum, quod Galen. 14 Meth. docet, ut oculus ſa-  
 nus claudatur atque exprimatur. Si enim oculus tus, neq. vlla  
 ſuffuſus inde non tumet, nec pupilla ampliatur, de- fontis perenis  
 ſperatio eſt. Alioqui vitio ſuccurritur. Phantaſina- affectiōis me-  
 tum ſplendores & idolorum, quæ ſuffuſis oculis iſcholica, nec  
 obuervantur, legē 2. de ſympt. cauſis. epilepſia, aut  
 obſtructionis  
 nervi optici  
 excuſatio poſ-  
 ſit afferri.

Principiis 15 ergò obſtandum eſt. Demothe- 16 Ut ex de-  
 apud Aëtium, & alij quidam Græci venam ſecant collo cepha-  
 in cubito. Clyſteribus 16 acribus, iisdemque pur- lico cū hiera-  
 vtraque.

# DE MORB. INTERNIS

gationibus, sed exigua quantitate & per interualla

17 *Ad materia, quæ in oculos fluit, reuulsionem.*

repetitis, Cucurbitulis in 17 occipitio cum scarificatione affixis, Apophlegmatismis, Errhinis per interualla vti iubent. Cornel. Celsus addit sectionem

18 *Ut qui per eas ad oculos deferatur vapor, interceptiatur.*

venæ frontis, sanguinis detractionem è naribus, v-  
sionem 18 venarum temporalium, quæ certè lo-  
cum habere possunt, vbi grauis capitis dolor est, at-  
que inde defluxio in oculos. Optimus victus, 19

19 *Cuiusmodi est hydro-  
mel simplex,*

qui pituitam extenuat, sine vaporibus. Vitandum  
vinum est, pisces, liquidiora omnia iuscula. Assa e-  
lixis meliora.

*aut origanatum, loco vini, paratâ iuscula ex hyssopo & salua, abstinentia rerum acriû & piperatarum, deductio alterius cibi asueti, cibi autem simplicis, & omnis ali-*

Collyriis primùm leuioribus: deinde paulatim  
maioribus vtendum est. Clysteres è Centaurij deco-  
cto, vel similibus comparandi sunt. Alioqui vel  
hieræ picræ ʒ. 6. vel hieræ diacolocynth, semuncia,  
aut alia eiusmodi pharmaca in clysteribus dissol-  
uenda sunt. Purgatio ex hiera picra, cui aliquid hier-  
ræ diaco. admixtum sit. Exempli gratia.

*liena mixtura expertis.*  
20 *Ut dormiendo coactio calorem anathy-*

ʒ. pul. hieræ picræ ʒ. 2. pul. hieræ diacol. ʒ. 1. cum  
succo fœniculi formentur pilulæ: capiat hora 20  
somni. Hæc purgatio decimo quoque aut decimo-  
quinto die reuocanda est. Per interualla mythri-  
datij 21 aut theriacæ ʒ. ʒ. aut ʒ. 2. aliàs ieiunis, aliàs  
hora somni, aliquando 22 quatuor horis ante  
pastum imperanda sunt semel in hebdomada. Po-  
terit aliquando imperari ablutio capitis ex deco-  
cto absynthij, betonicæ, stœchados, maioranæ,  
miasis ad ce-

rebrum feratur, quæ incidendo, tergendo & attenuando, materiam præparet,  
preparatamque ad ventriculum euehat, vt euacuari possit.

21 *Ut ʒ. conferuæ beton. & anthos an. ʒ. 1. ʒ. mythridati ʒ. ʒ. f. bol.*  
22 *Sunt enim alexypharmaca longè à pasto, & antè pastum impe-*

randu.

fœniculi , in lixiuio factò è cineribus farmento-  
rum , adiecta etiam vini portiunculâ , quarta aut  
sexta parte.

Collyria è melle , succo fœniculi ; aut herbarum  
superiore capite descriptarum comparari debent.  
Adiiciatur quoque 23 *℞ fœllis* fellis aliquid lenioris , aut *℞ lucii, non ac-*  
fortioris, semper habita ratione mollitiei, duritiei, *℞ cipitris, &*  
temperamenti oculi. Alia enim remedia pueròs aut *℞ rapaciũ autũ*  
senes, rusticos & vrbanos, cœruleos & fuluos ocu- *℞ reliquarum.*  
los, cæcios & nigros iuuare possunt.

Hæc verò priusquam adhibeantur , opportu-  
num fuerit post purgationem fomentum affectæ  
parti instituere. Vesicula piscis plena decocto fœ-  
niculi tepidè oculos applicetur pro fotu. Sed lau-  
da priùs vesicula.

In pueris lactantibus aliquando nutricis inspi-  
ratio satis esse potest. Nutrix itaque mandat denti-  
bus semen fœniculi , sagapenum , ammoniacum,  
galbanum, aut eorum aliquid, quæ suffusos iuuant:  
atque vbi os incaluit , leuiter inspiret halitum ocu-  
lo lactantis. Hoc consilium etiam adultis prodesse  
potest. Secundum est, vt ex 24 eadem materia ocu- *24 ℞ ex*  
los suffumiges. Aqua è melle destillata & suffusio- *herbis, semi-*  
nes, & albugines interim percurat. *nibus , aro-*  
*maticis & gũ-*  
*miophthal-*

Quæ distillatur è melle rosato , lenior est. De-  
inde quæ ex melle communi. Pòst etiam è melle  
scyllitico.

In his aquis aliquando modicum sacchari can-  
di liquandum est. In distillatione proximo capite  
numeratæ herbæ & materia , tum etiam sagape-  
num, ammoniacum, galbanum, cõmisceri possunt.  
Aut si iam distillata aqua est , in ea macerentur. Si-

# DE MORB. INTERNIS

militer & vis aquarum, fœniculi, maioranæ, & cæterorum augeri potest. Collyria fortiora.

℞. fellis accipitris, balsami ana ℥. 2. adde, si vis, hellebori albi, piperis ana ℥. 1. cum aqua raphani fiat collyrium. Aliud.

℞. terebinthinæ lb. β. sulphuris viui ℥. 2. mellis ros. ℥. 4. plantaginis & arnoglossi ana M. 2. fiat distillatio in alembico. A fortioribus collyriis, si mor-  
detur oculus, statim oui candido, aqua ros. aut lacte muliebri temperandum malum est. Plura remedia

ex proximo capite & 25 aliis reperes.

25 Cuiusmo-  
di est colly-  
rium Ioannis  
de Vigo.

Punctionis verò, quæ acu fit, tempestiua occa-  
sio est, cum materia suffusionis mediocriter con-  
creuit. Cuius formulam descriptam habes cap. 21.  
lib. 6. Pauli, & lib. 7. Cornelij Celsi, & 14. Metho-  
di ad finem, & apud Albucasis, vbi fingitur 26 Al-  
magdan quod vocant.

26 Instru-  
mentū est chi-  
rurgicū Cæ-  
terū dum pū-  
gitur oculus,  
obliquo lumi-  
ne ager sede-  
re debet, vt  
immutus ma-  
neat.

℞. frumenti crassiusculè conquassati, M. 2. sul-  
phuris viui. ℥. 1. sagapeni ℥. 6. salis, piperis, ana ℥. 2.  
mellis lb. β. terebinthinæ ℥. 2. cum yrinæ pueri lb. 2.  
fiat distillatio in alembico.

℞. fabarum fresarum M. 2. conquassentur in  
mellis lb. 2. terebinthinæ ℥. 3. gummi elenij ℥. 1. in  
succo fœniculi & marrubij ana lb. 2. fiat distilla-  
tio. Vel.

℞. frumenti crassiusculè conquassati, hord. ana  
M. 1. mellis, lapid. calaminar. ana ℥. 2. sulphur. ℥. 1.  
salis ℥. β. distemperentur in vase æneo cum aqua  
fœnicul. & plantag. succo granatorum, deinde fiat  
fortis expressio.

## EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Distinguendum initio, sítne ὑπίσφαγμα, ὑπόπυον, ἄνυξ,

*γλαυκώμα*, an *ὕπόχυμα*. Deinde si *ὕπόχυμα*, siue suffusio, an  
 primò & per se, an per consensum. Postremò, sitne in princi-  
 pio, incremento, statu, aut penitus confirmata. *Υπόσφασμα*,  
 sugillatio est, sanguinis nimirum effusio per tunicas in spa-  
 tia, quæ venis circumiacent. Principio rubet: progressu tem-  
 poris luescit: postremò nigrorem contrahit. Multitudine  
 & diuturnitate temporis aliquando in pus vertitur, ut sanguis  
 omnis per grumos collectus sub cute in aliis corporis parti-  
 bus. Tunc fit *ὕπόπουον*, pus nimirum sub cornea, dimidium  
 nigri occupans, aut per totam corneam tunicam pellucens,  
 unde dolor pulsatorius, vehemens, rubor totius oculi, &  
 temporum dolor. Fit etiam aliquando *ὄνυξ*, cum, ab ulcere  
 (ut ait Aëtius) profundiore pus defluens, & inter tunicas de-  
 lapsus, ac in circulo iridis figuratum, vnguis resecti imagi-  
 nem refert, differuntque ferè in sola vnguis similitudine. *Aëtius serm.*  
 Ex quo intelligi potest, id symptōma, quod Galenus de sym- *3. Tetrab. 2.*  
 ptōmatum causis sugillationi tribuit, ut ita affecti, quæcun- *Gal. lib. 1. de*  
 que videant, rubra esse putent, haudquaquam esse perpe- *symp. causis.*  
 tuum, sed in principio tantum apparet. Nam aliis tempo-  
 ribus subnigrum quid ob oculos volitare existimant, quod  
 multi sæpè similitudine decepti suffusionis principium esse  
 credunt. Causæ sunt, ruptio vasorum, contusio, ictus, ple-  
 nitudo, dolor capitis, lippitudo, inflammatio prægressa.  
 In Glaucomate crystallinus humor densatur & resiccatur,  
 neque vnquam curari potest. Alij putant viridem quendam  
 humorem crystallino permisceri, atque inde fieri glaucum  
 colorem ex viridi & albo. Ab omnibus differt. Suffusio siue  
 catharracta, & loco & causa. Sugillatio enim est in tuni-  
 cis & à sanguine: Glaucoma in crystallino humore vniuerso,  
 & à siccitate: suffusio intra corneam & crystallinum hu-  
 morem, ab humore potissimum aqueo ibi concrecente:  
 prætenditurque ille humor aliquando toti pupillæ, & visum  
 adimit, aliquando partitantum. Per consensum fit, cum per  
 interualla visa quædam visis propriè suffusorum similia ob-  
 uersantur ob oculos. Idque vel à bilioso humore è ventri-  
 culo, vapore ad oculos sublato: vel à cerebro, fumis ab isto  
 humore delatis per venas & arterias cum spiritu, ut in phre-  
 nitide, & febrium ardentium vigore: vel à toto corpore, ut  
 instante crisi. Per consensum fieri indicant, si altero tantum

*Suffusio per  
 consensum  
 quæ fiat.*

## DE MORB. INTERNIS

*Suffusio pri-* oculo incipiat, perpetua non sit, post cruditatem augeatur,  
*maria à secū-* pupilla non obscuretur, crisis instet, febris vigeat. Contra-  
*daria suis si-* ria oculum primariò affici demonstrant, tùmque in princi-  
*gnis distin-* pio veluti fumus est, quem si acu delere velis, diuulsus recur-  
*et.* ret, aut in particulas tenues dissectus visum grauiùs offen-  
 det, multiplicia obiecta pro vno repræsentans. Sub statum  
 concrefcit in nebulam, tùmque ferè sine dolore acu dimoue-  
 tur à pupilla. Vbi obduruit, acu si pungatur, tunicam simul  
 adducit & lacerat, vnde periculum cum dolore maximo con-  
 sequitur.

Purgato corpore conueniunt collyria fortiora ex felli-  
 bus, ad discussionem, ruptorium, cauterium post aures, san-  
 guisugæ in temporibus, ibidem emplastra, venæ sectio, ma-  
 sticatoria, potiùs quàm Errhina, pulueres à pastu, condita,  
 forus, acus. Post aures in ceruice cauterium, aut funiculus  
 fetaceus in occipite plurimùm confert, si inter corneam &  
 albugineum humorem intercipiatur nebula. Sed quæ inter  
 crystallinum & pupillam hæret, non ita dissolui potest sine  
 acu. Sit acus paulò minor longitudine minimi digiti, cras-  
 situdine, vt cæteræ, è materia firma, ne frangatur intra ocu-  
 lum, manubriolo striato, ad comprehensionem firmiorem.  
 Albucasis compungit acu per cauam acum ducta, vt per ca-  
 uitatem aqua defluat, nec in reliquum oculum incidat.

*Quibus in*  
*oculis tutior*  
*sit ad catar-*  
*ractam pun-*  
*ctio.*

*Punctio ocu-*  
*li remedium*  
*à capra in-*  
*uentum.*

Punctio in pleniore oculo tutior, iam contracta catar-  
 racta, sed ferè aliquid albuginei humoris dissoluitur, &  
 manet oculus minor. Remedium à capra inuentum, quæ sti-  
 pite confixa in suffusione visum recuperauit, vt Galenus do-  
 cet initio Isagoges. Aliquando tunica imbibita humore ex-  
 turgescit, & indurefcit, vbi emolliendum, laxandum priùs  
 quàm resoluendum. Barbari ad claritatem visus aures perfo-  
 rant annulo immisso, ne foramen claudatur. Fellium genera,  
 præsertim gruis, galli veteris, tauri, hirci, lac equinũ cum melle  
 illitum, stercus lacertæ, hyrundinis. Sed acribus non vtédum,  
 nisi paulatim assuefacto oculo, vt erugine, cuperosa, &c. Sina-  
 pismus è stercore colúbino, hederae terrestres decoctũ, donec  
 quarta pars supersit, ad fortũ per dies 25. Aqua mellis cum ra-  
 dice ireos, conizæ, chelidonizæ, triticum cum sale & melle in  
 vase æneo insolutum, & liquor expressus, succus hederae, co-  
 ctæ faba in hydromelite, deinde cum melle rosato pistata, &

expressa, inde oculorum illitus, pulvis ex seminis raphani  $\mathfrak{z}$ .i. cum ammoniaci aridi  $\mathfrak{z}$ .ß. & balsamo. Vitriolum album in lacte aut aqua euphrasie, fœniculi, & similibus, addita aloë, sacculus plenus maiorana, naribus & oculis admodus, serpentina in materia Chirurgica describenda, soluta succo anagallidis rubrę, sterus corui, aut fel cum melle. Quidam succum rutę, fœniculi, saluie, vel herbas cum tritico & sale incoquant vino albo, & ita sumunt. Decoctum fœniculi, guaiaci, euphrasie, rutę, seseleos, aromat. cum macere, ex eodem fots & portio. Collyrium siccum ex macere, semine fœnic. seseleos & euphrasie, aqua distillationis hyrundinum vel picarum. Vidua æconomi Regij de Chaulmont Lutetie aqua è phœnicea anagallide distillata multos curavit. Potest distillari cum melle, sicuti & Monachus quidam salis M. i. in vino albo nouem diebus agitato in vase æneo, donec virescat. Sequentia quoque probantur, ad obtusum visum, & catarractam.

*Anagallidis  
phœnicea aq.  
stillatitia  
multos suffu-  
sione libera-  
uit.*

$\mathcal{L}$ .Baccarum lauri purgatarum  $\mathfrak{z}$ .4. Tere cum vrina pueri impubis, fiat fortis expressio. Deinde cum mucagine gummi arabici, vel tragac. extracta cum aqua argentar. fiat illitus.

$\mathcal{L}$ .rad. ireos recentis  $\mathfrak{z}$ .i. fortiter pistetur cum succo fœniculi depurato per residentiam, deinde addito modico sacchari candi, & mucag. fœnic. fiat linimentum.

$\mathcal{L}$ .succu chelidonię & conizę an.  $\mathfrak{z}$ .i. mellis.  $\mathfrak{z}$ .2. &c.

# ANTO. VALETII EXERCIT. XXI.

**Q**Uod Græcis *Ἐπὶ χυμα*, Latinis suffusio appellatur, morbus est in compositione, seu in numero, cum videlicet aliquid toto genere præter naturã succrescit. In hac etenim affectione serofus humor inter crySTALLINUM humorem & corneam tunicam colligitur, qui paulatim cogitur, & densatur. Quum primùm aduentat, tenuia, lucetia, atque



## DE MORB. INTERNIS

*Hypochy-  
ma morbus  
in compo-  
sitione.* etiā caliginosa corpuscula perpetā ob oculos ægris  
videntur obuersari. Quod etiam iis accidit, quibus  
per consensum ventriculi oculus utrūque suffunditur.  
Verū affectus vtriūsq; dignotio ex Gal. cap.  
2. lib. 1. de caus. sympt. & cap. 1. lib. 4. de loc. mal. affe-  
ctis satis manifesta.

*Gal. lib. 13.  
Method. &  
Paul. Eg.  
ca. 22. lib. 3.* Incipiens hypochyma aliquando digeritur: sed  
si diutiùs constiterit, & quasi limus factus fuerit hu-  
mor, sola punctoriij styli mucronis per corneam  
pertusione curari potest.

*Hypochyma  
in curatio.* Apparabitur humor, vt antè in visus imbecillita-  
te, deinde educetur. Et quia iterata purgatione est  
opus, hanc pilularum massam, in plureis doses vrē-  
dum, imperare licebit. ℞. massæ pilul. lucis maior. &  
cocc. an. ʒ. 2. specier. hierē. dupl. aloë. ʒ. 1. agar. troch.  
rhei elect. an. ʒ. 1. aqu. fœnic. chelidoniæ infusionis.  
ʒ. 1. turpethi benè gummosi cum tantillo zinzibe-  
ris, f. massa pilul. adiecto, si velis, syrupo de stæcha-  
de. Dosis erit ʒ. 4. vel, si parum mouerit, gr. 2. aut. 3.  
dacrydij adiicientur. Vsus sit semel in hebdom.

Si plethora adsit, aut si quæ inflammatio suase-  
rit, vena cubiti pertundetur: quanquam Rhazes æ-  
gro prohibendum censeat, ne cucurbitulis, neque  
ex venis in manum distributis, sanguinem extrahat,  
ne scilicet humor magis congeletur, exhausto per  
phlebotomen spiritu, à quo discuti deberet. Itaque  
cucurbitulæ sine scarificatu sæpè ac sæpè hîc vtili-  
ter apponuntur.

Antequam verò ad topica & collyria ab Autho-  
re præscripta veniatur, fomentum oculo instituetur  
ex decocto huiusmodi.

℞. fœnic. virid. parietar. & beton. an. M. i. semin. fœnugr. ʒ,

ß. flor. chamæm. & meliloti an. p. i. f. decoct. in aqua & vino alb. pro fotu oculi cum spongia, vel gossipio: vel demisso cap. excipiat vapor.

Comparantur collyria ex exsiccantibus & incidentibus, qualia è fellibus siccis cum marrubij succo dissolutis. De his Gal. libr. 4. de compos. pharm.  $\chi^1$   $\rho\sigma\pi\gamma\varsigma$ . Memorabile est, quod à clarissimo viro, D. De Montifaut, accepit remedium, mihiq; commune fecit, Petrus Morellus Genabensis Medicus exercitatusissimus, amicus vnicè charus. Ouum recens sub cineribus ad duritiem coquitur: medium diuiditur: detracto vitello, puluere è vitriolo albo & saccharo cando confecto impletur: ambabus partibus arctissimè colligatis maceratur in aqua ros. aut euphras. per 4. dies: expressione facta fit collyrium. Huius præstantiam experientia confirmat.

Non prætereunda sunt, quæ caput roborant, & materiæ reliquias discutiunt, vt sacculi antè commemorati, & quæ in eum vsum assumuntur opiatæ, electaria, pulueres, vt.  $\mathcal{L}$ . conseru. anth. 3. i. spec. electar. diamarg. calid.  $\mathfrak{D}$ . i. conser. rosa. 3. ß. misce. capiat per se, vel dissolu. in aqua. beton. fœnic. Cætèrùm si suffusio sit per consensum ventriculi, facilem habet curationem, purgatione ex hiera imperata. Si suffusioni similis eruptio sanguinis, aut alterius humoris ex ictu, aut plaga, vt in suggillatis, curanda proponitur, secatur imprimis vena: mox sanguis turturis, aut columbæ ex tenellis alis expressus, in oculum instillatur.

*De hæmorrhagia. CAP. 22.*

**H**æmorrhagia Græcis peculiariter intelligitur profluuium sanguinis è naribus, vt constat ex

## DE MORB. INTERNIS

Hippocrate sect. 3. lib. 6. Epidem. sent. 21. Quanquā ex vocabulo, quodcūque sanguinis profluuium intelligi potest. Quale est 1 è sede, 2 vtero, ore. Rarum est, quod quibusdam contingit peculiari natura, vt aperta è trunco corporis, hypochondriis, thorace, facie, venæ clausura, redundantem sanguinem depleant. Quibus eadem remedia conueniunt, quæ in hæmorrhagia è naribus.

1 *Vt in dysenteria à ματιώδ.*

2 *Vt purgatione menstrua, profluuium muliebri, lechiu.*

3 *Vt in iuuenibus, in febre ardente.*

4 *Vt in purgatione, & iuuenum hæmorrhagia, mutilorū dysenteria, hæc bona, vt signum, & vt causa.*

5 *Ad reuulsionem obscuram.*

6 *Vulgò agglutinantis appellat.*

Hæc autem aliàs 3 critica est: aliàs ex 4 consuetudine naturali. Nonnunquam omnino præter naturam est. In duobus primis generibus sanguis supprimi non debet, nisi viribus iam metuitur. Multò etiam minùs, ac tardiùs ætate iuuenili, temperamēto sanguineo, aut vbi consueta aliqua vacuatio intermissa est. Quales sunt hæmorrhoides, vomitus sanguinis, phlebotomia, & mēstrua in mulieribus. Vbi verò supprimendus est, remedia sunt 5 vincula, cucurbitulæ, phlebotomia, Sanguisugæ, 6 anacollemata indita naribus, aut admota reliquis corporis partibus. Vincula ergo digitis pedum & manuum, testiculis, articulis interuallo trium digitorū, auriculis iniicienda sunt. Frictiones etiam deorsum ductæ, immersiones extremorum in aqua calida, vel frigida conueniunt.

Phlebotomia è cephalica eiusdem lateris, aut vtræque, si vtrinque profluit sanguis: idque angusto vulnere, ne tanta fiat vacuatio. Tutiùsque aliquoties diuersionem repetere, quàm semel ducto sanguine animi deliquium excitare. Quod tamen animi deliquium Paulus & aliquot alij probauerunt. Gal. in Prorrhethico non expectandam animi deiectionem præcipit. Atque experimento certum est,

animi deliquio sanguinem non restitisse. Sanguisuga post aures, aut in sede, iis maximè, quibus consuetæ supprimuntur hæmorrhoides. Cucurbitulæ statim post vincula, & ante phlébotomiam hypochondrio eiusdem lateris affigendæ sunt. Affiguntur & scapulis, & summæ ceruici, etiam cum scarificatione, si opus fuerit, & vires tolerant. Anacollemata verò, & quæ induntur naribus, magna ex parte refrigerant: quorum usus 7 post alia supradicta remedia tempestivius est, iam reuulsa in partes contrarias materiâ, id est, in 8 partes inferiores corporis, aut posteriores capitis. Alioqui usu refrigerantiû plurimi quidem deterius habuerunt: inde conuulsi, aut oborta spirandi difficultate suffocati. Et hæc remedia infirma omnia comperit Gale. præ maioribus 9 illis remediis, ex quinto Methodi, ex Prorrhethico, ex lib. de sang. missione. Anacollematis ergo, & aliis topicis post reuulsiones utendum erit, habita ratione naturæ capitis & partium, quibus admoventur. Anacollemata fiunt ex argilla, farina volatili, farina triticea, incorporatis cum oui albumine, addito momento aquæ rosar. & aceti. Potest quoque aliquid adiici boli armenæ, sang. drac. & rerum eiusm. quæ adstringunt, quale hoc est.

℞. 10 argillæ ʒ. 2. boli armenæ ʒ. β. acaciæ, hypocystidos ana ʒ. 2. cum oui albumine & modico aceti fiat emplastrum, applicetur fronti & temporibus. Induntur in nares, quæ refrigerant, adstringunt, inuiscant, aut crustam ducunt, interim mixta

II portiuncula narcoticorum. Verùm & narcotica, q. s. cum his maceretur sanguis draconis. Excipiantur singula gossipio carpto, & nari indantur. II Ut hyoscyami, opij.

7 Ne sanguis in asperam arteriâ, aut asphagum præcumbat, vel caput efficiat, & parotidas excitet.

8 Ut in mulierum hæmorrhagia.

9 Quæ putræant cum cuncta, generatione prohibendo, intercipiend.

10 Vel. ℞. argillæ, farinæ volatilis ana. ʒ. i. misceatur cum al

bumine oui, & tantillo aceti. Imbuatur gossipio carpto, naribusque imponatur, ad pugnandum cum anastomosi.

Vel. ℞. succi lanceolæ (id est plantag. acutioris) burse pastoris

# DE MORB. INTERNIS

& caustica cum periculo esse solēt. Sine metu sunt,

12 *Præfer- tim lanceola, Et fructus rubi immatur.* 12 succus plantaginis, succus rubi, mespilorum, cornorum, & alij eiusmodi. Lanugo arboris, quæ foliis insidet, aut quæ veluti nucamenta pendent è specie populi, 13 vel masculi-falicy (quem Galli *Marsault* appellant) medio mense Martio colliguntur, macerantur in aceto, siccantur, & vsui asseruantur. Vfus tempore induntur per se naribus, aut conueniente medicamine imbuuntur, atque ita imponuntur.

13 *Aqua etiam stillatitia ex nocamentis salicis.*

Athanasia Nicolai cum succo pentaphylli. Alexandri pulvis, qui ita paratur. ℞. consolidæ, sanguinis drac. carab. ana ʒ. i. hæmatit. corall. cornu. ceru. vsti ana ʒ. 2. f. pulu. Datur ad ʒ. 2. vel ʒ. i. cum liquore conuenienti. Alius.

℞. rutæ vstæ ʒ. i. sarcocoll. lithargyri, sang. dracon. ana ʒ. 4. f. pul. vulneribus etiam immixtus sanguinem mirificè sistit. Alius.

℞. testæ pectunculi marini vsti, sanguinis dracon. carabe ana ʒ. i. spongiæ nouellæ vstæ nostro more, punic. vsti ana ʒ. 3. Licinium oui albumine imbuitur, superaspergitur pulvis, & naribus, vel vulnere immittitur.

Spongia aceto acerrimo imbuitur: imbuta pice liquida circunducitur: tum fictili vase reposita crematur: in puluerem redigitur. Pulvis efficacissimus est, & per se insufflatur naribus, vel liquidis medicamentis commiscetur. Aliud.

℞. thuris ʒ. 2. aloës ʒ. i. cum oui albumine incorporentur. Penicillus è mollissimis pilis leporis, aut floccus è lanugine, aut nucamento suprà dicto, in eo medicamento incoquitur, & ita naribus imponitur. Penicilli etiam conueniunt è tela araneorum, cui infi-

cui infideat farina volatilis.

℥. succi basil. ʒ. 6. aceti ʒ. 2. caphuræ ʒ. 2. misce.  
Linamenta hoc medicamento imbuta induntur na-  
ribus

℥. aquæ plantaginis, ros. an. ʒ. 6. aceti, vini albi  
adstringentis ana ʒ. 3. caphuræ ʒ. 1. misce, & in mi-  
scella madefac. linteamina, quæ collo inuoluas, he-  
pati, pedibus, testiculis, & mammis.

℥. aquæ panis porcini ʒ. 1. caphuræ ʒ. 1. attra-  
hatur in nares. Terra sigillata, bolus armena, san-  
guis draconis, Trochisci de carabe, ouî albumine &  
aceti momento dissoluuntur.

Hinc madefactus penicillus naribus imponitur.

Radix 14 pœoniæ subiecta linguæ sanguinem si-  
stir: herba verò fronti imposita, aut naribus indita.

Fragaria herba trita similiter iuuat.

Vtile est etiam olfacere caphuram in aceto dis-  
solutam.

Quidam temerario remedio, cum reliqua om-  
nia non iuissent, eum, cui profluebat sanguis, in  
balneum deduxit, atque demersit ad collum, & ita  
restitit sanguis. Verum ab hoc remedio certum exi-  
tium est, si vires vehementer laborent.

Vulgus vititur corallo è collo suspenso.

Lapides, iapsis, onyx, hæmatites, id est, lapis san-  
guinariis, eodem remedio esse creduntur.

Sunt, qui applicent parti, vbi debet fieri reuulsio.

# EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Gal. comm. 1. *Gal. comm. 1.*  
Alenus scribit comment. 1. τῶν ἐπιδηµῶν, apud Hippo- *in li. 1. Epid.*  
cratem τῆς αἱμορραγίας nomine profluuium sanguis è na- *sens. 9.*

## DE MORB. INTERNIS

ribus intelligi, si per se ponatur, non expressa particula, unde effluit. Alioqui nomen generale est in omni sanguinis vacuatione, siue per crism fiat, siue symptoma sit lætæ arteriæ, aut venæ. Sed ex arteria exilit tenuior, flauior & cum saltu. Quatuor in vniuersum modi sunt. Referatio oris vasorum per ἀνασφάλωσιν, ab eorundem imbecillitate, sanguinis copia, acrimonia: transcolatio, sudoris instar, per διαπήδησιν, à raritate tunicæ, sanguinis tenuitate vel sero, gracilium vasorum apertione. Diuisio tunicæ, à vulnere, contusione, ruptione per ρήξιν. Postremò διάβρωσις eiusdem, id est, exulceratio aut erosio intrinsecus facta à vitioso succo & acri: extrinsecus à valentibus medicamentis, aut igne. Vix tamen ab externis venis sanguis profluit, nisi vel erodantur, vel rumpantur ob densitatem in cute externa.

Si per διαπήδησιν profluat, serosorum humorum purgatio, venarum densitas, sanguinis crassities procuranda. Si per διάβρωσιν crustam inducentia erunt vsui. In cæteris vacuantia, repellentia, refrigerantia, adstringentia, obstruentia, rescicantia, sanguinis missio, diuersio, ligaturæ, cucurbitulæ, frigidiorum perfusio, epithemata, & similia.

Laudatur sanguinis profluuium post partum, tempore mensium, in synochis febribus, & aliis per crism, enaribus post capitis dolores, modò affectio frigida non sit. Proinde remedia nulla postulat, nisi immoderatum sit, vires superet, & futuræ hydropisis, aut cachexiæ periculū minetur.

Profunt succus caudæ equinæ in vino, puluis Alexandri, Trochisci Rhazæ, de terra sigillata, de carabe, soluti in oui albumine, ex Heraclide, manuum, cruris, articulorum ligatio, frictio, cucurbitula supra vmbilicum, nisi sit imbecillior. Porri succus auxilium est sæpe probatum. Nonnulli accipiunt porros nouem, aut decem recentes, medios transfigunt filo, folia extrema amputant, vt odorem inspirent, circumdant collo obuersis foliis naribus, & deorsum versis capitibus. Stercus asini odoratum, expertum etiam reiicientibus sanguinem, vrtica Græca trita, fronti alligata, cherepyllon ex oleo nucum, plantaginis, millefolij succus, herba trita, caphura aceto soluta, sanguis ægri.

Ανακολληματα] Paulus explicat agglutinamenta. Fronti enim applicantur, habentque agglutinandi & obstruendi facultatē,

*Hæmorrhagiæ morbi quatuor.*

*Hæmorrhagiæ sistētia.*

cuiusmodi sunt tela aranearum, farina volatilis, emplastrum *Paul. Ag.*  
Comitissæ, & similia soluta oui albumine. Sed inutilia, cum *sub finē cap.*  
per venas & arterias interiores humor decurrit. *16. lib. 7.*

## ANTO. VALETII EXERCIT. XXII.

**H**æmorrhagia symptoma est, quod sub genere *Gal. lib. 3. de*  
excretionis immodicæ continetur: fitque vel *caus. sympt.*  
venæ tunica diuisa, vel vasis ore reserato, vel sudo- *lib. 5.*  
ris modo sanguine transmissio. *Meth.*

Eius causæ sunt externæ, internæ. Externæ, quæ- *Hæmorrha-*  
cunque rumpunt, incidunt, contundunt, clamor *giæ cause.*  
magnus, & acutus. Internæ, sanguinis copia, praua  
qualitas, vasorum infirmitas, facultas excretrix im-  
moderatiùs mota. Vbi copia sanguinis mali huius *Gal. cap. 10.*  
causa est, atque etiam acrior eiusdem qualitas, nul- *lib. de curat.*  
lum præsentius remedium reperitur venæ sectione: *rat. per sang.*  
quæ tum præsertim celebretur, cum moderata san- *missionem.*

guinis copia effluerit, & fortis lationis impetus  
perstiterit. Ducetur paulatim, & per internalla san-  
guis, nisi viribus minùs metuatur. Quod si citatior  
hæmorrhagia iam vberiore vacuârît, cucurbitu-  
læ magnæ hypochondriis è directo affixæ, dein sca-  
pulis & ceruici, artuum frictio, deuinctioque sa-  
tis erunt. Mox properandum ad ea, quæ calorem  
cohibent, propterea quæ sanguinem refrigerant, &  
ad motum reddunt ineptiorem. Huius generis infi-  
nita cum assumenda, tum ad mouenda comparari  
possunt. Sumuntur syrapi myrtill. ros. siccar. de pa-  
pauere, de nymphaea, granator. cydoniorum, & si-  
miles, cum aquis centinodij, plantag. portulac. ar-  
nogloss. vr.

℥. semin. plantag. portulac. lactul. ana ʒ. ʒ. ros. rubr. ros.



## DE MORB. INTERNIS

transmarin. ana p. i. f. decoct. in aqu. chalybeata ad quart. 3. In colatura dissolue zulapij ros. syrup. cydon. ana ʒ. 2. puluer. trochiscor. de carabe ʒ. i. ʒ. f. zulapium pro dosib. 3. Vel. ʒ. pulu. trochisc. de terra sigillata ʒ. i. coralli rub. cornu ceru. vsti an. ʒ. i. syr. myrtill. ʒ. i. aquæ, vel succ. plantag. ros. vel nymph. ʒ. 2. vel ʒ. zulapium: exhibeatur.

Vel ex conferu. ros. symphyti, additis bol. armen. terr. sig. lotis, corall. rub. lap. hæmat. cornu cerui vsti, feminibus plantag. & lactuc. cum syrup. myrtill. parabitur opiata.

Eodem pertinet ciborum refrigerantium & in-craissantium vsus.

Sed hæc refrigerantia non nisi post sanguinis fluxum alio reuulsu imperanda sunt. Neque verò fronti atque capiti illicò refrigerantia topica adhibenda: alioqui enim conuulsio, suffocatio, dyspnœa plerumque accideret, aut ipsa etiam hæmorrhagia adaugeretur.

Hoc emplastrum fronti & temporibus appositum, sua lentitia meatus obstruendo sanguinẽ exitu prohibebit.

ʒ. bol. armen. sang. drac. ana ʒ. 3. mastich. farinæ volatilis ana ʒ. 2. cum oui albumine, vel cum plantaginis succo f. emplastrum.

Proderit etiam contortum ad ellychnij formam linamentum in nares immittere, quod in hacmersum sit mistura.

ʒ. bol. arm. terr. sigill. ana ʒ. i. aloës & pilor. lepor. minutim concisorum ana ʒ. ʒ. excipiantur cum albumine oui & oxycrato, & in formam linimenti redigantur.

Sunt, qui rutam, aut vrticam viridem aceto maceratam naribus imponunt: alij spongiam eodem aceto imbutam. Lapidis molaris feruefacti, & aceto acerrimo extincti vapor naribus exceptus, præstan-

tiffimum creditur afferre remedium.

Escharotica, vbi prædicta omnia nihil promo-  
uerint, ex vitriol. chalciti. gypf. & gummi æquis par-  
tibus, vel per se in nares insufflanda, vel linamento  
capta indenda. Sed hæc, vt etiam narcotica, nõ nisi  
summa vrgente necessitate sunt vsurpanda.

Quod si ab hepate, aut liene, feratur sanguis, epi-  
thema ex aq. plantag. cich. ros. oxalid. ana ʒ. 2. aceti  
ʒ. 1. santal. citr. vel diamargar. frigid. ʒ. 1. comparabi-  
tur: quo imbuta linteola hypochôd. admouebûtur.

Denique post sanguinis fluxum optimè repres-  
sum utilis erit purgatio, quæ tollenda sit hæmor-  
rhagiæ causa. Et quia, vt plurimum, biliosus, acer  
& mordax est humor, cholagogum huiusmodi po-  
terit imperari.

℥. prun. damas. tamarind. ana ʒ. ʒ. ʒ. semin. melon. cydon.  
plantag. ana ʒ. 1. flor. violâr. & nenuphar. ana p. 1. f. decoct.  
pro dosi. In colatur. infunde rhei elect. ʒ. 2. santal. citr. ʒ. 1. In  
expressione dissol. iulep. ros. vel syrup. cydon. ʒ. 6. f. dosis.

De I Angina. CAP. 23.

**A** Ngina inflammatio est faucium, aut muscu-  
lorum, qui ad fines asperæ arteriæ siti sunt.  
Nonnunquam etiam exteriorum ceruicis. Despe-  
ratio est, 2 cum nusquam apparet. Cum grauissi-  
mus dolor est, febris, cum os hiat, lingua exerta est,  
intercepta deglutiendi via, & potus per nares 3  
refluit, aut si ad initia ceruicis cauitas est, intrò ad-  
ducta vertebra. Hæc vt minuuntur, ita leuior mor-  
bus est. Oportet ergò statim initio collocare ægros  
loco satis 4 amplo, 5 nec frigido: ita residere in le-  
cto, vt 6 caput altius attollatur. Liquidiora 7 sun-

1 Quæ tumor  
est cõtra na-  
turâ, cum ru-  
bore, dolore,  
calore, Et flu-  
xu, diuinctus.

2 Quod si  
quis euaserit,  
peripneumo-  
nicus fit, &  
intra dies 7.  
moritur aph.

3 Obstructo  
scilicet æso-  
phago.

4 Vt liberè  
aërem ducât.

5 Ne cõstrin-  
gatur meatus  
iam obfessus.

6 Nam non  
nisi ceruice  
recta spirare  
quâ ortho-  
pnici.

7 Qualita-  
te & consi-  
stentia humi-  
da, qualia  
sunt ptisina,  
colatitia,  
pulli iuscui,  
& carnis vi-  
tulivæ, gela-  
tina, quæque  
sit cinamomi  
expers.

# DE MORB. INTERNIS

8 *Vel dies a-* to alimenta. 8 Parcissimè viuant quantum vires tor-  
*liquor omni-* lerare possint. Abstineant iis omnibus, quæ 9 flu-  
*na à cibo ab-* xiones incitant, quale vinum, vaporosa, & calida fe-  
*stineant, si vi-* rè omnia. Vitent enim 10 glutinosa, quæ cùm etiã  
*res vāeant* non detergeant, vias iam oppressas angustia inter-  
*sue infirmi-* cipiūt. Primis diebus, atq; adeo initio morbi, 11 san-  
*tatus actus.* guis detrahendus est, adhibito prius hoc consilio.  
9 *Vt omnia* Mulieribus tum grauidis, tum quibus menses sup-  
*piperata, &* primuntur, angina fit aliquando. In grauida, san-  
*aromatica.* guinem detrahes nullo metu ad tres, quarnòrve  
10 *Hæc enī* vncias, plus minusve, vt scopi 12 phlebotomię indi-  
*homines fa-* cabunt. Minus, si fœtus 13 maior est, vt post septi-  
*ciant pneu-* mum mensem. Quod si mulieri grauidæ etiã tum  
*maticos.* menses fluunt, 14 multò liberius sanguinem è cubi-  
11 *Ad eua-* to detrahes. Hic enim & ab angina matri, & ab a-  
*ciationē ma-* bortione fœtui periculum est. In iis vero, quæ vte-  
*teria coniu-* rum non gerunt, & menses supprimuntur, venam è  
*ctæ, & ante-* crure vulnerabis, copiosiusque detrahes. Tū ad bra-  
*cedetis reuul-* chij venas, quæ morbo cōueniunt, phlebotomiam  
*sionem.* transferes. Hoc consilium multis aliis morbis, qui-  
12 *Ex morbi* bus corripuntur mulieres, commune est. In aliis, si  
*essentia, sym-* quidem manifesta signa plenitudinis appareant, è  
*ptomatum* saphena: si mediocria, è media cubiti. Alioqui è ce-  
*rebertentia,* phalica sanguinem detrahes mediocri vulnere, ne  
*digritate* si amplius sit, nimium viribus detrahatur. Si angu-  
*partū, causa* stius, effluat tenuis sanguis, crassus relinquatur.  
*materiali &* Hyeme, vbi anginę ferè phlegmaticę, partior de-  
*effluente de-* tractio, sed foramen maius esse debet. Vere, & re-  
*sumpti.* liquis temporibus copiosior, vulnúsque angustius  
13 *Quia mul-* imprimatur. Cucurbitulę ex libro de cucurb. col-  
*lier grauida* locentur.  
*secta vena*  
*abortit, præ-*  
*sertim si fœ-*  
*tus grandior*  
*sit.*  
14 *Quoddita*  
*comparata*  
*fit mulierum natura, vt sanguine abundet.*

Mollis 15 aluus esto leuibus 16 clysteribus, 15 *Omnis enim angina alui profluuium desiderat.*  
 multò magis si febris est. In quibus interim dissol-  
 ues cassiæ fistulæ ʒ. i. vel ʒ. ss. cathol. vel hieræ 17  
 picræ. Huius hieræ summa vis probata. Nam cùm  
 angina multos Romæ suffocaret, eaque veluti pe- 16  
 stis tota vrbe grassaretur, inuentum remedium à  
 Medicis, vt post frugalem cœnam ʒ. i. pul. 18 hie-  
 ræ in pilulas coactos exhiberent. *Ut fiat decoctio ex fero lactis: in qua dissoluatur cassia, aut catholica pro clystere.*

Quo auxilio quicunque vsi sunt, periculum de-  
 clinârunt tam atrocis morbi.

Paulus in nonnullis, omissa 19 phlebotomiâ, 17 *Non, si febris adsit.*  
 acrioribus clysteribus vtitur dissolutis ʒ. 3. hieræ  
 diacolocynthidos. Sed quod antè dictum est, prius- 18  
 quam iniiciamus clysteres 20 acriores, leuioribus  
 vti oportet, qui inueteratum stercus emolliant &  
 detrahant. *Simplicis, ad exclusionem pituitæ salsæ, per deriuationē in aluum.*

Purgationes quoq; leues ex cassia, manna, ad ʒ. i.  
 aut eo plus in 21 decocto passularum, hordei, flo- 19  
 rum cordialium, tamarindorum, sebesten, prunorū. *Sed & ante venæ sectionem h. e.*

Suspectum pharmacum, quod Asclepiades im-  
 perauit ex aloë & colocynth. tum quia in 22 pilu-  
 las conformat, tum quia fortius est. *gargarismus imperandus. ʒ. aque hordei. lb. i.*

Dissoluta enim liquoribus, non coacta in pilu-  
 las, pharmaca magis conueniunt, propter difficul-  
 tatem deglutiendi. *aqu. ros. & plantag. ana ʒ. 2. succi gargariorum ʒ. i.*

Atq; dum hæc fiūt, gargarismis vtendū est, initio  
 quidē repellētib;: deinde admixta vi detergēte, &  
 resolvente: post etiam, si fuerit opus, maturantibus. *ʒ. garga. p. st sectionē venæ, ex la-*

Atq; vbi dolor grauior est, & sentitur exulcera-  
 tio, lenientibus, quorum materiâ & compositionē *ele calido im-*

*perabitur. 20 Uti qui sunt ex decocto capitali & hiera vtraque. 21 Vel in decocto pulli, aut carnis vitulina. 22 Quas anginosus deglutire non potest.*

# DE MORB. INTERNIS

repetes ex 6.  $\chi\tau^1$  τοπ $\pi$ ς, & cap. 43. octauī Aëtij. Recentiores Medici iisdem etiam vtuntur, vel his.

$\mathcal{Z}$ . decoctionis rosarum sic.  $\mathcal{Z}$ . 4. cum diamor.  $\mathcal{Z}$ . 2. Ex sorbis, cornis, moris rubi, aut alioqui immaturis, è granatis acidis poterit exprimi succus, & quarta parte sacchari, aut mellis rosati dulcari. Dianucum & diamoron initio dissoluantur in duplo liquore adstringente, quales sunt supradicti succi. Decoctum rosarum, plantaginis, sorborum, cornorum, mespilorum, & similium adstringentium, vel in aquis inde distillatis. Conserue sunt cornorum, sorborum, mespilorum, mororum immaturorum, quarum vncia in duplo liquore adstringente dissoluta reprimentem  $\mathcal{Z}$  3 gargarismum efficit. Et hic quoque laudatus reprimendo & leniendo.

23 Quo vti-  
tur in eūte an-  
gina, præfer-  
tima siua.

24 Vel.  $\mathcal{Z}$ .  
decocti sebe-  
sten.  $\mathcal{Z}$ . 2. a-  
quæ è sorbis,  
aut cornis  $\mathcal{Z}$ .  
4. f. garg.

25 In quan-  
titate, quali-  
tate & vsu.

26 Huius  
hacerit com-  
ponēdi ratio.  
 $\mathcal{Z}$ . ros. sic.  
M. s. fiat de-  
coctio in tri-  
bus libris a-  
quæ. Incola-  
tura ad lib. 2.  
dissol. mell.  $\mathcal{Z}$ .  
3. vel  $\mathcal{Z}$ . 2. fiat  
hydromel.

$\mathcal{Z}$ . 24 succi expressi è cassia fistul.  $\mathcal{Z}$ . 1. decocti  
rosarum aut aquæ plantaginis  $\mathcal{Z}$ . 2. vel decocti se-  
besten.  $\mathcal{Z}$ . 2. aquæ è sorbis, cornis, aut mespilis distil-  
latæ  $\mathcal{Z}$ . 4. misce pro gargarismo.

Vt augetur morbus, ita repellentium  $\mathcal{Z}$  5 modus  
minuendus, & augendus resoluentium. Itaque plus  
mellis admiscemus: vtimurque hydromelite, plus  
minúsve diluto, in quo rosæ  $\mathcal{Z}$  26 præbullierint, sy-  
rupo rosato, syrupo etiam de papauere, vbi fluxio  
tenuior est. Vbi his remediis nihil proficimus, venæ  
sub lingua incidendæ sunt. Alij ex Archigene &  
Asclepiade venā frontis, & quæ ad angulum oculi  
pertinet. Hippocrates lib. 3. de morbis venam quæ  
sub mammis est, in paracynanche, quæ leuior est  
angina, pertundit. Nonnulli venas ceruicis.

Cæl. Aurelianus capite 4. lib. 3. Acut. sanguinem  
trahere è locis sub mammis constitutis, noxium

esse atque putidum contrà Hippocratem contendit. Ac noxium quidem, quòd plurima oporteat corpora diuidi, cùm neque facilè sub visum venæ possint deuenire. Putidum, quia vlla sine difficultate, profundiore facto foramine, iusta sanguinis detractio è venis humeralibus approbatur.

Verùm tutius est post vniuersalem vacuationem perseuerante malo cucurbitulas cum scarificatione ad initia ceruicis adfigere, &c. Postea venas sub lingua, vel phlebotomo aperire, vel cultello scarificare.

Sanguisugæ iisdem locis, quibus cucurbitulæ, affigi possunt: quæ vbi detractæ fuerint, cucurbitulæ inducuntur, perpetuò habita virium ratione.

De cinere hyrundinum, humano stercore, canino, & aliis, quæ melli mixta, aut aliter præparata angina conueniunt, lege postremos lib. Galen. de simplicibus, vt de assellis & aliis remediis, commentarios secundum locos.

Lenies dolorem & asperitatem gutturis aquâ, in qua mica panis albissimi coxerit. Aut 27 panis <sup>27 Vel fiet</sup> ita coctus vehementer exprimatur: colluatur succus. Eodem modo è fursurum, tritici, pinguium <sup>cataplasma</sup> cremore. Lac etiam per se, mucago semin. cydo- <sup>ex radicibus</sup> niorum, lini, althææ, aut hic Sorani efficacissimus <sup>luliorum</sup> gargarismus. <sup>althææ, ca-</sup>

℥. glycyrrhizæ recenter rasæ & conquassatæ ʒ. <sup>tyro, farina</sup> 3. mellis rosati ʒ. i. aquæ fontanæ lb. ss. coquantur <sup>lini, oleoque</sup> omnia ad crassitudinē, è colatura fiat gargarismus. <sup>lilaceo.</sup>

Penidia quoque in lacte dissoluta, ptisanæ succus, hordeatum, lac amygdalarum dulcium similiter colluatur. Maurant.

## DE MORB. INTERNIS

℥. ficuum pinguium ʒ. 3. hyssopi P. i. fiat decoctio ad dimidias, colaturâ colluatur.

*In periculo suffocationis.*

Anginosi sæpissimè periculo suffocationis laborant. Quòd si periculum inde natum est, quia erupit tumor, & sanies in pulmones & cor defluxit, desperatio est, nisi summo 28 beneficio naturæ adiuuentur. Alioqui sæpè fit, vt cum nimis increuerit tumor, omninò intercipiat vias spiritales, 29 vbi certa mors est, nisi occurramus. Itaque extremo malo extrema remedia tentanda sunt. Repetenda sectio venarum sub lingua. Cucurbitula magna & cum 30 multa flamma initio ceruicis affigenda est. Collum & thorax onere leuanda sunt, atque inungenda oleo de liliis, aut fœnugræco.

Caput his attollendum est, vt probè sedeant, Aër frigidus introducendus est. Locus sit lucidus & perspiratus. Cucurbitulæ quoque in pulpis scapularum, sub mento, in mento, & maxillis. Alij etiam in futura coronali, & sub mammis coaptant. Rhazes etiam vesicante phœnigmo vtitur initio ceruicis, tùmque gargarismis acrioribus vtendum est, vt hydromelite, in quo pugillus hyssopi, aut origani coxerit, aut radix gentianæ, cucumeris agrestis, iridis. Aut.

℥. seminis sinapi ʒ. 2. canquassentur, & in aceto acerrimo macerentur. Incorporentur cum modico melle. Deinde dissoluantur in ʒ. 2. mulsæ, ad gargarismum.

Quòd si his artibus nihil proficimus, vtimur auxilio Asclepiadis. Vtendum est tum etiam omnibus ferè medicamentis.

28 Vt expectorato, aut alui profluuiò, aut vrina purulenta exclusione.

29 Impeditur enim actio, per quam est vita.

30 Vt maiorem attrahendi vim habeant vacue fuga.

Hiante ore lingua deprimatur: culter ligneus acutus indatur in guttur, vt tumor disrumpatur. Tum prono capite sanies repurgetur. Vbi in faucibus manifestus tumor est, vellicandus est vnguib; aut ferro aperiendus.

Alij 31 spongiæ partem ad magnitudinem a- 31 Nonnulli  
uellanæ suspendunt è filo, & ita ab ægro deuora- etiam panis  
ri iubent. Intumescit spongia, atque dum vi re- crustâ deuorandam præ-  
trahitur, tumorem rumpit. Hoc alij bolo carnis bent.  
falsæ semicoctæ ita suspenso & deuorato, tum vi retracto, molliuntur. Alioqui scarificandus locus est sub maxillis, sub mento, in collo, vitatis semper neruis & arteriis. Sic enim aliquando sanies effluit. Alioqui cucurbitulæ scarificatis locis apponendæ sunt.

Enido hyrundinis in aqua decocto, aut oleo communi, vel chamæmelino emplastrum faciunt, quod inducunt collo. Alij è stercore humano recenti. Quidam, quod tolerabilius est, è lana succida, insuccata in oleo communi, oleo liliorum, chamæmeli, aut simili, quorum consilium est, vt foras materiam euocent.

#### EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Anginæ species quatuor à Paulo constituuntur, quibus Paol. Ag.  
quintam etiam recentiores addiderunt. Omnibus commu- cap. 27. lib. 3  
nis est inflammatio aliquando cum tumore, deglutiendi dif- fiatim in ini-  
ficultas, impedita respiratio, dolor circa laryngem & œso- tio.  
phagum. Differunt parte affecta. Fiunt enim in musculis vel Anginis o-  
colli, vel gutturi, vel vix. *σωάγχι* in musculis pharyngis: mnibus quid  
*παρασωάγχι* in musculis faucium externi: *χωάγχι* in muscu- communi  
lis internis laryngis: *παρασωάγχι*, in externis. Quinta fit luxa.



## DE MORB. INTERNIS

tis vertebrae ad anteriora. In qua locus cauus apparet cum dolore, musculorum circumiacentium tumor, respiratio difficilis, hiatus oris, lingua exerta, & à sua radice mota, solaque ventribus *Κυνάχη* dicebatur, ut scribit Aëtius. Periculosissima omnium, & quæ eodem die iugulat, si neque in faucibus, neque in ceruice tumor aut rubor apparet, si dolor vehemens, violenta inspiratio, cibi & potus refluxus per nares, & similia ab Hippocrate scripta in Prognosticis. Distinguitur à peripneumonia & pleuritide, quia dolor in gutture maximus cum angustia, nullus in thorace. Vbi pulsus magnus & vndosus, peripneumonia: durus & tensus, conuulsio metuenda est. Imminente suffocatione paucus & rarus: agentibus animum, creber & inæqualis apparet. Cuidam in musculis dextræ partis laryngis cum orta esset inflammatio, neque appareret, sed tactu duntaxat externo dolorem præ se ferret, mors subita tribus horis à missione sanguinis consequuta est. Alius iussit sibi gurgulionis finem amputari absente Medico, cum inde suffocaretur, & seruatus est. Quod mirum certè videri non debet. Nam & Antonius Beniuenius medicus eruditissimus de Nicolao Rota angina laborante idem fermè commemorat. Hic cum opportunis præsidii nihil leuatus esset, & arescente corpore, pallente facie, ac vertentibus oculis spes salutis adempta foret omnis, ne æger Deo & naturæ incuratus dimitteretur, ad insolitum, utile tamen, auxilium visum est confugere. Locum iussit altioribus plagis sub ipsis maxillis acetiam supra collum scarificari: ex quo cum sanies multa prorupisset, adeò morbus sedatus est, ut faucibus ipsis spiritum simul & cibum captantibus, facilis dein ad bonam valetudinem ægro ipsi data sit regressio. Post febrem repentinè inuadens, & non apparens, lethalis. Si ad pulmonem conuertitur, septem diebus interimit.

Remedia sunt sanguinis missio è cephalica dextra, repellentia intrò sumpta, gargarismata, sectio venarum sub lingua, clysteres ad reuulsionem, inunctiones, vnguenta, syrapi, potiones, lohot. Mulier quædam superstitione butyrum mense Maio asseruabat, & colligebat tribus diebus rogationum, viris è lacte vaccæ, quæ marem peperisset, mulieribus, quæ foeminam. Vrgente malo inungebat collo, ceruici partibus vicinis, carpo plurimum fricando. Atque hac ratione non pau-

*Hipp. aph.  
10. lib. 5.*

cos sanitati restituit. Datur diacodion, vbi somnus conciliandus, & tenuis fluxio. Vbi educendum, magis cum melle. Potest addi glycyrrhiza, interdum fapa, & mel.

## ANTO. VALETII EXERCIT. XXIII.

$\Sigma$ υνανχῆ affectio Latinis angina dicta, musculo- *Gal. lib. 13.*  
rum gutturis interiorum, seu faucium est in- *Meth.*  
flammatiō, in qua nullo existente in thorace, vel  
pulmone vitio, difficilis redditur spiratio. Anginæ  
species ex differentiis symptomatum, partium la-  
borantium natura, causæ duplicis distinctione, pe-  
riculo maiori aut minori petitas, videre est apud  
Hippocratem sent. 16. 17. & sequentibus lib. 3. Pro-  
gnostic. & apud Gal. cap. 4. lib. 4. de loc. mal. affect.  
& comment. in aph. 34. lib. 4.

Acutissimus est hic morbus, primo, secundo,  
tertio interdum die iugulans, ob interceptam res- *Angine*  
pirationē. Quocirca quum primū respirationis & *curatio.*  
deglutitionis difficultas obrepit, venæ sectio in cu-  
bito, subducta prius blando clystere aluo, præsentan- *Paul. Aig.*  
neum est remedium. Verū sanguis non subito ac *cap. 27. li. 3.*  
semel, sed pluribus interpositis vicibus, euacuan-  
dus: ne cumulata, semelque facta vacuatione, ani-  
ma ægro deficiente, suffocationis periculum super-  
ueniat, dum materia in affectam partem collectim  
prorumpit. Altero à venæ sectione die lenis purga-  
tio exhibeatur: quam si sumere æger nequierit, a-  
crior clyster iniicietur. Mox, fluxio si penitus consti-  
terit, vena sub lingua pertundatur.

Quinetiā in ipso anginæ principio, vt & inflam-  
mationum reliquarum, indicatur affluentis humo-

## DE MORB. INTERNIS

ris repulſio. Hæc perficitur repellentibus, non foris adhibitis, ſi quidem materia intrò regerenda non eſt, ſed ore tantum contentis gargarifmis, quales ab Hollerio parantur multi. Hic omnium inſtar eſſe poterit.

℥. agrim. & plantagin. ana M. i. granor. berber. cortic. mal. granat. ſemin. acetof. & porrulac. ana ꝓ. 2. roſ. rub. hord. integr. ana ꝓ. i. paſſularum non mundatar. ꝓ. ꝓ. f. decoct. & colatura ad ꝑb. i. In qua diſſol. diamor. dianuc. & ſucci granat. ana ꝓ. i. ꝓ.

Huius partem ore continebit æger ad leuiorem gargarizatum. Vehementior enim partes affectas mouet, quibus incaleſcentibus augetur fluxio.

Vigente, aut inclinante morbo & larýngi impactam materiam concòquere, & diſſipare oportebit. Itaque ad gargarifmũ parabitur decoctum ex maturantibus & diſcutientibus, vt ex beton. hyſſop. origan. floribus chamæm. melilot. ſeminib. lini, fœnugr. cum glycyrrhiz. & paſſul. mund. in quo diſſoluetur mellis roſacei, aut ſyr. roſ. quantitas proportioni decocti reſpondens. Extrinſecus verò eiufmodi applicabitur cataplaſma.

℥. ſem. lini, fœnugr. ana ꝓ. ꝓ. coq. in hydromelite: adde ol. amygdal. dulc. & dialthææ. q. ſ. cataplaſma.

Fit etiam emplaſtrum è medulla caſſiæ cum oleo communi, vel chamæm. adiecta portione dialthææ, vel emplaſtri de mucaginibus vel de meliloto. Vel denique uſui erit topicum ex ſterc. canino albo medicamentum Muſæ, quo fortius nullum nouiſſe ſe, neque in angina, neque in magna tonſillarum inflammatione, aut iis, quibus ex glandulis ſuffocationis periculum immineret, Galenus ingenuè profeſſus eſt.

*Gal. part. 4.  
cap. 2. lib. 6.  
de cõpoſ. pha.  
καὶ τὸ πρῶτον.  
& cap. 19.  
lib. 10. de  
ſimpl. medic.  
facult.*

**T**ussis causa sola 2 intemperies, partium 3 cō-  
sensus, vt lumbricis, vel humore acri, stoma-  
chum infestantibus, & quod sæpè fit, à cerebro de-  
fluxio, aliàs calida, aliàs frigida, tum etiam humor  
in pulmonibus conceptus, aliàs crassus, aliàs tenuis,  
interim viscidus, nonnūquam etiam asperitas 4  
arteriæ. Vt rectè cures, causa cognoscenda est.

Intemperies 5 frigida, quod sæpè fit, hÿeme 6  
rigente, domicilium calidum, animæ retentio vi-  
ni 7 dulcis & calidi potus, partium pectoralium  
munitio ex linteis calentibus, 8 pedum calor &  
capitis, sufficienti remedio esse possunt.

Defluxio tenuis, maximè si copiosior est, reti-  
nenda est incrassantibus: multò magis, si acris est.  
Id quod intelliges ex oculorum & faciei rubore,  
titillatione, aut etiam mordicatione oris interio-  
ris, sapore, vrinis multùm coloratis, tum etiam an-  
tecedentibus causis. Hæc enim tussis, etiam si initio  
levis est, 9 tabem denuntiat.

Itaque statim initio medicamenti vtendum est,  
quæ inspissent & obtundant materiã. Conueniunt  
itaque aqua hordei, syrupus violatus, de papauere,  
mucag. psilij, se. cydoniorum, decoctum papau-  
rum, adiecta sapa, vt & somnum cōcilies, & fluxio-  
nem incrassatam cohibeas, nec attenues. Melitismis

gnum est tussis leuiter irritans, quæ tacendo cesset, fiatque à spiritu, non à maligna  
distillatione. 6 Tempestas præsertim Aquilonia repenti oborta. 7 Ex  
lib. 3. de diata in morb. acut. 8 Num venarum, quæ ad pedes ferantur, continui-  
tate calor superiores petit partes.

9 Quæcumque enim distillationes à capite tussiculosos & raucos homines red-  
dunt, nisi tempore conquiesuerint, alteram faciunt tabi differentiam.

1 Ex suffla-  
tione vehemē-  
tissima, qua  
spiritus mul-  
tus celeritinē  
foras erum-  
pit, ad exclu-  
sionem mate-  
ria, quæ pul-  
mones lacef-  
sit, & vias  
intercipit.  
2 Frigida  
salicet. Gal.  
cōment. I. in  
libr. I. Epid.  
sentent. 12.  
3 Vt hepatis  
& vetricu-  
li: vel etiam  
aliarum af-  
fectionū me-  
tastasis Et  
trāslatio sym-  
ptomática, vt  
in pleuritide,  
& hydrope.  
4 Quæ sic-  
ce tussis cau-  
sa vna exi-  
sit.

5 Cuius fr-

# DE MORB. INTERNIS

plurimum vtuntur Medici in tussi, quibus tamen abstinendum est, vbi fluxio est tenuis. Mel enim attenuat. Sed loco mellis vti oportet vocato melle passulato, ficato, quod syræum nonnulli vocant, succo glycyrrhizæ, aut prunorum. Hæc autem ita comparabis. Passulas, ficus, pruna, iuiubas, sebesten, horum aliquot in aqua coques ad putrilaginem: tum vehementi expressione percolabis, & iterum coques ad mellis crassitudinem.

Hic etiam vtimur mucagine gummi tragacanthi, gummi arabici extracta in aqua rosarum, & incorporata in aliquo succorum prædictorum. Vt gratia exempli.

10 Item ad  
sistendum fe-  
runt catur-  
rum hoc po-  
terit comode  
prescribi  
syrup. ros. de  
siccis cū qu-  
drupla infu-  
si nerof. 3. s.  
pul. de cyno-  
glossæ gra. 4.  
aut 5. excipia-  
tur cochleare  
vniū ante ho-  
ram somni.  
11 Vena se-  
ctio Et ad ca-  
tharræ gene-  
rationē pro-  
hibendam, &  
ad fluēcu ma-  
terię auersio-  
nem confert.

℥. mucag. gummi tragacanthi extractæ in aqua rosarum 3. 6. incorporentur in mellis passulati, succi glycyrrhizæ, aut similis 3. i. s. Quod si vigilæ vrgent, & dolor maior est, misce pilularum de cynoglossæ 3. 2. & affunde aliquid syrupi de papaue- re, violati, aut rosati. Finge pilulas pondo vnus scrupuli, quas contineat 10 in ore. Atque vbi maior fluxio est, secta 11 cephalica diuertenda erit. Deinde etiam purgatione è cassia fistula, manna, aut penidiis admixtis. Vt.

℥. cassiæ 3. i. penidiorū 3. 6. dissoluantur in aqua hordei, passularum decocto, aut glycyrrhizæ. Sæpè vtendum est hordeato cum saccharo violato. Partes quoq; colli & thoracis, si incaluerint, illinendæ. ℥. ol. viol. 3. 2. mucag. sem. psilij extractæ in aqua vngulæ caballinæ 3. i. cetæ lotæ in aqua viol. quantum suff. fiat linimentum.

Nimis vrgente malo, cauteriis etiā vtendum est, cū in syncipite, tum etiam in ceruice & scapulis.

Multa

Multa reperenda ex capite de Catarrho.

In materia frigida neque phlebotomia, neque purgatione utendum est, nisi corpus 12 admodum plenum sit, tuncque cassia, addita terebinthina, ut sint cassiæ drach. 6. terebinthinæ drach. 3. fiat bolus cum saccharo, vel dissoluentur in ficuum decocto, vel simili.

Possimus quoque uti 13 agarico, inde pilulis formatis cum rhab. cum pul. hieræ picræ, hieræ dialoc. cum elephang. pil. aut etiam fortioribus.

Sed melius fuerit uti prius 14 melicato, in quo vel hyssopum, vel thymum, vel marrubium, aut aliquid tale incoxeris. Alioqui uti 15 syrupo capil. ven. de hyssopo, de marrubio, & similibus. Iam purgato corpore incidendum, detergendum, siccandum. Sed in desiccantibus cautio est, ut ne nimium calfaciant, qualia sunt acria, diuretica, inimicissima 16 expuitionibus è thorace. Nec statim initio utendum est, maximè si materia crassa, aut viscida est. Præterea utimur semine apij, vrticæ, nasturtij, scyllæ, erisimi, raphani, fœniculi, & torrefiunt, atque in puluerem rediguntur: tum horum 3. 2. commiscen-  
tur 3. 6. mellis despumati.

Laudant, ut per interualla bis aut ter in hebdomada mythridatium aut theriaca ad magnitudinē auellanæ ex vino albo exhibeatur.

Ambarum ex cōuenienti decocto datum, v tpo-  
te passul. mund. aut simil. tussis à tenaciore materia inueteratæ præstantissimum erit remedium.

16 Itaque hic poterit syrupus præscribi ℞. pruna damasc. & iunib. ana num. 14. passul. mund. 3. 1. B. ficus ping. dactylos ana num. num. 3. bechq. scabiose, m. M. B. hyssop. 1. glycyrrhizæ ras. 3. 6. f. decocto, in colatura ad lb. 1. dissolu. sac-

12 Et ea caco-  
chymia ple-  
thora per op-  
pressionē dia-  
phragmatis,  
atque pulmo-  
num, morbo  
augeat.

13 Ut, ℞. aga-  
rici troch.  
rhei electi,  
hieræ picræ,  
an. 3. i. mala  
æntur aqua  
hyssopi infu-  
sionis agarici  
f. pilule.

14 Ut, ℞. hyssop. orig. ana  
M. B. coqua-  
tur in tribus  
lib. aque fon-  
tanæ: in cola-  
tura ad lib. 2.  
dissolue mel-  
lis 3. 3. f. meli-  
cratum.

15 Vel ℞.  
oxymel. sim-  
plic. syrup.  
capill. ven. Et  
de hyssop. an.  
3. 1. dissolue  
in decoct pas-  
sularum &  
glycyrrhizæ,  
f. iulepus.

## DE MORB. INTERNIS

*char. albiss.  
quart. 3. ele-  
ctarij diati-  
reos sim-  
plicia 3. 2.  
vel 3. 3. f. syr.  
17 Ne faciāt  
homines pneu-  
maticos.*

Animaduertendum quoque hoc loco liquidioribus potius vtendum esse, quàm crassis & solidis medicamentis, vbi repurgandi consilium est. Contra verò solidis, vbi coquendum. Deinde etiam non vtendum esse viscosis, nisi habeant 17 aliquid detersionis, vbi exasperata arteria est. Conueniunt viscosa sine mordicatione, quale est tragacanthum, gummi arabicum, oui luteum forbile, butyrū, mucago sem. Cidoniorum, lac per se, mel passulatum, succus iuiubarum, ficuum, dactylorum veterum, nō recentium (recentes enim exasperant) hordeatum, lac amygdal. dulcium, penidia, saccharum violarum, alphenia ex dulci oleo, medulla Articaulis vulgò dicti cum butyro, pineol. amygdal. cum butyr. Vbi coquendum est, aliquid croci, thuris, myrrhæ, & eorum quæ leniunt, medicamentis adiiciendum est, vt semen irionis, vrticæ. Detergent mel & saccharum. Desiccant aromata, sed non nisi liquore aliquo diluta, imperanda sunt.

Plura remedia capite de asthmate & pleuritide.

Suffumigia initio quidem, si modica fluxio est, nec est capitis plenitudo. In fine verò, roborando capiti & thoraci.

*18 Praesertim  
rubrorum: in  
quo saccharū  
sit dissolutū.*

Senes tussiculosi, ex 3. de victus ratione in morbis acutis, potu vini dulcis tepido, butyro recenti, addito saccharo, dulcoramentis, condimētis, atque interim decocto 18 caulium, leuibúsque remediis curandi sunt.

Narcoticis aliquando vtimur, vbi tussis molestior est, & perpetuæ ferè vigiliæ. Illicitur ergò syrupo de papauere cum decocto palmularum, aut pilula de cynoglossa, pondere scrupuli semissis. Aut his.

℥. spicæ celticæ ℥. i. cinamomi ℥. 2. croci gr. 8. castorei gr. 6. opij in sapa macerati gr. 4. Omnia excipiantur melle, fiantque parvæ pilulæ pondo ℥. i. teneat in ore.

Tutior est usus narcoticorum iam purgato corpore, & thorace non ita pleno. Vehementer commendant syrupum myrtillorum sedandæ tussi. Calidæ quidem, cum iulepo rosato: frigidæ, cum decocto passularum aromatizato modica spica.

Adhæc voci læsæ à frigido diaireos Salomonis: à calido diapenidion & diatragacanthum frigidum cum syrupo violaceo vtiliter accommodatur.

Optimum contra tussim siccam, exasperatam arteriam, & raucedinem istud est electarium.

℥. penidiarū, succi glycyrrhiz. ana ℥. i. amygdal. purgatar. nucleor. pini. passul. enucleat. tragacanth. ana ℥. i. rhodomel. q. s. f. electar. Datur ad ℥. 3.

Comparatur etiam antidotum, quod ad tussim ita confert, ut vnica portione liberet ægrotantem. Quale est. ℥. castorei, ana ℥. 4. succi baccar. laurī, cinamom. spicæ, succi mandragoræ, cardamomi ana ℥. 2. croci, cassiæ lign. dauc. ana ℥. i. ss. costi, myrrhæ, galbani, piperis alb. ana ℥. i. mellis q. s. Dato ad magnitudinem castaneæ cum tepida. Idem pleuriticis & empyicos maximè iuuat.

Diapente asthmaticis, tussientibus, & omnibus affectionibus pectoris & pulmonis instituitur.

℥. styrac. optim. bdellij, tragacanthæ, galbani, opij ana ℥. 6. olei nardini q. s. detur in modum anelanae. Sed & ad siccam tussim sequens formula multum proderit.

℥. radic. pulegij ℥. i. apij virid. M. r. infundan



## DE MORB. INTERNIS

tur hor. 24: in mellis optim. ℥. i. aceti ℥. ss. coquantur lento igne ad crassitudinem: dein linteolo transfundes. Dabis cochlear vnum, vel duo, per se, vel cum decocto passul. mundatar. Idem è decocto fœnugr. sæpiùs loti, & reiecta aqua, addito melle subquadruplo, vel inde facto syrupo.

### EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Ut in sternutatione cerebrum, in vomitu ventriculus quod noxium est, concitato quodam naturæ impetu expellere conantur, ita in tussi, partes thoracis simul insurgunt, concutunturque muscoli, ut vel quæ carni suæ molesta sunt, in pulmonum arterias expellant: vel quæ in aspera arteria præter naturam continentur, foras eiiciant, non per contractionem, sed confertim emisso per eius interiores ductus plurimo spiritu, haud secus ac si quis, quæ in fistulæ cavitæ hærent, afflatione vehementi expurgare velit. Causa est, vel humor, vel corpusculum aliquod, vel inæqualitas ab intemperie liberum spirituum exitum prohibens, vel compressio diaphragmatis à tumore. Humor est aliquando viscidus & lentus, siue sit infarctus pulmonibus, meatus expirationis & inspirationis opplens: siue defluat à capite in asperam arteriam, ut in catarrho, pituita: siue è thorace educatur. Aliquando verò tenuis defluxio substantiæ, quæ cum à spiritu comprehendi non possit, sæpiùs repetitur tussis, ut quum serosa humiditas in hydropè, & tenuis quædam materia, aut sanies in pulmonum inflammatione (præsertim in principio) vel pleuritide, vel tabe resudat in asperam arteriam. Potest in meatu illius panis aut potus portiuncula, aliqua illapsa contineri, vel tuberculum, vel vlcus, vel cum defluxio diutius restiterit, in pulmonibus crassior reddi, & quasi lapidescere, ut, expurgari non possit, vel, ut in gibbosis, tuberculum in spina, quod si non ita durum sit, aliquid desudet in arteriam. Potest nasci, materia è cerebro in spinam delapsa per tussim, aut inde augeri. Intemperies vel frigida est, quæ sola interdum, si levis fuerit, spiritus cohibitione, ore & naribus clausis supprimitur: vel

*Tussis quæ excitetur.*

*Tussis causæ multiplex.*

*Gal. cōment. 2. in libr. 6. Epidem. sentent. 24.*

ficca, vt in hecticis, aut cum columella exesa est, vel diuisa. Opprimitur diaphragma tumore, vt hepatis, in eiusdem inflammatione, quam sequitur tussicula, vel tussis sicca: quæ in scirrho non ita apparet, fortasse quia nulla fit refudatio. Cognoscitur tensione ac duritie hypochondriorum, & signis excrementis.

Tollenda causa per contraria. Remedia sunt, sputum pro-uocantia, inspissantia, attenuantia, detergentia, pilulæ, sy-rupi, lohot, vel eclegmata, bechica, tabellæ, trochisci, narco-tica, suffumigia. Sed in his, quæ sistendis fluxionibus è ca-pite in asperam arteriam & stomachum imperantur, videndum ne tam naribus hauriantur, quàm ore. Non enim viam natu-ralem, qua diuertere debent, præcludere oportet, aut adstrin-gere: sed quâ descendunt, per palatum nimirum, nisi maior noxa suppressa, quàm procedente materia metuatur.

## ANTO. VALETII EXERCIT. XXIIII

**F**Erinas è capite in pectus & pulmones destilla-tiones sæpe sequitur tussis, nonnunquam ali-  
quam intemperiem. Calidam quidem, vt in feбри-  
bus: frigidam, vt Aquilonia tempestate, eaque ma-  
gis est sicca. Aliis quoque morbis, quibus concidit,  
tussis symptoma efficitur, vt pleuritidi, hepatidi,  
tabi. Si à simplici sit intemperie, faciliè suo contra-  
rio oppugnatur.

*Paul. Æg.  
cap. 28. li. 3.*

Si coniunctam habeat materiam, vti frequentius  
habet, ea fluere parata conuenienter apparabitur:  
crassa & frigida tenuantibus: incidentibus & ter-  
gentibus lenta: calida frigidis atque incrassantibus:  
mox purgabitur, vt in capite de catarrho. Quibus  
autem præsidiiis concepta pulmonibus materia ex-  
pui facilis reddi possit, in pleuritide dicetur.

*Tussis cura-  
tio.*

# DE MORB. INTERNIS

De 1 Asthmate. -CAP. 25.

1 Pathemate  
primigenio  
febru exper-  
te, nō sympto-  
mate aut à  
pulmonu tu-  
berculo aut e-  
tiam à labefa-  
stata vi mo-  
trice in cere-  
bro Et ceruica

libus nervis  
2 Adest enim  
sūma spirādi  
difficultas,  
vt non nisi e-  
recto corpore  
spirent.

3 Quæ vel io-  
cale in cere-  
bro habuit  
generationē  
vel è cerebro  
defluxit.

4 Quibus  
aer recipitur  
& fuligo ex-  
cluditur.

5 Propter pulmonum compressionem. 6 Non enim senes firma habent latera ad  
materiam, cuius sit causa ipsius, exclusionē: quia cerebro sunt humidiorē, excrementis  
sicciore temperamento, & pulmones in his infirmiore calore languent. 7 Quod vene-  
nata metallorum aura pulmones & vim cerebri motricem, atque cervicalium nervo-  
rum resoluat. 8 Ad vitandum rheumatismum. 9 Vt foco luculento, aere tenui, non  
caliginoso. 10 Ad mundificandā materiā frigidā, quæ contumaciter bronchiis  
pulmonū adhærescit. 11 Vt si sedo cubet nō iaceat. 12 Quæ deducitur altera pars cibi  
assueti, simplici & euclymi. 11 Neque crassi, neque assueti: nam tale meatus inter-  
cipit. 14 Id enim pulmones recreabit male affectos, alas pulmonum explicabit, ma-  
teriāque preparabit. 15 Modo biliosus non sit & sitibundus. 16 Cuiusmodi ex  
lutro, medulla, sapa. 17 Vt inscula ex hyssop. thymo, satureis.

**A**sthma, 2 suspiriū Latinis, à pituita 3 crassa &  
viscida, inclusa 4 bronchiis pulmonis. Vnde  
anhelitus molestissimus, magisque 5 iacentibus  
quàm sedentibus. Affectus 6 senibus familiaris,  
& iis, qui metalla, 7 hydrargirum, & arthenicum  
& alia eiusmodi tractant. Hyeme magis, etiam  
extrema, & phlegmatica conditione excitari solet.

*Curatio.*

8 Superiore cœnaculo, loco 9 lucido, & calore  
10 plusquam temperato, altioribus, 11 mollibusque  
stragulis, capite & thorace subleuato, multo etiam  
magis, cū dormiunt, collocare oportet.

Frugalis 12 vita, potus 13 vini tenuis, & veteris 14  
dulciusculi, mellita 15 alimenta, vel condita 16 iis re-  
bus, quæ leniunt, incidunt, 17 tergent citra manife-  
stum calorem. Iam liberalior potus esse debet, cum  
repurgandi consilium est. Omnino abstinendum  
frigidis, adstringentibus, minusque calfacientibus.

Vitanda asthmaticis, ex comm. 3 lib. 6. Epid. acia,  
vt allium: dyspepta, vt bubula, ouilla, suilla, om-  
nis denique cacochoymia, vt & ea, quæ tensio-  
nem facere sunt nata, qualia flatuosa. Nec minùs

fugiendæ animi perturbationes, motus vehemens, clamor, ira, & similia. Phlebotomia concedi potest ætatibus mediis, si nihil est in scopis vniuersalibus mittendi sanguinis, quod repugnet.

Si vehemens malum est, si suppressi menses, aut hæmorrhoides: alioqui inedia, aut vita parcissima aliquot diebus imperanda est, & clysterum frequens vsus vtilissimus. Leuiter mollienda aluus est.

Materia in thorace concepta, incidenda, abstergenda, 18 diluenda, repurganda tum pharmacis catharticis, tum iis, quæ sputa ducunt. 19 Materiâ repurgata, desiccantibus vtendum est. Roborandæ sunt partes. Peregrinatio, nauigatio 20 in mari, ventatio è curru, aer maritimus, alia quoq. eiusmodi, quæ calfaciunt & siccant, sunt præcipienda. Clysteres primùm molles sint, ex remollientium decocto cum cassiæ ʒ. 6. in ea dissolutis. Aliqua verò ex parte præparata & purgata materiâ dissoluemus semunciam diaphænici, ʒ. 3. hieræ diacolocynt. ʒ. 6. benedictæ, in pectorali decoctione.

Leuiter aluum remolles ʒ. i. cassiæ, & ʒ. β. penidiorum, dissolutis in hac decoctione.

℥. glycyrrhiæ, passul. enucleatarum ana ʒ. 3. iubarum, sebesten, ana N. 6. florum anthos & borraginis ana P. i. spicæ ʒ. i. fiat decoct. In col. dissol. & c. vt cassiæ, penidiorum, & cæt. Laudatur melicratum hoc modo paratum.

℥. fœnugræci M. i. hyssopi P. 2. ficus N. 6. Fiat decoctio ad ℔. β. In col. dissolue mellis crudi ʒ. 4. Parari quoque poterit syrupus ex succo radicum enulæ camp. hyssop. aq. vngu. caballinæ, & scabiosæ, di sunt homines tibi obnoxij) perniciosus perhibetur.

18 *Vt ex facili expectetur.*

19 *Ad hanc conferet oxymel simplex*

*Gal. vel hyssopo cõditum melicratum,*

*syrupus de hyssopo, de præstio, syrup. capil. verner. violac.*

*vt ℥. syrup. violac de hyssopo oxymel.*

*simpl. an. ʒ. i. Misceantur.*

*Vtatur loco lohot.*

20 *Vt sine spirandi difficultate moueatur corpus. Vide tamen ne tabidus sit aeger.*

*Nauigatio enim romi inducit, quæ*

*πνευμάδες, (id est, ei, cui extant atque*

*eminent siapula retrorsum in medi*

*alarū excor-*

*nes, cuiusmo-*

## DE MORB. INTERNIS

vel ex herbarum succo extracto, aquis additis, & melle albo.

Laudatur quoque ius galli decrepiti, tum quia morbo conuenit, tum etiam quia ventrem leuiter subducit.

Oribasius hoc modo incoquit. Gallum rufum & decrepitum infarcit sale: tum incoquit cum porro, anetho multo, & oleo. Loco olei, butyro vtitor, aut oleo pingui. Potest & concoqui cum polypodio, semine carthami, cumino, aniso, hyssopo, thymo, satureia, & aliis eiusmodi. Decoctio quoq; poterit dulcari melle albo, aut saccharo. Per interualla quoque fortioribus purgationibus vtendum est, vt pil. factis ex pul. hieræ picræ, & agarici trochisc. ana ℥. 2. aut pilulis elephanginis, mastichinis, de hiera, assaieret, cocciis, & similibus. Massa earū pilularum ℥. 2. cum 2. ℥. agarici. Ex oxymelite scyllitico formantur in pilulas.

Pulueris quoque hieræ diacol. ℥. 2. agarici trochiscati 3. β. coniungitur ex syrupo de hyssopo. Alioqui.

℥. catholici 3. 6. diaphœ. 3. 2. cum infusione ℥. 2. agarici, modico spicæ, & hydromelite sufficienti fiat potus.

Iam bene purgato corpore, thorax repurgandus est, cui rei materia conuenit ex lenientibus, incidentibus, detergentibus, postremò etiam ficcantibus. In viscida enim materia & crassa tenuare & adstringere, in tumoribus tenuia ficare expedit.

Passulæ, ficus, sebesten, iuiubæ, glycyrrhiza, penidia, saccharum, Alphenia, semen althææ, lini, & similia leniunt.

Incidunt verò & tergēt aristolochiæ radix, gentianæ, enulæ, centaurij, semen melanthij, scyllæ, irionis, vrticæ, bombacis, origanum, thymum, satireia, calamethum, pulegium, brassica, absynthium, abrotonum, hyssopus, allium, porrum, piper, castoreum, gutta ammoniaca, serapinum, & à proprietate, aselli, vermes serici, pulmo vulpis & erinacij, stercus lacertæ, vermes subiecti vrticis, interiora oculi Philomelæ cremata, & in puluerem redacta, guaiacum quoque, siue lignum sanctum manifesta ratione hîc conuenit.

Desiccant sulphur viuum, & arrhenicum rubrum.

His autem sic vti oportet. Nam è radicibus, herbis, seminibus decoctis melicratum parari debet: deinde reliquorum, quæ à pròprietate iuuant, in puluerem redactorum  $\mathfrak{z}$ . 2. plus, minúsve, melicrati vnciæ inspergi debent.

Alioqui ex aliis succus expressus melli commiscetur, aut horum puluerum  $\mathfrak{z}$ . 2. mellis  $\mathfrak{z}$ . 2. commiscentur, quale hoc erit.

$\mathcal{L}$ . hyssopi  $\mathcal{M}$ . i. ficus 6. fiat decoctio ad lb.  $\beta$ . in qua dissol. mellis  $\mathfrak{z}$ . 3. aut 4. aut 2. fiat melicratum, cui insperge pulueris facti è pulmone vulpis  $\mathfrak{z}$ . 3. pro duabus dosibus. Aliud.

$\mathcal{L}$ . pul. gentianæ, enulæ, aliptæ moschatæ, diaireos  $\mathfrak{z}$ . 2. mellis quantum sufficit.

Optimum est vti melle scyllitico per se, vt cum decoctione pectorali, melicrato hyssopi, aut simili.

Per interualla quoque theriacæ aut mythridatij  $\mathfrak{z}$ . i. per se aut cum modico aquæ scabiosæ, vngulæ caballinæ, vino albo tenui, veteri, plurimùm

# DE MORB. INTERNIS

conuenit.

℥.styracis pinguis, terebinthinæ ana ℥.4. spicæ  
 ℥. 1. cum melle despumato fiat electarium. Sed in-  
 terim dum hæc fiunt, thorax fricandus est, atque in-  
 ungendus oleo amygdalarum dulcium, chamæme-  
 lino, anethino, de keiri, iasmino, de lilio, laurino, iri-  
 no, costino, de spica, ordine ducto à leuioribus. Aut  
 poterit ex his linimentum fieri cum æquali parte  
 mucaginis seminis lini, althææ, fœnugræci & ceræ  
 quantum sufficit. Gratia exempli.

℥. ol. iasmini ℥. 1. β. mucag. seminis althææ ℥. 1.  
 mucag. seminis fœnugr. extractæ in aqua scabiosæ  
 ℥. β. cum cær. quantitati. sufficient, Fiat linimentum  
 pro thorace. Post vnctionem lana molli, gossipio,  
 aut lana sordida thorax contegendus est.

In periculo suffocationis, & nimis oppresso spi-  
 ritu, cucurbitulæ scapulis affigendæ & cruribus.  
 Dandæque, vt ore contineat, aquæ hordei ℥. 3. sac-  
 chari ℥. 1. croci Gr. 4.

℥. oxymelitis ℥. 2. salis ammoniaci ℥. 1. croci Gr. 3.

℥. salis ammoniaci, sem. nasturtij, pulmonis vul-  
 pis an. ℥. 1. croci Gr. 4. dissol. in iulepi violati ℥. 4.  
 pro duabus dosibus.

Tumq. frictiones & vincula extremitatum con-  
 ueniunt, & ea, quæ in angina iam dicta sunt.

Desiccandum iam bene purgato corpore &  
 thorace hoc modo.

℥.styracis, mastichis, terebinthinæ, arthenici rubri  
 ana ℥. 4. incorporentur in vitello oui. Deinde cum  
 hoc medicamēto frustula ligni iuniperi illinantur:  
 postea siccantur: ex siccatis fiat suffumigium, quod  
 per tubulum ore excipiat. Similiter fiat ex sulphu-

ris viui & arrhenici rubri pari pondere.

In debilioribus arrhenico abstinendum est, vtémurque solo sulphure incorporato in terebinthina, styrace, mastiche.

Iam bene procedente morbo, cucurbitulis sub mammis, sed breui mora vtendum est, vt tantum attrahant, non etiam discutiant.

Similiter Dropaces, Sinapismi, Phœnigmi, exulcerantia, thoraci aptanda sunt.

Extremum est, cauterium in medio pectore. Crudelius est auxilium vstionis, quod ab Aëtio describitur, cap. 57. Sermonis quart. Tetrabibl. 2.

In vigiliis dabis ʒ. β. philonij, quod etiam anhelitum iuuabit.

In siti vehementi, aquâ hordei, cum saccharo, vtendum item iulepo violato, glycyrrhizæ succo, sed ore contineatur tantum, non etiam deglutatur.

Adhæc in abscessu triticea farina in mariubij decocto coquitur, & inde pectus fouetur salutari asthmatici auxilio. Et illud quoque parabitur.

℥. scabiosæ M. i. iuiubar. ficuum, dactyl. ana n. 6. glycyrrhiz. ʒ. 2. bull. in aqu. s. in colatura dissolue mell. optimi ʒ. 2. penidiar. ʒ. 1. oxymelit. simpl. ʒ. 1. s.

℥. diaireos Salomonis ʒ. 2. incorporentur in ʒ. 2. butyr. loti cum aqua scabios. cardui, &c.

#### EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Asthma, difficultas respirationis, qualis iis, qui diu cucurrerunt. Ex quo ἀσθμαίνω, anhelare, quod à cursu, & vehementi exercitio commouetur.

Angustia quoque fit peripneumonicis, suppuratis & Pleuriticis, sed cum febre. Hæc autem eam spirandi difficultatē, quæ

*Alexand.*

*Trall. cap. 4.*

*lib. 5.*



## DE MORBIS INTERNIS

cum respiratione densa, & sine febre est, intelligimus. Cuius causa licet in multis præsens semper adsit, grauius tamen spirant commota materiâ, vt & in pleuritide. Duo habet perpetua symptomata, & signa, quibus facîle ab omnibus vel solo intuitu internosci potest: angustiam seu arctationem partium thoracis, quam ægri sensu manifesto deprehendunt.

*Ὠπρόπνοισιν*, id est, rectam spirationem, quod ægri non nisi recta ceruice spirare queant. Cum enim aspera arteria à gutture in pulmonem porrecta, ibi scindatur in multas propagines, per quas spiritus diffluit, si thorax cum collo curuetur, meatus comprimi necesse est, ac spiritum magis intercipi, vnde capite & thorace subleuato stare coguntur.

*Asthmatis cause due vulgo statuuntur.*  
Causam duplicem quidam constituunt, crassum & viscosum humorem, non in leuibus, sed asperis arteriis, quæ sunt respirationis instrumenta: vnde obstructio sufficientem efflationem & inspirationem prohibēs, quæ facit vt parua sit, densa, & velox respiratio. Velocitate enim, & densitate compensare nititur natura, quod deest ad refrigerationem cordis, aut excrementorum fuliginosorum excretionem, ob paucitatem aëris ingredientis, & expirationis. Altera causa est tuberculum aliquod crudum in pulmonibus genitum. Causam tamen huius symptomatis, siue morbum ipsum, non semper in fistulis aut cavitatibus pulmonis consistere, experientia constat. Anno 1549. mense Septembri Monachus quidam in Collegio d'Arras breui asthma interiiit. Corpore dissecto abscessus repertus est in vena arteriosa, & sine pari, integris omnino pulmonibus. In quodam (nomine Britio) asthma mortuo in via Calendæ, pulmo, tanquam spongia, imbutus multò humore pituitoso inuentus est. Fit & à resiccatione, vt in aurificibus, chymistis, fabris ferrariis, & similibus. Quibus addi possunt, inunctiones & remedia à morbo gallico. Rhazes libro quarto continentis adiecit pectus strictum, & paruum pulmonem. Qui naturalem cōstitutionem habet, iugiter (inquit) fit asthmaticus. Hippoc. verò Apho. 46. libr. 6. fieri significat aliquando à tuberculo nato in spina, vt in gibbis. Quod si magnum est, & durum, siue crudum, asthma facit: si non ita durum, & aliquid desudat in arteriam, tussim. Aliquando etiam suppuratur, & interimit. Si fuerit in collo, asperam arteriam contrahit: in dorso, pulmonem & vicina corpora: sub septo,

*Asthmatis causam non semper in pulmonum cavitatibus consistere.*

*Monachus asthma sublatu.*

*Britioni asthma mortuo inuētus pulmo multa pituita imbutus.*

*Asthma etiā fieri à resiccatione.*

renes & lumbos: urinam quoque intercipit. Huiusmodi tuberculorum materia potest cieri è cerebro in spinam per tussim. Vel causæ sunt, ictus, casus, non cōueniens decubitus pueris, inconcinna deligatio, gestus deformis. Moriuntur ferè suffocati pure, vel cūm adolescunt, ad incrementum cordis & pulmonis non accrescente thorace, iugulantur. Philotimus ab influente sanguine, sed contra rationem, fieri scribit. Sunt igitur in vniuersum Asthmatis causæ, crassus humor, vel tuberculū in cauitatibus asperæ arteriæ: bronchia intercepta multa & viscida materia: resiccatio vehemens, abscessus, strictura pericardioris, & pulmonis compressio: tubercula in spina, siue sponte enata, siue à causa externa: flatus multi septum transuersum distendentes, ex quibus sequitur, viis interclusis, neque expirationem, neque inspirationem satis conuenientem fieri. Periculum autem maximum imminet, cum omnes muscoli intercostales, superiores scapulæ, & omoplata trahuntur, virium imbecillitas, vehemens calor, angustia partium spiritalium conspicitur. Vbi omnes, aut plures concurrunt, æger morti proximus est: vbi duæ, non facilè seruari potest.

In abscessu, totius corporis habita ratione, attenuantibus, vt aromatis & siccantibus: in crassis & viscidis humoribus, attenuantibus sine manifesto calore, & detergentibus vtendum. Syrupi, pilulæ, purgantia, conferuæ, eclegmata, vnguenta, apozemata, flatus discutientia. Augenda vis medicamento- rum, si materia non in bronchiis pulmonis, sed in spatio thoracis, & membrana succingente hæret. Suffumigia, dropax, sinapismus, phænigmus, cucurbitulæ sub mammis. Quidam in medio thorace cauterium laudant, alij vnum in brachio quatuor digitis sub osse scapulari, alterum in crure quatuor digitis supra genu inter duos musculos. Clysteribus vtendum, potu pauciore, sed paulò crassiore, dum materia coquitur: largiore & dilutiore, dum expurgatur: phlebotomia ætate media, suppressis mensibus, hæmorrhoidibus, & si febris adsit.

*Asthmatis  
causæ in vni-  
uersum que  
sunt.*

**D**yspnœæ genus est asthma, motricis facultatis symptoma, in quo crebra tussi correptus æger spiritum sine sono & anhelatione ducere nequit. Huic malo causa est & flatus, pituitæque multæ, crassæ præsertim & viscidæ, è capite in pulmonis bronchia per asperam arteriam delapsus, vel pleuritis in ea translata. Eò confluentes, aut ibi sensim congesti humores, cum efferuescunt ac tument, asperam arteriam haud aliter occupant, quàm quum arietinum pulmonem cum aspera arteria elixamus: quo tempore cogimur ipsum asperæ arteriæ caput extra vās deducere, vt conceptæ intus pituitæ multæ sit exitus.

*Gal. cōment.  
ad sent. 30.  
Prophet. 2.*

*Asthmatis  
cūratio.*

Laboriosa & difficilis est asthmatis cūratio. Et enim neque venæ sectio, nisi æger sanguine abundet, hīc multum iuvat, quòd quæ obstruit materia, viscida sit & crassa: neque purgantia medicamenta, quia vix ad pulmones pertingunt: neque clysteres, qui aluum distendendo diaphragma premunt, & grauiorem inducunt spirandi difficultatem. Dante tamen inducias affectu apparabitur ad educationem infarcta pituita hoc apozemate.

℞. radic. petros. fœnic. asparag. feminis cartham. ana ʒ. i. rad. ireos, serpentariæ maior. enul. campan. ana ʒ. β. thym. epithym. hyssop. marrub. scabios. tussilag. capill. omn. bugloss. borrag. ana M. i. iuiub. sebesten, dactyl. ana num. 12. passul. mund. ʒ. i. semin. quat. calid. maior. & alth. malu. bombac. vrtic. ana ʒ. 3. glycyrrhiz. ras. ʒ. β. flor. cardiac. anth. & genistæ an. p. i. f. decoct. ad lb. i. In colatura dissolue syrup. capill. ven. & de hyssop. ana ʒ. 2. f. apozema conditum triasantal. & diaircos simpl. ana ʒ. i. pro dosib. 4.

Ab his purgatio sequitur. Quæ quia sæpè iteranda est, ex superiori apozemate, additis semi. cartha. & folior. sennæ mundat. ana  $\mathfrak{z}$ . i. agaric. trochiscati  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . syrupus solennis bis in hebdomade ad  $\mathfrak{z}$ . 2. vel 3. in singul. dos. cum aq. hyssop. aut scabios. exhibendus, præscribetur. Vel hæc cōcinnabūtur catapotia.

$\mathfrak{z}$ . puluer. hieræ picræ  $\mathfrak{z}$ . iij. agar. recens trochisc.  $\mathfrak{z}$ . 2. rhei elect. in oxymelit. infusi  $\mathfrak{z}$ . i. pulpæ tamarindor. & salis gemm. ana  $\mathfrak{z}$ . 2. succi glycyrrhiz.  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . cum syrup. de hyssopo f. massa. Detur  $\mathfrak{z}$ . i. semel in hebdomad.

Conferent interea, quæ materiam fluere paratam auertant, errhina, apophlegmatismi, caustica, de quibus cap. de catarrh. & tussi. Hûc etiam pertinebunt sputum promouentia, vt syrup. thoracici, de glycyrrhiza, hyssopo, iuiub. prassio, & linctus, quæ vulgò lohot seu eclegmata appellātur. Quamquam hæc peritioribus quibusdam Medicis non ita probantur, quod lentore suo in ipso transitu adhærescant, & propterea expectorato viam minùs liberam relinquant.

Euporistum est, & Græciæ plebeculæ hac etiam tempestate vñtatum remedium ad pulmones infarctibus à crassis humoribus liberandos : quod ipse aliàs ab Angelo Vergecio natione Græco, Regio nuper Scriptore, viro omnis cultioris literaturę Protomystæ, & mihi studiosa necessitudine coniunctissimo, accepi. Animalcula Millepedæ & aselli Latinis, Græcis *ὄροι*, Gallis Cloportes appellata, quæ sub aquariis vasis stabulantur, panno lineo involuta in vino albo macerantur, hinc facta expressio potui datur. Dictu mirum, quàm breui saburratos pulmones depleat. Id quod obseruare licuit in

*De millepedis vide Dioscorid. ca. 34. li. 2. & Gal. lib. 11. de cōpos. phares. καὶ τὸ πορ.*

## DE MORB. INTERNIS

Ludouico Iouin, scriba & bibliopola, in ædibus D. Ioannis Lateranens. è regione collegij Triquetici: qui tamen inueterato tandem asthma contrahuit.

Probatum est ad leuandum asthma quantumuis magnum, tabellam vnam diatragacanthi guttulis aliquot olei saluiæ, anisi, aut rosmarini arte chymica extracti, irrigatam, præsentaneū afferre adiuuētum. Optimum quoque erit thoracem totum illinere, vt sese faciliùs explicare atque colligere ad spuitionem queat.

℥. olei liliacei & amygdal. dul. ana ℥. 2. buty. recent. axung. gall. & anser. ana ℥. 1. mucag. femi. lini & fœnugr. cum aqu. vngul. caball. extractæ ana ℥. 6. hyssop. sicc. enul. campan. ana 3. ℥. cum cera pauc. & croco f. linimentum.

Dein veniendum ad suffumigia, quæ materiam reliquam absumant, & cerebri catarrhum haud aliter absorbeāt, quàm si quis collumialem in cloacam viam calcem iniiciat. Ore per tubulum excipiuntur. Iisdem capitis integumenta suffiuntur. Interdum capiti emplastrum aptatur sistendæ fluxionis gratia.

℥. pic. naual. mastich. ammoniac. ana 3. 2. emplastr. contr. ruptur. 3. ℥. nuc. mosch. 3. 1. ex his emollitis f. emplastrum.

Adhæc si subitaneum ab asthma periculum immineat, nec superioribus detur locus remediis, quamprimùm cucurbitulæ lumborum partibus paulò supra renes, quò diaphragma peruenit, & pulmonis portio, admouendæ, quia conscendentem ad asperam arteriam pituitam promptissimè reuellunt.

**P**leuritis dolor est lateris 2 acutus, 3 pungens, cui 4 assidua febris, 5 difficultas spiritus coniuncta sunt. Pulsus 6 durus & ferratus, supinus ferè decubitus. Nam in latus sanum conuersis tumor suspenditur, atque ita distenditur membrana quæ patitur, ideóque ita asperatur dolor. Vbi verò ægro lateri incumbunt, ex eo, quòd subiecto corpore supprimitur, ampliatur doloris sensus, fusa latius materia. Tum quia pulmo lateri affecto innititur. Hic tamen decubitus altero tolerabilior est. Optimus autem, qui in asthmate præscriptus est. 7 Noctu ferè exacerbatur, ac diebus impatibus. Ab exercitio frigida 8 potus, vini 9 intemperantia, inspiratio 10 gelida & Aquilonia, multò magis, si præcessit Auster, ac de repente succedit frigus, venena 11 interim, concussio etiam externa huic malo occasio esse consueuerunt.

Materia ferè 12 biliosa, aut sanguinea, quod partim sputis, partim aliis 13 excretionibus & antecedente vita coniicies. Rarò pituitosa & 14 melancholica. Interrogandus æger est, num suppressa sit solennis aliqua purgatio, vt in mulieribus menses, ingrauescit, quòd in somno partes internæ & viscera magis incalescant, cum calor à superficie corporis ad centrum se recipit. 8 Quia frigidi, constringendo meatus, sanguinem in costas exprimit. 9 Vnde materiz ὀρεξμοος, & catarrhi generatio. 10 Præcipuè si Auster antè diu fluit. Nam cū Austriua tempestas bellum cerebro indicat, corpus replet humoribus, quos Aquilonia constringendo exprimit: tum verò dum frigus ipsi thoraci nocet, fluxioni excipienda sit idoneus, hinc pleuritis. 11 Vt Leporu marini vsus. 12 Quod tunicam costas succingentem, quæ densa est, crassa materia subire nequeat. 13 Vt alui, & urinarum. 14 Quæ ferè siue nescit quòd pepasmi expers.

ce e illas accingentem, quæ et am m quæ

lori intercor-

st. cum, qui-

6<sup>a</sup> illa adhæ-

ret tunica.

2 Vihemens

et intolerabi-

bilis, qui suâ

celeriter ab-

solut histio-

riam.

3 Ob mem-

brane natu-

ram.

4 Ob cordis

viciniam &amp;

pericardii.

5 Est enim r-

spiratio par-

u. et frequē-

6 Ob natu-

ram mēbra-

ne, &amp; mate-

ria copiam.

7 Pleuritis

nocturno magis

# DE MORB. INTERNIS

- 15 Nam si pars aliqua prædoluerit, in ea se morbus obfirmat, aut si læsitudo antè fuerit obfessa.
- 16 Apho. 24. lib 5. in viris hæmorrhoides, aut anniuersarium profluuium, aut alioqui statû certis interuallis, vt ex aluo, naribus, vlceribus. Ex his enim vitium lateri contrahi potest, præcipuè 15 quibus ea pars infirma est. Quæ etiam hyeme ideo faciliùs patitur, quòd infirmatur frigore. Frigus 16 enim omnibus partibus thoracis inimicissimum est. Hoc modo igitur methodum distinguendæ pleuritidis instituit.
- 17 Quod animaduertisse scilicet n. d. d. Syluius i latomo quod d. cuius hepar cū nothi costis vinculis & fibris colligabat ur.
- 18 Parua & frequens spirandi diffcultas.
- 19 Neq. materia, neque loco vera.
- 20 Inflammati musculus magnus est pulsus & frequens: tunica verò inflammate parua & durus.
- 21 Vt principiu, augmentum, status & declinatio.
- Quæ pleuritidem imitantur.
- Quibusdam corporibus à natura datum est, vt 17 hepar fibris quibusdam costis inferioribus co-puletur. Itaque laborante hepate imago plenritidis repræsentatur. Aliis materia quædam crassa & viscida in membranis pectoris colligitur, toto etiam thorace, vnde dolor grauis, tussis, 18 dyspnœa, & 19 ficta pleuritis Nam nec pungit dolor, nec febris incenditur, vt nec si flatus membranarum, aut intercostalibus musculis impactus est. Aliquando etiam musculi inflammantur, 20 sed pulsus hic alius, nempe mollis. Dolor grauis est, non pungens, & omnia ferè leuiora sunt. Membranæ quoque thoracem distinguentes, si inflammantur, par negotium vitæ faciunt, atque verus lateris dolor. Sæpe etiam inferioribus costis inflammatis, diaphragma, atq; hinc stomachus grauiter laborat magno periculo. Morbus hic proximo vere, Anno 1551. antè Pascha, plurimos, & eos maximè, qui vel temerè, vel negligenter curati sunt, sustulit. Omnia ergò via ac ratione distinguenda sunt, vt etiam vniuersalia 21 morbi tempora, è sputis maximè, tum vrinis, alui excretionibus, & aliis, de quibus Apho. 12. lib. 1. & commentario lib. 2. Prognost. & Criseon. 1. Ex his enim

tempora distingues, tempus euentumque crisis pronuntiabis, meliusque auxilia 22 institues.

23 *Curatio.*

Vitæ ratio 24 methodo illa vniuersali, quæ ab Hippocrate primo 25 Aphorismorum indicatur, æstimanda est. Nunc etiam consuetudo adiungenda, cum ægri in ediam Hippocratis non ferant, & aliis ciborum, potusque generibus assueti sint. Initio aqua hordei, ex hordeo pulicula. Principiis, 26 liquidior: post etiam 27 crassior, ac deinceps mixtis amygdalis, tum amygdaloga. Post etiâ eadem ex pullorum iusculis dissoluta. Tenellæ pullorum carnes, intrita madida, quæ & infriatas carnes, & synterimata appelles licet, vulgò coliria, & colatitia iuscula. Præter hæc, vulgi expressiones, tortiua iura, atque iis omnibus liquidiora instauratitia distillata, quæ ad 28 *ἡ δὲ αὖ καὶ ὠφέλιμα πόματα* (sic enim appellat. Paul. Æg. cap. 15. lib. 7.) & reliquas id genus potiones referri possunt. His autem 29 defectis viribus uti mos est. Nam integra virtute nutrities 30 tenuiùs Synterimata ergo è pulpis galli decrepiti, postquam longa decoctione remolliueris, & exactè infriaueris, conficies. Atque eo iure, in quo gallus coxerit, dissolues. Alioqui id quod conficitur à natura, melius ex assis pulpis, quæ alis copulantur, & sub iis positæ sunt. In capis, perdicibus, & iuuenibus gallinis detrahendū lardum est, priusquam infrientur, atque dum assantur, aquâ violarum, scabiosæ, borraginis, conspergi possunt. Tor-

22 *Indietæ pharmacia, Et chirurgia.*

23 *Ætionū, quas libesat Et pleuritis per causæ a-motionem re-stitutio.*

24 *Vt in eūte morbo, dū siccus manet, si vires valeant sine infirmitatis metu, prius in curam morbi incūbamur, quàm naturæ studeam⁹: deinde viciō loco & iure præscribam⁹ tenuem, vt exquisitum intelligam⁹, quibus paucis Et semel sit exhibendus.*

25 *Et libr. 2. de victus rat. in morb. acutis.*

26 *Ne pleuriticum fac-*

*ciant anhelosum. 27 Cum humescere os cœperit. 28 Paulus Ægineta lib 7. 29 Vt aquæ naturæ studeas, & pugnes cum morbo. 30 Si brevis sit morbi hystoria, & cum virium integritate ad statum peruenire queat.*



## DE MORB. INTERNIS

tiua iura, id est, expressiones ex eodem modo affis capis, perdicibus & cæteris succulentis. Ideoque priusquam legitimè coctæ sint carnes, etiamdum succosæ prælo bene mundo supprimantur. Sed & exossari prius melius est: deinde ita contorqueri, ut vberem succum reddant, qui interim hyosaccharâ, id est, saccharo violato dulcari potest. Instauratitia hac conuenient formula.

℞. Conferuæ borragi. violarum, capill. ven. an. ʒ. i. conferuæ enulæ ʒ. β. diamargariti frigidi, triafantali ana ʒ. β. quatuor 31 semin. frigid. ex corticatorum, sem. limonum, cardui, bombacis ana ʒ. 2. aquarum distillatarum è violis, scabiosa, borragine, buglosso, vngula caball. an. ʒ. 4. aquæ decoctionis galli decrepiti, alterati cum borragine, buglosso, calendula, & 32 modico hyssopi lb. 4. cum carnisbus vnus capi iuuenis bene carnosus, & 33 mica panis fiat distillatio in alembico secundum artem.

℞. supradictæ distillationis lb. β. cum sacchari violati ʒ. i. β. & ʒ. i. cinamomi. Coletur per manicam Hippocr.

### *Instauratitium pro pauperibus.*

Minori sumptu gallus decrepitus ad putrilaginem coquitur cum vitulina: expressio fortis cum iusculo sorbetur, cuius alimenti vim maiorem existimant, si cum numis aureis, aliquando etiam gemmis nodulo inclusis & inditis ventri galli. Præterea vocata gelatina, concreto succo carniū vires fouendæ sunt. Per multi pleuritici vinum appetunt, quo tamen 34 interdicensum est, nisi virtute colabente animi deliquium metuatur. Tūmque buc-

31 Cucurbitæ, cucumeris, melonum & citruli.

32 Propter amaritudinē.

33 Quæ macerata sit in aqua scabio.

34 Inflammationis mentis.

cella panis in vino tenui, & modico aquæ violarū immergatur. Sæpiùs naribus admoueat, fugatur interuallis. Acida adstringentia, quæ refrigerant vehementiùs, aut calfaciunt 35 vitanda sunt.

36 Loco lucido mediocriter elato, molli culcitra, capite ac thorace subleuato, collocandi sunt. Qui si decidunt 37 in pedes, lignū aliquod, aut aliud corpus pedibus obicitur, vt in ea figura persistant. Hæc vbi ita fuerint 38 prouisa, statim initio de 39 maioribus remediis cogitandum est.

Maiores remedia sunt, purgatio & phlebotomia. Si subsistit aluus, clyster mollis iniici debet. ℞. mal. bismal. violar. ana M. i. fursur. hordei ana M. ss. viol. p. 2. f. decoct. ad ℥. i. plus, minusue: pueris enim selibra, aliquando vnciæ nouem satis esse possunt. In colatura dissolue cassiæ ʒ. 6. vel ʒ. i. saccharicraffioris ʒ. i. mellis rosacei colati ʒ. ss. olei violac. ʒ. 3. vel ʒ. 2. Purgatio interim satis esse potest. Nec perpetuò 40 phlebotomia opus est.

Placuit enim Hippocrati, cū dolor ad hypochondrium inclinaret, vt pharmaco 41 potius, quàm phlebotomo vteremur. Pharmaca verò præcipua credidit helleborum nigrum, aut peplion. 42 Gal. verò hieram diaco. quæ helleboron, non scammonium, vt peplion, recipit. Posteritas Medicorum, leuioribus inuentis, veterum pharmaca reliquit. Leuissimum, ac plurimū vsurpatum cassia. Datur hæc ad ʒ. i. ss. ʒ. 10. ʒ. i. ʒ. 6. eaque dissoluenda est aqua hordei, sero lactis, passularum, glycyrrhizæ, eiusmodiq; pectoralium decocto, vel cum saccharo in bolum cogenda est.

35 Hæc enim expectoratiū prohibent.

36 Vt materia foras euectur, & refrigeretur corpus.

37 Quod fit iactatiōe, vel viriū infirmitate.

38 Adhibita scilicet promissione loci, aeris & decubitus.

39 Quia propter impedimentum partis cuius officio vita carere nequit, prius est in morbi curam incumbendū, quàm in uatura studendum.

40 Vt cum expectoratiū cruentum est, facileque excutitur.

41 Ad motionem coniuncta cause

42 Gal. commentario in sent. II lib. 2. de ratione viſt. in morb. acutis.

# DE MORB. INTERNIS

43 Quòd pur-  
gandi vis ei  
sit imbecil-  
lior.

44 Mastix  
enim ex euē-  
tu purgat,  
dum ventri-  
culum ad-  
stringit.

45 Vt si ex-  
pectatū ob pe-  
tūs proce-  
dat, si vires  
sunt infirmæ  
si difficultas  
expectorandi  
in lateris in-  
firmitate cōsi-  
stat, si pleu-  
ritis mitifica-  
ta fuerit, &  
ad cōctionem  
perducta.

46 Magni-  
tudine cause  
est sympto-  
matum vehē-  
mentia.

47 Vt melā-  
cholici.

48 Vt iis qui  
sunt λεπτοί  
καὶ μικροί  
λοι αἷμα.

49 Effera  
scilicet, &

que nullo cōsistit loco, diuersæque excitat symptomata pro varia parte, in quam  
influit.

Datur etiam, sed ferè 43 aucto modo, mel aëriū,  
id est, manna. Vbi verò obstructionis cōiectura est  
in primis venis, rhabarbari ʒ. 1. vel. 2. in aqua hor-  
dei, endiuia, aut similitum infundūtur, & cum mo-  
dico cinamomi, fit potus. Neque metuenda eius ad-  
strictio est. Nam & mastiches ʒ. 3. mouendo ventri  
44 pleuriticorum veteres imperauerunt.

Alternis diebus, maximè paribus, in quibus ferè  
quies est, aut lenior morbus, clyster mollis iniici  
debet, si non descendit aluus. Alioqui, quod vtilius  
est, Cassiæ ʒ. ʒ. aut ʒ. 6. in bolum cum saccharo co-  
gendæ sunt. Dandæque vel manè, vel vespèri, horæ  
dimidio ante cibum.

Consilium vsus pharmaci augebit, si dolor leuis  
est, si natura æger non ita eufarcos, aut aliena 45 o-  
pinio à phlebotomo. Alioqui si 46 grande malum  
est, etiam si ad hypochondrium declinet dolor, tu-  
tius auxilium phlebotomia est Galeno. Priùs etiam  
quàm de pharmaco decernas, interroganda ægri  
natura est. Alij enim 47 difficilius purgantur: alijs  
48 vel leui pharmaco immodicè turbatur aluus.  
Hi ergò à phlebotomo habere possunt commo-  
dius. Quòd si incognita ægri natura est, & phar-  
maco vti decet, medicamentum eliges tum quali-  
tate, tum quantitate medium, ne vel non purges,  
vel supra modum vacues.

Tempestiua purgatio turgente 49 materia, pri-  
ma die, aut non vltra secundam. Et, si pleuritidem  
eò processisse perspexeris, vt sputa prodire incipiāt,  
purgans medicamentum minimè exhibendum, ne

spūti motus inhibeat, ex Hippocrate libr. 3. de morbis. Nec omnino agarico, aut etiam hiera diacoli. interdicitur, quin vtilicet, dolore in ventrem declinante, non ita vehementi affectione, atque vbi à pituita malum est.

Imperabis ergo 50 catholici 3.6. rhab. & agar. infusorum, vti decet, an. 3. 2. cum hydromel. quantum sufficit, fiet potus. Eodem modo 51 & catholico 3. 4. pul. diacol. misceri possunt. Diaphœnicon quoque & diaprunum pauperibus imperari possunt.

Phlebotomia remissionis tempore, & eo die quo leuior est paroxysmus, cōmodior est. Itaque etiam vespere & nocte media, vrgente malo, & oblata occasione sanguinem detrahes. Nec perpetuo semel is ducendus est. Nam suspectis viribus, vacuationem partiri melius est, vt manè 3.6. vesperi vnciæ sex depleantur. Est præterea, cum de repente noua sit affluxio, vt inde omnia symptomata recrudesçât, spūta quoque vel cruda sint, vel retineantur: tūmq̃ & sexto die, & octauo, vt 52 Anaxioni, aut etiam tardius, sanguinem mittimus. Hócque remedium secundò ac tertio reuocamus, si quidem non repugnant vires. In quo tamen cautio esse debet. Nam aliquando vbi antea signa omnia salutem prænuntiauerint, crisis tempore, quæ ferè fit ad septimum, aut aliam diem criticam, vehementer pleuritis exacerbatur, symptomata omnia crescunt, tum nihil mouendū est: sed omnia naturæ 53 cōmittēda sunt.

Desperatis rebus, nihil quoque mouendum est.

In pueris etiam bimis, senibus octogenariis, mulieribus grauidis, 54 remedium hoc temperari debet, non omnino prohiberi.

50 Vel 2℥. ex  
pressionem 3.  
2. rhei electi,  
3. 1. β. vel  
3. 4. agar. in  
hydr. cocto o-  
primè infuso-  
rū cū 3. 1. ci-  
namomi, in  
qua dissolue  
catholici, sy-  
rupi mel. an.  
3 6. f. potio.  
51 Vi 2℥. ca-  
thol. 3. 6. pul.  
hier. diacol.  
3. 1. vel 3. 4.  
f. bolus.  
52 Hippocr.  
sect. 3. lib. 3.  
τὸν ἐπιδῆμα.  
53 Vi si humo-  
ris corruptio-  
ne phlegmone  
in gangræa  
abierit, si vi-  
res, siccæ & lā-  
gueāt, si expe-  
ctorandi dif-  
ficultas in la-  
teris infirmi-  
tate cōsistat,  
Et πύχρος si  
ue stertor aq-  
sit. Tū enim  
de salute est  
desperandum.  
54 Preser-  
tim si grālis  
sit scieris.

55 *Ut tantum effluat sanguis, quantum illud fuerit.* In pueris venæ interim angustiores non apparēt, idque magis in pinguiusculis. Qua in re sanguisutis vtilicet, 55 decurtata harum cauda, vt vacuationis modus certò finiatur.

56 *Quandiu sit pulchritudo. Nam si melius iam factum sit, cubiti venā secare est satius.* Suppressa aliqua per partes inferiores vacuatione, vbi malum inde ortum est, in insigni plenitudine, in materia virulenta, cūque statim initio materia in caput rapitur, ac mentem cōmouet, è 56 venis cruris eiusdem lateris sanguis trahendus est. Alioqui è basilica eiusdem lateris.

57 *In actu, motu & dilatatione* Vacuationis modus è 57 pulsu, 58 sanguinis motu, 59 colore, & corpore præscribendus est. Si initio purus ac rubens effluit, vacuationis modus, cum iam liuidus excernitur. Si aquosus & crudus initio, claudenda vena est, cum iam rubentior & flauior apparebit. Si basilica non apparet, media vulneretur. Atque cum iam vulnerata est, 60 pollex ramo cephalicæ imprimatur.

59 *Si ruber fluxerit, mox inger, vitimo loco melior: presertim si pleuritis in superioribus sit.* Animaduertendum pleuriticis iuuari phlebotomia, locis perflatis ab Aquilonibus: lædi verò regionibus, quæ obuertuntur Austris. Hic ergo vel purgatione vtendum est, vel temperanda sanguinis detractio.

In biliosa pleuritide Arabes phlebotomia 61 interdiciunt. Hippocrates quoque hac sententia prohibuisse visus est. Sanguinem, inquit, non detrahes, vbi expuitur sanguis, si regio repugnat, si æger pleuriticus est, si natura eius admodum biliosa.

61 *Quia san- guis sanus est.* Galenus sententiā Hippocratis recipit, nisi quòd 62 non probat sanguinem non detrahi, spuentibus sanguinem pleuriticis.

62 *Imò probat hanc sententiā Gal. commentar. in librum de humoribus.*

Hippocrates priusquam veniat ad maiora remedia, 63 fomētis vtitur, quæ aliquando satis esse possunt, aliquando morbum indicant.

Itaque si sputa biliosa, vesica suis ex aqua calida ad dimidium implenda est, admouendæque lateri. Alioqui gossipiū, vel lana mollis infusa in aqua tepida, & expressa subinde apprimatur lateri. In ea aqua, si vis, incoques violas, melilotum, chamæmelum. Fouebis quoque oleo violato & chamæmelino, si crassa & viscida sputa sunt.

℥. milij frixi M. 1. furfuris frixi P. 2. salis torrefacti 3. 1. Interim dum friguntur, vino tenui conspergi possunt, & si perfrixit latus, aqua vitæ vel hyssopi, aceto etiam, si corpus carnosum est & calidum, neque vehementer vrgeat tussis. Inde fiunt sacculi, qui calidi lateri applicantur. Possunt hi sacculi in vino aut aceto immergi, in quibus vel hyssopū, vel origanū, vel thymum, aut aliquid tale coxerit. Inunges tum ex anethino & rutaceo. Eiusmodi quoque sacculis cumini semen, baccæ lauri, sicc. hyssopus, origanum, rosmarinus, & similia immisceri possunt.

In tenui & cruento sputo sacculus ex milio, furfure, & sale descriptus, sed siccus & calefactus, applicari debet, inunctio ex chamæmelino & amygdalino.

Oportet autem omnia, quæ lateri admouentur, esse 64 leuia, mollia, calida: videndumque, ne quæ calida admota sint, tempore refrigerant, calorque linteis calentibus, aut alia arte fouendus est. Sunt, qui nullis eiusmodi remediis vsi, neque fomentis, neq; maioribus illis auxiliis certas antidotos commendant. Quales sunt. 65 Dens apri in scobem comminuitur, dantur 3. 2. ex vino albo tenui. Aliud.

63 Liquidu,  
siccu, mistis,  
suauibus, a-  
cribus, curā-  
di, & explo-  
rādi gratia.

64 Ne sua  
inequalitate  
partem offen-  
dant.

65 Valet in-  
eunte morbo  
ad materię  
orgasum,  
palyndromē,  
aut fluxionē  
prohibendā.  
Habet eni-  
m apri vim  
adstringendi  
maximam.

## DE MORB. INTERNIS

Radicis lappæ siccæ, quæ purpureum florem gerit, aut floris 3. 2. è mulsâ propinantur. Aliud.

66 Cômēda-  
tur mirificè  
puēdum bu-  
bulum, aut  
ceruinū, tosiū  
et in tenuis-  
simum pulue-  
rē redactum;  
datur ad 3. 1.  
cū oxymelite,  
aut vino albo

67 Ad reuel-  
lendum et  
vacuādum.

68 Simplici  
aut scyllitico,  
si materia sit  
lētā, nec alui  
imbecillitas,  
aut melancho-  
lia hypochō-  
driaca ab ei-  
usu evocet.

69 Leniter:  
nam coctione  
longiore ama-  
rescit.

70 Ut 3. 4.  
ad lb. 1.

66 Coralli rubri & testæ auellandarum rubrarum ana 3. 1. datur è mulsâ. Rustici ius serpilli expressum cū aqua cardui benedicti vtiliter vsurpant. Possunt hæc quidem tentari, non neglectis aliis remediis.

Cucurbitularum in pleuritide 67 plurimus vsus est, de quo Galen. in lib. de Cucurb. Vtimur quoque plurimum aqua hordei, sacchari, syrupo violato, de iuiubis, 68 oxymelite, hydromelite, decoctione pe-  
ctorali, syrup. capil. ven. & de glycyrrhiza.

Aqua hordei, si quidem detergendum est, & sic-  
candum, ex integro hordeo parari debet.

Si leniendum, si extinguenda sitis est, idem hor-  
deum fricandum asperiore linteo, & exteriori tuni-  
ca spoliandum est.

Si nutriendum magis, proportio hordei ad aquam  
augenda est, magisque coquendum est, dum disfrin-  
gatur hordeum. Ferè parant aquam hordei, vt sit a-  
qua vigecupla, id est, vt sint xx. partes aquæ, & vna  
hordei.

Sæpè etiam quartam partem syr. viol. commisce-  
mus, aut modicum sacchari violati, vel, vt in ptisana  
vulgari, glycyrrhizam rasam 69 concoquimus. A-  
qua sacchari deterget, coquit, lenit, nutrit.

Sit autem sacchari 3. 1. in viginti partibus aquæ:  
coquitur ad sui dimidium. Potest tamen sacchari  
modus augeri, vt etiam aliquando 70 sub quadru-  
plum saccharum sit, quale hoc est.

℥. aquæ coctæ, vel aquæ hordei lb. 1. sacchari  
communis vel violati 3. 3 atque aliquando colatur  
aqua illa cum dicto saccharo, & modico cinamo-

mi: cum videlicet nutriendum magis, coquendum, detergendum, repurgandum & roborandum. Iulepi violati vsus est, vt leniamus sitim, & calorē temperemus, leuiter cōcoquamus, & facilius sputum reddamus. Syr. de iuibis lenit, maturat, tēperatus est: conuenit quoque, vt violatus, incrassando sputo.

Oxymelitis suspectus vsus in pueris 71 macilētis, iis quibus genus neruofum infirmum. Quibus asperior tussis, vigilix maiores, sputa quoque tam crassa, vt propē sicca sint, similiter & si æger debilior est. Tempestius autem vsus fuerit, si nihil horum repugnat, si fluxio tenuis non est, si sputa mediocriter crassa, hoc est, nō ita resiccata. Hydromelite, vt aqua sacchari vtendum est, nisi quod calefacit magis & omnino maiore vi præditum est, quàm aqua saccharata. Decoctione pectorali ad sit. m, ad coquendum, leuiter detergendum, & incidendum vti licet.

Syrupus capill. ven. incidit, deterget sine manifesto calore. Syrup. de glycyrrhiza ad omnia supradicta utilis est & pectus roborat. Itaque vt postulabit vsus, modò his, modò illis vtendum est. Veteribus quoque melicrata probata sunt ex aqua, in qua radix violę purpureæ, stœchas, chamædrys, chamæpitys, horum vnum coxerit. Atque 72 initio supprimendæ fluxionis suffitu vtimur.

℞. 73 vernicis ʒ. i. mastichis, ros. an. ʒ. 2. fiat pul. pro suffitu cum stupis cannabinis. Item.

℞. diatragacant. frigidi ʒ. β. teneat alternatim in ore. Plura in cap. de catarrho.

In coquendo verò quod influxit, vtendum est 74 lacte amygdalino, butyro per se. Coquit enim, lenit modicè, educit.

71 Tenuib<sup>9</sup>,

qui alio sunt

infirmiore, &

mulierib<sup>9</sup> hi-

stericis, &

melancholicis.

72 Cum ex-

closo sit à ca-

pitate in fauces

73 Vel. ℞.

℞. rnicæ, ma-

stich. nigellæ

romane ana

ʒ. i. furfuris

macri ʒ. i.

pulueris ro-

sarū rubrarū.

ʒ. 2. si. puluis

pro suffitu.

Excipitur pi-

leo nocturno.

Huc etiam

spectant sac-

culi & mæ-

sapia ex mi-

llo, sale &

furfurē capi-

ti admonen-

da manè.

74 Si nulla

alīa καρπώ-

πία, ac non sit

æger δύσπο-

δus.



# DE MORB. INTERNIS

Poteritque modicum sacchari violati commisceri, vt paulò pleniùs educas, postea verò aliquid mellis. Ita magis repurgabis. Magis etiam, si ad  $\frac{3}{2}$ . butyri,  $\frac{3}{2}$ . diaireos simplicis admisceas, vel amygdalas amaras, persicorum nucleos, aut 75 similia amara torrefacta, & in puluerem redacta.

Butyro quoque quarta pars terebinthinæ lotæ in aqua maluæ commisceri potest.

Parabilia quoque remedia sunt 36 melicrata, in quibus radix althææ coquendo, hyssopus, thymum, & similia incidendo & repurgando coxerint. In eandem rem comparant eclegmata, initio quidem cum multo 77 diatragacantho: postea verò cum 78 multo diaireos. Ferèque in remediis pleuriticis lenientia, detergentia, incidentia, repurgantia commiscentur: quale hoc est.

$\mathcal{L}$ . electarij diatragacant. frigidi  $\frac{3}{4}$ . 6. sacchari candi, penidiarum, pilularum albarum ana  $\frac{3}{4}$ . diaireos simplicis  $\frac{3}{4}$ . 2. syrupi violati & iuiubarum an. quantum sufficit, fiat eclegma.

Vbi verò magis repurgandum & extenuadum, loco penidiarum, mel album: loco syrupi prædicti syrupum cap. ven. & aliquid oxymel. miscebimus.

Iam aucto morbo, ad hos vsus vinum album, tenue & aquosum concedi potest. Inunctiones lateris fiunt ex oleo violarum & aliis, vt supradictum est, oleo de keiry, delilio, mucaginib. femin. cydoniorum, althææ, lini, fœnugræ. extractis in aqua violarum, vngulæ caball. scabiosæ, hyssopi, butyro, fordibus lanarum, terebinthina, axungia galli-

ballinæ  $\mathcal{M}$ .  $\beta$ . hyssop.  $\mathcal{P}$ .  $\mathcal{I}$ . glycyrrhizæ rasæ  $\frac{3}{4}$ .  $\beta$  si decoctio: in colatura ad  $\mathcal{I}$ .  $\mathcal{I}$ . dissolue sacchari quart. 3. electarij diaireos simplicis  $\frac{3}{4}$ . 3. si syrupus.

75 *Hæc in pituitosapleu- ritide, affe- cto & de- elinante morbo.*

76 *Vi  $\mathcal{L}$ . sal- se parilla  $\frac{3}{4}$ . 2. radic. enu- la campanæ ireos an.  $\frac{3}{4}$ .  $\mathcal{I}$ . salmæ & be- sonica  $\mathcal{M}$ .  $\mathcal{I}$ . si. decoct. In colatura dis- solve mellu lib.  $\mathcal{I}$ . si. hy- dromel, quod maxime hye- me vsus ha- beat.*

77 *Ad flux- ionem sistē- dam.*

78 *Ad expe- ctoratū pro- mouendum.*

79 *Vel  $\mathcal{L}$ . iuiubar, pru- na damasc. an. num. 20. passul. mun- datar.  $\frac{3}{4}$ .  $\beta$ . daestylus, si- cus pingu. an. num. 3. vngul. ca-*

*ballinæ  $\mathcal{M}$ .  $\beta$ . hyssop.  $\mathcal{P}$ .  $\mathcal{I}$ . glycyrrhizæ rasæ  $\frac{3}{4}$ .  $\beta$  si decoctio: in colatura ad  $\mathcal{I}$ .  $\mathcal{I}$ . dissolue sacchari quart. 3. electarij diaireos simplicis  $\frac{3}{4}$ . 3. si syrupus.*

næ, anferis, anatis, suis, & quæ plurimum laudatur, vrsæ. Adduntur pulueres, ireos, thymi, hyssopi, marrubij, gentianæ, sinapi, cnici, brassicæ, & fermentorum vitis, non initio quidem, sed iam progressu morbo. Sic enim ferè posteriorum Medicorum vsus. Veteres autem vehementioribus remediis vsi sunt. Latus lana sordida leniente & concoquente integitur: postea etiam in fine morbi lana sulphurata. Formulæ sunt.

℥.ol violarum, amygdalarum dulcium an. ʒ.β. misce. Cui adde post initia, mucagin. sem. cydoniorum excorticatarum ʒ.6. mucag. sem. lini ʒ.β. cerę modicum, fiat linimentum pro latere. Postea.

℥.mucag. sem. althææ & cydoniorum ana ʒ.6. mucaginis femin. lini & fœnugręci ana ʒ.β. ol. de keiry, adipis vrsi ana ʒ.3. œsypi ʒ.2. cerę modicum, fiat linimentum.

℥.dialthææ ʒ.2. cum oleo amygdalarum dulcium, fiat vnguentū molle. Atque vbi iam resolendum est, adde pul. ireos, aut similis ʒ.2. Tūmque bonum fuerit, 78 folium brassicę ad ignem tabefactum, & butyro illitum superponere lateri, vel ex eiusdem brassicę caulibus combustis, & in cinerem redactis, mixta adipe, linimentum conficere. Nam id medicamenti affatim discutit.

Atque vbi ad suppurationem vergit, semen nasturtij & sinapi cerato cōmisceri possunt. Quo tempore.

℥.rad. althææ & liliorum repurgatarum ana ʒ.1. ficus pingues N. 2. Coquantur omnia in vino albo. Deinde cum axungia & oleo de liliis pinsentur in mortario. Fiat emplastrum molle, cui insper-

78 Hæc ex  
Paulo Bri-  
neta, cap. 33.  
lib. 3. desum-  
pta, ad plen-  
ritudinem no-  
tham.

## DE MORB. INTERNIS

ge femin. nasturtij & sinapi in puluerem redacti  
ana ʒ. i. Tentatis omnibus his remediis, si quidem  
desperatio est, & vires tolerare possunt, cauterium  
actuale, aut potentiale (quod vocant) lateri infe-  
rendum est.

Scarificatio quoque cum cucurbitula, eo mo-  
do, quo in libello de cucurbitula dictum est.

### *Pleuritis notha.*

Est nonnunquam lateris dolor, qui pleuriti-  
dem ementitur, & propterea plenritis notha solet  
appellari. Eius causæ scholiis nostris proximè de-  
scribuntur.

Ad curationem verò hæc remedia comparari  
poterunt. ℞. farinæ tritic. M. i. mell. ʒ. 2. coquantur  
in decocto rutæ & nepetæ: deinde addita vitulinæ  
axung. lot. in aqua chamæmeli ʒ. i. f. f. cataplasma  
dolenti parti admouendum. Rustici succo nepetæ  
lana excepto, superposita fascia, contra pleuriti-  
dem, & internos dolores vtuntur.

℞. maioranæ, rut. ana M. i. bacchar. laur. p. 2. vehe-  
menter tere in mortario: adde mell. ʒ. 4. f. velut ca-  
taplasma, quod impingatur lateri calidum: super-  
ponatur lana, & fascia alligetur.

℞. decoctio. absynth. lb. f. ficuum pinguium tri-  
tarum ʒ. 3. f. decoctio ad crassitudinem: f. fortis ex-  
pressio. In expressione rursus coque mellis ʒ. i. f. ra-  
dic. ireos pulueratæ, rad. caul. an. ʒ. f. iteretur expres-  
sio, & cum cerato laurino fiat vt prius.

*Nicol. part.  
2. libr. 2.*

Achariston à Nicolao descriptum ad nucis my-  
risticæ magnitudinem datum omnibus interaneis  
doloribus subuenit.

Olea muscellinum, styracinum, ex descriptione

Nicolai compositū, scylliticum, puleginū, è floribus in oleo infusus, & in vase duplici coctis, & vehementer expressis, hypericinum, mastichinum lateri tepi-da cum lanis sordidis vtiliter apponentur.

# EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Musa in Aphorismos, ita pleuritidem distinguit, ut notha sit in superiore parte tunicae tegente costas, aut inter costas: vera, in mediastino. Quod & rationi, & experientiae repugnat: quibus perspicuum est in succingente costas, aut perioestio, aut saltem in musculis intercostalibus veram cum veris propriisque symptomatis excitari: notham in musculis externis. Licet haudquaquam negandum intra thoracem speciem quandam pleuritidis non veram fieri posse. Multis enim ex ratione vitae, quae crassa & viscida gignat, multus humor eiusmodi in corpore cumulat, qui in vacuum spatium thoracis & pulmonem delatus, membranisque harena, dolorem pleuritico similem affert, sed sine febre, vel certe febricula, aut etiam frigidiore corpore, quam antè, respiratione quasi in collo suffocante, pulsu difficili, tardo, minimo, ubi neque phlebotomia, neque similibus remediis ad pleuritidem accommodatis, sed iis, quae humorem illum incidunt, tenuent, & ducant, semper est utendum. Signa autem certissima, quibus in cæteris & pars affecta, & materia affectus internoscuntur, huiusmodi sunt. Si æger in partem lateri dolenti oppositam decumbere non potest, in membrana costas succingente affectio est, quae suspensa pondere concepto grauat. Si in partem affectam, digito leuiter premenda pars exterior cutis. Nam si æger dolorem inde percipit, in musculis externis: sin minus, nisi costa grauius tractetur, vel in perioestio, vel in musculis intercostalibus subsistit.

Tum notanda erit pulsatio ad distinctionem vtriusque. Nam in musculis intercostalibus comprimitur arteria, unde pulsatilis dolor. Omnibus eadem ferè sunt alia symptomata, exceptis febre & sputo. Spuria in musclis externis à materia frigida vel flatulenta, sine febre est. Sputum in inflammatione intercostalium, ob minorem resudationem, pau-

*Anto. Musa  
erronea de di-  
stinctione  
pleuritidis  
opinio.*

*Pleuritidis  
signa, ex af-  
fecta parte  
& materia  
affectus pe-  
tenda.*

## DE MORB. INTERNIS

cum: in perioftio, ferè nullum, tum ob materiæ paucitatem, tum quòd sudore sæpè & infensili transpiratione resolvatur. Sanguineam indicant (cæteris signis non prætermiffis) sputum cruentum: biliofam, ex rubro flauescens: pituitosam tardè apparens, subalbidum. A melancholia rariffimè fit, & si fiat, vix curatur. Cùm autem morbus iudicetur, vel excretionè, vel coctione, vel abscessu, nisi solvatur celeriter in sanguinea missione sanguinis: in biliosa, vel eodem modò, vel sæpiùs sudore, aut hæmorrhagia è naribus, saltem intra diem septimum, in peripneumoniam degenerat: aut post 14. in *ἰμπύημα*. Peripneumonicus est æger, si dolor punctorius imminutus, febris & spiritus difficultas aucta, sputum spumosum, rubentes genæ, morsque est ferè semper in propinquo. In hac dolor fit aliquando, non ratione pulmonis, sed mediastini & membranarum. Quòd si non repurgetur materia, cocta in pus vertitur, fitque empyema, sanie, -uæ per sputum educi debuit, in spatio thoracis collecta. Terminus autem iudicandæ pleuritis per expuitiones, decimusquartus. Non, vt Fuchsius, & alij, ab eo die numerando, quo cœpit æger expuere. Nam id falsum esse, & ea quæ sæpius accidunt, & Anaxionis hist. 3. Epid. demonstrant. Si enim ita numeres, non 14. diebus eo modo iudicatus fuisset, sed ferè 24. quia cœpit 11. Rectè igitur Hipp. Quicumque morbo laterali laborantes, in quatuordecim diebus non repurgantur, ij ad suppurationem vertuntur.

*Phlebotomia* *ἔξ* purgatio.] Ex eodem latere fit, dextro quidem ob venam vulgò *ἄξυρον* dictam, quæ è directo est: sinistro verò, tum ob intercostalem, quæ oculus ramorum venæ *ἄξύρου* in sinistrum latus perreptantium copulatur: tum ob naturæ conatum, quæ sese ita exonerat. Verùm de phlebotome è directo celebranda nobilissima est disceptatio à recentioribus agitata.

Andræas Vesalius Bruxellensis, insignis Anatomicus, & Carol. Q. Imperatoris Medicus, semper secandam brachij dextri iecorariam, seu sit in dextro latere, siue in sinistro pleuritis, ingeniosè causatur. Ab eo ratio assignatur cuiusmodi: quòd vena *ἄξυρος* dicta, hoc est sine pari, à latere dextro venæ cauæ propè cor oriatur, quæ per spinam delata ex utròque latere octo costas alit inferiores, ac  
ad dia-

*Morbus tri-  
bus iudica-  
tur modis.*

*Hipp. aph.  
3 lib. 5.*

ad diaphragma, & membranam intersepiemtem distribuitur: unde expeditus multò pleuritidem committens materia retrahatur, si sanguis è brachio dextro extrahatur: quia basilica dextri brachij ἀξυρον magis respicit, quam basilica sinistri. Sed id argumentum nullius est momenti apud eum, qui rem Anatomicam paulò oculatiùs perspexerit. Nam vena sine pari, quem recipit à caua vena sanguinem, non ampliùs ad eam remittit: imò suis in osculis venæ cauæ coniunctis ita fabrefracta cernitur, vt ei idem ferè eueniat, quod vesicæ urinariæ, aut cordis vasorum orificiis. Quòd verò sanguinem semel receptum ἀξυρος non reuomat, ex dissectionibus certum est.

Nam si venam cauam in parte superiori secueris, & fistula in eam intromissa inferiorem versus partem sufflaueris, tota ipsa caua vena in parte inferiori simul cum vena sine pari inflabitur, & tumida euadet: at si venam ἀξυρον parte infima secueris, immisssaque cannula ore ventum sursum impuleris, dubio procul vena caua non inflabitur, nec tumida euadet: quia àër in vena sine pari contentus exire nequit. Quòd si àër à vena sine pari ad cauam non deriuetur, quomodo sanguis àère corpulentior refluet? Quæ questio vt discutiatur, obseruandæ sunt cauæ venæ ascendentis propagines ad institutum nostrum facientes. Caua vena ascendens sursum ad cor contendit, rectaque ad iugulum fertur in multas diuisa partes, è quibus duæ illæ sunt memorabiles axillaris & cephalica. Inter quas venas duas prope iugulum ab utroque latere vena quædam media est ex axillari ferè enascens, quæ inde obrepens in multas finditur venulas, quæ in vniuersum cum ramusculis & venulis sine pari copulantur, quæ, vt dictum est, octo costas alit inferiores. Quum igitur iecoraria vena in pleuritide pertunditur, sanguis non tantum in vena caua contentus educitur, sed is potissimum, qui in inflammatione continetur, aut est prope inflammationem, præcipuè verò si morbus octo costas inferiores occupet: sed multo magis si quatuor superiores, quòd cum his magnam habeat axillaris vena communionem. In quibus secari vena tutò non potest, cucurbitulæ in principio inguinibus affiguntur ad diuersionem. Purgantia multis de causis reiiciun-

# DE MORB. INTERNIS

*Pleuritidi  
cathartica  
cur minus cō-  
ferant.*

*Hippocr. aph.  
19. lib. 6. &  
Gal. in com-  
ment.*

*Hipp lib. 2.  
de vict. rat.  
in morb. acu.  
sent. II. &  
Gal. ibid.*

*Gal. ad fi-  
nem comm. 3.  
lib. 6. Epid.*

*Peripneumo-  
nia an venæ  
sectionem de-  
sideret.*

tur. Primum, quia cum sputa prodeunt, eorum prohibent motum: deinde in inflammationibus internis nihil est parte inflammata educunt, & partes sanas colliquant: postremò, quia in pleuritide & peripneumonia habitis profluuium ventris metuendum. Quæ omnia docet Hippoc. Sed hæc postrema ratio infirmior. Addit enim Galen. in cocto morbo, & mediocri, non inutiliter aliquando aluum profluere, licet in maligno malum, & ut causa, & ut signum. Causa quidem, quia vires exoluit. Signum, quia attractricis hepatis, & alteratricis, ventriculi imbecillitate significat. Quod autem Hippoc. cum dolor ad hypochondrium extenditur, laxantia præscribit, Galenus concedit, sed tantum ad materiam antecedentis educationem, siue est splene, siue est cauis hepatis, non est thorace, aut latere. Soranus Hippocratem reprehendit, qui non fecit venam, ubi ad hypochondrium descendit pleuritis. Idem Galenus tacite in Hippocrate taxat. Sed enim in exiguo dolore lateris & sputo cruento, quod est indicium clementissimæ pleuritidis, non est necessaria phlebotomia: sed aliis auxiliis profligari debet, maximè in homine biliosissimo, ætate iuniore, vel seniore, ex libr. de Humoribus. Perperam igitur faciunt, qui in cruento sputo statim sanguinem detrahendum esse colligunt. Rarò autem utendum purgantibus, iisque leuibus, in principio, morbo pituitoso per defluxionem, & si materia fluat ab hepate. Sed tutius adhuc clysteribus agitur. In peripneumonia etiam de venæ sectione dubitari potest. Primum, quia ex Anatome non satis perspicuum, quia via materia inflammationis in venam sectam veniat, cum nullus ramus à vena caua pulmonibus distribuatur, & pervenam communem phlebotomia fieri debeat. Deinde quia post pleuritidem, asthma, aut anginam, venæ sectio ferè lethalis, quod iam afflictas vires occupent. At si suppressis mensibus, hæmorrhoidibus, aut solenni aliqua euacuatione vteri, & similibus oborta sit, in quibus hæpar in thoracem & pulmonem sanguinem reiicit, si sputa rubra, plenitudo, & quæ sanguinem indicant nondum degenerasse in melancholiam, aut bilem, de venæ sectione non dubitandum: alioqui abstinendum. In cæteris curatur peripneumonia ferè ut pleuritis, clysteres, sanguinis missio, syrapi, decocta, vnguenta, sacculi, eclegma-

ta, cōdita, frontalia, emplastra, linimenta, cerata, pasta regal-  
lis & similia.

*Id u persflatus ab Aquilonibus.*] Lib. 3. Epid. scribitur in pleu-  
ritide Romanos & Athenienses obiectos ventis calidis mala  
ferre sectionem ventis: Parios & Hellespontios melius. Cate-  
rū non omni pleuritico conuenit necessariò, etsi expuat  
concocta. Lege 6. Epid. & historiam pithyonis initio tertij.

## ANTO. VALETH EXERCIT. XXVI.

**I**llabens in membranam costis subtensam san- *Pleuritidis*  
guis tenuis & biliosus (crassus enim & pituitosus *generatio vni-*  
densum membranæ corpusculum vix subit) tumo- *de.*  
rem & inflammationem, pleuritidem, mutato ab  
affecto loco nomine, appellatam, gignit. Talis verò  
phlegmone ad tria morborum genera referri po- *Pleuritis ad*  
test. Quatenus enim tumor, ad morbum in compo- *tria genera*  
sitione: vt inflammationem sequitur calor & ten- *morborum*  
sio, ad intemperiem reducitur. Et quia tussis ab hoc *reducta.*  
affectu separari nequit, dum rumpitur abscessus, &  
effusa in spatium thoracis sanies in asperas pulmo-  
nis arterias recipitur, tussiendoque excreatur, solu-  
ta quoque vnitas adest. Pathognomonica pleuriti-  
dis verà à spuria notis distincta signa fasè descri-  
buntur ab Hollerio ex Galeno cap. 2. libr. 5. de loc.  
mal. affect. lib. 12. & 13. Meth. itémque comm. 1. in  
lib. de Humorib. secundum Hippocratem.

Affectum hunc quia fluxionis sobolem esse in- *Pleuritidis*  
telligimus, & inhibitionē materiæ affluentis, iis ma- *curatio.*  
ximè in inflammationibus, quæ sunt νόσημα γινώ-  
σκειν, esse vacuatione priorem ex Galeno didicimus,  
basilica dolentis lateris secatur: quæ tamen præter-  
quam quod reuellit, deriuat etiam cōmodè & eua-



# DE MORB. INTERNIS

cuat. Promptè, vel ante solutam aluum, ducitur sanguis: alioqui dolore, ardore, & partis debilitate perpetuò attrahentibus, magis phlegmone exasperatur. Sanguinis detrahendi modum doloris conditio, corporis habitus, & anni tempus indicabunt. Quamquam verò sanguinem vsque ad coloris mutationem mittendum præcipiunt, nisi vel malignitas inflammationis, vel vires hoc denegent, & ægri faciliè propter calidam atque humidam temperiem, qualis est in pueris, & iis, quibus mollior corporis habitus, resoluantur, cauendum tamen diligenter, ne missione sanguinis copiosiore vires multum atterantur, in quarum robore salutis spes in pleuritide consistit. Cathartica valentiora non imperantur, ne agitato corpore fluxionem augeant. Itaque leuior erit purgatio, qualis hæc.

℞. rh. elect. ʒ. 2. infundantur in decoct. pect. cum santal. citr. ʒ. f. in expressione leui dissol. syr. de hyssopo, vel capill. ven. & cathol. ana ʒ. β. f. potio.

Rhei sic imperati adstrictio tanta non est, quæ sputo expellendo obsit, vt meticulosi medici subuerentur.

Quoniam autem coniunctæ pleuritidis materiæ vacuandæ ratio & via cōmodior non est, quàm per asperam arteriam, eclegmatis, syrupis, vel etiam apozematis promouebitur sputum, non omisis interim, etiam ab initio, topicis anodynis paulò post explicandis. Magis aliis placet syruporum, quàm eclegmatum, vsus, quòd internam asperæ arteriæ capacitatem promptiùs subeant, quòdque longè sint paratiores. Si itaque sputum admodum tenue in-crassandum sit, hæc formula præscribetur.

*Hippo. sent.  
74. lib 4. de  
rat. vict. in  
morb. acut.*

℥. syr. de glycyrrhiz. & iuiub. ana ʒ. i. Misce. Vtatur eclegmatis loco cum baculo glycyrrh.

Vel syrup. violaceus in hanc rem faciet. Syrupis licebit aliquid diacodij immiscere. Aut.

℥. cass. recens mundatæ ʒ. 6. diatragacanth. frigid. ʒ. ʒ. pi-lular. hypoglottid. ʒ. 2. sacchar. cand. ʒ. i. ʒ. radic. ircos. Florët. ʒ. i. syr. capill. vener. & de glycyrrhiz. an. q. s. f. eclegm. Adde & velis, conseru. ros. borrag. bugl. ana ʒ. i.

At si sputum præ lentore & crassitie expelli non possit, ex vsu erunt incidentes syrupi.

℥. syr. acetos. simpl. & capill. ven. ana ʒ. i. vtatur cum bac. glycyrrh. vel. ℥. oxymelit. scyllitic. ʒ. i. syr. de hyssop. & acetos. simpl. ana ʒ. 6. cap. vt. antè.

Quod si fortiore sit opus, ex eclegmatis ad asth-ma ʒ. ʒ. radic. ari priùs in hydromelitè cocti ʒ. i. syr. de hyssop. & oxymelitis simplic. ana ʒ. 6. fiet lohot. Sæpe accidit, vt vnà sputum promouere, & vires recreare oporteat: atque tum tabellæ, opiata, condita instituuntur.

℥. conseru. rosar. borrag. bugloss. enul. campan. ana ʒ. 2. diatrag. frig. & diatr. simpl. ana ʒ. i. ʒ. penid. ʒ. 2. electar. de gē-mis ʒ. i. rasur. çboris, corn. ceru. ana ʒ. ʒ. cum syr. iuiubino fiat opiat. vel cum sacch. conditum.

Contingit aliquando, vt copiosa sit fluxio, quæ se in pulmones receptat: in qua ad ea quæ sangui-nem incrassant, catarrhúmque sistunt, confugien-dum, etiam si sputi educationem remorentur. Nam suffocationis periculum, quod à catarrho impêdet, magis vrget.

℥. conseru. ros. antiq. ʒ. i. ther. veter. ʒ. 3. bol. arm. lotæ in ap. ros. ʒ. i. cum syr. ros. sicc. aut papauerino f. opiata. Vtatur horâ somni ad magnitudinem nucis auellanæ.

Sed de reliquis id genus remediis plura cap. de catarrh.

## DE MORB. INTERNIS

Extrinfecus adhibenda, quæ foras trahunt, linimenta, cataplasmata, denique fomenta, si tamen ab his largioris attractio materiæ non metuitur, vel si pleuritis sit notha, vel à flatu, aut fluxione exigua.

℞. olei kerini ℥. i. olei anethini ℥. 6. olei lilior. ℥. 8. f. litus, superposita lana succida.

Sylvius duos aut tres parabat facculos ex floribus chamæm. melil. aneth. furfur. mil. solis in sartag. frixis: quos iubebat admoueri nunc lateri, nunc ad anteriore thorac. partem prope collum, per quam flueret humor, ut eius fluxionem sisterent.

Efficacissimum est & hoc vnguentum.

℞. olei amygdal. dulc. & irini ana ℥. i. axung. gallin. capi. anser. cunicul. butyr. recent. ana 3. 2. croc. gr. 5. cum tantillo ceræ f. vnguentum.

Periclitatores empyrici in oleo ceræ arte Chymica extracto, cum vino albo aut aqua cardui, epoto, vel etiam per se lateri illito summam pleuritidis medelam reponunt.

Cataplasmata si admoneantur, videndum ne crebriore eorum usu pus promoueamus; distulam diaphoresim consilium est moliri. Versa enim in empyema pleuritis funesta.

### De 1 sputo sanguinis. CAP. 27.

**S**anguis expuitur à thoracis venis 2 niger, 3 grumosus 4 fœtidus, cum doloris sensu. A pulmonibus 5 flauus, tenuis, 6 spumosus, sine 7 doloris sensu. Atque hinc rupta, exesa, aut aperta vena. Rupta affatim erūpit ex clamore, casu, cōcussione pectoris, perfrictione, plenitudine. Plenitudo ex ratione vitæ, suppressis mensibus, aut

1 Symptomate cum sim-  
pliciter, tū cum  
phlegmone  
coniuncto  
2 Quia crassus & non  
arteriosus.  
3 Quod in  
capacitatem  
confluxerit.  
4 Quando-  
quidem sit  
corruptus.  
5 Refert e-  
um partem,  
unde manat,  
ideam.  
6 Crebro  
pulmonis mo-  
tu.  
7 Pulmones  
namque sen-  
sus sunt car-  
pores.

solenni aliqua vacuatione. Exesis, 8 sensim & per  
interualla ab humore acri, quem vel caput demit-  
tit, vel ratio 9 vitæ, aliquando etiam inedia 10 col-  
legit. Apertis ex 11 calidior & humidior ratione  
vitæ. Ruptis glutinantia, quæ citra morsum siccant:  
exesis 12 cibi boni succi, & pharmaca sarcotica:  
apertis adstringentia conueniunt.

Expuitur sanguis ab arteria aspera, tùmque do-  
lor sentitur. Omninò paucus sanguis expuitur ex  
faucibus & ore, cum sciectione, non tussis. Tussis  
enim excitatur, cùm ab arteria, pulmone, thorace,  
13 sanguis excernitur. Ex gingiuis tantùm leui spu-  
tatione eiicitur. Aliis à capite defluit, nò adeò pau-  
cus, niger, læuis, linguam & palatum commaculās,  
titillans, ad nates grumos relinquens, ex vulnere,  
frigore, ebrietate, & capitis plenitudine. Qui si par-  
te aliqua in arteriam defluit, tussis irritat leues, faci-  
lèque gargarismis 14 adstringentibus suppressitur.  
Sanguis quoque aliquando euomitur à ventre, lie-  
ne, hepate, proximisq; venis niger, grumosus mul-  
tus. E stomacho verò aut œsophago admodum  
15 exiguus reiicitur. Hæc omnia igitur, priusquam  
remedia instituas, distinguenda sunt.

*Curatio sputi sanguinis è pulmonibus.*

Inedia, silentium, leuis respiratio, veneris & vini  
abstinentia, quies tum animi, tum corporis impe-  
randa sunt. Medicatis alimentis vtendum est, quæ  
morbo conueniunt.

Si à capite defluxio, suppressenda ex iis, quæ cap.  
de catarrho dicta sunt. Componenda tussis, quæ  
vexat grauius. Sanguis, ex interna brachij, angusto  
vulnere, modica quantitate, bis aut ter vna die, aut

8 Quia di-  
stillationes è  
capite, quæ  
tussicuiosos  
et raucos ho-  
mines red-  
dunt, per exe-  
sionem vasis  
tæbe afferunt.

9 Cuiusmodi  
est vsus cap-  
putri, & le-  
porum marini.

10 Prasertim  
in biliosis.

11 Vt vini  
generosioris  
usu.

12 Ad sisar-  
cosim facien-  
dam.

13 Thorax  
enim tussis se  
expedire con-  
tendit omni  
molestia, vt  
ventriculi  
vomitu, &  
cerebri ster-  
nutamento.

14 Vt ex de-  
cocto plâsag-  
bala. sty, cen-  
tinodij, succo  
granatorum,  
& aqua ro-  
sacea.

15 Quia par-  
uas habet ve-  
nas.

## DE MORB. INTERNIS

duabus detrahi debet, sed viribus constantibus. Nam in infirma muliere Romana Galenus libro 5. Method. sanguinem non detraxit: quam tamen percurauit, cum venisset initio (hoc autem initium 1.2. vel 3. die) pauco sanguine excreto. Si plenitudo in causa est, largiùs. Si suppressis mensibus, vena cru-  
ris aperienda est, & aliis artibus mensis irritandus. Iniicienda vincula coxis & brachiis, ad articulos, & in eisdem locis adhibenda frictio. Cucurbitulæ hypochondriis, ilibus, atque inguinibus affigendæ. Sanguisugæ in pectore affigendæ sunt: tum remediis, quæ intrò assumuntur, & topicis vtendum est.

Comparentur illa ex adstringentibus, portulaca, plantagine, polygono, omphacio, sumach, galla, cortice glandium, radice rubi, consolidæ, althææ, centaurij maioris, hæmatite, electro, corallo, balau-  
stis, rosis. Alius ordo.

Bolo armeno, terra sigillata, sanguine draconis, gummi arabici, tragacantha, thure, mastiche, mir-  
rha, melle cocto. Hæc postrema ruptis venis magis conueniunt, vt illa apertis. Oportet autem vitare omninò, quæ nimium adstringunt. Propterea me-  
dicamenta hæc ex glutinantibus, adstringentibú-  
que mixtis componuntur: vt si aperta vena est, ad-  
stringentia: si rupta, glutinantia superent. Sed quia horum vis non facilè penetrat, necesse est aliquid admiscere eorum, quæ tenium sunt partium: qua-  
lia sunt aromata, spica, cinamomum, fantali, doro-  
nicum, & similia ex particularium compositio. Ga-  
len. libro 7.

Atque vbi immodicè perturbat tussis, etiam nar-

cotica misceri debent, opium, semen papaueris albi semen hyoscyami albi, & cicutæ, cortex radicis mandragoræ, philonium, theriaca vnius anni.

*Particularia remedia.*

Xenocrates apud Gal. hædi sanguinem nondum concretum cum pari mensura aceti elixabat, dabátque tribus deinceps diebus. Dosis  $\mathfrak{z}.3.$

Frequens vsus antiquis, maximè initio, atque vbi grumorum suspitio, oxycrati diluti, id est, aceti ita commixti aquæ, vt bibi possit. Acetum quoque in vsu fuit: sed animaduertenda sunt, quæ de oxymelite proximo capite annotauimus.

Coagulum cerui, hædi, leporis, Græcis & Arabibus hac in re commédatur, quod mirum esse possit, cum natura sit acri, digerente, & exsiccante.

Auerrhoës & Arabum familiæ parte aliqua refrigerare, adstringere, & reprimere scribunt, aut elemétari qualitate, aut proprietate quadam. Certum est experimento, quod & Dioscorides scripsit, & in lacte probari potest, dissoluta coagulare, coagulata dissoluere. Deinde modica quantitate exhibetur, & ex iis, quæ vim acrimoniæ refringant.

Dosis ciceris magnitudo ex oxymelite, vel posca, si grumi dissoluendi sunt. Alioqui ex aqua ferrata, plantaginis, & similibus.

$\mathfrak{z}.$  coralli rub. torrefacti, & in aceto extincti, terræ sigillatæ, ana  $\mathfrak{z}. \text{ss.}$  spicæ  $\mathfrak{d}. \text{ss.}$  cum  $\mathfrak{z}. 2.$  succi portulacæ, aut polygoni, vini granatorum, lactis vstulati, fiat potus. Vel ex eodem corallo, terra Lemnia, bolo Armena, cum syrupo rosarum è siccis, vel myrtyllorum, concinnabitur potio. Rhabarbarum māditur, datur in substantia cum aqua plantaginis.

## DE MORB. INTERNIS

Herbas dat Celsus edendas sanguinalem, plantaginem ex aceto. Sūt qui animalium ossa cum suis cartilaginibus & tendinibus siccata in puluerem redigant, quem cum aqua adstringente ponui dent.

℥. carnium limacum coctarum in vini austeri, & aquæ plantag. ℔. 2. conseruæ consolidæ maioris, & ros. ana ℔. 1. Cum decoctione limacum fiat distillatio in alembico.

℥. suprà dicti distillati ℔. 1. coletur per manicam Hippocratis, cum saccari rosati dissoluti in aqua plantaginis ℥. 2. santali, spicæ ana ℥. 3. Symphyti sæpe vsi sunt veteres in sanguinis reiectione, quæ admodum Galen. lib. de theriaca hanc vsurpauit cum symphyti decocto.

Puluis è limacibus in tegula siccatis, sanguinem comprimit.

Idem præstant trochisci de carabe, de terra sigillata cum decocto hæmatitis conquassati: athanasia cum decocto polygoni, vinum saluiatum. Aut.

℥. lapid. hæmatitis, bol. arm. optim. corall. rub. mummiæ, pulmo. vulp. sicci ana ℥. 1. seminis botryos, cinam. ana ℥. 1. sacch. ros. ℥. 3. ℔. cum mucagine tragacanthæ extracta in aqua saluiæ vitæ & myrtillor. f. troch. Vel incorporentur in conserua ros.

Vbi viribus metuitur, expressionibus vtendum est è perdicibus, turturibus, quarum ventres adstringente materia farciantur. Aut distillata hoc modo imperanda sunt.

℥. conseruæ ros. cornorum, symphyti an. ℥. 2. electarij diarrho, Abbatis, diamargar. frigidi, triasantali, aromatici rosati ana ℥. 2. spicæ, cornu cerui, coralli rubri, pulueratorum ana ℥. 1. ℔. trochiscor.

de terra sigillata, de carabæ, de spodio ana  $\mathfrak{d}.$  4. feminis acetosæ, portulacæ, plantaginis ana  $\mathfrak{z}.$  1. aquarum, portulacæ, rosarum, plantaginis, vini granatorum ana  $\mathfrak{z}.$  4. decoctionis duarum turturû, & vnius perdicis lb. 4. cum mica panis albißimi infusi in vino granatorum, & carnibus vnius capi fiat distill. Coletur per manicam Hippocratis vt prius. Licebit etiam parare syrup. è succo plantag. vngula caball. centaurio, scabiosa, bipinella, quo tanquam lohot vtatur.

$\mathfrak{z}.$  4. testarum oui, detracta membrana interiores,  $\mathfrak{z}.$  2. puluerisentur. Dentur ex aquæ plantaginis  $\mathfrak{z}.$  3. succi saluix  $\mathfrak{z}.$  2. sacchari rosati  $\mathfrak{z}.$  3. Detur ieiunis.

$\mathfrak{z}.$  4. gummi arabici, tragacanthi assi, boli armenæ ana  $\mathfrak{d}.$  1. coralli torrefacti, cinamomi ana  $\mathfrak{d}.$  3. Ex lacte cocto eodem modo succi ex supradicta materia ad  $\mathfrak{z}.$  2. aut 3. per se exhiberi possunt. Poterit inspergi  $\mathfrak{z}.$  1. eorum, quæ comminui possunt, aut decoquuntur in aqua pluuiali, in lacte, in aqua ferrata, aut simili.

Centinodium & in iusculis coctum, & partibus adhibitum efficacissimum comperi reiectione sanguinis, menstruis, &c.

Similiter hordeata, lac amygdalinum, ex eiusmodi liquoribus parari debent, iidemque pulueres inspergi possunt. Interim quotidie aqua hordei cum saccharo rosaceo, syrup. è rosis siccis, syrupo myrtill. sanguini temperando erit accommoda. Vsu autē adstringentium aliquando sputum supprimitur, & fit spirandi difficultas: vbi ad lenientia redeundum, vt paulò post obseruabitur.



## DE MORB. INTERNIS

Admouenda thoraci, non quæ adstringunt vehementer (horum enim vis ad pulmonem non penetrat, cogitque sanguinem in pulmones) sed iam vacuata copiâ, sedato motu, vinum adstringens cum oleo rosato, myrthino, cydoniorum. Commodum erit emplastrum præscribere, pectori, dorso, & lateribus affigendum. Quale hoc est.

℞. ceræ, pic. resinæ pini, bitum. ana ℥. i. mannæ thuris ℥. 6. cerul. ℥. 4. vitrioli ℥. 4. opopanax. ℥. 2. ol. quod. l. aceti ℥. 20. Confectionis modum petito ex cap. 4. lib. 3. de materia chirurg. Hyeme etiam nardinum conuenit cum lana sordida in eo madefacta, & appressa pectori. Loco vini, aceti vsus est æstate, benè carnosò corpore, robusto genere neruoso, nec vrgente tussi.

E thure, terra sigill. bolo armena, oui albumine incorporatis cataplasmata fiunt adiungenda thoraci, adiungunturque post vsum lanæ sordidæ prædictæ. Quòd si malum ex perfrictione ortum est, taphia, sinapi, & quæ ex his conficiuntur medicamenta ex vsu sunt. Oportet autem hæc permittere, dum calor medicamento penetret. In grauiore tussi philonij aliquid imperabis, quod aliter Græcis, aliter Arabibus describitur.

### *Philonium Græcorum.*

℞. piperis albi ℥. 20. opij ℥. 10. croci ℥. 5. seminis hyoscyami albi ℥. 20. spicæ nardi, euphorbij, pyrethri ana ℥. 1. excipiantur melle cocto.

### *Philonium Arabum.*

℞. papaueris albi, hyoscyami ana ℥. 20. opij, terræ sigillatæ ana ℥. 10. hæmatitis lapidis, croci ana ℥. 5. castorei, spicæ, euphorbij, pyrethri, margarita-

rum non perforatarum, carabe, zedoariæ, doronici, galliæ moschatae ana ʒ. i. caphuræ ʒ. i. cum melle ros.colato incorporentur. Dosis est à ʒ. β. ad ʒ. i. cum succo arnoglōssi, aut vino diluto modica aqua rosarum.

Rhazes Philoniū sic describit. ℥. piperis, ameos, foliorū rutæ, mentastr. castorei, baccar. laur. cumin. an. ʒ. i. opij, mandrag. seminis hyoscyam. alb. an. ʒ. i. mellis q. s. quoniam scilicet omnium dosis ʒ. i. aut ʒ. 4. Si addas dacrydij ʒ. 1. fiet solutium.

Idipsum, vel philonium Romanum, cum polygonij succo vehementi tussi, vigiliis, fluxionibus medebitur. Vel.

℥. mummiæ puluerat. ʒ. 2. mastichis ʒ. 2. cum mucagine tragacanth. extracta in aqua saluiæ fiant hypoglottia.

Trochisci de bolo armena, & similes cum pulueribus conuenientibus & syrup. ros. sicc. in modum lohot sumi poterunt.

Meminisse verò oportet nunquam vtendum esse narcoticis recens paratis, sed semestri spatium esse expectandum, aut eò plus.

Nec statim his vtendum est, sed tentatis priùs leuioribus remediis, & vbi natura robusta est. Datur tamen interdum theriaca recens, vt quatuor mensium, crassioris fabæ magnitudine, somni conciliandi gratia, fluxiones siccandi & crassandi. Exhibetur autem vespere. Postridie quoque, perseverante fluxione datur eodem vespertino, tempore, sed quantitate paulò minore. Quieta verò iam fluxione, mane sumitur, sed ætate vigente, vt annorum 10.

Velex syrupi de papauere, de iuiubis, rosarum

## DE MORB. INTERNIS

de siccis ana 3. i. parabitur zulapium ad somnum promouendum, & fluxiones præpediendas accomodatissimum. Multa ex quinto methodi colligenda sunt, quæ ad sputum sanguinis pertinent.

### EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

*Αναφορικοί*, quasi ἀνωφέροντες, sursum ferentes, & αἱμοποιοὶ Græcis dicuntur, qui ex inferioribus partibus per os sanguinem reiciunt. Ex ore quidem & gingivis, si expuitione prodeat sine tussi, & paucus: è gutture, si cum screatu: ex aspera arteria, si cum tussi leui: ex pulmone & thorace, si cum tussi vehementi. Sed vehementior adhuc tussis est, cum è thorace reicitur, quia primum ad pulmonem trahitur, & inde per asperam arteriam deturbatur. Vomitu redditur è ventriculo, siue è cerebro defluerit, siue ibi concreuerit, aut casu, vel percussione, vel erosione cumulatus fuerit. Interpretes tamen Coacorum præfagiorum ita habet. Qui spumofum sanguinem euomunt, dolore infra septum transversum non existente, de pulmone vomunt. Et quibus quidem magna in ipso vena

*Galen, libell. de vena sect. contr. Fracturataos.* rumpitur, multum vomunt, & in periculo versantur. Quibus verò minor, minus educunt, & securiores sunt. Quanquam Galenus refert quendam in palæstra graui plaga accepta, ferè duas cotylas sanguinis tussiendo expuisse, qui statim secta vena, & adhibitis iustis remediis conualuit, & in posterum superuixit. Ergo ab apertione venæ, aut ruptione in maiore quantitate reicitur, idque tutius est, licet non sine periculo. Ab erosione verò, in exigua. Hoc deterius, ferèque primum tussim siccam excitat & magnam: aliquando copiosior, cum vas insignè exesum cum vlcere pulmonis, & lateris sinistri dolore, vnde sequitur tabes. Distinguendum etiam diligenter an acrior sanguis & vitiosior distillationem excitet, & in pulmonem confluat, vnde fiat erosio: an vitio pulmonis & imbecillitate excrementum ibi colligatur, quod putrescat: an suppressi menses, aut consueta aliqua vacuatio. Cum reicitur niger & concretus, & antè fluxit è naribus, indicium est è cerebro in pul-

monem profluxisse, aut asperam arteriam. Cognoscitur autem à carne seu propria substantia pulmonis ulcerata exire, *Sanguinis à propria pulmonis substantia manantis signa.* duobus signis certissimis: vno, si sit spumofus, vt scribit Gal. commentar. in aphorism. 30. lib. 7. modò tamen spuma firma maneat. Nam aliquando venis ruptis, aut thorace ulcerato, licet rarò, & non necessariò, spumofus expuitur sanguis, si agitatio quædam ac motus accedat, vnde spuma illi inducatur. Sed hæc citò euanescit. In pleuritide etiam rarò spumofus, licet id aliquando contingat. Alterum est, si carunculæ & ramenta vasorum similiter excreta, & propriam visceris substantiam referentia simul appareant. Spumofus autem est, quia leuis, tenuis, aëreus & spirituosus sanguis, quo nutritur pulmo, quibus accedit motus, & aëris inspirati commotio. Lege cap. 6. lib. 4. de locis affectis, signa Meth. 5. Particularia remedia. 7.

Remedia sunt phlebotomia, potus aquæ, silentium, parçissima vita, exigua respiratio, frictio & vincula extremorum, potiones ad reprimendum sanguinem, Cucurbitulæ in regione hepatis, epithemata, vnguenta, condita, linimenta, syrupi in crassantes, ligaturæ, coctio materiæ, purgatio, dissoluentia sanguinem coagulatum, clementia sputum. In erosione, priusquam, sanguinem expuant, ad diuersionem angustio foramine vena secanda, purgandum, diuertendus catarrhus, caput & pulmones confirmandi. In multitudine humorum è thorace expurganda habeatur ratio, ne materia supprimatur, nève sanguis irriteretur. Etenim suppressio sputo lenientia iterum veniunt vsurpanda. Oxymel & acetum suspecta, si puer, aut mollis æger, macilētus, neruoso genere imbecilliore, asperiore tussi, sputis crassioribus, aut liquidioribus, ægro debili, & senè. Frequenter repetenda phlebotomia, si vlcus non est, si recens malum & non inueteratum, si vires firmæ. E faucibus & tonsillis minùs periculi: ab arteria plus: à pulmone plurimum. Inde enim suppuratio, & tabes.

ANTO. VALETII EXERCIT. XXVII.

**A**ίματος πλύσεως, seu sanguinis reiectionis nomine Galenus libro quinto Methodi cap.

## DE MORB. INTERNIS

*Gal. lib. 1. de  
lo. mal. affect.*

propriè sanguinis exclusionem intelligit, quæ à thorace atque pulmone manat: quanquam sanguis è gula, ventriculo, hepate, splene, nonnunquam etiam ex aliqua oris parte, gingivis, faucibus, gurgulione in os confluat, dum is, qui per nares purgandus erat, ad palatum descendit. Causæ repetendæ ex capite de hæmorrhagia.

*Hæmoptys-  
eos curat. o.*

Ad curationem maximum est in victu incrassante & adstringente, qui & sanguinem ad fluxum reddit ineptiorem, & vlcus ipsum vnit, momentum. Qualis erit ptisanæ cremor, cui inspersa sint malorum punicorum grana: vel hordeatum: quod efficacius fuerit, si hordeum coquatur in decocto lactuc. portul. plantag. centinod. & seminis eorundem, adiecto saccharo rosaceo. Basilica vena confestim pertunditur ad reuulsionem, quia sanguine ad affectam partem semper confluente, frustra adstringentia, agglutinantia, & alia eius generis, præscriberentur. Mox hæc potio propinetur.

℞. rhei vstulati ℥. i. mummiæ, terræ sigill. ana ℥. i. syr. cydon. ʒ. i. cum aq. ros. & plātag. f. potio. Dabitur manè, vesperi.

In eundem vsum concinnantur zulapia, quæ præcipuè sub horam somni assumuntur.

℞. syr. ros. sicc. de papauere, & cydon. ana ʒ. i. aqu. plantag. portulac. centinod. an. quart. i. puluer. corn. ceru. vsti, lapid. hæmatitis an. ʒ. i. mastich. ℥. i. f. zulapium pro dosibus ʒ.

Vel lupinares trochisci, ineunte præsertim somno ore continendi, imperabuntur.

℞. gummi tragacanth. & arab. in aqu. rosar. dissoluti ana ʒ. i. amyli ʒ. 2. bol. armen. terræ sigill. ana ℥. 4. mastich. ʒ. i. cum syrup. myrtill. aut aq. plantag. vel centinod. f. trochisci. Vfus sit, vt suprà.

Hûc pertinebunt opiata, condita, pulueres. Noui nostratem quendam Lemouicum hæmoptoicum, qui cùm alternis temporibus multum reiectasset sanguinẽ, nec vllis potuisset remediis sanescere, ad Iulium Cæsarem Scaligerum, Medicorum suæ tēpestatis facilè Principem, confugit: ex quo puluerẽ accepit, cuius vsu breui conualuit. Huius formulã quia mihi communicauit, liber hîc adscribere.

℥. spodij, ros. rubr. bol. armen. terr. figill. hematitis. ana 3. 5. corall. rub. carab. margaritar. non perforat. ana 3. 2. gummi, tragacanth. ana 3. 2. sem. papau. portulac. sem. mal. sem. ros. rub. sem. arnogloss. cornu cerui combusti ana 3. 3. acac. succi barbæ hircinæ, succ. glycyrrhiz. ana 3. 2. amyli torrefacti 3. 3. Terantur, misceantur, f. puluis: cuius dosis sint 3. 3. Datur cum aqua pluuiali.

Hoc remediũ tandem descriptum reperi apud Serapionem cap. 25. Tractat. 2. Dum verò ista fiunt, si restiter alius, clystere subducetur, vel purgati medicamento adstrictionem aliquam relinquente.

Sic post reuulsionem & deriuationem suppressio sanguinis sputo, & bene purgato corpore, totus thorax oleo cydoniorũ, rosaceo, vel myrtillorũ, ilinetur, maximè verò æstate. Quod si multa fiat sanguinis eruptio, citra tussim, cœli cõstitutione calida, agro robusto & carnoso, spongia aceto imbuta de consilio. Aërij thoraci apponenda. Verum malum à perfectione ortum linimenta & cataplasmata calefacientia postulat. Sed, de his plura vide apud Gal cap. 8. lib. 5. Methodi.

De I Phthisi. CAP. 18.

Phthisis vlcus 2 est pulmonis, quod ferè 3 sputũ sanguinis sequitur, aut tussiculam 4 ex acriore

*1 Quæ sit per  
anastomosis,  
est; funesta  
magnitudine  
causa, vt de-  
stiliatioue ca-  
tarrih e capi-  
te, vlcere pul-  
monum: sym-  
ptomati ca-  
lamitosa vi,  
ob marcorem  
totius corpo-  
ris: diffi-  
cultate cura-  
diquod  
vltus pulmo-  
num curari  
nequeat pro-  
pter perpetuũ  
eorũ motum:  
nec sarcotica  
eò integris vi-  
ribus perduc-  
possint. 2 So-  
lutio cõtinui-  
cum sordibus  
& ichore cõ-  
iuncta.  
3 Rupta in  
pulmonib. re-  
nar. 4 Per  
theorema il-  
lud. Quæcum-  
que distilla-  
tiones à capi-  
te tussiculosos  
& raucos ho-  
mines reddũt  
nisi temporis  
progressus co-*

# DE MORB. INTERNIS

qui scant, al  
teram faciūt  
tabis differē-  
tiā 5 Quia

aer, qui inspi-  
rādo ducitur  
tabificā ac quō-  
rit i pulmonē

b<sup>o</sup> qualitatē,  
Et quod vlcus  
phthiōis sit,

febrisque in  
corde accēda-  
tur. 6 Ex-  
hausti digi-  
torum car-  
ne. 6 Hippo-

cratica vul-  
go dicta, de-  
picta lib. 1.  
Prognō.

8 A siccitate  
partis ex hau-  
sto alimento,

aut cibi vitio  
naturalī fa-  
cultate labe-  
factata.

9 Ichorem Et  
saniem.

10 Quae sit  
phthiriomate  
febre Et aeris  
infectio.

11 Si πικρό-  
χολος nō sit ager. 12 Vena sectio, si agri vires ferāt, celebrari potest ad ardoris fe-  
brilis extinctiōē, Et catarrhi auersiōē. Interim cibādus est ager hordeato, deter-  
gendū vlcus: si quē ager fuerit tēperamento frigidiore, Et si sit hyems, hydrome-  
lite simplici, aut composito ex bechio, scabiosa si autem fuerit biliosior, aqua sac-  
charum aut hydro, dilutiori. 13 Vel ex electario diaireos, saccharo cādo, penidus.

deffluxione. Aliquando etiam ruptos abscessus tho-  
racis, cum, videlicet, effuso pure in spatium thora-  
cis, atque ita putrescente, nec in tempore repurga-  
to, pulmones exulcerantur.

Signa phthisis cum ex aliis, tum ex Hippocr. &  
Gal. Apho. 60. 2. in Prognosticis, & cap. 14. lib. 2.  
Chronion Aureliani.

Phthisim sequitur totius corporis 5 languor at-  
que extenuatio, 6 curuantur vngues, cauantur ocu-  
li, succedit mortifera 7 illa facies, 8 capilli deflu-  
uium sequitur, alui profluuium, & mors.

Hoc malum, vt incurabile, maxima pars veterum  
Medicorum in nulla spe habuerunt.

Itaque initio abstergendum atque 9 resiccandū.  
Vbi iam satis detersum est, atq; iam nihil saniosum  
repurgatur, glutinare oportet. Sed dum hęc fiunt,  
10 extenuatio corporis instauranda est. Vtemur er-  
gò mulsā 11 initio ex aquæ potabilis lb. 1. 3. 1. β.  
mellis. Per omnia vbi detergendum, melle crudo  
vtendum est: vbi glutinandum, melle cocto. 12

Postea verò scēnugræci loti, subinde abiecta prio-  
re aqua, decoct. vtemur, in qua octaua pars vel sac-  
chari, in calidiore conditione: vel alioqui mellis,  
dissoluitur.

Similiter è 13 frictio lini femine, è ciceribus rubris,  
è nuce pinea resinosa, ex iride Illyrica, aristolochia,  
porrò & similibus descriptis in cap. de asthmate.

Alioqui cum quadruplo melle eclegmata fiēt, tritis

atque in puluerem redactis, quæ cōminui possunt. Cicer rubrum in aqua madeat, atque ita tumebit: tum ficcari debet, torrefieri in latere calēte, teri subtilissimè. Eius pulueris ℥. 2. inspergantur mulsæ, aut concorporentur melle.

Marrubij M. 1. decoquitur in lb. 6. aquæ ad dimidias. Colaturæ addi debet lb. 1. mellis, plus minúsque, idque totum decoquitur ad crassitudinem.

E succi marrubij ℥. 2. succi caulium, scyllæ, hyssopi, & similiū, & mellis lb. 1. coctis, fiunt eclegmata, quorum vim augeri volunt, si ℥. 2. pulmonis vulpis ad ℥. eclegmatis admisceas. Nucem pineam, resinofam cum ℥. 1. glycyrrhizæ decoques in lb. 6. aquæ. Col. addes penidiorum ℥. 4. rursus coques ad crassitudinem. Conuenit, ubi tenuis sputatio est, cūmque lenire & coquere oportet.

Similiter è butyro, melle & terebinthina, duobus horum, aut tribus mistis.

Variandæque remedia eiusdem generis, ne fiat satietas.

Diuerſi verò generis, cūm mutātur indicationes.

Intereà videndum, anne à catarrho in fauces prolabente phthisis causam habeat. Tum enim pulmo roborandus, cuius imbecillitate excrementa & gignuntur, & promptius admittuntur. Dein emplastrum è labdano, resina, pulueribus conuenientibus comparatum bregmati affigetur.

Atque dum hæc fiunt, hordeatis cum saccharo, aut melle, lacte amygdalino, vino albo, tenui, & subdulci, lacte, aliisque rebus, quæ vires refouent, utendum est.

Iam purgato vlcere, instauratis viribus, alimen-



# DE MORB. INTERNIS

14 *Ut vitulina carne, pullis gallinaceis.* tis 14 partim mediæ materiæ, partim reficcantibus & glutinantibus vtendum est.

Gestatio mollis conuenit, aër ficcus, balneum dulce ( vt scilicet, firmis viribus, in linteo, quod à duobus teneatur, immergatur balneo, ex decocto omaforû, maluæ, bismalu. & parietar.) à quo inunctio ex oleo violaceo, butyro recenti, theriaca, mythrifatium, emplastra siccantia adiuncta pectori.

15 *Ad mouendi capiti, ad exhauriendû fontem catarrhi.* Dropaces, atque etiam 15 Sinapismi conueniunt.

16 *Hæc ad sistendâ fluxionem.* Bolus armena, terra sigillata & similia imperanda sunt. Hæc ferè placuerunt veteri Medicinæ. Posteritas Medicorum eadem obseruauit: quædam etiam addidit. Lacte 17 plurimùm vsa est asinino, & caprino: in summa seroso, cum detergendum est. Ouillo, vaccino, muliebri, cum refouendû est: vstulato vaccino, aut etiâ cum aqua pluuiali cocto, cum glutinandum. Itaque initio asinino & caprino cum modico mellis, ne cogatur aut acefcat in ventriculo, modico quoque salis vtendum est. Refouentur vires lacte muliebri, quod exugat æger è mamma mulieris, quæ sit sana. Atque id quidem melius est suctum, quia cum lacte spiritus & vita exugitur. Si defit muliebri, vaccinum bibat recens emulctum, cum modico sacchari.

17 *Lactis vsum conceditur, si nulla sit febris excusatio, si non sit popyrus, id est, si non sint flatu viscera distenta, & sit æger ventriculo frigidiore, nec sit cephalalgicus.* Sugendum lac erit matutino tempore. Abhinc tribus horis ouum sorbeant. Vino vrantur albo, tenui, dulci, diluto. Pullaster ad prandiû comparetur infarctus succido hordeo, & passul. mûdatis. Aqua, quâ vinum diluant, & concoquant cibos, sit aqua hordei. Colatitiis, consumpris è perna vitulina, capone iuvene infarcto hordeo cum herbis commodis, locus erit: de quibus paulò pòst.

Hordeata quoque, & lac amygdalarum ex lacte, vel pullorum decocto confici debent. Pineola, castaneæ miscetur hordeatis. Condiuntur multo sacchar. ros. infunduntur illa prius in aqua rosacea veteri, dum coquuntur, eadem aqua insperguntur.

Pythocles ex Hippocrate septimo Epid. lacte, multa cum aqua ammixta, renutriebat.

Vtilissimum erit syrupum resumptiuum, à Ioanne Tornamirano cap. de febre hectica descriptū, Vsurpare.

Resouendis viribus lactis cremor cum multo saccharo conuenit. Sanguis humanus destillatus, aqua cancrorum, destillatum restaurans. Vbi glutinandum est.

℥. lactis lib. i. aquæ pluuialis, in qua rosæ maderint ʒ. 3. Simul bulliant, subinde ferro candente aut calybe intincto. Alioqui.

℥. lactis à quo butyrum extractum sit, lb. ʒ. teneatur nocte vna sub dio. Fortiter agitur & despumetur: cui adde sacchari rosati ʒ. ʒ. boli armenæ ʒ. i. sæpe vtatur. Hoc modo igitur vteris lacte. Saccharum rosatum maximè commendatur initiis recens. Cum glutinandum est, veteri potius vtemur. Similiter conserua rosarum & syrup. ros. Conserua datur per se, aut cum syrupo myrtillorum, aut aqua hordei, in qua cancri fluuiatiles coxerint. Cancrī crudi seruescunt prius in aqua, & repurgati in quadruplo lacte vaccino, aut conuenienti, concoqui debent ad dimidias. Deinde caudæ desquamati, vel per se comeduntur, vel integrè contunduntur, & inde succus in lac, in quo coxerint, exprimitur. Bibitur lac hoc, aut inde amygdalogaia, vel

## DE MORB. INTERNIS

hordeatum. Comparatur maximè, vbi viribus consulendum est.

Túmque aliquando vitellum oui vnà dissoluimus. Coqui possunt ex aqua hordei. Testæ verò cancerorum in fictili vase cremari debent, & glutinando asseruantur.

Eodem modo limaces & testudines præparant. Verùm oportet diligentius multò repurgari. ℞. carn. limac. benè mundatorum lb. i. vngul. callinæ benè tritæ ℥. 2. lactis pinguis q. s. f. decoctio ad perfectam coctionem limacum, deinde expressio fortis quæ saccharo edulcetur.

Pulmo vulpis in frustula diuiditur, abluitur ex vino, incoquitur leuiter in aqua rosarum, decocto sumach, aut simili. Rursus lauatur, siccat. Usus tempore in puluerem redigitur ℥. 2. cum syrupo myrtillorum exhibentur. Vel hoc modo.

℞. pul. pulmonis vulpis. capill. ven. sem. fœnic. ana ℥. 2. incorporentur cum succi liquiritiæ ℥. 2. mellis coct. quantum sufficit, cum affusione modici syrupi de myrtillis.

Consolidant hæc. Caseus recens, lac vstulatum, testæ cancerorum, bolus armena, terra sigillata, sanguis draconis, olibanum, mastix, carabe, gummi arab. corallus, rosæ, balaustia, myrrha, & alia eiusmodi. Dantur ex vitellis ouorum, & alia quædam ex lacte vstulato, succo cydoniorum, rosarum, granatorum, syrup. myrtillorum rosato de siccis.

Vel. ℞. caudarum cancerorum fluuiatill. desquamatarum & lotar. ℥. 3. lactis recent. lb. i. bulliant ad

medias: dein caudæ contundantur fortiter, & cum lacte dissoluantur: cui adde farinæ hord. amyli puriss. ana p. β. lactis amygdal. dulc.  $\frac{3}{4}$ . 4. misce lento igne. Est quoque hîc Philonij perfici vsus, quod proximè descripsimus. Pata leonis vulgò dicta trita affigitur pectori & gutturi: phthificis & anginosi foras attrahere materiam creditur. Rustici transfixam aurem radice implent, & ita curant. Nutriendum aliquando iure galli decrepiti, alterati cum herbis, & ceteris rebus, quæ conuenient. Ad consolidationem maximè facit panis purissimus, cum decocto mastiches pistus, & vinum subadstringens.

Conueniunt fructus, ficus, vux passæ, pistacia, nuclei, pinei, dactyli dulces, pira cocta, & sacchar. conspersa.

Videndumque maximè circa initia, ne nimium siccantibus vtamur, quibus cum volumus vtî, lenientibus commiscebimus, aut multo liquore diluemus. Febricitantibus phthificis, sitientibus, & calidiorem stomachum habentibus diamelon Alexandri è succo cydonior. Vel è cydoniis incoctis in aqua rosar. aut vtrisque seminibus frigidis, additis ros. santalis alb. rub. succ. glycyrrhiz. recent. vel.

$\frac{1}{2}$ . aquæ rosarum  $\frac{3}{4}$ . 4. malorum dulcium libr. i. f. sacchar. lb. i. santal. alb. & rub. succ. glycyrrhiz. rosarum ana  $\frac{3}{4}$ . i. f. quatuor feminum frigidior. ana  $\frac{3}{4}$ . i. syrup. rosar. q. s. Mala intus & extra purgantur, cum aqua rosarum lento igne, vel in diplomate coquantur ad tertias, tere in mortario: deinde in aqua rosarum & syrup. de coque, & cum pulueribus & saccharo misce. Dentur  $\frac{3}{4}$ . 3. mane & vesper. Distil-

# DE MORB. INTERNIS

latum refouendis viribus conuenit.

℥. conferuæ borrag. violarum, ros. ana ℥. i. β. conferuæ ireos, enulæ ana ℥. β. electar. de gemmis sine speciebus, diarrho. Abbatis, triasantali sine caphura, diamargar. frigidi ana ℥. 2. margaritarum perforatarum, coralli, ambræ citrinæ ana ℥. i. paf-sularum, ficuum, sebesten, glycyrrhizæ ana ℥. 6. nucleorum pini, amygdal. ana ℥. β. gummi tragacanthi, gummi arabici ana drach. 2. sem. anisi, fœniculi, vrticæ, quatuor sem. frigid. communium, sem. papaueris albi ana ℥. i. terræ sigillatæ, boli armenæ, rosarum siccarum ana ℥. 3. aquarum bipinellæ, vngulæ caballinæ ana ℥. 4. decoctionis limacum, can-crorum, duarum iuuenum gallinarum ana libr. i. cū carnibus vnus capi iuuenis bene pinguis, vnus perdicis, mica panis in vino odorifero infusi, & lb. i. sacchari albissimi, fiat distillatio. Deploratis insti-tuitur eclegina ex seminis vrticæ ℥. f. cinamom. ℥. i. & mellis quantitate sufficiente, vel decoctum è flo-ribus rosmarini cum aqua pluuiæ. Quòd si his re-mediis nihil proficiatur, vel vruntur, vel relegan-tur ad mare.

## EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

*φθίσις* pro tabe & atrophia qualibet aliquando sumitur. Significat enim syderationem quandam & marcorem, exte-nuationem, ἀπὸ τῆς φθίνεως, ita vt nonnunquam etiam ad oculi affectus traducatur, præsertim pupillæ. Quatuor tamen præci-puæ species reperiuntur, apud Hippocratem & Galenum: re-nalis, lib. de morbis internis: dorsalis, 2. de morbis: extenua-tio sine pulmonis vlcere, ab eius tamen calida & sicca intem-perie, aut febre hæctica: quarta, quæ omnium maxime pro-

*Phthisis qua-tuor species.*

priè *φθίσις* dicitur, Atheniensibus phthoë, ab ulcere pulmonis. *Phthisis pro-*  
 Hæc duo perpetua habet symptomata: febrē lentam, parvam, *priè dicta*  
 putrem, quotidianam, noctu magis, quàm interdiu, affligen- *duo perpetua*  
 tem, quæ oritur à putredine humoris, aut propriæ substantiæ *symptomata.*  
 pulmonis, vnde calor ob viciniam cordi necessario communi-  
 catur: deinde extenuationem totius corporis, colliquatis ni-  
 mirum, & consumptis carnibus, ac solidis partibus supra mo-  
 dum resiccatis, tum ob febrem, quæ corpus perpetuò depasci-  
 tur: tum ob deiectiones humidiores, & crebros sudores, qui  
 inde consequuntur. Exulcerationis pulmonum causæ multæ  
 esse possunt, sed duæ præcipuæ, & frequentissimæ, sputum san-  
 guinis repressum nec expurgatum, & defluxus pituitæ salis à  
 cerebro calefacto. Præcedit tussicula, punctura quædam ad  
 latus, mammillas, scapulas, titillatio faucium, præter cætera  
 signa superiore capite explicata. Familiaris est quibus oblon-  
 gum collum, angustus thorax, caput infirmum, sublimes sca-  
 pulæ, tanquam alæ, vnde *φθινώδες* & *πτερυγώδες*, quasi alati, no-  
 minantur. Apud Hippocr. & Galenum tria in hoc affectu re-  
 periuntur mortis certissima signa, sputum grauiter olens, ca-  
 pilli defluentes, alui profluuium. Quæ tamen tum ad curatio-  
 nem, tum ad prædictionem diligenti egent distinctione. Pri-  
 mum in tabescentibus aliquando gingivæ & os exulceran-  
 tur fluxione, & pituita grauis defluit à cerebro, vnde sputa  
 grauiter olent, quæ tamen mortem proximam non indicant.  
 Deinde alui profluuium quibusdam accidit deficiente natu-  
 ra: aliis conuersa distillatione in stomachum, quibus solet tus-  
 sis imminui: cæteris alia occasione, atque id non semper le-  
 thale. Idem iudicium de capillorum defluxio, quod humorum  
 vitio, & capitis cachexia fieri potest. Ita igitur accipiendum.  
 Si sputum è pulmone educatur, & vel carbonibus inductum,  
 vt vult Hippocr. in Aphor. vel, vt Philoth. in vas vitreum aqua  
 plenum, & impositum prunis iniectum, vt in calefendo dis-  
 solutum vaporem edat, ægro & assidentibus manifestam gra-  
 uitatem & contagiosum halitum inspiret, lethale est. Osten-  
 dit enim putredinem, & *κακοήθειαν*. Deinde grauis halitus cor-  
 vicinum lædit, vnde mors celerior, sicque malum est, & vt  
 causa, & vt signum. In Coacis præfagiis inde etiam mortis a-  
 liud signum colligitur: si, videlicet, sputum iniectum æqua  
 marina æneo vasi inclusa, in fundum mergatur. Idem demon-

*Pulmonum  
exulceratio-  
nis due cau-  
sæ præcipuæ.*

*Aph. II. 12.  
14. lib. 5. &  
16. 7.*

*Philothæus  
comment. ad  
aph. II. lib 5.*

## DE MORB. INTERNIS

frant capilli defluentes ob siccitatem, vel virium imbecillitatem, & humida deiectio, ob potentiae debilitatem, vt ait Galenus. Additur in Præfagiis, si suppresso sputo mens ad nugas & delira verba commoueat. Formula enim mortis in tabidis est, cum sputo retento vel ob copiam, vel virium imbecillitatem, vel adstringentium vsum, obserantur viæ spiritus, vnde ægri strangulantur. Tandiu enim viuunt, quandiu pulmonem per sputa expurgant. Atque etiam hinc efficitur, vt & autumnus, & Ver humores fundendo, & omnes conuersiones insignes tabidis infestissimæ sint, adeò vt his vulgus ipsum sæpè mortem denuntiet, foliis arborum cadentibus, aut renascentibus.

Coquere oportet, tenuare, diluere, expurgare, detergere, siccare, glutinare, instaurare corpus, catarrhum auertere, confirmare cerebrum & pulmones, vitare, quæ deorsum purgant (nisi materia fluente) quia sic sputum & pus retinetur, materiae motu altò reuocato, & corpus magis consumitur. Phlebomia non conuenit vlcere facto, nisi noua fiat expuitio, aut venæ alicuius recens apertio metuatur, & vires ferant. Remedia sunt syrapi, potiones, linimenta in pectore, conseruæ, fumigia pulueres, lohot, hordeum immundatum, lac asininum, balneum, & similia.

### ANTO. VALETII EXERCIT. XXVIII.

*Phthisis  
prima diff-  
rentia ex  
Gal. comm.  
ad aph. 10.  
lib. 3.*

**P**rimariæ duæ phthiseos differentia Galeno statuuntur: vna quidem ab acri distillatione è cerebro, vt pituitæ salsæ, aut biliosæ materiae, sensim ac sensim pulmones excauantis: altera, quæ proprio pulmonis vitio, nulla prægressa fluxione, sit orta, rupto, exeso, aut aperto aliquo vase. Quibus accedit quæ ex fluxione aliarum sit partium. Succedit nonnunquam peripneumoniæ, pleuritidi, empyemati, sanguinis sputo. Interdum morbus est hæreditarius. Est quoque contagiosus. Signis suis satis elucescit.

*Gal. cap. 3.  
lib. 1. de diff.  
febr.*

Phthisis nisi primis statim diebus curetur, insana-  
bilis est: quòd scilicet pulmonis vlcus citra tussim  
expurgari nequeat, à qua tamen maximè laceratur:  
vnde mutuas velut per operas malum tabidis in  
orbem redire consuevit. Deinde medicamenta par-  
ti affectæ idonea, integris viribus eò non pertingūt.  
His causis duabus additur continuus pulmonum  
motus. Et quamuis vlcera pulmonis curaueris, quia  
tamen callosas & fistulosas reliquias ferè depo-  
nunt, facilè denuò exoriuntur. Imprimis igitur, si  
vas aliquod in pulmone sanguinem fundat, vulnus  
quàm celerrimè glutinandum, antequam phleg-  
monem ingeneret, remediis cap. super. explicatis.  
Quod si ferina è capite destillatio primum sit hu-  
ius morbi suscitabulum, venæ sectio, purgatio, ca-  
pitis confirmatio, tussis inhibitió remedio erunt,  
vti in catarrho dictum est. Si vlceris tergendí con-  
siliu præualeat, hydromel solum, vel cum hyssop-  
o, hordeatum, aqua saccharata, syr. de glycyrrh. lac  
asinin. imperabuntur. Sed hæc detergentia nõ dum  
sanguis reiicitur, sed cum restiterit, exhiberi debent.  
Atque tum detergere atq; cõsolidare sic oportebit.

℞. lohot de pulmone vulpis ꝯ. 1. syr. ros. siccat. vel syr. de  
glycyrrh. aut de hyssop. ꝯ. ꝯ. Misceantur. Æger lambendovta-  
tur cum baculo glycyrrhizæ.

Proderit interim suffitus ex yngula caballina, &  
hic quoque puluis longè à cibo vtendus.

℞. bipinell. siccat. ꝯ. 2. ireos Florent. ꝯ. 2. ꝯ. sacch. 1 of. ꝯ. 2.  
vtatur vt supra.

Marcorem verò atq; consumptionem, quã cordis  
exsiccatio infert, instaurare licebit sequentibus re-  
mediis, & parti affectæ, & affectui quoque ipsi con-  
uenientibus.

*Phthisis  
curatio.*



## DE MORB. INTERNIS

℥. amygdal. dulc. mundat. ʒ. 2. pineol. bene præparator.  
passul. mund. in aq. rosar. contus. ana ʒ. i. pulpæ carnis capi,  
vel coxarum ranar. vel cancro. fluuiatil. vel testudin. ʒ. i. β. me-  
dull. quat. semi. frigi. maior. althææ & bombac. ana ʒ. 2. anis.  
ʒ. i. cinam. ʒ. β. amyli parum, sacchar. q. s. fiat passa panis vel  
cum vino (si febris non dehortetur) vel iusculo capi. vel aqu.  
conueniente. Ex qua fiant placentulæ coquendæ in clibano.

Hûc pertinent consumpta ex pulpis optimar. car-  
nium, pullor. caponum, gallinar. & partium succu-  
lentarum vituli, arietis, diu longo igni percoctarû:  
expressa ex armo ouillo, perdicib. assatis, & similib.  
itémque syrupi resumptiui vulgò appellati. Vt.

℥. passul. mund. pistacior. pineol. & glycyrrh. ras. ana ʒ. 3.  
iuiub. sebesten, sic. ping. an. n. 8. hyss. agrim. scabios. bipinell.  
vngul. caball. hordei decorticati ana M. i. semin. melon. bom-  
bac. vrtic. althææ, fœnic. ana ʒ. i. β. flor. viol. & ros. ana p. 2.  
cum carn. duar. testud. nemoral. præparator. & minutim con-  
cisar. f. decoct. ad lb. i. In colatur. dissol. sacchar. albissimi, &  
sacchar. ros. ana lb. β. aspersa ʒ. i. aq. ros. fiat syrup. perfectè  
coctus, cuius cochlearia duo subinde agrotanti exhibeantur.

In admotis magna vis non est, quia pulmo pro-  
fundiùs latet. Si tamen educi sputû oporteat, quod  
ex stertore intelliges, thorax antrorsum & retror-  
sum lenientibus illinetur ex cap. de pleuritide repe-  
tendis.

### *De cordis tremore seu palpitatione.*

C A P. 29.

palpitatio  
cordis, quæ  
frequentè af-  
fert syncope,  
est insanabi-  
lis, & quæ fit  
ex cõmissione  
pericardii cū  
cordi.

Π Α' λμος, quem formidinem quidam veterum  
appellant, motus est præter naturam ab ex-  
cretrice incitatus, cū id quod nocet, aut nocere vi-  
detur, expellere contendit. Id ipsum verò aliquando  
aqua est concepta cordis panniculo præter modum

aucta. Aliquando vapor quidam crassus cordi inclusus : aliàs etiam aliunde importatus, vt è matrice, ventre, & proximis visceribus. Interdum venosus per arterias & venas illatus. Inflammatio quoque & 2 tuberculum palpitationis causæ esse possunt, vt & intemperies. Quæ omnia ex cordis 3 temperamento, totiusque corporis antecedente vita, & aliis signis coniectura artificiali 4 distingues.

## Curatio.

Si sanguinis 5 copia in causa est, si aqua concepta panniculis, si 6 inflammatio, aperienda est vena 7 dextra basilica. Auicennas & Arabes dextram, si sanguis causa est, sinistram basilicam, si 8 vapor, aperiunt. Sinistra quoque aperiri potest, si materia non ventriculis cordis, sed corpore concepta est. Quodd si malum ab inferioribus partibus inuehitur, aut insignis plenitudo est, venæ crurum secari debent.

Gal. quinto de locis affectis omnes adiutos phlebotomiâ scribit, & extenuante victu, quibus cor palpitabat. Id autem, quia verisimile sit vaporem esse crassum; vnde cor palpitat. Neque inutilis est purgatio, si cacochymum corpus est: siquidem ex vitiosa materia excitatus vapor palpitationem inuehit. Quod ad reliqua attinet, distinguendum est, sitne causa frigida, an calida, vt inde ratio vitæ instituat, quæ vim medicatam habeat, & malum corrigat.

qui hemorrhoidibus laborarunt, aut qui vino se & carnibus inuitant multis.  
6 Quæ pulsû duro & febre dignoscitur. 7 Vt reuelatur sanguis calid. 8 Qui ducitur per os secundum arteriam venosam parte sinistra, aut hypochondrio sinistro per arteriam celiacam.

2 Vt in gallo dissecto obseruasse se tradit Gal. cap. 1. lib. 5. locor. male affectorum.

3 Cuius signa pete ex Galeni microtegni.

4 Vt ritè curatione instituas. Nā vt

sunt cause, sic et morborum idea: & vt morborum idea, sic varia remedium

genera instituenda sunt.

5 Vt inueniuntur, quæ ex

ephelis excessive ob ha-

emorrhag. naturalem sup-

pressam; aut in mulierib<sup>9</sup>,

quibus menses nō respondent, aut in,

## DE MORBIS INTERNIS

Materia itaque calida, ambra, styrax, calamintha,  
moschus, lignum aloës, caryophyllū, cinamomum,

9 *Viſ. cor-* cortex citri 9 & citrangulorum, crocus, nux mo-  
*ticis citri cō-* ſchata, macis, ſem maiora, baſiliſci, vinum aromati-  
*ditū, myroba-* cum, odoriferum ( Hippocraticum vulgò appellāt)  
*lan. cōd flor* enula, fœniculus, petroſelinum, galanga, zedoaria,  
*orengiæ cōd.* amomum, cardamomum, cubebæ, roſmarinus, mē-  
*nucis moſcha* tha, polium, calendula, theriaca, mythridatium, 10  
*te cond. con-* potio moſchata, electarium lætificans Galeni, diam-  
*ſeruæ anth.* bra, diamargariton calidum, diathodon cum ſpe-  
*viol. bugleſſ* ciebus, alipta moſchata, gallia moſchata, pleres ar-  
*ana 3. 2. ſpe-* chontica, capus, perdix, & volatilia. Eiuſmodi, con-  
*ciertū diamar* fixa lardo, conſperſo priuſ cinamomo, aſſa cum  
*gariti calid.* aſperſione vini aromatici. Confectio de aromati-  
*aromatici ro-* bus, vbi ſuſpicio eſt auræ venenofæ, plurimū com-  
*fati, lætitie* mendatur. Interim verò ſi cordis calida intempe-  
*Gal an 3. 2. ſ.* ries ſuaſerit, ad refrigerantia conuerrere, opportu-  
*ſacchari ro-* num erit, & cum ea pugnare ſumptis ſyrupis è flo-  
*fati ad pon-* ribus perſicorum, è granatis, de ribes, de ſucco ace-  
*duſ omnium,* toſæ, &c.  
*fiāt trochiſci*  
*Dentur bis*  
*in die è co-*  
*chleari.*

10 *Vel* ℥. Conuenientissimi verò in causa frigida sunt tro-  
*cortic. citr.* chisci moschati, quorū hæc est formula. ℥. mastich.  
*conditi, conf.* spicæ, xyloaloës, cinam. caryophyl. gall. moschatae,  
*borrag. me-* cubeb. cardamom. granor. paradisi, cortic. citr. ana  
*lißæ an. 3.ß.* cubeb. cardamom. granor. paradisi, cortic. citr. ana  
*cōfect. alker-* ʒ. 4. moschi ʒ. ʒ. cum vino odorifero fiant trochisci  
*mes, myt bri-* pondere 3. 1.

*Frigida materia.*

*ana ℞.i. fiat  
bolus: desur  
sub horam  
semni.* Violæ, nenuphar, rosæ, santali, caphura, acetum;  
omphacium, berberis, cerasa, & pruna acidula, ace-  
tosa, succus malorum granatorum, pomorum odo-  
riferorum, acetositas citri, limonũ, citrangulorum,  
perfica, carabe, coriandrum præparatum, cydonia,

pira, lac acetosum, diarhodon Abbatis sine speciebus, diamarg. frigidum, triasantali. Condita ex his, ut conseruæ & 11 syrupi. Sed condita & opiata sicioribus, humidioribus arida, ceu trochisci, magis erunt ex usu. Distillata in balneo mariæ, ius pulli infarcti floribus cardiacis, & similia. Ambigua, aurum, argentum, margaritæ, coralli, os de corde cerui, rasura eboris, cornu cerui, vnicornis, fragmēta hyacinthi, smaragdorum, blattæ bizantiæ, spodium, doronicum, melissa, borrago, buglossum. Sed horum quædam ad frigida, quædam ad calida referri possunt. Ex his trochisci comparantur, fiunt 12 epithemata, poma odorifera, stragulæ & vestes suauitatem odore imbuuntur. Potiones conficiuntur, quæ & palpitacioni cordis, & syncopæ conueniunt. Trochisci quoque parantur ex materia eiusmodi. ℞. spodij, scamin. cucumeris, citrul. endiu. lactuc. portulac. ros. santal. albor. ana ℥. 4. caphur. ℥. 1. cum succo citrul. fiunt trochisci pond. ℥. 4. Sumat quotidie unum cum liquore conueniente, ut cum aquæ rosarum ℥. 1. in qua ℥. 4. ligni aloës maduerint.

Electarium de gemmis, confectio de ligno aloës, cardiacos releuant.

Proderit & vinum diluere aquis cardiacis, in quibus vnicornis maduerit.

Auro & argento sic vtendum est. Calefiant in mediis carbonibus; deinde quadragesies recalfacta extinguantur in vino, aut liquore conuenienti. Liquor postea bibitur. Horum quoque vim relinquunt volunt, si conseruantur in ventre volatiliū, dum elixantur aut assantur. Retinentur ore, & salua deglutitur. Hoc modo argentum sitim lenit. Alij tenuis-

11 Vt ℞. suc-  
corum depu-  
ratorum bor-  
rag. acetose,  
endiuia, ci-  
tri, pomorum  
odorifer. ana  
℥. 3. sacchar.  
9 ℥. f. syrupus  
vtatur bis in  
die cum aqua  
decoctionis  
acetoselle.  
12 Vt ℞. a-  
quarū scabi.  
acetos. buglo.  
ros. melis. ana  
℥. 3. santalo.  
omnium, tro-  
chisc. de ca-  
phura ℥. 2. f.  
epithema pro  
corde.

## DE MORB. INTERNIS

simis bracteolis, quæ folia vocant, & inde condita, electaria vegetiora reddunt. Rursus alij in pulvisculum tenuissimum comminuunt, & ita cum iusculo gall. decrepiti, cum collatitiis, expressionibus, distillatis exhibent. Sed hæc metalla venena credita sunt antiquis, ob immixtum hydrargyrum. Est & aurum 13 potabile in eundem usum. De colorato confectio alkermes cum rasura vnicornis mirificos præstabit sanitatis fructus.

13 *Hoc commentum est.*

### EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Omni-  
bus  
partibus vim quandam naturam insitam esse, quâ quod offendit, quoad fieri potest, à se propellant, haud dubium est. Omnium tamen non eadem ratio. In epilepsia, sternutatione, vomitu, id contractione efficitur: in tussi, efflatione. In cordis autem palpitatione idem fieri suspicari licet. Concutitur enim cor, & veluti tremulo quodam motu afficitur ob causam noxiam, tanquam ingressum repente hostem formidans, aut superaturum, aut præ imbecillitate languescentem sibi cessurum. Neque tamen negamus vera & propriè dicta palpitatione, de qua Galenus agit, cor affici, id est, dilatari & inflari præter naturam à substantia halitiosa & copiosa, cum perspirare non potest: subsidere autem, ubi foras extrusa fuerit, aut ut alij volunt, palpitationem cordis mediam quandam esse dispositionem, inter pulsum & imbecillitatem. Sed non ideo dilatatur, quia impletur: aut subsidit, quia vapor foras truditur. Verum cum vaporem aliunde irruentem, vel in se genitum præ imbecillitate dissolvere, aut arcere nequeat, modò dilatatur, modò contrahitur in sese, quia stimulat, & palpitatione excutere nititur quod nocet, donec liberum habeat motum, vel omnino deficiat. Unde sæpè syncope, aut mors repentina consequitur, præsertim si causam intra se præsentem semper habeat. Inde enim cum & frequentius, & vehementius irritetur, tandem repente succumbit. Ob id optimè Hippocr. Qui frequenter ac fortiter absque

*Palpitatio tremulus quidam cordis motus.*

*Hippo. aph. 41. lib. 2.*

absque causa manifesta deficiunt animo, de repente moriuntur. Quod ad cordis palpitationem etiam, quæ sæpe syn-  
 copem antecedit, iure accommodare videtur Galenus. Ex-  
 citari autem potest à tuberculo, abscessu, multo sanguine  
 obstructionem faciente, intemperie calida, vermibus non  
 solum orificium ventriculi, sed & cor ipsum vellicantibus,  
 ut vult Mesuæus, subita vacuatione, imprægnatione, in-  
 flammatione, aqua tunica inclusa & humore putri ac malè  
 olente plena, lapillis, venenosa qualitate, spirituosio halitu,  
 siue ab externis, siue ab internis, siue in ventriculis cordis,  
 siue in substantia, siue in pericardio, siue in arteriis causa  
 subsistat, siue accidat extrinsecus, ut vtero, liene, hepate,  
 ventriculo. E quibus causis nonnullas in dissectis corpo-  
 ribus hoc morbo peremptis exploratas habuimus: quas non  
 grauabor hic subiicere. Archidiaconi cuiusdam dissecto  
 cadauere, abscessus in substantia cordis iuentus. In alterius  
 pericardio, aqua. In Britone quodam in collegio Trique-  
 tico iacente, inflammatio cordis. In alio, abscessus in vena  
 arteriosa. In multis pericardium flatu distentum, qui  
 tandem solet in aquam concrefcere, nisi cordis calore dissol-  
 uatur. In muliere, quæ quatuor mensium spatio incredi-  
 bili vrinæ cruciatu laborauerat, duo calculi reperti in corde  
 cum multis abscessibus, integris renibus & vesica. Sed no-  
 tatu dignissima historia Præsidis primarij Rhotomagensis,  
 nomine Remon. Ab ineunte ætate ad annum quinquage-  
 simum quintum, quo obiit, cordis palpitatione corripi so-  
 lebat, præsertim à somno meridiano, & ubi arctius tibias  
 constrictas habebat. Sensus quidem tremulus erat ad caro-  
 tidas, hinc pulsus vel nullus, vel paruus, & sine ordine. Sol-  
 uebatur paroxysmus edito crepitu, ructu, clystere, dolore in  
 medijs clauiculis excitato, deinde in frõte, vel tussi satis violen-  
 ta sponte mota. Relictis tibiarum vinculis, & somno melius  
 habebat. Eadem symptomata in muliere nobili apparue-  
 runt. Vtrisque hepar calidius, ventriculus frigidior. Hinc  
 multa fuliginosa excrementa, spirituosusque vapor & crassus  
 in arteriis interceptus continebatur, qui in cor exhalans, in-  
 cutiebat tremorem & palpitationem, donec motu, attritu,  
 aut calore (quod ad id non sufficeret, facultas vitalis) dissol-

*Palpitatio  
infinitis fere  
modis excita-  
ri potest.*

*Io. Mesuæus  
cap. de tremo-  
re cordis.*

*Archidia-  
coni palpita-  
tione cordis  
intercepta hi-  
storia.*

*Brito ex in-  
flâmato corde  
palpitans oc-  
cidit.*

*Palpitâs ex  
abscessu in  
arteriosa ve-  
na moritur.*

*Mulier ex  
calculis & cor-  
de reiectis co-  
borta inflâ-  
matione con-  
cidit.*

*Præses pri-  
marius Rho-  
tomagensis,  
REMON  
palpitatione  
cordis crebro  
drûque cõsi-  
stas.*

## DE MORB. INTERNIS

ueretur, aut alicunde exitum haberet. Ob eandem causam ictericis, splenicis melancholicis ferè omnibus, cachexiâ laborantibus, puellis solet contingere, vapore flatuoso educto ex vitioso humore. Eodem modo Galenus refert ex balneo & vitiosis lignis succensis mulierem solitam animo deficere. Alteram ab vteri affectibus idem pati. Cuidam, si vel per horam lauaretur, idem accidere, nisi prius panis aliquid assumpsisset. Hominem, dum exolueretur, & cor fortiter palpitaret, repentè interiisse. Sed omnibus neque eadem causa, neque eadem pars affecta. Modò enim in ore stomachi, modò in corde fit principium defectionis animi. Palpitatio quoque non semper causam habet in corde, sed pars aliqua affecta est, cum qua mutuum habet consensum, vt pericardium, & arteriæ, præsertim maiores & viciniore, inde vterus, & similia. Causa autem modò per se morbum efficit, vt tuberculum, aqua, inflammatio: modò aliquid commouet, quod morbum efficiat, vt balneum & ligna succensa in muliere, cuius meminit Galenus, & hepar ac ventriculus in Præfide Rhotomagensi. Quam causam Hippocrates manifestam appellat, aphorismo adducto, sicut priorem non manifestam, à qua periculum mortis repentinæ imminet, non ab altera, licet tandem quoque interficiat. Ob idque vitam Præses ad 55. annum produxit, cum ceteri eodem morbo, sed causa dissimili, breui perierint. Frequenter hoc modo fit. Sympateia aliarum partium, præsertim quibus arteria magna insidet, decubitu in dorsum & renes vsu vaporosarum rerum, animi vehementi perturbatione, accedente cordis promptitudine per intemperiem calidam, pestilentiali aëre, fætido halitu & venenoso, venenis, tumore vehementi, & similibus. Pulsus & in morbo, & in valetudine euarians, vt è magno in paruum, veloci in tardum, raro in frequentem, affectum cordis indicat vel primum, vel secundarium, ac tanto periculosiorem, quanto vel frequentius corripit, vel magis continuus vt à nobis obseruatum est in clarissima muliere, Dom. Duchastel. A flatu fieri indicant repentina accessio, asthma, motus tremulus in genis, aut alia parte, dolor

*Gale. comm.  
ad aphor. 41.  
lib. 2.*

*Palpitatio-  
nis causa nō  
semper in cor-  
de posita.*

subitò accedens & desinens, obtenebratio in oculis, sibilus aurium. Ab aliis causis, intemperies corporis, symptomata, & similia.

Remedia sunt, victus attenuans, exsiccans, medicamenta alterantia, cardiaca, purgatio, phlebotomia, pilulæ, opiatæ, condita siccioribus naturis: humidioribus trochisci & arida, epithemata, vel potius sacculi, syrapi, clysterum usus, præsertim in paroxysmo. Celerius enim vapores reuocant. Frictio è linteis, quæ conceperint odorem pulueris violati, fortis inspiratio, ut gementium, contentis in ore cardiacis antidotis, quòd magis penetret qualitas, illitus arteriarum, ubi magis pulsant, & affricatio per eadem medicamenta cardiaca, vaporatio. Phlebotomia & victu attenuante curabat Galenus. Quod optimum est in crassiore sanguine & vapore. *Gale. sub finem cap. 1. lib. 5. de loc. mal. affect.* Omnes tamen scribit ante senectutem mortuos, vel syncope, vel alio genere morbi. Vitentur vincula extra accessiorem, adstrictio à vestibus in ventre, thorace, iugulo, alis, inguinibus, & ubicunque insignia vasa, præsertim arteriæ. Si in febrem acutam incidant, corripuntur syncope, ut in vacuationibus imperandis & balneis maxima cautio esse debet. Ob idque ad periculi prædictionem, ne in Medici culpam mors reiiciatur, interrogandus æger in morbis, num per sanitatè aliquândo soleat exolui, aut palpitare cor. Sæpè etenim, dum sanguis mittitur, purgantur, & ea fiunt, quæ ex ratione morbi oportet, syncope intercepti moriuntur.

## ANTO. VALETII EXERCIT. XXIX.

**P**Alpitatio cordis est dilatatio præter naturam, morbi solius opus. Vnde improprie, & solum secundum analogiam tremor appellatur, siquidem hic fiat à natura & morbo, quum voluntarius motus inchoatus non perficitur. Huius affectus causa est, vel cordis intemperies frigida, vel sanguinis copia, vel vapor aliquis, aut aquea substantia plus æquo in pericardio contenta, vel eiusdem tuberculum aqueum, carnosum, sanguineum. Primariò cor

*Galen. initio libr. 2. de caus. sympt. Gale. cap. 2. lib. 5. de loc. mal. affect.*



## DE MORB. INTERNIS

afficitur, vel per consensum corporis totius, vt in febre pestilente, aut maligna, vel viscerum.

*Palpitationis curatio.*

In palpitationis curatione minimè procrastinandum, quia syncopen, atque etiam mortem repentinam sæpè inuehit. Mittitur sanguis, sed parciore manu, è basilica sinistra, nisi plethora dextram aperiendam suaserit: alioqui promptius à sinistra auxilium.

Serosus, aut pituitosus humor, qui sæpiùs morbi huius soboles existit, cathartico accommodato purgabitur.

℞. radic. gram. & petros. ana ʒ. 2. flor. cardiac. ana p. i. semin. card. benedict. anis. & fœnic. ana ʒ. ʒ. f. decoct. In colat. pro dosi infunde agar. recens trochis. ʒ. 4. rhei elect. ʒ. i. cinam. ʒ. i. In express. dissol. syrup. laxat. rosa. pallid. ʒ. i. f. potio.

A purgatione parabitur humor zulapiis è syrupis de hyssop. capill. ven. de bugloss. aquis melissophyll. beton. card. concinnatis. Proderit ante, aut post zulapium tabellam vnam electarij aromatic. rosati, aut alterius recens parati sumere.

℞. electar. lætif. Galen. dianisi. ana ʒ. i. ʒ. rasur. ebor. corn. cerui, ossis de cord. ceru. ana ʒ. ʒ. santal. vtriusque ana ʒ. i. sacchar. in aqu. melissophyll. dissol. q. s. fiat electa. per lozeng. pond. ʒ. 2.

Iteranda erit superior purgatio: vel hæ pilul. ante pastum alternis diebus imperandæ.

℞. aloës elect. ʒ. 2. myrrh. agar. trochis. & rh. elect. ana ʒ. 2. cum syrup. de hyssopo f. massa. Ex cuius semidrachma fingentur duæ, aut tres pilul. duab. hor. ante pastum sumendæ.

Intereà cardiacæ potiones, opiata, condita non omittantur. Cordis verò regioni extrinsecus sacculi applicandi.

℥. flor. bugloss. melissophyll. rosmarin. ana ʒ. 2. ling. aloës, mac. ana ʒ. i. cinam. nuc. moschat. ana ʒ. β. santal vtriúsque ana ʒ. i. f. puluis. Excipiatur gossipio moschato, fiatque sacculus panno serico intersutus: admoueaturne gioni cordis.

Eidem epithemata instituuntur ex aqua. melissophyll. calendul. cardam. borrag. vino odorifero, puluerib. agallochi, cinam. carophyllorum: vel ex iisdem pulueribus oleo irino & moschato exceptis, cera pauca addita linimenta.

Verum si feruor cordis palpitationis causa sit, contraria usurpabuntur remedia, cum sumpta, tum admota, scilicet refrigerantia: quorum materiam copiosè descriptam reliquit Hollerius.

*De Syncope. CAP. 30.*

**S**YNCOPE est 1 præceps virium lapsus ex insigni 2 spiritus euacuatione, alteratione, 3 interceptione. Euacuatur spiritus, quia subtilior factus est, quia corpus rarius est, in acri vehementique calore. In 4 vehementi animi motu, cum iis, quæ excernuntur immodicè, doloris grauitate, morbi magnitudine, fame, abscessus 6 subita eruptione, & maximè in parte princeps, aut quæ arteriis plena est: neruo, aut neruosa parte affectis longo labore, ore ventriculi insigniter affecto, vel ab humorum frigidorum copia, vel ab humorum acrimonia, lentore, crassitie. Aliquando etiam intemperie. In cruditate, quam sequitur alui solutio, intemperie partium principum & consentientium.

*nu vomica, aneurismi: a te rupto: hepatis quoque vomica: vacuatione repentina hydrops, aut empiematis.*

1 Ex spiritu et partium solida rum corruptione & alteratione: in quorum commoderata quantitate et qualitate virium robur consistit.

2 Tum etiam generationis priuatione, υπερκάθαρσις.

3 Ut animi perturbatio, ne, respirationis difficultate, insignium vasorum obstructione.

4 Unde repentinus natui caloris motus intro, aut foras.

5 Ut deiectionibus, vomitionibus, cholera, morbo, sudoribus magnis.

6 Ut pulmo-

## DE MORB. INTERNIS

Vteri affectibus, intemperie calida & sicca nimis attenuatis humoribus, vitalis virtutis imbecillitate. Alteratione verò, intemperie totius corporis principiorum, & earum partium quæ consentiunt, corruptione, vel ab aëre pestilente, vel à venenis externis, ab internis humoribus venenosis, à materia putri retenta in ventre & intestinis. Interceptione, ab humorum copia, à crassitie & lentore eorundem, qui vias spirituales intercipiunt. Distinctis causis curationem institues, colligésque ex primo ad Glauconem, quæ ad hanc rem pertinent. Similiter & ex lib. 12. Methodi medendi.

### *Curaq.*

In euacuatione, refouendæ sunt vires, paucò alimento dato interuallis, 7 distillatis, expressio-  
nibus, gelatina, 8 iusculis, vino, aromaticis.

### *Puluisculus cordialis.*

℥. marg. splendorum ꝑ. 2. rasuræ eboris, of-  
fis de corde cerui ana. ꝑ. 1. vnicornis Gr. 4. sacchari  
viol. 3. 2. Utatur medio cochleari cum syrupo de  
acetositate citri. Alius

℥. corticis citri 3. i. margarit. splendorum ꝑ. 2.  
sem. citri conditi, sem. melonum, & acetosæ ana  
ꝑ. 2. limaturæ auri, fragmentorum smaragdi, hya-  
cynthi, saphiri ana ꝑ. 1. sacchari rosati 3. 3. misce,  
detur medium cochleare cum vino albo, tenui, o-  
dorifero, & parum vinoso, diluto cum aqua, in  
qua aurum sæpius extinctum sit.

Exhibetur verò vinum, quod sua substan-  
tia spiritus quàm celerrimè repare. At aduer-  
tendum est, ne sit aliqua viscerum inflammatio,  
aut delirium, aut ardorem cruditate. Alij syrupum

7 Ex cõser-  
uis cardiacis  
pulueribus se-  
minibus, flo-  
ribus, fructi-  
bus. Vt ex cõ-  
seruis borrag.  
bugloss. anth.  
nuce moscha-  
ta, & id ge-  
nus reliquis.  
8 Diffeca-  
tur in frusta  
capus aut co-  
xa aristina  
& coquitur  
in phiala bul-  
liente in vase  
magno aquæ  
pleno, datur  
cũ omphacio  
simonum.

acetositate citri ad  $\mathfrak{z}$ .i. cum aquæ oxalidis  $\mathfrak{z}$ .2. dissolutum propinant.

*Trochisci calidi.*

$\mathcal{L}$ . mastichis, spicæ, ligni aloës, cinamomi, caryophyllorum, galliæ moschatae, nucis moschatae, cubebæ, cardamomi maioris, granorum paradisi, corticis citri ana  $\mathfrak{d}$ .2. moschi Gr.6. Cum vino odorifero fiant trochisci, pondere  $\mathfrak{z}$ .i. aut  $\mathfrak{d}$ .4. Alius pulvisculus ad idem.

$\mathcal{L}$ . electarij de gemmis, confectionis alkermes, aromatici rosati ana  $\mathfrak{d}$ .2. macis, cinamomi ana  $\mathfrak{d}$ . $\beta$ . sacchari in aqua borraginis dissoluti & siccati  $\mathfrak{z}$ .3. misce, fiat pulvis.

*Epithema frigidum.*

$\mathcal{L}$ . aquæ distillationis rosarum, 9 violarum, 9 *Vel acetosa*  
borrag. ana  $\mathfrak{z}$ .3. vini tenuis odoriferi  $\mathfrak{z}$ .i. specierum *scabiosæ, tunc-*  
diamarg. frigidi  $\mathfrak{z}$ .i.  $\beta$ . misce. Pannus purpureus his *tundem.*  
calidis imbutus cordi admoendus.

*Epithema calidum.*

$\mathcal{L}$ . vini quartaria tria: melophylli, moschatae  $\mathfrak{z}$ .3. misce.

*Inunctiones.*

$\mathcal{L}$ . olei de costo. & iasmino ana  $\mathfrak{z}$ .i. ambrae Gra. 4. Alia.

$\mathcal{L}$ . 10 olei viol.  $\mathfrak{z}$ .2. cum duobus granis caphu-  
ræ misce, fiat inunctio.

Inunctiones, & epithemata sub sinistra mamma fiunt.

Potiones fiunt in frigida, ex vino tenui odorifero, ex syrupo de corticibus citri, cum aquis me-

10 *Vel olei ro-*  
*sati & cydo-*  
*niorum an.  $\mathfrak{z}$ .*  
 *$\beta$ . his imbutis*  
*go  $\beta$ ipm car-*  
*ptum cordi*  
*admonetur.*

# DE MORB. INTERNIS

lissophyll. borraginis, calendulæ.

In calida, cum syrupo de limonibus, de persicis, oxyfacchara simplici, syrupo acetoso, violato, de acetositate citri, & similibus. Maximè commendatur syrupus de pomis, qui ita parari debet.

11 Vel. ℥. suc  
coriū depura-  
torum aceto-  
se, agrest. en-  
dinia, borra-  
limonum, po-  
morum odori-  
ferorum ana  
℥. 3. sacchari  
rosati q. s. fiat  
syrup.

℥. 11 succi pomorum odoriferorum cocti & depurati lb. 1. coletur per manicam Hippocratis cū facchari violati ℥. 3. cinamomi ℥. 2. Vel, recentiorum more, cum æqua portione, aut paulò minore facchari, fiat syrupus. Eliguntur poma omnino odorifera, partim acidula, partim dulciuscula. Alioqui 12 pomatio optimo vtendum est, ex quo vel iulep, vel syrupus parari potest.

12 Modò id  
abradendo &  
exasperando  
nō sit intesti-  
nis molestum.

## EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Vires corpo-  
ris in quibus  
sint cōstitutæ.

Εκλυσις leue animi deliquium: λειποψυχία animæ defe-  
ctio grauior, nondum tamen ad sudorem vique: Syncope,  
grauissima & morti finitima, quasi concisio, quodd spiritus, &  
vires concidant. Philotheus loco λειποψυχίας, in Aphor. λει-  
ποθυμίαν, animi defectum dicit. Sunt, qui distinguant. Aëtius  
libr. 5. εκλυσιν, & λειποθυμίαν pro eodem sumpsit. Distinctio fa-  
cilior hac methodo, cum causarum varietate innotescet. Ani-  
mi defectionem nihil aliud esse, quàm præcipitem virium la-  
psum communi omnium notione perspicuum. Vires autem  
sunt in spiritu calori natiuo iuncto, & temperamento solida-  
rum partium, calore insito, & humore primigenio siue radi-  
cali constante. Ergo in tam præcipiti virium lapsu, vel spi-  
ritus, vel temperamentum, vel utrūque collabitur. Spiritus  
autem vitalis cū sit in corde, duplicemque motum habeat,  
vel intrò, foras, vel foris, intrò, deficit, vel quia non genera-  
tur, vel corrumpitur, vel alteratur, vel non mouetur, vel diffi-  
patur. Non generatur vel corrumpitur à proprio recepraculo,  
propter intemperiem fortem cordis, vt scribit Galen. cap. 1.  
libr. 5. de locis affectis: vel defectu alimenti. Corruptitur,

vel alteratur, à venenata qualitate, siue interna sit ab aliquo membro, siue externa, vt ab ambiente aëre. Non mouetur ad externa, sed intrò cogitur & suffocatur, vel ab affectionibus animi vehementioribus, vt ingenti tristitia, anxietate, mœrore, dolore, cura, & similibus, vnde sæpè syncope & interitus, vt Galenus docet de symptomatum causis: vel à corpore, vt respiratione prohibita, multitudine & crassitie crudorum humorum exiguos meatus obstruentium, vnde Syncope, aut si non obstruant neque onerent, *ἀπὸ ψύχια* oritur, vt Galenus docet 12. Methodi. Hūc referri possunt tumor aliquis præter naturam in corde, vel pericardio, vt in dissecto, cuius ex Galeno meminit Philotheus, tunica inclusa in ventriculo cordis plena humore putri malè olente, vermes & similia, de quibus dictum est superiore capite, quæ aliquando obstruunt, aliquando aura venenosa spiritus inficiunt, & cor vellicant, sicuti & humor è ventriculo, aut vtero, aut hepate, aut cerebro, aut etiam pulmone.

*Philoth. côm.  
in aph. 41. li.  
2. Aphor.*

Obsēraui idem cuidam accidisse anno 1549. quod *Galenus de Antipatro Medico*. Huic enim mortuo inuentus abscessus in *eo Antipatr. vena arteriosa*. Sectioni mecum interfuit Nicolaus Lambert *sub finē li. 4.* chirurgus. Motu autem è corde affatim & repenti aliquando *loc. affect.* foras dissipatur spiritus, & euanescit eodem modo, quo intrò cogitur, vel ab affectu animi vehementiore, vt in gaudio, voluptate, ira, vigilia, risu: vel causa in corpore contenta, vt insigni euacuatione, purgatione per medicamenta, resolutione spirituum concurrentium ad aliquam partem dolore affectam vehementi, aut erosam, vt ad os ventriculi valde sensile, suppuratione, aut ruptione apostematis, vel tuberculi, siue introrsum facta, vt in ventriculum, siue extrorsum, vt in aqua in hydropicis educenda. Simul enim exhauritur spiritus, & vnà cum ruptione euanescit. Quod Hippocr. multis locis significat, vt Aphor. 27. libr. 6. & 8. libr. 7. In partibus quoque exolutionem fieri, vt vacuatione sanguinis, ita & puris, 2. Epid. Memini vidisse syncope mortuos in huiusmodi ruptione è liene. Dissipatur etiam spiritus, pluribus motibus, tenuitate, raritate corporum ipsos continentium, tenui humore & calido, sudore nimio. Atque hæ sunt ferè causæ, quibus læduntur spiritus, qui si suam affectionem communicent partibus solidis, ita vt incipiant resolui, quod sudore cognoscitur,

## DE MORB. INTERNIS

erit Syncope valde periculosa, imò veriùs mors ipsa. Neque enim ferè moritur homo, nisi quadam syncopis specie. Sin in spiritibus tantùm sit, nec facultas vitalis omnino dissoluta, Lipothymia propriè dicitur, cuius terminus sudor est. Ob id Galenus scribit ad Glauconem Lipothymiam syncopis principium esse. Solidarum autem partium temperamentum multis quoque modis labefactatur, ob defectum alimenti, consumptionem proprii humidi, refrigerationem calidi innati, in longissimis morbis ex atrophia, in febribus acutis à colliquatione, & similibus. Hinc efficitur duo propria & perpetua esse symptomata in Syncope, frigus totius corporis à calore exoluto, & sudorem diaphoreticum, siue syncopiticum, à dissolutione solidæ substantiæ. Est enim sudor hic pessimus, & vt causa, & vt signum. Causa, quia solidas partes spoliât humido, & virium substantiam dissipat. Signum, quia imbecillitatem naturæ non ampliùs humores continentis indicat. Sed in Lipothymia tantùm frigus apparet, sic dicta, quòd sit in instrumento animi, id est, spiritu. In utrâque tamen sensus & motus priuatio est, & pulsus defectio. Causæ ex propriis signis cognoscendæ: remedia vnicuique causæ accommodanda.

Confirmanda facultas vitalis, si ab intemperie: à tuberculo & similibus difficilis curatio. In aspera arteria dyspnoeam efficit: in tenuibus, spirituum alterationem. Iisdem remediis, quibus asthmatici, curantur. Filio Rogier procuratoris Regij febricitanti in pulsu deficientè & intercidente animi deliquium accidit. Asthmaticis remediis euasit. In euacuatione nimia reficiendus æger, vino diluto (diluitur verò aqua frigida, vt frigore fluxum contineat, celeri motu fluxum reuocet) theriaca recenti, irrigatione aquæ frigidæ, ventriculi linimento, frictione partium superiorum, excretio retinenda. In veneno, vomitus, theriaca, myrrid. propria antidotus, pulueres cordiales conueniunt. In alicuius partis sympathia, topica, suffitus, vntiones, cordis roboratio, partis affectæ curatio. In resolutione spirituum, alimenta optimi succi facilè & citò nutrientia, humectantia. Diogenes Laërtius scribit Democritum multos annos effluentem spiritum retinuisse medulla panis albi intincta vino optimo, vt Cretico, & conspersa puluere menthæ appositæque stomacho, & naribus.

## ANTO. VALETII EXERCIT. XXX.

**Q** Vanquam syncope ex Galeno libr. 12. Meth. *Syncope maxime vitale obsidet facul.*  
 virium est omnium lapsus, in eo tamen affectu vitalis præcipuè, quæ fundamentum est cæterarum, afficitur. Hinc pulsus ferè nullus, nulla penè respiratio sensus & motus abolitio, in ore pallor, extrema algida & madètia, denique ipsissima mortis imago. Causæ sunt summa, ob intemperie, cordis imbecillitas, semper lethalis, spirituum à quavis *Syncopes causa.*  
 causa exolutio, vel subita eorundè & præfocans ad cor reuocatio, qualis hæmophôiis, quib. sanguis adimirur, sæpè euenit, qualitas aliqua maligna, aut halitus teter, tota natura insensus, conspurcatio ab assumpto veneno, aut à morfu animalis venenati, ab aëre inspirato ex fodina metallica, ex cadaueribus & leguminib. putribus & à vètriculi, vteri, aut alterius partis, in cuius cōsensum cor trahi possit, vitio.  
 . Vocatus Medicus ad ægrum syncope prehen- *Curatio syncopes.*  
 sum, omne suum studium imprimi, ad symptoma referre debet, vt præsentè accessione eum liberet. Proinde agnita causa, remedium ipsi contrarium instituet. Galenus in omni syncope vinum commendat, quod alioqui, vrgente febre, inflammatione, vel mentis alienatione, perniciosum. Eo tamen vti licebit intermissionis tempore, sed pauco, & decocto buglossi, borrag. aut simili diluto. Odo- rata, vt lintea aqua rosacea, aceto & pauca caphura imbuta, naribus admota iuuabunt: talia enim spiritus promptè recreant. Aspersio quoque frigida poros occludendo, & vim sopitam antiperistasi exfuscitando, confert.

Recreato à paroxysmo ægro, de syncopes causa



1 *Est enim immoderata perturbatio vetriculi sursum ac deorsum per vomitum & secessum facta, à causa non habens, ut ait Galen. lib. 2. Meth. Pars affecta est vetriculus, cui consentiunt intestina.*  
 2 *Id vero accidit ut plurimum ob vellicationem & erosionem vetriculi &que orificij vetriculi: vnde contrarij duomodo sequitur naturæ maxime insens.*  
 3 *Quare crura & manus contrahuntur, animaque deficit.*  
 4 *Quibus concurrentibus mirum non est, si subito quies moriatur.*

tollenda cogitatur. Si plenitudo suffocationem minuetur, phlebotome haud aliter prodest, quàm si quis exiguo igni, qui præfocatur, lignum subtraxerit, vnde reuiuifcat. Si frigida intemperies, aut calida in causa sit, valebunt cardiaca capite superiore enumerata. Si sumptum sit venenum, vomitus subinde repetetur, fortis iniicietur clyster, alexiteria, quæ tota pugnent substantia, sumentur, & applicabuntur, vt theriaca, mythrid. & id genus alia.

*De cholera.*

*CAP. 31.*

**C**Holera morbus est 1 acutissimus, sine febre ferè, quæ vel vno die, vel altero, vel certè paucis 2 diebus hominem rapit, substantiâ corporis effusa, partim assiduis vomitionibus, partim iisdem deiectionibus.

Hippocrates cholerae siccae meminit Commentario 4. de ratione victus in acutis, cuius naturam & curationem ex eo loco intelliges. In humida vero animaduertendum in primis est, vt si fieri potest, 3 vomitus componatur, & relinquatur motus, qui ad intestinum est, corrupta ferè ac exitiosa materia, quæ excernitur. Itaque initio retinenda non est, sed tum primùm, cum vires inde confidere videntur. Itaque initio 4 aquæ tepidæ, aquæ hordei, aliquando etiam adiecto momento saccari, aut mellis, vbi frigida materia est, imperandus est potus ad 3.6. Quod si æger borborygmis & flatibus sollicitatur, cochlearè medium seminis cumini poterit aquæ incoqui. Hac arte fluctuans materia, & ad vomitum incitata, repurgatur, ex quo sistendo vomitui intendendum est.

℥.zulapij ros. ʒ.3. succi granatorum ʒ. i. β. mis-  
 ce, vtatur breuibus interuallis, duobus aut tribus  
 cochlearibus. Conueniunt & syrapi, 5 rosatus,  
 myrthinus, de cydoniis, de granatis, & similes in  
 causa calida. Idem quoque in causa frigida, sed  
 conspersis pulueribus spicæ, cinamomi, nucis mos-  
 chatae, & similibus. Alioqui syrupus de mentha, de  
 absynthio, & similes.

5 Hī syrapi  
 non sunt in  
 aquis dissol-  
 uendi, meto  
 relaxationis  
 ipsius ventri-  
 culi ab humi-  
 ditate nimia.

Oportet autem assumi cochleari, breuibus in-  
 teruallis, & sine aquis. Largior enim potus hīc non  
 conuenit.

Eum enim  
 adstringere  
 tum oportet.

Laudatur remedium ab antiquis ex vini grana-  
 torum ʒ. 2. succi menthæ depurati ʒ. β. & vtatur  
 cum cochleari, vt prius dictum est. In causa frigi-  
 da, 6 vinum optimum, tenue, & odoriferum ali-  
 quando satis esse potest. Imperabis quoque, vt gra-  
 natum integrum, acidum, dulcoratum cum saccha-  
 ro rosato odoretur. Æger sugat interim: eiusdem  
 quoque grana commanducet. Conspergenda fa-  
 cies aqua frigida, aqua rosarum per se, vel in frigo-  
 re, adiecto vini odoriferi momento, vel moschi  
 modico. Vtendum quoque iis, quæ exterius admo-  
 uentur stomacho, qualia sunt hæc.

6 Si sine fe-  
 bre fuerit af-  
 fectus, quæ  
 magna ex  
 parte ab est.  
 Vinum vero  
 generosum  
 vel merum  
 assumatur,  
 pro natura  
 ægræ, consue-  
 tudine, tem-  
 pore, aëre.

℥. fantalorum rubror. ros. ana ʒ. 2. galliæ mos-  
 chatae ʒ. β. caphuræ Gra. 6. Madeant in aquæ ros.  
 ʒ. 4. aceti ʒ. i. β. Panniculi in hac miscella mersi &  
 expressi, quantum fieri potest, frigidi toti ventricu-  
 lo applicentur.

Dilatatur em-  
 tem aqua an-  
 rata, argen-  
 tata, chrys-  
 beata: vnde  
 sola vini po-  
 tione multas

Potest inungi stomachus oleo rosato, de cydo-  
 niis, de spica, de absynthio, vt res exigit. Quod si ti-  
 metur nimia refrigeratio, miscellæ supradictæ suc-  
 cus menthæ, absynthij, aliquid quoque cinamomi

præter spe-  
 ciem asse-  
 ribit Alex.  
 Trall.

# DE MORB. INTERNIS

7 *Vulgo paratur scutum ex mastiche & carne cydoniorum oleo conueniente exceptis. Quibus licet aliquid cerati stomachici Galeni immiscere.*

aut vini austeri odoriferi commisceri potest: 7 Mastichis  $\frac{3}{2}$ . aut 3. cum oui albumine, cum oleo cydoniorum, aut conuenienti dissoluuntur. Inde fit emplastrum, quod extendi debet in aluta formata ad modum scuti. Caterum quæ confirmant ventriculi robur sumpta & admota, vt in vomitu & leienteria, veniunt vsurpanda.

Vulgi experientia est, eboris tabella admota ventri vomitus compesci. Sed interim dum hæc fiunt, somnus & quies, quantum fieri potest, concilianda sunt. Consulendum viribus, partim odoribus, partim alimentis.

Perdulas ergo, aut iuuenes pullos columbarum confixos baculis myrthi, rubi, cinamomi, vt res exigit, conspersos interim, dum assantur, aqua ros. vino granatorum, vino austero, odorifero, primum quidem calidos & plenos fumo naribus ægri admovebis. Ex eo tortiuo prælo succum inde exprimes: expressam materiam naribus ægri admovebis: succum sorbendum exhibebis. 8 Dabis gelatinam cum succo granatorum distillatam, qualem in spuito sang. Sunt qui bucellam panis assent, vino granatorum conspergant, edant, dein vinum vtiliter ebibant. Eundem assatum panem vino immersum, & caryophyllorum puluere aspersum, aluum sistere certo constat experimento.

Quod si nihil continet æger, prius data aqua tepida, cucurbitulam magnam affiges ventri, & interim dum ea cucurbitula fixa est, cibum exhibebis. Breuibis interuallis cucurbitulam figes, & refiges, & ita nutries, ex Galeno sub finem libr. de paratu facilibus.

8 *Huc spectant pulueres ex saccharo rosato, & margaritis, manus Christi, conserua rosar. cydonior. oxiacanthæ condita, &c.*

Consensus est veterum Medicorum, dropacifmum impositum ventri singulare esse remedium assiduè vomentibus. Parabis dropacem ex quatuor partibus picis & vna olei cydoniorum vnà liquatis, deinde extensis in aluta. Postremo medicamentum calidum ventri applicabis.

Laudantur vincula articularum, frictiones mediocres, fofus ex oleo multo, magis vbi conuulſio est, vel imminet. Fouetur ſpina, muſculi conuulſi articuli. Cucurbitulæ quoque & ventri & ſcapulis aſſigi poſſunt. Quòd ſi refrigerantur extrema, linteis calentibus inuoluenda ſunt.

Si ſpaſmus accidit, redeundum ad curationem ſpaſmi. Si vrget ſitis, ſemina cucumeris in aqua temperari debent, donec intumeant: tum cortex exterior detrahitur: quod eſt reliquum, aqua incoquitur: aqua refrigerata bibitur. Contra ſyncopen cum aliis remediis ſupradictis, tū buccella imbuta vino admota naribus, contenta ore vtendum eſt. Eraſiſtratus ex Chryſippo præceptore vinum aqua frigida dilutum cholera morbo affectis, tanquam extremum remedium, commendat, vt vel morti proximos reſoueat. Idem probat Galenus libello de venæ ſectiōe aduerſus Eraſiſtrat.

*Trochiſci Rhaſæ.*

℞. maſtic. boli arm. thuris ana ꝯ. 2. ſ. carabe, cardamomi ꝯ. 2. caphuræ, galliæ moſchatae, caryophyll. ana Gra. ꝯ. cum ſucco granat. fiant trochiſci pondere ꝯ. 4. Derur vnus, ſuperbibatur ꝯ. 1. ſucci granat. iulep. granati, ſyrup. cydoniorū, aut ſimilis. Deoriū reptante materia choleram morbum cōmittente, optimum erit naturæ opitulari, exhibito

9 *Clysteres* cathartico conuenienti: vt infuso rheo & uehementius expreffo, fyrup. laxat. ros. pall. fyr. de cich. compos. cum rheo. Atque id quidem tutius impetrabitur, cum materia naturam ad excretionem sollicitat, nihil tamen effatu dignum vomitu, aut deiectione excludit. Clysterum 9 hîc duplex est vsus. Initio reuocandis vomitionibus, & hi simplices esse debent. Postea verò collabentibus viribus, qui & leuiter reprimant, & adstringant.

## EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

*Deinde fortiores paulò & vehementiores.*

*Cholera morbi dux species.*

*Cholera arida effectrix causa.*

*Cholera humida rade.*

Hippocrates quarto de ratione victus in acutis, & Galenus in Comm. & Isagoge, duplicis cholerae meminerunt, arida & humida. In utroque perturbatio est ventriculi immodica infra, supraque. Differunt causa, & symptomata. Arida enim fit ex spiritu flatuoso, acri, qui siue egeratur, siue retineatur, lancinat & mordicat partes ventris neruofas. Venter inflatur, strepitus fit, dolor in lateribus & lumbis, aluus nihil deiicit, sed adstringitur. Humida gignitur, vel ab alimentis, vel medicamentis. Alimenta in causa sunt, quæ succum crudum, flatuosum, acrem procreant, ægrè coquuntur, tardè permeant, vt intestina suilla infarcta sanguine, cæpis, pipere, pinguedine, quibus nihil difficilius coquitur, laserpitij succus, caseus, suilla caro, bubula, caprina, ventres animalium infarcti. In summa, quæcunque vel flatuosum succum generant, vel acrem, vel facilè putrescentem, vel humiditatem acrimoniae iunctam habent. Corruptuntur enim facilè, & acrimonia fluxiones irritant ex toto corpore, mordicantes orificia vasorum, quæ ad ventrem pertinent, vnde vomitus, & deiection. Medicamenta sunt, vt helleborus, apud Galen. Comm. in apho. i. lib. 5. Apho. Sed hoc nomine reliqua quoque violenta pharmaca intelligenda, vt Colocynthis, Scammonium. Ex his enim aliquando generatur conuulsio, aut immoderata purgatione, aut neruorum substantia resiccata, aut demorso ore ventriculi, neruis laborantibus per consensum, ab æruginosa bile, vt

bile, vt in adolescente, cuius meminit Galenus, & in negotiatore quodam Rhemenſi, cui vomitu citato deſiit conuulſio. Aliquando verò Cholera ſequitur. Mordentur enim, vt de alimentis dictum eſt, partes neruoſæ vi medicamenti, & acrimonia humoris attracti, à cuius etiam quãtitate poteſt ventriculus comprimi, idque præſertim fit, cum humores non ſunt ad purgationem parati. Fit aliquando è toto corpore, aliquando ex quibuſdam partibus, vt hepate. Huic maximè proprium eſt ſymptoma, de quo Galenus agit comm. in eundem Aphor. Contractio, videlicet, in muſculis & pulpis tibiarum, quam vulgò, *Gouttes crampes* nominant. Quod accidit viduæ deſuncti Præſidis de Longueil, & Domine Diyuor. Morbus eſt peracutus, vt qui quarto ad ſummum die finiatur. Alia ſymptomata ſunt & ſigna, vomitus, deiectiones bilis frequentiffimæ, deliquia animi, ſudores exigui, ſitis pulſus vermiculantes, ruſtus nidoſi. Quibuſdam accidit certis interuallis, naturâ ſeſe exonerante, ſed ob impetum humoris bilioli erumpentis, ſalubri humore ſimul cū vitioſo foras expulſo. Huiuſmodi homines Græciς *χολερικοί, ἢ χολεριῶντες* dicuntur: Plinio bilioſi.

Curatio perficitur ſublata cauſa, conuulſione, ſyncope, tremulo motu, ſingultu, ſi adſint. Purgatione, ſi facilè ſoluatur alius prouocatione vomitus, qui prohibetur iniecto clyſtere calido, vt prouocet, pingui, leniat. Hydrelæo calido partes, corporis fouentur. Subducto ventre, & eò conuerſa materia, ſanitas. Dormiat, vt coquat. Vinum ſit tenue, ad penetrationem, vetus, meracum, ad coctionem, modò à cruditate morbus ſit. Pauciſſimo vtatur cibo, lacte aſinino, vt purget & leniat. Neque ſimul deiectionem, & vomitum prouocare licet. Quæ enim in ventre continetur, ſubducenda, & vomitus prohibendus, Hipp. 4. Acu. Ventriculus roborandus admotis. Conueniunt adſtringentia, emplaſtra, ſacculi, linimenta, vnguenta, cerata, epithemata, ſed celeritè agunt ſotus. Cucurbitulæ inter vmbilicum & ſtomachū, purgatio, pilulæ, condita.

# ANTO. VALETII EXERCIT. XXXI.

Cum pungens dolor atque erodens, tormina & nauſea quenquam inuadunt, hiſque adſunt

## DE MORB. INTERNIS

*Gal. lib. 2.  
Meth.*

aut proximè succedunt, vomitus, & ventris per inferiora turbatio, cholerae morbi certa significatio affertur. A causa nomē habet. Accidit enim vt plurimum à bile vellicationem & erosionem vtriūsq; orificij ventriculi committente: vnde contrarij duo motus naturæ molestissimi consequuntur.

*Cholera mor-  
bi curatio.*

Vomitus quia grauissimum naturę negotium facessit, statim in initio iuuandus, digito, aut penna ori indita, vel hoc vomitorio.

℥. aqu. decoctionis hord. & raphan. ʒ. 3. olei comm. & hydromel. an. ʒ. ʒ. f. vomitorium, tepidè sumatur.

Vel etiam deiectione materia in ventriculum concepta vacuabitur, iis præsertim, quibus laboriosa vomitio. Purgatio verò sit eiusmodi, vt aluum non lubricet, qualis hæc.

℥. cortic. myrobal. citrin. & gran. berber. ana ʒ. 2. feminis acetos. portul. ana ʒ. 1. f. decoct. ad dosin. In colatur. infund. rhei. elect. ʒ. cum pauc. cinam. In expressione dissol. eiusdem rhei puluerati, vstulati ʒ. f. zula pij rosacei ʒ. 6. f. potio.

Clysteres quoque sæpe iterentur, vt motus omnis deorsum ducatur. Comparabuntur ex iis, quæ humorum acrimoniam retundant, vt ex lacte, oleo viol. sacchar. vitell. ouor.

Robori autem ventriculi sumptis & admotis prospiciendum. Sumptis, si calida sit causa, syr. ros. limon. de acetos. citr. & similibus: qui per se exhibentur, nec in aquis dissoluuntur, metu relaxationis vetriculi à nimia humiditate, quem adstringere oportet. Admotis, vt oleo cydon. ros. myrt. vel litibus ex iisdem oleis & pulueribus ros. rub. santanl. malicorij institutis. Si frigida causa, syr. de mentha, & consimiles valebunt. Alexander Trallianus sola

vinum potione multos præter spem euasisse scribit. Vinum generosum sit, merum, vel dilutum aqua aurata, argentata, vel chalybeata. Plura ad hunc affectum remedia ex capite de laenteria petenda.

*De imbecillitate 1 stomachi CAP. 32.*

**I**mbecillitas stomachi frequens 2 conualescentibus: magis etiam 3 ab imperfecta crisi, in quo renocanda sententia Hippocratis. Si à morbo cibum assumens quis, non corroboratur, largiori 4 alimento corpus vti significatur. Quod si non assumenti cibum hoc accidat, scire oportet, 5 quod indiget euacuatione.

In conualescentibus ergo, quibus reddita est appetentia, imbecillitas ventriculi non potest tantum conficere, quantum appetit. Modica itaque quantitate, sed breuibus interuallis, cibis boni succi, & qui facile coquantur, reficiendi sunt. In aliis, quibus appetentia non redditur, reliquæ morbi in causa sunt, quæ optimè vel rhabarbaro, vel hierâ picra ex decocto cicerum, aut absynthij repurgantur.

In sanis verò debilitas est, vel à sola intemperie. Cuius indicia sunt, calidæ quidem, æstus in 6 medio corpore, sitis assidua, & lingua arida, iactatio corporis, aliquando etiam extrema, vel frigida, vel temperata, nec pro ratione æstus calentia, à cibo nidorosi ructus. Frigidæ verò frigoris sensus in parte infirma, nulla sitis, 7 saluatio aliquando multa, 6 *Ut æstus viscera incendant. Nam ubi calor, ibi mori* 7 *Ex humoris in ventriculo fluctuantis copia, per continuitatem peritioris tunice ad os.*

1 Alui sine ventriculi, in coquendo & appetendo, quæ duæ sunt actiones ventriculi, coctio & appetitio. 2 Morbo defunctis, collapsi habitu, alieno temperamento, & mutata ventriculi actione languida. 3 Superflue morbi materia, aut empyemate.

4 Quod scilicet sit infirmus ventriculus, et morbi diuturnitate collapsi habitu, abalunatoque temperamento, necessitati corporis satisficere nequeat.

5 Ad excludendas morbi reliquias, quæ suætionis sensum in per-



# DE MORB. INTERNIS

8 Ea vel lo- ructus acidi. Alia ex arte Medica Galeni require.  
cale habet in Causa quoque nonnunquam materia est, eaque vel  
alio genera- 8 quantitate peccat, vel qualitate. Rursus vel cor-  
tionem, vela- pori stomachi, vel ventriculi imbibita est, vel in ca-  
liūde affluit. pacitate fluitat.

9 Ex lib. 10  
Therap. me- Intemperies quoque aliquando complicantur,  
thodi. quarum omnium signa colliges ex arte medica.

10 Sumptis  
Et ad motū: Intemperies contrariis, calida quidem frigidis, vt  
vt cōser. vio- potu frigida, frictione articulorum, cerato Galeni,  
larum rosar. cuius hæc est descriptio.

borrag. iulep ℥. ceræ lotæ in aqua rosarum ℥. β. olei rosacei  
rosato, syru- in aqua rosarum similiter loti ℥. 2. liquefiant in va-  
po maior. pu- se duplici. Quod quum fuerit refrigeratum, diu  
nicorum: ad- malaxetur cum aqua frigidissima, vel succo plan-  
motū itē ven- taginis.

triculo, vt ha- Imperanda ratio vitæ, quæ refrigeret. Et 10 contra  
pso, linimēto, æstum ac sitim his utimur.

ex aqua ro- ℥. sem. cucumeris in aqua macerati, & excorti-  
sarum et bu- cati ℥. β. tragacanth. dissolut. in oui albumine ℥. 2.  
gloss. Hap- liquefiant in vase duplici cum eodem oui albumi-  
sus verò cy- ne: fiant hypoglottia, id est, pilulæ, quæ teneantur  
donorū oleo sub lingua.

11 Cuiusmo- di est Syrup. Quod si syrupis utimur, iis omninò abstinen-  
acetatus. Et dum est, qui 11 acetum recipiunt, nisi humiditas cō-  
tamen oxy- iuncta sit.

facchari loco In frigida, volatiliūm carnes confixæ cinamomo,  
prescribi po- test, ob suū aut lardo consperso puluere cinamomi, & ita 12 as-  
tali punici. sata. Alimenta omninò calida, vinum odoriferum,  
12 Vt condi- mento ex pul aut etiam colatum cum saccharo, cinamomo, gra-  
ueribus ca- nis paradisi, modico zinziberis, & similibus. 13

ryophyllorū, nuci moschata & cinamomi cum sapa. 13 Aut fiunt condita, opiata è nuce mo-  
schata, myrobalan. confectis, cortic. citr. cond. flore aureng. cond.

Fotus è 14 sacculo mollissimis plumis anseris ple-  
no, & aliis quæ postea de siccitate in hectica febre  
dicentur.

14 Fiunt sac-  
culi ex radi-  
ce cypert, cal.  
arom. scœ-  
nuantho, ca-  
ryophyl. ab-  
synthio Ro-  
man. menth.

orig. chama-  
meio ros. Coquuntur in  
aquis parti-  
bus aquæ &  
vini rubri:  
decocto ma-  
defacta spo-  
gia admo-  
nietur stomacho.

A fotu au-  
tem illinatur  
oleis absynthi  
menth. &  
nuc. moscha-  
ta.

Humiditas, si fluitat, vomitu elicienda est. Vbi  
imbibita est, & qualitate peccat, pharmaco repur-  
ganda est. Si tantum quantitate peccat, & præter  
modum stomachum ac ventriculum remollit, ad-  
stringentibus medicamentis, admixta aromatum par-  
te ad resiccandum, utendum erit. Si crassus & visci-  
dus humor est, incidendus oxymelite, aut aliis eius-  
modi, tum pharmaco deiciendus est. Materia eo-  
rum, quæ infirmum stomachum è frigore confir-  
mant, cinamomum cortex citri, caryophyllum, ma-  
stix, lignum aloës, zinziber, & chebuli conditi, ma-  
cis, mentha, absynthium, galanga, scœnuant. caruū,  
ami, flores anthos, vinum aromaticū, nux moscha-  
ta, piper, aromaticum rosatum, diagalanga, diacu-  
minum, diatrium pipereum, diacydoniū cum aro-  
matibus, theriaca, mythridatium, syrupus, de men-  
tha, de corticibus citri, mel anthosatum, oleum nar-  
dinum, de spica, de mentha, in quo aromata calida  
coxerint, ut piper, cinamomum.

Frigida. Coralli, santali, ambra citrina, corian-  
drum præparatum, ebur, cornu cerui, & vnicornis,  
cydonium, pira adstringentia, rosæ, diarhod. Abbat.  
trochisci de spodio cum semine acetosæ, myrrha,  
acetosa, diacydonion sine speciebus, scorina ferri, li-  
matura chalybis ceratum santal. vnguentum ros-  
atum, oleum rosarum, & de cydoniis, syrup. rosat. &  
de cydoniis, aliæque eiusmodi, quorum pars in con-  
trouersiam temperamenti venire potest Ceterum  
calidam temperiem corrigere possunt. Horū enim

## DE MORB. INTERNIS

omnium vsus, vel quia inde puluisculi & electaria, potiones quoque confici possunt, aut topica, quæ exterius applicentur. Vrgente sitis ardore semina portulacæ, cucumeris, cucurbitæ, acetosæ & similia, trita & excepta mucagine tragacanthæ proderunt. Item glycyrrhiza recens. Per omnia tamen videndum est, ne adstringamus nimium, ex quo siccitas immodico cōtrahitur, ne nimium humectemus. Hinc enim virtus harum partium dissoluitur. Neque nimium refrigerandum, vnde extingatur calor.

Tepidis vtendum non est, sed vel frigidis, vel calidis, quòd tempore virtus stomachi relaxetur.

Remedia externa anteriore parte ad sterni initium sub pectore aptanda sunt: quanquam & posteriore parte ad duodecimam vertebra[m] probato remedio applicari possunt. Vtræque parte posita magis iuuabunt. Sed oportet ea quæ posterius ponuntur, habere aliquid tenuium partium, quòd per difficiliorẽ viam penetrare possint. Humidiori ventriculo conuenit. ℞. ambrae citr. mastichis, iridis, an. ʒ. 3. ros. siccarũ ʒ. i. ʒ. fiat pul. detur ʒ. cum magno cochleari succi granatorum, vel sero lactis. Quòd si frigiditas adiuncta est, addes cinamomi, scœnuanthi, maceris ana ʒ. i. Quinetiam humidiori ventriculo conuenientissimum istud est remedium. ℞. aquæ vitæ lb. 2. aquæ rosar. lb. i. cinamomi ʒ. i. misce omnia. Deinde bis aut ter cola per manicam Hippocr. post infusionem horarum 24 Capiat bis in hebdomade cochleare vnum hyeme, æstate semel. Humiditatem quoque resiccāt ferè omnia in frigidis numerata, & vino incocta, quòd adstringat.

Ad idem paratur racematum vinum, in quo macerantur caryophylla, absynthium Romanum, &c. Ut si feruente musto, noduli vel sacculi pendeant è charyophyll. zinzibere, menth. absynth.

Sed vbi frigiditas coniuncta est, aromata commiscenda. Ad frigidam dispositionem.

℞. corticis rad. fœniculi ʒ. 2. coquantur in vini optimi ʒ. 4. ad dimidias. Quodd si maior refrigeratio est, coletur vinum per manicam Hippocratis cum ʒ. 1. cinamomi.

Instituuntur quoque trochisci, qui infirmitati stomachi à frigida caula mirificè medentur. ℞. ros. rub. ʒ. 3. ligni aloës, spice, mastich schœnuanth. mac. cinamomi, absynth. ana ʒ. 1. Ex vino veteri fiant trochisci. Diatrium pipereon, diacydonium Galenicum aromatibus conueniunt. Exhiberi verò solent electaria, lozengiæ, syrup. horas duas ante cibum: primùm quidem lozengiæ, deinde syrupi.

Quod si flatus adsunt, galanga, grana paradyssi, cuminum, lybisticum, caruum, bacca lauri, iuniperi, & similia vino odorifero incoquenda sunt in pul. redacta, macere & cinamomo adiectis incorporetur melle anthosato. Theriaca & mythridatio hîc vtendum est.

Calorem refouent catuli, cati, caniculæ, pulli, pullæ, manus admota ventri, rasura dibaphi, quæ plurimùm conuenit, vbi etiam frigiditas est, gossipium, sacculus è mollissima pluma anseris, pellis leporis. Gossipium in vino odorifero, decoctione menthæ immersum, expressum, siccatum, & ita impositum. Ceratum stomachicum Galeni, vel hoc.

# DE MORB. INTERNIS

℥.ol.de spica ℥.4.ceræ ℥.1.mastichis ℥.℔.lique-  
fiant in vase duplici. Deinde adde cyperi, macis, ci-  
namomi ana ℥.1.commifce diligenter, & rafurâ di-  
baphi excipe, quantum fatis eft, calidumque ap-  
pone.

Vel. ℥.mastich. cerati ftomachici Galeni, æqua-  
les partes: cum oleo abfynthij, aut de mentha f. em-  
plaftrum ventriculo apponendum.

℥.dialthææ ℥.1. mastichis diffol. in oleo de spica  
℥.℔.croci ℥.℔.mifce, extendatur in aluta pro ftoma-  
cho. Hoc & dolorem lenit, & ftomachum robo-  
rat.

Mastichis grana præmanfa & deglutita, Ceratum  
ftomachicum Galeni. Concalfacto verò ftomacho  
vrédum eft cerati fantalini ℥.2. malaxatis cum oleo  
de cydoniis, rofarum, deinde extenfis in aluta. Iule-  
pus rofatus, vinum granatorum, fyrupus acetofus  
fimplex, & fimiles fyrupi. Quòd fi humiditas calori  
coniuncta eft, aut aliquis humor biliofus, vel in  
ventre collectus, vel aliunde inuectus, abfynthio,  
hiera picra, rhabarbaro, caffia, & fimilibus hac ra-  
tione vtendum eft.

Abfynthij decoctum biliofa deterget & subdu-  
cit, fi quidem altiùs non fuerint imbibita: & hoc  
magis melicratum ex abfynthio, aut decoctum ab-  
fynthij cum oétava parte mellis rofati dulcoratum.  
Infestiffimum verò abfynthium, & quæ adftrin-  
gunt, quibus pituita ventriculo inhæfit. Tum enim  
priùs incîdi & tenuari materia postulabit. Hieræ  
picræ, & rhabarbari vſus eft, vbi imbibitus humor  
eft biliofus tunicis ventriculi. Vtriùſque ℥.1. aut ℥.4.  
ex decocto abfynthij, cicerû rubrorum, ſero lactis,

aqua endiuia, satis esse possunt. Alioqui  $\mathfrak{z}$ . i. cassia, aut catholicum imperandum est. Sed ab his roborandus erit stomachus: nec enim, ut hiera & rhabbarum, confirmare possunt. Ventriculus roborabunt oleum mastichinum & styracinum descriptione Nicolai, in quibus hapsus lanæ purpura intinctæ stomacho apponitur. Similiter olea nardinum & moschatum, costinum, è benzoïno, usurpari poterunt.

Vinum absynthites descriptum à Dioscoride deterget, roborat, appetentiam reddit. Quod si deest, molliores absynthij cauliculos recentes leuiter conquassabis, vino odoro, austeriusculo macerabis, & leuiter feruefacies, vel siccos eosdem cauliculos vino infriabis.

Id vinum maximè facere ad subuersionem stomachi Arriæ celebris fœminæ historia à Galeno cap. 3. lib. de Theriaca ad Pisonem descripta amplissimè confirmat. Hæc non appetebat, non continebat, ut pote stomachi affecta dissolutione, atque adeò in atrophie periculum incurrebat. At ubi medici Galeni consilio, vinum ex absynthio confectum propinârunt, illico appetentia est restituta, & ventriculus confirmatus.

In imbecillitate stomachi plurimus olim usus medicamenti è cotoneis. Syrupus acetosus è cotoneis sic fit.  $\mathcal{L}$ . succi cotoneorum per residentiam depuratorum, sacchari ana  $\mathfrak{lb}$ . i. aceti  $\mathfrak{z}$ . 3. coque ad spissitudinem. Conuenit calfacto stomacho, & inde infirmato. Poteris tamen imminuere modum sacchari, ut erit auctus calor: aceti, ut erit sensus stomachi.

# DE MORB. INTERNIS

## *Miua Rhaſæ.*

℥. ſucci cydoniorum maturorum per reſidentiam deputati ℔. i. ſacchari ℔. β. vini veteris ℔. β. coquatur, & deſpumentur. Tum.

℥. zinziberis, ſpicæ, cinamomi, caryophyl. ana. ʒ. 2. maſtichis ʒ. 4. Omnia pulueriſata nodulo includantur, & in prædicta miua calida macerentur: deinde reſrigeſcant, & nodulus exprimatur.

## *Græcorum.*

℥. ſucci cydoniorum, mellis optimi ana ℔. i. aceti acris ℔. β. aut non ita acris ʒ. 9. zinziberis ʒ. 5. piperis albi ʒ. 2. Succus cum aceto & melle modicè coquatur, deſpumetur, tum inde pulueres, & coque ad craſſitudinem.

Moderatis omnibus oris ventriculi affectionibus, præterquàm quæ æſtu vehementi oriuntur, proxima duo medicamenta conueniunt. Aliud.

℥. carnis cydoniorum, mellis ana ℔. i. aceti albi ℔. i. ſimul bulliant, & agitentur, tum adice piperis ʒ. i. zinziberis tantundem, petroſelini Macedonici ʒ. 8. hoc magis adſtringit. Ventri calida intemperie affecto, aut bilioſo, piper & zinziber ſubſtrahuntur. Ventri temperato tantum dimidium piperis & zinziberis ſubſtrahitur. Aliquando miuæ aromaticæ ʒ. i. theriacæ aut myſthridatij ʒ. i. commiſcentur. Datúrque hæc miſcella ex vino odorifero. Quòd ſi etiam dolor coniunctus eſt, in primis phlebotomia ex interna brachij conuenit. Perſeuerante malo, ex utrâque baſilica, & hoc magis ſi grauis dolor eſt, ſi repentinus, ſi difficilis ructus, & ſpiritus: ſi febris eſt, ſi dolor in dorſum & ſcapulas extenditur, ſanguis detrahendus.

Historia est quinto Epidemion, de muliere quadam, quæ in vehementissimo dolore stomachi, nullis aliis adiuta remediis, sanata est ducto ex utraque manu sanguine.

Postea verò leniendus dolor est, & si quidem venter æstuat, cucumeris semen, & hordei in aqua frigidissima macerari debet, & decorticari: cum adiecta parte glycyrrhyzæ rasæ & recentis coquatur aqua, de pulpametur. Refrigerata verò, vel niue, vel aliis modis supra dictis propinetur. Vesica ea aqua, vel alioqui frigida, ex dimidio plena sæpius adimoveatur.

Quod si materia aliqua concepta ventriculo dolorem facit, ea, ut prius, commodè repurganda est.

Cucurbitulæ umbilico, aut ad latera umbilici affigendæ sunt. Dextrum quidem, si ab hepate: sinistrum, si à liene in ventrem fluxio est. Sûntque omninò tria genera eorum, quæ dolorem leniunt. Primum, quod rescindit causam, ut pharmacum, & medicamentum, quod intemperiem corrigit. Secundum verò eorum, quæ reuera anodyna sunt, qualia sunt chamæmel. melilotum, anethum, flores rosinarini, croci, rosarum, violarum: quibus aliquid menthæ, absynthij, & eorum, quæ stomachum roborant, adiiciendum est. Similiter & furfures, milium, sal, dolorem leniunt: sed frigi debent, & sacculo includi.

℞. furfurum M. i. milij conquassati P. 2. salis ʒ. i. frigrantur in sartagine: deinde includantur: perfumeretur sacculus vino diluto aquâ rosacea, & effuso in laterem candentem. Aliud.

℞. florum anthos, rosarû, violarum, chamæmeli,



## DE MORB. INTERNIS

anethi, meliloti, ana P. 1. summat. absynthij P. ʒ. Fiant. sacculi: perfumentur, vt priùs, & applicentur calidi. Alioqui.

℞. menthæ, absynthij ana P. 2. chamæmeli, florum anthos ana P. 1. calami aromatici, schœnuanthi, mastichis an. ʒ. 1. Fiat decoctio in vino odorifero. In decoctione gossipium, aut rasura scarlatæ immergatur: exprimantur, & identidem calida applicentur. Materia quoque expressa ventriculo toti applicetur. Sed videndum, ne refrigescat, statimque oleo conuenienti vngere oportebit.

Vbi supradictis remedijs non cōcedit dolor, narcoticis vtendum est. Primùm quidem leuioribus, quales sunt syrapi rosarum, papaueris, myrthi, syrupus violatus, de nenuphare cum ʒ. 1. Philonij.

℞. syrup ros. & de absynthio ana ʒ. 1. opij Gr. 1. bulliant vnà leui ebullitione, deinde cum ʒ. 3. iuris pulli detur in potu.

℞. philonij in causâ frigida, in calida verò, requiei descriptione Nicolai, vnus ʒ. ʒ. in vino tenui odorifero.

℞. pilul. de cynoglossò ʒ. 1. dissol. in syrapi rosati, & de papauere ana ʒ. ʒ.

Trochisci Stellæ. ℞. spicæ, mastichis, cinamomi, schœnuanthi, castorei, myrrhæ, olibani, piperis, aloës, absynthij, sem. hyoscyami albi, & mandragoræ, opij ana partes æquales, vt ʒ. ʒ. Fiant trochisci cum vino dulci, pondere ʒ. 2. Detur vnus cum vino odorifero.

*Albucaſis non reuellandum remedium.*

℞. opij ʒ. 1. cum alliorum capitibus duobus. Conquassentur, fiat distillatio in alembico: eius a-

que modicum bibatur. Eadem arte poteris opium commiscere rebus stomachicis suprâ enumeratis, & inde aquam elicere. Alia narcotica superiùs descripta remedia quoque plurima ex 8. libro de compositione medicamentorum  $\chi\tau^{\iota} \tau\omicron\pi\gamma\varsigma$ .

Quod si vlcus affuerit, quod ex signis in scholiis dicendis intelliges, ita moderanda sunt omnia.

Medicata edulia purgantia sint: vt lac amygdalarum dulcium cum saccharo multo, hydromeli, syrup. rosatus, conferua rosarum.

Vbi purgatum fuerit vlcus, acribus omnibus, acerbis, acidis, falsis, abstinendum: mitigantibus vtendum, quæ & detergeant, & glutinent. Qualia, lac calidum, hordeata saccharo rosato condita. Sed & ingula paulatim deglutienda, & iis lentior quidam insit oportet. Itaque oua sorbilia optimam materiam præstant, qua saccharum, mastiche, farina hordei tosti, fœnugræci, limaces, cochleæ, balauitia, malicor. mucago tragacanth. gummi Arabicum excipi possunt. Sed de his fusiùs in nostra ad 8. Galeni librum de compositione medicamentorum  $\chi\tau^{\iota} \tau\omicron\pi\gamma\varsigma$  perioché diximus.

#### EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Affectus ventriculi in œsophago, stomacho, siue orificio, fundo, tunicis, pyloro, infiniti propè reperiuntur, tantò periculosiores, quantò coctio & distributio cibi magis necessaria est vniuerso corpori. Quales sunt, intemperies omnis generis, tumores præter naturam, obstructions, defluxiones, excrementa illic collecta, vel nata, vel aliunde immissa, cibis intemptius, nimius, vitiosus, deiecta appetentia, nausea, vomitus, humores in tunicis infarcti, aut in fundo fluitantes inflammatio, inflatio, dolor, exulceratio à causa interna, vt

*Ventriculi affectus sunt  
ferè innume-*

## DE MORB. INTERNIS

humore acri, pharmaco, cibo, osse acuto, præcedente abscessu, erosio, fames canina, immoderata sitis, & similes, quorum signa, causas, remedia explicare maioris est operis. Multa ex ex Galeno colligi possunt 3. & 6. de morb. & sympt. 5. de Locis affectis, 6. de sanitate tuenda 7. Methodi. Signa ex Microtegni. Octauo κατὰ τόπον ita describit stomachicos contra Andromachum, qui stomachicas confectiones sine discrimine scripserat prodesse stomachicis. Quod & vulgò hodie etiā Empyrici faciunt.

Plerique (inquit) vulgò homines eos, qui appetentiam perdiderunt, ita vocant, & quibus post acceptam cibum, ventris os grauiatur atque opprimitur, & quandam ægrè tolerabilem anxietatem habet. Appellant eodem modo etiā illos, quibus nausea contingit, & maximè si ad vomitum impellat, & adhuc magis, si cibi corrumpantur, quandoque nidorosi facti, quandoque etiā aliam vitiatam qualitatem adepti. Et præ his omnibus adhuc magis illos stomachicos nominant, quibus ructus eiusmodi cum molestia quadam & anxietate ac subuersione contingunt, sæpe cum nondum cibum acceperunt. Quinetiam si per plurimum tempus cibi in ore ventris morentur grauantur, & vix descendentes, hos itidem stomachicos appellant. Alios item appetitum caninum appellatum habentes, vt & plurima edant, & maximè grauari paulò post reuomant, similiter vocant. Alios rursus qui fortiter exoluuntur, vbi diutius in ediam pertulerint, & si non citius cibum accipiant, in ore ventris morsus percipiunt, eodem modo stomachicos vocant. Hactenus Galenus. κοιλιακοὶ autem sunt, qui cibum non continent. Ante cibum, ab humore confluente: post cibum, ab imbecillitate: vtroque tempore, ab vtraque causa dolor commouetur. Nonnunquam à cibo cessat, quia cibum naturam colligit, temperat, calfacit. Vlcus esse coniiciendum ex dolore, ardore, deglutito synapi, & similibus rebus calidioribus, aut frigidioribus, pure apparente in vomitu, vel deiectione. Vlcus ventriculi causa duplex: interna, externa. Externa, vulnus: quod si magnum, est incurabile, vt in viuario Aureliano, & id constat ex Aphorismo 18. libro 6. Externa quoque causa est venenosum pharmacum, os acutum acus. At interna, est humo-

*Stomachici  
qui vulgò dicuntur.*

*κοιλιακοὶ  
qui appellantur.*

ris acris confluxio. Non ciendus vomitus, ne inde vlcus laceretur, & materia aliunde trahatur. Eodem modo neque stercoratio, neque tussis. Ab humore acuto lingua infecta, sapor redit in os, & in vomitu, secessuque, cum ardore, calore, siti, angustia. Si in orificio ventriculi, grauiora symptomata, frigiditas extremorum, syncope, dolor grauior, &c. Ex varietate causarum indicationes curationis sumenda.

*Si à morbo cibum.* ] Conualescentes à morbo aliquando multum appetunt, ob extenuationem membrorum, non solum ab inanitione spiritus & humoris, balneo, profluuiis, sudoribus, insensibili perspiratione, colliquatione, & similibus, sed etiam à ieiunio, inopia alimenti, calore languescente, vt flamma, quæ in ellychnio insita ab oleo & aëre fomitem & pabulum sumit. Aliquando verò appetentiam habent deictam ob vitiosos humores relictos. Vtrique sapè, nisi accuratè tractentur, in recidiuam incidunt. Priores quidem, quia cum extenuata membra multum appetant, non tamen sumpta conficere potest imbecillus calor. Constat enim historiâ multorum, qui à longa inedia sese repleant, inde suffocari. Posteriores verò, quia reliquias morbi tandem natura stimulat aggredi cogitur. Quando enim plus nutriuntur, tantò magis læduntur, donec accrescente malo morbus repetat. Hi igitur curantur vacuatione, vt docet Galenus libello de sanguinis missione contra Erasist. & Hippocrates, lib. 6. Epid. Illis verò remedio sunt, rerum non naturalium commodatio, labor, cibus, potus, somnus, Venus, omnia mediocria: deinde longo tempore substantiæ reparatio per alimenta pauca, bene nutrientia, facilia coctu, sapius exhibita. Nam pauca non sufficiunt: nimia non coquuntur.

# ANTO. VALETII EXERCIT. XXXII.

**V**entriculi imbecillitas facultatis est concoctio- *Gal. cap. 4:*  
 cis error, quo vel ἀπεψία, alterationis priuatio, *lib. de diff.*  
 vel βραδυπεψία, coctionis imminutio, seu sympt.  
 tarditas, vel denique δυσπεψία, & deprauata co-

# DE MORB. INTERNIS

ctio infertur. Causæ sunt intemperies, frigida, calida, humida vel sicca, quarum notæ ex Galeno libr. 7. Method. scitè ab Hollerio repetuntur: vel præter naturam tumor, phlegmone, erysipelas, abscessus, aut denique externæ rei alicuius vitium, vt cibi & potus immodica copia, noxia qualitas, intempestiuus vsus, præposterus ordo, excrementorum corruptela, breuitas somni.

*Gal. lib. 3. de  
caus. sympt.*

Nuda intemperies rarò huic affectui causa est, sed sæpiùs cõiunctam habet materiam: frigida quidem pituitam, vel ex cibis collectam, vel à capite, vicinisque partibus transmissam, vel crudam humorum colluuiem ab antecedente morbo acuto, aut chronico relictam: calida verò bilem. In frigida itaque purgabitur ex hieræ picræ ʒ. 3. vel ʒ. ʒ. cum vino albo dissolut. Hieræ vsus si osculorum venarum apertionis metus, vel vteri gestatio, aut hæmorrhoides dehortentur, pilulæ præscribentur.

*Imbecillita-  
tis ventriculi  
à caus. frigi-  
dæ curatio.*

℞. pilul. de hiera & agar. an. ʒ. ʒ. cum syrup. de mentha, vel absynth. f. pil. mol.

Conferent quoque pilulæ ante cibum ad ʒ. 2. datæ. Ad iterandam purgationem parabitur humor syrupis conuenientibus: & interea robori ventriculi sumptis & admotis prospicietur. Sumuntur electaria, opiata, vel condita.

℞. zinziberis cond. ligni aloës an. ʒ. 1. puluer. electar. aromatic. ros. & diarhod. Abbat. ana ʒ. ʒ. cum saccharo in aqua absynth. dissoluto f. electar. per lozeng. pond. ʒ. 2. Sumat vnam hora 1. ante pastum, à qua licebit vini optimi modicum superbibere. Per se satis sunt interdum, zinziber conditum, cortex citri sicca, myrobal. condita. Vel. ℞. conferuæ, melissophylli, bugloss. borrag. & ros. an. ʒ. 2. confer. anth. ʒ. 1. cortic. citr. cõd. ʒ. 4. confect. alkermes ʒ. 1. puluer. electar. latificantis Gal. & de gem-

de gemmis ana ʒ.ʒ. rasuræ ebor. corn. ceru. ana ʒ. i. cum syr.  
de absynth. f. opiata: cap. manè instar glandis.

Topica erunt, fomenta, linimenta, scuta.

℞. ciper. & calam. aromatic. ana ʒ. ʒ. santalor. omnium  
ligni aloës ana ʒ. i. absynth. vtriûsque, menth. maioran. ros.  
rub. ana p. i. f. decoctio addendo quartam partem vini albi,  
pro fotu regionis ventriculi cum spongia per horam antè  
cibum.

Post fotum siccatus locus linitur oleis mastichi-  
no, menthaceo, moschato, quæ efficaciora erunt,  
si arte Chymica sint extracta. Superponitur gossi-  
pium moschatum. Vel.

℞. maioranæ, absynth. Rom. ros. rub. flor. ros. marini,  
calam. arom. ana ʒ. ʒ. cinam. caryophyl. nuc. moschat. mac. ga-  
lang. ana ʒ. ʒ. ligni aloës, cyper. schœnuanth. an. ʒ. 4. mastich.  
ʒ. i. f. pulvis pro scuto, intersuto ac facto gossipio moschato,  
& ventriculo applicando.

Faciunt hæc eadem remedia ad fluctuationem,  
inflationem, & id genus alias vetriculi affectiones.  
Cum autem calida fuerit ventriculi imbecillitatis  
causa, purgatio cathartici bilem ducentibus perfici-  
cietur, vt rhei diluto, electario de succo ros. aut ca-  
tapotiis aureis, de rhab. de aloë. A purgatione da-  
bitur tabella vna electarij refrigerantis, vt diamar-  
garit. frig. vel diatragacanth. Temperabitur humor  
syrup. refrigerantib. acetoso, viol. ros. granator. de  
limonib. cum aquis eadem præditis facultate. Litus  
sint ex oleis myrtill. ros. viol. lotis in aceto.

Cæterum symptomata, quæ ventriculi sequun-  
tur imbecillitatem, vt vomitus, singultus, curabun-  
tur supradictis & proximè dicendis remediis. Fluor  
alui si adsit, pane tosto in vino austero macerato,  
& ventriculo applicito, vel emplastro ex ʒ. 2. cydo-  
niati cum oleo myrtill. aut cydon. emollito, &

DE MORB. INTERNIS  
mastich. puluerat. 3. i. sinapifato cohibendus.

1 Deprava-  
tus ventricu-  
li motus 

contra natu-  
ram, qui con-  
uulsionis mo-  
do fit, cum ta-  
mē conuulsio  
non fit. Con-  
uulsio enim  
tantum cadit  
i partem, quæ  
mouentur &  
omnis con-  
uulsio syni-  
ptoma est cau-  
sa morbosæ  
singultus au-  
tem & ster-  
nutatio non  
item.

2 Galen. lib.

3. de compos.  
pharmac. lo-  
cal.

3 Vti in con-  
uulsione ab  
inanitione,  
ab exhausto  
humido pri-  
migenio.

4 Hac distil-  
lata restaura-  
tina conficiuntur ex conseruis bugloss. viol. borrag. nenupharis aquis scabiose,  
bugloss. eudiuia. Hac omnia in alembico reponuntur simul cum seminibus  
frigidis, cardiacis, cum decocto capi, carnibus perdicum, mica panis albi, vini.  
Stillat humor, cui misceri potest saccharum & cinamo. tenuissimè pulueratum,  
exhibetur egro.

De singultu. CAP. 33.

Singultus 1 conuulsio quædam est, & prauus  
motus oris ventriculi, vel ipsius etiam ventri-  
culi 2 vi retentrice officiū negligente, & robustiore  
expultrice.

Singultus causæ inanitio & repletio. Qui ab ina-  
nitione, ferè lethalis est, sequiturque inlignes eua-  
cuationes, vt sanguinis è vulnere, è locis muliebri-  
bus, aut aliunde. Sequitur dysenterias, diarrhæas,  
& cætera eiusmodi. Ardores quoque & graues in-  
flammationes viscerum, de quo priusquam præsa-  
gium instituas, vide num sit à repletione. Minus e-  
nim periculosus est, sæpèque cum multa per ven-  
trem euacuantur, singultus à repletione est, quia  
pars materiæ, quæ à reliquo corpore confluit in vē-  
trem, tunicis ventriculi imbibitur.

Singultu excluduntur non solùm quæ in corpo-  
re ventriculi, sed etiam quæ stomachi & œsophagi,  
continentur. Sunt qui ad inanitionem adiungant  
causam singultus, perfrictionem oris ventriculi, de  
quo 8. de compositione medicamentorum parti-  
cularium, & Apho. 13 & 39. lib. 6.

In 3 inanitione, etiam si desperata res est, iu-  
uandus tamen æger 4 destillatis, collatitiis, iusculis  
& expressionibus, cibis humectantibus, inunctio-  
nibus, & expressis, cum decocto capi, carnibus perdicum, mica panis albi, vini.  
Stillat humor, cui misceri potest saccharum & cinamo. tenuissimè pulueratum,  
exhibetur egro.

ne dorsi & ventriculi ex oleo violarum, 5 hydre- 5 *Fiatq; ha-*  
læo quoque. *psus ex gossi-*

Ex aquæ & olei partibus æqualibus adhibendus pio carpto il-  
est fatus. *lu imbuto o-*

Si perfrixit, calfaciendum est per ea, quæ non tam petuo vērūcu-  
adstringant, quàm rarefaciant. In perfrictione enim lo & dorso  
stomachus, neuosum corpus, cōdensatus est, ideó- infideat.  
que non transpirat : ex quo repletio fit, à qua sin- 6 *Quæ ex di-*  
gultus. Vino itaque odorifero cum tantillo cina- sentione &  
momi & galangæ occurrendum est malo. *oppressione*  
*alui digno-*

Stomachus & spina oleo de castoreo, de piperi- scitur.  
bus inungenda sunt, aut inde cerata conficienda, 7 *Vinum aro-*  
perpetuò seruata ratione, ne adstringamus, donec matites, aut  
acquicuerit singultus. *absynthites*

Vbi flatuum 6 multitudo, iisdem ferè remediis Carthusiano-  
sedatur. Vino quoque, in quo ruta, rosmarinus, se- rum, aut etiã  
men dauci, cumini, carui, cubebæ, baccæ lauri, aut hydromel vul-  
inniperi, galanga, lybisticum, 7 & alia eiusmodi co- go dielū mal-  
xerint. Aut eadem cum vino odorifero maluatico, uaticum, aut  
aut simili colabimus per manicam Hippocratis. 8 *vinū malua-*  
Aqua vitæ cum tantillo cinamomi, anethum quo- ticum, horum  
que quadã proprietate, vt volunt, singultum sedat. omnium instar  
Electaria fiunt ex nardo gallica, zinzibere, feseli, & esse poterunt.  
proximè enumeratis remediis cum melle. Mel an- 8 *Est aqua*  
thosatum hîc conuenit, vt 9 confectio de baccis in qua madue-  
lauri, 10 theriaca vetus, & mythridatium. rit comit ane-  
thi Æthiopi-  
ci, quod regiō  
appellant.

Flatuosis à corrupto cibo solennis est hic puluis. 9 *Hæc conse-*  
Æ. spicæ Celticæ, zinziberis, nepetæ, fesel. rut. dauc. ctio est acrior  
cumini ana ʒ. i. sacchari anthosati ʒ. β. f. puluis. Vel. 10 *Hæc mi-*  
Æ. castorei ʒ. i. Detur cum melicrato. *risicè flatus*  
*discutiunt.*

Quodd si materia est aliqua continēs causa singul- 11 *Per aph.*  
tus, ea vel calida, vel frigida. 11 Calida vacuetur vo- 17. lib. 4.



# DE MORB. INTERNIS

22 Si peculia-  
ris natura à  
vomitu te e-  
uocet.

13 Vel ℥.  
rhei elect. ʒ.  
4. infunde in  
aqua endiuæ  
fero lactis, de  
cocto cicer.

rub. In ex-  
press. dissolue  
hieræ picræ  
3. 2. f. potio.

14. Ad tempe-  
rationem hu-  
moris acrioris

15 Hæ pilula  
simul vacuan-  
di & tempe-  
rands vi pol-  
lent.

16 Hoc re-  
medij genus  
valet ad in-  
flātionem  
hepatis &  
ventriculi.

mitu, si fieri potest. 12 Alioqui ʒ 4. rhab. 13 vel tan-  
tundem pul. hieræ picræ in fero lactis, vino grana-  
torum acidorum, & maturorum, aqua endiuæ, de-  
cocto cicerum rubrorum infunde, expressionem  
exhibe. Hîc obseruandum est, leuiores purgatio-  
nes esse debere, quæ ad ventriculi affectus accom-  
modantur, nisi à toto corpore humor cõfluat. Tum  
si perseverat singultus, 14 aqua frigida propine-  
tur. Subinde hæ pilulæ imperentur.

15 ℥. spodij, sem. endiuæ, portulacæ, ligni aloës  
ana ʒ. 1. pulpæ tamarindorum 3. 1. rhab. elect. 3. 2.

confice cum oxycrato, aut vino granatorum. Aliud.

℥. syrupi ros. acetosi, oxysaccharæ simplicis an.  
3. 2. In quibus infunde summitatum absynthij 3. ʒ.  
fiat infusio in calidis cineribus, tum duobus aut  
tribus cochlearibus refrigerati remedij per inter-  
ualla vtatur. Vel zuparium parabitur eiusmodi.

℥. succi endiu. aut cichorij per residentiam depu-  
rati 3. 4. cum sacchari violacei 3. 2. f. zuparium. Op-  
portunus erit vsus electarij triasantalini, quod non  
modò ventriculum confirmat & hepar, sed & re-  
frigerat.

16 Cerati santalini 3. 4. cum oleo rosato malaxen-  
tur: deinde commisce spodij, rosarum ana 3. 1. cum  
succo semperuiui agita: inde finges duo scuta in a-  
luta. Alterum stomacho ad sternum: alterum ad  
duodecimam & tertiamdecimam vertebam dorsi  
applicabis.

*In causa frigida.*

Vbi crassa & viscida materia, melicrato hyssopi,  
vel oxymelite simplici materiam præparabis. Tum,  
vt mouebitur, per vomitum aut ventrem repurga-

bis ex hiera picra dissoluta in decocto cicerum rubrorum. Dabis autem hieræ modum à semuncia ad unciam. Conuenit in hoc singultu acetum scyliticum, oxymel cum cinamomo aromatizatum, <sup>17</sup> *Tale melicratum vinofum vulgò dicitur.* melicratum ex rebus incidentibus, hyssopo, thymo pulegio, satureia, & similibus. Maximè probant galangam.

℥. vini albi tenuis odoriferi ℥. 3. in quo leuiter ferueat galangæ ʒ. i. cinamomi, sem. anethi an. ʒ. β. Conuenit & castoreum in vino odoro ad ʒ. 2. Sed quia fædo est odore, cinamomo, semine apij temperari potest. Conueniunt & hæc, schænuanthum, asarum, maiorana, aristolochia, enula, zinziber conditum, acorus conditus, diatrium pipereon, diacuminum, diagalanga, theriaca vetus. Exteriùs verò <sup>18</sup> *Quinetiã fetus ex calamo aromatisco schænuantho, origano, absynthio, mentha.* 18 oleum de liliis, de amygdalis dulcibus.

Instituitur etiam cerotum singulare in causa frigida. ℥. olei nardini ʒ. i. aloës, mastich. ana ʒ. i. succi absynthij ʒ. 2. cum cera fiat cerotum.

Et iam sedato singultu, atque vacuata materia, ea quæ roborant adstringendo. Fit aliquando, vt materia quædam venenosa sit, cui hoc puluere occurrendum sit.

<sup>19</sup> ℥. sem. anethi, cardui bened. citri ana ʒ. i. melissæ, corticum citri an. ʒ. β. coralli rubri, galægæ, macis, cinamomi ana ʒ. β. margaritarum, fragmentorum smaragdi ana Gr. 8. cornu cerui, & vnicornis ana Gr. 4. cum saccharo borraginato, & vino albo tenui odorifero fiant lozengia, vel puluis.

Quod ad cucurbitulam attinet, iam vacuata materia primùm scapulis, tum pectori & umbilico, postremò ventriculo & 12. dorsi vertebræ af-

<sup>19</sup> *Hoc electarium non modò ventriculi singultus, sed variis alihæfectionibus cõfert. Facit ad omnẽ venenam aurã eluendã, & ad effœciam vinẽ excitandã.*

figi debet.

20 *Huius  
re melij nul-  
lus est vsus.*

Quòd si nec his quidem resistit singultus, his locis phænigmi aptari debent. Alij in malo contumaciori imperant 20 ellebori ʒ. i. galangæ, cina-momi ana ʒ. i. macerentur per noctem in vini mal-uatici ʒ. 3. colatura proximè. Nec omittenda ster-nutatio, clamor, &c. eiusmodi,

## EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

*Singultus mo-  
tus vomitu  
vehementior.*

Ἀνγξ, λυγμὸς Hippocrati & Galeno, Latinis singultus. Motus est eiusdem generis cum vomitu, sed fortior & vehe-mentior. Deinde per vomitum natura tantum quæ in ventri-culi spatio sunt, expellere conatur. In singultu verò non so-lum hæc, sed multò magis, quæ in ipso ventriculi corpore hærent, altiùsque & penitiùs impacta sunt, atque ob id vehe-mentiore motu est opus. Id experientia perspicuum. Si quis enim acre aliquid, vt piper deglutiat, siue cum melle, siue cum aliquo alio, postea vinum bibat aqua calida tempe-ratum, calore potus ad interiora piper deducitur, & sua acri-moniam ventriculum stimulat. Inde vt in tussi thorax, ita hîc punctus aliunde ventriculus primùm dilatat sese, quo valen-tiùs excutiat quod nocet: deinde quasi collectis viribus, sese dstringit & compressione edit singultum. Sonat autem, quod aër aliquis in vacuo ventriculi spatio comprehensus prema-tur, & per angustiores vias reddatur. Quia ergò multa con-currunt in singultu, pro eorum varietate ad diuersas facul-tates locis diuersis refertur, à Galeno, morricem videlicet, expultricem, naturam solam, retentricem, quòd dum dila-tatur, cibos complecti nequeat. Philoth. ψυχικὸν παθὸς facit conuulsionem. Singultum verò, σωματικόν. Musa ineptè vertit frigidum pro animali. Quanquam non minùs corpo-rata passio videtur in conuulsione, quam singultu. Hinc etiam duplex difficultas. An sit conuulsio; & an præter inani-tionem & repletionem, quæ sunt conuulsionis propriè dictæ causæ, à tertio quodam causarum genere fieri possit. Qui con-uulsionem esse aiunt, primùm Hip. & Gal. autoritate nituntur,

*Vide Galen.  
commen. i. in  
prorrh. sent.  
23 & com.  
2. in idem  
Prorrh. sent.  
59 & alijs  
ferè infinitis  
locis.  
Philoth. com.  
in apho. 3. li. 5*

Sic enim aph. 4. lib. 5. Galenus scribit. Quod autem (inquit) singultus conuulsio sit stomachi secundum Hippocr. nos utique nouimus. Deinde ratione. Quia nerui satis insignes, sed breues, à sexta coniugatione in ventriculum perreptantes, ad suum principium contrahuntur, & partem cui inferuntur simul adducunt. Alij negant. Primum quia conuulsio musculi propria est affectio. At neque ventriculus, neque ipsius os musculus est. Deinde dilatatur, antequam contrahatur, postea redit in naturalem situm: quod in conuulsione non fit. Præterea Hippocr. in Aphor. postquam de conuulsione loquutus est, singultum adiicit, tanquam tertium quid. Sed hæc disputatio nominis tantum videtur esse. Proinde utriusque respondemus ex Galeno aph. 39. lib. 6. Singultus verò concedatur (inquit) conuulsio stomachi nominari, quando aliud fuerit sermonis propositum. Quando verò hoc solum studuerimus, ut passionis substantiam cognoscamus, melius fortassis fuerit non conuulsionem nominare, sed quendam motum eiusdem cum vomitibus generis, sed fortiolem & vehementiorem. Hæc Galenus, cui addimus *ἐν παντί μορῇ προαιρετικῶν* conuulsionem fieri, ut ait Philoth. Vbi Musa ineptè vertit *προαιρετικόν*, propositum, cum significet partem, quæ pro arbitrio mouetur. Est enim conuulsio propriè dicta, inuoluntarius motus, in parte, quæ voluntate mouetur. Singultus autem fit in ventriculo, & sæpius in ipsius orificio. Differt ergo à conuulsione propriè dicta, motus formulæ, & partis affectæ, naturæ. Latius tamen sumpto nomine, conuulsio rectè dicitur Hippocrati. In altera difficultate argumenta quoque afferuntur in utramque partem. Galenus 8. *κατὰ τὸν οὖν* se non reperisse scribit in conuulsione tertiam causam supra euacuationem & repletionem. In singultu maximè, acres nimirum humores stomachum mordentes. In quo inconstantia notatur, ut qui toties dixerit conuulsiones sæpè fieri demorso ori ventriculi ab acri humore, ab aura ascendente, humore aut semine putri in utero, veneno, quæ causæ eadem sunt cum tertia, quam affert Galenus. Hinc efficiunt singultum & conuulsionem esse, & à duabus tantum causis, ut cæteras omnes conuulsiones, fieri inanitione nempe, id est, summa siccitate, & repletionem per humiditatem superfluum, siue replendo nervos con-

*Musa lapsus*

*Musa puerili error.*

*Conuulsio propriè dicta quid.*

*Galenus leuitatem insinuat.*

# DE MORB. INTERNIS

trahat, siue grauet, siue qualitate aliqua vitiosa pungat. Videntur autem rursus homonymiâ decipi. Nam κατὰ τόπους, singultum distinguit à propriè dicta conuulsione. In cæteris locis generalis vocabuli acceptio. Cum enim conuulsio fiat in musculis, & neruoso genere, nerui autem alij potissimum motui, alij insigniori cuidam & exactiori sensui destinati sint, ad voluptuosa retinenda, & noxia reicienda, vt qui ad orificium ventriculi mittuntur, in illis acris humor pungens, aut venenosa quædam qualitas, vel aia, conuulsionem non efficit nisi per accidens: vt in arthritide, in qua punguntur nerui, neque tamen conuelluntur: & in aia è ciuie ascendente, quæ non musculos cruris, sed ventriculos conuellit, & ad contractionem excitat. In posteriore genere contrà fit. Cum enim mordentur partes, quibus nerui illi insignes inseruntur, peculiari quodam motu, vt in tussi, sternutatione, epilepsia, vomitu, & in singultu, expellunt causam noxiam. In quibus certè Galen. tertiam quandam causam agnoscere nobis videtur: in cæteris minimè. Ac proinde conuenienter rerum naturæ scripti κατὰ τόπους, se non reperire in conuulsione tertiam causam, vt in singultu. Quod etiam intellexit de aliis conuulsionibus, quæ eodem naturæ conatu fiunt, quo singultus, nec sibi hac in re contradicit.

Et reuera qualitas quædam in pipere videtur, aut à sanie, aut corruptela, quæ neque inanitio, neque repletio dici potest, nisi minùs propriè sumptis huiusmodi vocabulis. Sic enim, vt capite de conuulsione dictum est, aliquando referuntur omnia ad inanitionem & repletionem.

Fit hic affectus in ventriculo, stomacho, & œsophago, idque vel per ἰδιονόειαν, vel sympateam à meningibus, intestinis, vtero, neruosis partibus, hepato inflammato.

Causæ sunt inanitio, repletio, qualitas humoris, frigiditas, febris singultuosa, de qua lege Commentar. Galen. 4. Acu. inflammatio meningum, ventriculi, hepatis, mesenterij, humor acris infarctus tunicis, punctio acrium humorum, pituita tunicis hærens, rigor, vnde neruosa corpora duriora effecta coguntur, & proinde replentur, quia dissiliari non possunt, sanguinis eruptio, longa inedia, temere adhibita neruis topica, materia, quæ euomitur, orificium ventriculi irritans,

*Galenus à  
calumnia li-  
beratus.*

*Singultus  
causæ.*

vel in eo imbibita, aut abscessum efficiens. In inflammatione hepatis aut alterius partis communicatur affectio per nervos, & feruor stomacho, vel refudat bilis & regurgitat, vel comprimitur ventriculus. In inflammatione cerebri rubor oculorum permanens perspicitur, & qui non euanescit post vomitum, licet aliquando etiam sequatur stomachi inflammationem, sed rarius. A bile vel corruptis cibis cognoscetur ex præcedente victus ratione, ructu, vomitionis sapore, colore flauo, calore. Ab inanitione ferè fit cum vehementissima siti.

Vt pars & occasio, ita grauius periculum. Nam in febre periculosus est singultus, nisi sit criticus, & signa coctionis manifestò appareant. Sic enim sæpè indicat crîsim vomitione futuram. In histericis ab vtero non ita periculosus. Ab inflammatione vteri, deterior. A musculis & ossibus temporum, lethalis. A sanguinis fluxu, malum, vt ait Hipp. Sed Galenus rectè addit, vt plurimùm. Quod vidisse memini in nobili quodam quinquagenario, vel seniore, è familia D. d' Antraques, cuius ille erat œconomus. Effusa enim incredibili sanguinis copiâ, euasit à conuulsione, deliquiis animi, singultu, adhibita cucurbitula, & sanus superuixit. A vomitu quoque malum. Cum enim vomitus, qui remedium esse debet, singultum gignit, ab inflammatione cerebri vel stomachi metuendum.

Erysimachus Medicus in conuiuio Patonis Aristophanem conuiuiam singultientem docet tria remedia singultus: continere spiritum (de quo lege Galen. de difficult. spirandi.) colluere fauces frigidâ (contracto ad interiora calore, vel obtuso sensu) & irritare sternutamentum in vehementi, nec aliis auxiliis cedente. Id (inquit) si bis, aut semel feceris, etiam si frequentissimus sit, tollitur. Responder Aristoph. non priùs cessâsse singultum, quàm sternutamento represserit. Gal. in Aph. distinguit id prodesse, si singultus fit à conclusis humiditatibus. Eos enim, qui ex inanitione fiunt, qui sunt rariores, non sanat sternutatio: alios maximè. Concussio enim capite & ventre, tum reliquo corpore, maximè neruoso, excutitur materia, quæ singultum facit. Sicuti eadem calfacta successione, tenuatâque, partim vacuata & discussa, partim translata in partes ignobiles, vt scribitur 4. de rat. vict. in acu. In pituita tuni-

*Singultus per sympathiam factus ex hepate inflammato, aut aliis partib.*

*Singultus, largo sanguine effuso sedatus.*

*Singultus tria ex Erysimacho homericore remedia.*

## DE MORB. INTERNIS

cis hærente incidendum, detergendum, vacuandum vomitu, pilulis, coquendum, roborandum, fots ex oleis calfacientibus, vel sicci fots humidis meliores, conspersa tamen aquâ vitæ, vel simili, cucurbitulæ primùm scapulis affixæ, deinde ad 12. vertebam & ventrem. Si sit à biliosis humoribus vomitus, detergentia, in sanie acri, aromatica omnia, discutientia odorata vsurpanda. Odora enim stomachum colligunt, grauitè olentia dissoluunt. In inflammatione ventriculi cauenda, quæ in inflammatione hepatis dicuntur. In omnibus causis, clysteres ad humoris deriuationem. Ligaturæ inducendo dolorem, singultum sedant, per fasciam compressio, phœnigmi perseverante malo. In vacuatione, nisi lethalis fuerit, lactis potus, optima iuscula, cucurbitulæ. Ab alimentis acribus, aut medicamentis, oleum amygd. dulc. oliuarum, butyrum, ptisanæ cremor, aqua frigida. Sunt quædam vulgaria, vt experimentum, quod probari vidimus, compresso utrîque ad latera medico digito dextro, rei tristis narratio, aut insolitæ timor, aliò videlicet seducta virtute animali, quæ respiratio- nem facit. Cuidam nullis remediis cedebat singultus, nisi vino Hippocratico albo: cui refrigeratum fuisse ventricu- lum par est. In herniosis senibus sæpè fiunt singultuosæ fe- bres: in quibus singultus non curatur, nisi reposito intesti- no. At si reponas vi, paulò post moriuntur. Itaque despera- tio. Anno 1647. iuxta ædem S. Stephani de saxis, Puella assiduè singultiebat, nihil deglutiebat, dolore facto in œso- phago. Antea pulmonibus bubulis largiter vsa fuerat. Huic grauitas in stomacho, nausea, vomitus. Frustulum tamen pulmonis, quem ederat, in œsophago restiterat. Cucurbitu- lis & idoneis remediis tandem reiectum frustulum, sicque liberata est.

*Experimen-  
tum ad sin-  
gultum.*

*Puella assi-  
duè singul-  
tiens.*

*Gal. comm.  
ad aph. 39. li.*

*6 & cap. 2.  
lib. 3. de sym.  
caus. & côm.  
in sent. 59.  
Porrh. 2.*

ANTO. VALETII EXERCIT. XXXIII.

**S**ingultus est motus ventriculi violentus, eius- dem cum vomitu generis, sed intensus, atque eò vehementior: quo nititur facultas expultrix, quæ penitiùs ipsius oris vetriculi corpus infestât, vel quæ

sunt tunicis obstinacius impaſta, eaque mordentes vires habentia excutere, ac foras amandare. Huius affectus cauſæ ſunt repletio, inanitio, acrium, aut fe-  
 roſorum humorum appuſſus. Fit autem vel per  
 idiopathiam, vel per conſenſum partium quarun-  
 dam, vt iecoris inflammati, vel corporis totius, vt in  
 febribus ardentibus. Singultus à plenitudine ſana-  
 tur per ea, quæ inſarcta ſecant, abſterguntque, me-  
 dicamenta per vomitoria & catartica. Inanitioni,  
 quæ ferè incurabilis exiſtit, debentur polychyma  
 & euchyma alimenta. Sæpè ciet flatuſ ſingultum :  
 ſed hîc admota cucurbitula, vel fomento è flatuſ  
 diſcutientibus comparato facilè vaneſcit.

*De Bulimo & Canina appetentia.*

C A P. 34.

**B**ulimos vnum famis genus eſt, 1 phagedæna  
 alterum. Ingens atque inſatiabilis appetentia.  
 Vtriuſque multæ ſunt differentiæ, & cauſæ euariât.  
 Aliis longum iter per 2 frigora & niues, aut alio-  
 qui externum frigus inde affecto 3 ſtomacho bu-  
 limi cauſa eſt. Sed initio quidem multa appetunt :  
 poſteà verò concidit appetentia. Propterea hoc ge-  
 nus ita definit Galenus. 4 Bulimos caſus eſt appe-  
 tentiæ à frigiditate exteriori, ex indigentia totius  
 corporis, & imbecillitate ſtomachi, qui & refrige-  
 ratus nimium, & reſiccatus eſt. Propterea vniuer-  
 ſalis curatio in calefacientibus & humectantibus,  
 tum 5 balneis, tum fomentis & eduliis poſita eſt.  
 Appetunt ergo hi initio quidem vehementiùs, ſed  
 tempore nihil appetunt. Alia quoque ſpecies eſt,

1 Phagedæna  
 nomen cata-  
 chriſtuſ pro  
 canina appe-  
 tentia ſumi-  
 tur. Cōment.  
 in ſent. 37.

ſect. 3. lib. 6.

τῶν ἐσθιδνῶν.

2 Quoniam  
 aqua vorax,  
 vigilia item  
 vorax. lib. 6  
 Epid.

3 Ventriculi  
 ſcilicet oriſi-  
 cio : vnde la-  
 beſcitur  
 vñ ciborum  
 appetens.

4 Gal. lib. 1.  
 ad Glauc.  
 bulimum in-  
 ter ſyncopes  
 cauſas enume-  
 rat.

5 Singulari-  
 bus quæ Græ-  
 ci τρεπιδόμα-  
 τα appellant.  
 Dum enim  
 ſyncopes me-  
 tus ingruit,  
 vniuerſalia  
 minimè ſunt  
 præſcribenda.



cap. 19. lib. 5 *de Historia animal.* cum acris & mordax humor inhæsit tunicis stomachi, ut nulla iam sit appetentia, atque ita contabescat corpus. Meminit & alterius generis in libro *de Theriaca.*

*de Gal. libr*

*de Theriaca*

*ad Pisonem.*

8 *Per Apho.*

8. lib. 2.

9 *Apho.*

lib. 2. *In quibus*

*nimirum*

*perfectæ ex-*

*tenuationis,*

*nec inchoatæ,*

*signa appa-*

*rent, ab ex-*

*hausto par-*

*te solidarum,*

*nec solum, spi-*

*rituum & hu-*

*morum, immu-*

*tatis partibus*

*nutritioni di-*

*cate, in ha-*

*bitu, tempe-*

*ramento, &*

*actione.*

10 *Cibus li-*

*quidus, imbe-*

*cillimus, con-*

*coctus facili-*

*ter & mini-*

*mè sitis ferri:*

*Quod partes*

*solidæ (quarum*

*proprium munus est concoctio) ab exhausto laborent, nec tam facile*

*partes nutritioni dicatæ à diuturno negotio ad otium se conuertant.*

11 *Dissipatus scilicet tantum spiritibus atque humoribus, superstite partium in-*

*tegritate, & non labefacta, a naturali æconomia.*

12 *Hippoc. lib. de alimento.*

Quibusdam nascitur in intestinis latus vermis: is si diuturnius ieiunium est, lancinat intestinum, & ventrem. Vbi verò cibus ingestus est, exugit atque depascitur, ex quo destitutum corpus alimento emarcescit. Aliud quoque indicium est illius vermis proditum ab 6 Aristotele, quod in egestionibus alui similia seminibus cucurbitulæ, aut cucumeris, apparent. Excludendus is 7 vermis eo modo, quo dicitur cap. de vermibus. Rursus 8 frequentissimus est bulimus in iis, qui coalescunt: magis etiam, si fuerit morbus longior. In his enim non solum humor & spiritus, sed & solidæ partes detrimentum acceperunt. Quæ in re utendum erit præcepto Hippocratis. 9 Quæ longo tempore extenuantur corpora, 10 lentè reficere oportet. Quæ verò 11 breui, breuiter.

In breui enim morbo, humoribus quidem & spiritibus aliquid detractum est: integræ verò atque incolumes solidæ sunt partes.

Quorum instauratio partim 12 odoribus propter spiritus, partim odoratis alimentis, & iis liquidioribus, propter spiritus & humores, partim etiam solidis, si quidem partes elementares attenuatæ sunt. Ad hæc leges Apho. Facilius est impleri potu,

quod partes solidæ (quarum proprium munus est concoctio) ab exhausto laborent, nec tam facile partes nutritioni dicatæ à diuturno negotio ad otium se conuertant.

11 Dissipatus scilicet tantum spiritibus atque humoribus, superstite partium integritate, & non labefacta, a naturali æconomia.

12 Hippoc. lib. de alimento.

quàm cibis, quartum de sanitate tuenda, 7. Methodi, & finem microtechnes.

Summa est, vt alimentis boni succi, qui facilè coquantur, distribuuntur, & nutrant, modica quantitate breuibz interuallis reficias : qui propterea quòd sæpè sitiunt, vino refouendi sunt hoc modo.

13 Lædit vinum vacuo stomacho ante cibum. Statim enim differtur in corpus : neruos offendit. Vnde tremor, conuulsio, delirium.

13 *Gal. comment. in aph. 21. lib. 2.*

Ex immodica verò quantitate, aut non conuenienti qualitate ciborum, recidiuæ fiunt. Temperstius est vini potus in medio cibo.

Post cibum interim dum alimentum conficitur, abstinendum vino, tum quia inde fluitat cibus, aut priusquam fuerit confectus, in corpus rapitur. Quo tamen tempore, si vehementer sitiant, tantùm exhibendum est potus q. s. vt desiderium obtundatur.

Iam confecto cibo, & vt distribuatur, comparato, abundè bibant. Postremum verò genus canina appetentia est. Contumax illa, atque insatiabilis, in qua multos cibos ingurgitant, sed eosdem statim more canum reuomūt, quia, videlicet, natura multitudinem non sustinet. Nascitur ferè à frigido, acidoque humore tunicis stomachi imbibito, quo modo spongia liquorem aliquem exsorbet. Nunquam etiam à sola intemperie nasci volunt. Intemperies contrariis corrigenda est.

In vitioso humore conueniunt, quæ incidunt, detergent, calefaciunt. Diuretica quoque, eaque pani, vino, eduliis mixta, aut aliter exhibita, qualia sunt melicrata è thymi, origani, hyssopti, satureiæ, pulegij, alij, porri, & similium decocto, aut qui his

respondent 14 syrupi.

14 *Vt syrupus de mentha, aut de hyssopo, de abjynth.*

Purgandus quoque humor est 3.2. hieræ picræ ex conuenienti melicrato. Alioqui conficiendæ pilulæ ex pulu. hieræ & agarici trochiscati ana ʒ. 2. Quòd si amarorem aloës ferant, hieræ puluis est melle incorporandus, aut ʒ. ʒ. electarij de hiera imperanda est.

Alioqui pilulæ fiant, quæ illinantur melle, aut puluis ex ouo sorbili exhibeatur. Potus multus vini, etiamsi non sitierint, conuenit, sed in medio cibo aut pleno ventre verisimiliùs, quàm vacuo.

Vinum giluum sit, aut vermiculum, nulla prædictum adstrictione, vetus, dulce, vel acriusculum. Hæc & contra causam faciunt. Contra verò symptomata 15 edulia pingua, oleaginosa, quæ relaxant corpus ventriculi, quod acido humore adstrictum est, & vehementiùs appetit. Omnia frigida, & quæ adstringunt, vitanda sunt.

15 *Ne aßiduitate edendi frangatur venter, & ex canina appetentia fiat bulimus.*

Stomachus oleo fouendus est, in quo thymum, & proximè dicta materia coxerit. Sed quia aliquando consuetudo fit vomitus, nihil retinetur, atque ideò incalescit corpus, modica quantitas alimenti semel exhibenda est: quam etiamsi non retinet ventriculus, cucurbitula ventri infigenda est eo modo, quo capite de cholera diximus.

#### EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Βέλμος, & κυνώδης ὀρέξις nomina sunt ingentem famem & omninò præter naturam significantia. Plutarchus in Symposiacis βῆ scribit idem significare, quòd πολὺ, quasi sit πολὺ λιμὸς, multa fames. Non eadem tamen huius vocis apud omnes acceptio. Aristoteles in Problemat. generaliùs sumpsit

pro fame à frigore, intrò compulso calore, quæ leui cibo acquiescit. Gaza βούλιμον vertit caninam appetentiam. Aphrodisæus in Problematis confundit cum pica, quia multa, sed absurda appetuntur. Quam etiam fieri scribit à Colico morbo, resuente vitio in stomachum. Sed Medicis vsu esse solent pro ea duntaxat fame, quæ contrahitur refrigerato & exsiccato ore ventriculi à frigore externo, qualis per niues iter facientibus contingere aliquando solet. Initio multa appetunt, cum nondum excessit modus refrigerationis, neque vomitionibus à cibo sumpto facilè corripiuntur. At ubi excessit frigus, ac robur stomachi resolutum, inappetentia consequitur & cibi fastidium, etiamsi corpus nutritione egeat. Hinc imbecillitas ventriculi, animi deliquia, virium exolutio, color fædus, torsio stomachi, cordis & extremarum partium frigus, pulsus obscuri. Suidas ex Medicorum libris fieri ait hyeme iter agentibus per summum frigus, & niues, cum corpore densato intrò pulsus calor alimentum depascitur. Liquatis niuib, & calore aëris redeunte, exiguum calorem solui, ita ægros hoc morbo corripi Galenus videtur aphorism. 21. libr. 2. à canina appetentia hoc solo distinxisse, quòd famem non habeat amplius adiunctam, licet ab ea inchoauerit, causamque vnicam affert, frigus externum. In libro tamen de Theriaca alterius speciei meminit, à latis vermibus & prægrandibus, qui chylum depascuntur. Sed hanc Auicenna, Serapio, Trallianus ad caninam appetentiam referunt. Huic similis est κυνώδης όρέξις, id est, canina appetentia, quod neutra vacuatio corpori ex inopia alimenti, aut calamitate frugis populo inuehatur, sed vtrâque oriatur ab affecto ore ventriculi, & puncto à causâ præter naturam. Distinguuntur causis & symptomatis. Nam canina fames causas in vniuersum duas habet, refrigerationem simplicem, & siccitatem oris ventriculi, ut superior, & acidum humorem oris ventriculi impactum, & pungentem. Acidus autem humor duplex, pituita & melancholia. Deinde symptomata sunt diuersa. Nam hic à cibo perpetuus vomitus, & perpetuus cibi appetitus more canum. Cum enim causâ, quæ pungendo famem excitat, semper præsens adsit, & imbecillior virtus cibi copiam non sustineat, necessariò sequitur vomitus. Hinc perseverante

*Arist. probl.  
2. sect. 8.*

*Bulimos me-  
dicus quid  
proprie sit.*

*Canine ap-  
petentia cau-  
sa et sympto-  
mata.*

## DE MORB. INTERNIS

malo tanta imbecillitas, vt nihil ampliùs ventriculus contineat, alui profluuium, cœliacæ, dysentericæ affectiones, hydrops. Nulla, vt in superiore, animi defectio, nisi diuturnitate mali robur oris ventriculi dissoluatur. Atque hæc est propria essentia caninæ appetentiæ. Galenus tamen vocabuli significationem sæpè traduxit ad alia famis genera, quæ oris ventriculi vitio non fiunt: sed vel ab inanitionibus corporis, vt 4. de symptomat. causis: vel imbecillitate retentricis, vt primo eiusdem operis: vel refrigeratis partibus thoracis & respirationis, libro de Vsu resp. Aëtius addit. Causa hæc adiici potest, quæ tamen ab Aëtio memorata non est. Vide cap. 6. Sermon. 1. Tetrabibl. 3. à raritate totius corporis, & occulta perspiratione. Sicque in vniuersum causas in fame canina constituere licebit, intemperiem solam frigidam, vbicunque sit, modò ad ventriculum perueniat, vt à niuib. & potu aquæ frigidissimæ: deinde pituitam acidam vel melancholiam: tertio dissolutionem totius corporis, siue exhauriatur insigni aliqua vacuatione, siue alimentis exigui nutrimenti, aut vsu assiduo detergentium, siue nimium transpiret. Quæ species ab aliis facillè distinguitur, quia alui deiectiones pauciores & sicciores, quàm pro cibi ingestio modo, & qualitate. Cæteræ autem internoscuntur ex relatu ægri, excrementis, ructibus acidis, sapore oris acido.

Remedia sunt, vomitus, deiectio, pilulæ, clysmata, iteratæ purgationes, opiatæ, linimenta. In resolutione optimè alentia: in refrigeratione, calfacientia, humectantia, balnea, fottus, medicamenta, alimenta. Sed Hippocratis singulare remedium, vini potio. Galenus pingua primùm dari iubet, vt obtundatur fames: deinde vinum ex eorum genere, quæ calfaciunt, qualia quæ fulua sunt, rubea, tenuium partium, sine adstrictione, idque in magna copia, licet non sitiant, siue ab intemperie frigida sit, siue ab acido humore. Aëtius quoque vinum exhibet & ieiunis & pransis. Sed in fame naturali admodum noxium ieiunis vinum dare, maximè verò giluum, acre, odorum, non adstringens, quia conuulsionibus & deliriis confestim corripiuntur. Quòd si vini potione non remittatur, ob materiam coniunctam, purgato, & ventriculi  
os robor-

os roborato. In iis qui per frigora & niues morbum contraxerunt, videndum, ne subita fiat mutatio subito, multum calefaciendo, quia sic calor exiguus & languidus dissolvitur: aut subito nutriendo, quia suffocantur. Si in deliquium animi inciderint, Archigenes reuocari docet odoramentis aceti, pullegij, panis intincti, malis, pyris aut aliis fructibus, qui ad manum sint. Extremæ partes constringantur, pungantur maxillæ vellantur capilli & aures. Reuocatis damus panem vino intinctum, deinde carnem suillam, & quæ multum exigua mole nutriunt, oua sorbilia, bulbos, cochleas, aromatica.

*Galen. lib. 8.  
de compositi.  
medic. α. καὶ  
τόπος.*

## ANTO. VALETII EXERCIT. XXXII.

**F**Ame assidua dum quis cruciatur, & tamen assumptus cibus ita grauat, molestusque est, ut cum mox vomere, aut per inferiora deicere cogatur, appetentia immoderata & canina fames vulgò dicta inuadit. Gal. comment. ad aphor. 21. li. 2. duas eius causas agnoscit, vel frigidiorum ventriculi intemperantiam solam, vel acidos, quos exorbuerit os ventriculi, humores. Hæc quia in celiacam, aut dysenteriam affectionem, hydropem, cachexiam, denique in atrophiam, commutari consuevit, sedulam requirit curationem. Si sola sit intemperies frigida, victus calidus remedio est. Si præterea humor adsit, parabitur syrupo acetoso, oxymelite, syrup. de hyssopo. Vacuabitur verò hiera picra, diaphœnico, dacartham. agarico & rheo in aqu. fœnicul. beton. vel oxymelite Galeni infusis.

*Famis canina  
cause duæ*

*Curatio.*

## De iecoris inflammatione. CAP. 35.

**I**Nflamatur iecur gibbis & cauis partibus. Vtrunque propriis iudiciis distingues, ex cap. 6. lib. 5. de locis affectis.

*i Humor  
morbificus  
partes obse  
se proprias.*

# DE MORB. INTERNIS

2 In inflammatione hepatis, si etas & vires perferant sine infirmitate metu, rectè celebratur phlebotomia, cum ad declinationem causæ antecedentis, & amotionem coniunctæ, tunc ad procurationem pepasmi, & materiæ exclusiorem.

3 Vel. ℞. aquar. end. cychor. agrim. ros. ana ℥. 3. aceti ℥. 6. santal. rub. ℥. 1. citr. ana ℥. 1. caphuræ. ʒ. ʒ. fit epithema pro recore dñi excandescit.

4 Potior est Græcorū sententia tum per se, tunc ex euentu. Per se qui dē, quod robor seruet: ex euentu, quia scirrhum vi-

Curatio alia Græcorum, alia Arabum. 2 Conuenit tamen de phlebotomia. Statim ergo clysterem mollem iniice ex ℥. i. decoct. communis. ʒ. 3. olei violati. In quo dissoluantur ʒ. 6. cassiæ, mellis rosac. & sacchari rub. ana ʒ. ʒ. Reddito clystere eo tempore, quo æger minùs calere videbitur, declinatione accessionis, venam basilicam diuidito. Quæ si non apparet, media, aut etiam cephalica, vulneranda est. Probatum quoque antiquis Medicis, ut venæ extremæ manus aperirentur. Galen. eam elegit, quæ ad pollicem vergit, & benè successit. Paulus, quæ ad minimum. Razes, quæ ad medium. Sed ex his parū sanguinis effluit. Grauis autem inflammatio est, & febris, quæ vacuationem desiderat & subitam, & copiosam, etiam ad animi deliquium, nisi partis nobilitas repugnaret, quæ sine graui detrimento subitam plurimamque vacuationem non sustinet: ex quo temperanda est vacuatio. Galenus ad finem septimi Methodi, & lib. 13. multam vacuationem facit: sed cæteris non consentientibus partitur. Adde quod calidius & siccus hepar minùs calido & sicco difficiliùs fert copiosam vacuationem, etiam si & inflammatio & febris vtrâque magna. Quod attinet ad topica, Arabes refrigerantibus vtuntur, quale hoc est.

℞. succi solatri tepidi ʒ. 4. cum linteolo, aut stupis cannabinis fiat 3 epithema. Aliud.

℞. aquæ ros. ʒ. 4. aceti ʒ. ʒ. santalorum rubrorum & citrinorum ana ʒ. i. caphuræ ʒ. i.

4 Græci relaxantibus vtuntur, quibus aliquid aromatum admixtum sit, quod adstringendo roboraret. Vtrisque scopus est, ut refrigeretur hepar:

Græcis præterea, vt vis eius conseruetur. Arabum remedia qualitate propria refrigerant. Græcorum verò per accidens. Nam apertis poris, resoluta in fumos materiâ, calorem hepatis euacuât. Græcorum.

℞. summitatum absynthij, carnis cydoniorum concisorum ana ʒ. 3. Decoquantur in aqua & oleo ad consumptionem aquæ: cum stuppis cannabinis, aut linteolis in expresso oleo mersis foueatur regio hepatis. Aut, mala cydonia purgata & contusa in aqua pluuiâ coque, & cum farina hordei & fœnugræci cataplasma confice. Galenus 13. Methodi vino incoquit. Coqui etiam possunt in absynthij decocto. Alioqui.

℞. ol. de absynthio, & cydoniorum ana ʒ. i. ceræ ʒ. β. liquefiant in vase duplici. Refrigerata malaxentur cum succo endiuie, cichorij, aut simili. Olea conueniunt ꝑ rosatum, de cydoniis, de masti-

*§ Hæc olea  
simul confir-  
mant, & in-  
temperie se-  
dant.*

che, absynthio, spica, schœnuantho, in quo santalacoxerint, quæ adstringendo roborant. Relaxant verò oleum de amygdalis dulcibus, de chamæmelo, anetho, meliloto, in quo althææ radix coxerit, oleum lini.

Sæuiente dolore, tritici farinam in decocto absynthij & anethi costam, & sacco immissam, utilissimum erit apponere. Sunt qui costum & calamum aromaticum cum liquore conueniente patienti ieiuno ebibendum præcipiunt, vt ægrum in latus postea decumbat. Aliis decoctum absynthij pontici modico conditum cinamomo probatur.

Vbi fluxio maior est, maior quoque infirmitas visceris, plus adstringentium, alioqui plus relaxantium miscendum est. In summa lenientibus, re-



# DE MORB. INTERNIS

soluentibus, relaxantibus, roborantibus vñ sunt veteres: aliquando etiam remollientibus, vbi iam durities suspecta esset. Mucagines conueniunt cum semine cydoniorũ, althææ, lini, fœnugræci. Quod

6 *Vt inleſum  
roſatus ſyr.  
malor. gra-  
natorum.*

7 *Vt aqua  
hord. cum in-  
lepo roſaceo,  
aut ſyr. mal.  
gran.*

8 *Vt. ʒ. a-  
qua hordei ʒ.  
8. ſyr capill.  
veneri ʒ. i.  
f. potio.*

9 *Vt diartho-  
dum Abba-  
tis, diamar-  
garitũ frigi.  
electarium  
triaſantali-  
num.*

10 *Vt cum  
oleo cydonio-  
rum, aut cum  
oleo abſyn-  
thite.*

11 *Addi-  
geſtionẽ, ſu-  
biato inſlam-  
mationis me-  
tu.*

ad potiones attrinet, vitanda sunt quæ 6 refrige-  
rant & adstringunt, nisi 7 aliquid commixtum sit,  
quod detergeat & aperiat. Propterea aromata an-  
tiquis probata sunt. Vti licet schœnuantho, spica  
nardi, calamo aromatico, cinamomo, folio, alaro,  
fantalis, caphura. Materia verò potionum ex hor-  
deo. Syrupus acetosus, zulapium factum ex aqua  
vel decocto capill. ven. cichorij, endiuia, fumarie,  
cuscute, glycyrrhizæ, hepaticæ, quatuor sem. ma-  
ioribus & minoribus cum octaua parte sacchari,  
& momento cinamomi, spicæ, & similiū. 8 Sy-  
rupi de cichorio, endiuia, cappill. ven. de fumarie,  
sed plurimū diluti non cum dupla, aut tripla  
aqua, sed potius sextupla, aut octupla. Diluendi  
verò supradictis aquis.

Electaria, 9 quibus confirmatur hepar, proximo  
capite dicentur.

Probatum est hoc oleum antiquis, etiam in-  
flammato hepate.

ʒ. rutæ P. 2. schœnuanthi ʒ. i. sem. lini ʒ. 2. me-  
dium capitis papaueris. Coquantur omnia in oleo.  
Ceratum santalinum cum 10 oleo cōuenienti ma-  
laxatur, capiantur ʒ. 3. cerati. Malaxentur, extendan-  
tur in aluta, fiat scutum ad formam crescentis.

Emplastrum 11 de meliloto, de althæa, vbi ma-  
turandum est apostema, itémque œsypi ceratum  
descriptione Philagrii, & Galeni, diachylon. Ma-  
laxentur cum oleo de liliis, aut in quo radices

althææ coxerint. Emplastrum factum est contulis foliis brassicæ, & melle, emplastrum ex ficibus pinguibus, althææ radice, coctis in oleo. Si magis resolueret consilium est, emplastro de meliloto adiicimus nonnihil ammoniaci, absynthij, aut similium: ex quibus pustulæ, seu vesiculæ excitantur, quæ oleo rosaceo percurantur. Quod si suspitio est infirmitatis, aliquid olei de absynthio & aromatum commiscendum est.

Reliquiæ clysteribus, & leuibus pharmacis subducenda sunt, <sup>12</sup> si quidem malum est in cauis hepatis. Quod si in gibbis, & copiosior materia est, <sup>12</sup> Nam causa hepatis per defectio- nes, conuexa per vrinas expurgatur. <sup>13</sup> deinde etiam diureticis vtendum erit, radice graminis, cichorij, endiuia, acetosæ, apij, petroselini, fœnic. rusci, asparagi, & aliis, quæ postea plenius dicentur.

Laudata herba eupatorium ab antiquis, & maiorana. Cucurbitulæ <sup>14</sup> vsus tum initiis, tum in ueterato morbo. Quidam enim è veteribus, postridie quàm missus fuerat sanguis, cum scarificatione affigebant dextro hypochondrio: relinquebant vulnus in crastinum, atq; iterum affigebant. Alij verò etiam inclinato morbo, vt reliquias vacuarent, similiter applicabant.

#### EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Vt Pleuriticis, & Peripneumonicis, qui lateris aut pulmonis inflammatione vexantur, ita *ἡπατιδὲς*, à iecore inflammato veteres appellarunt. Recentioribus alia huius vocis significatio, de qua dicetur capite sequente. Fiunt autem sæpius in hepate inflammatio, abscessus, scirrhus, imbecillitas, obstructio, vesicæ aqua plenæ in membrana extrema, quæ si rumpantur, hydropisim generant. Cauendum imprimis ne

## DE MORB. INTERNIS

fallamur, si quando tumor apparet in medio ventre. Nam quibusdam, ut quotidianis anatomis cernitur, hepar extenditur ad sinistras partes. Deinde diligenter distinguendum, num in musculis sit inflammatio internis, externis, aut in gibba parte, vel caua, & ne pro phlegmone hepatis, pleuritidem iudicemus. Communia & necessaria signa sunt in inflammatione iecoris tumor, dolor, febris, & ex his spirandi difficultas ac tussicula inanis. Aliquando hepar ob pondus deorsum inclinans tendit diaphragma, unde membrana succingens costas diuellitur, sicque dolor ascendit ad claviculas. Febris ardens est, lingua arida, rubens initio, deinde nigra & aspera, sitis inextinguita, nausea, cibi fastidium, singultus. Distinguuntur partes gibbae à cauis hoc modo. In parte caua dolor grauis, singultus, nausea magis torquent. Fluxus ventris, adeest nisi robustius sit viscus, quod, exuctis humiditatibus, deiectiones, faciat *στυπατώδεις*, & velut in globulos præ siccitate coactas vomitio biliosa maior sitis, linguæ ariditas & asperitas. In gibba, dolor punctorius ob ligamentam cum diaphragmate, urinae magis ruffae, partes vicinae, ut septum, magis opprimuntur: unde difficilius respiratio, tussicula manifestior dolor ad dorsum acutior ob ligamenta, tumor tactu deprehenditur. Inflammatio inter cutem cognoscitur tactu ob tumorem, visu, quia calida rubescit: frigida sine febre, vel dura, vellaxa. In medio ventre, retinet figuram musculorum, tumor externus maior, dolor acerbior. Sed ad exactiorem dignotionem lege caput 6. & 7. lib. 5. de locis affectis, ubi Stesiani & Theagenis historiae. Si in abscessum vertitur, lethale, cum ad carnem usque hepatis corruptio pertingit, & pus simile apparet faeci olei, ex incocta putredine propriae illius substantiae. At si pus intra tunicas contineatur, nihil patiente substantia hepatis, vacuato pure liberantur omnes. Neque enim necessarium est hepate suppurato hominem interire, nisi magnum sit vitium. Vnde Hippoc. 2. de Morb. Pulmone suppurato, si album & purum pus effluat fibris etiam cruentis intermixtis, agrum conualescere, si vitello oui simile, & subviride pus, cerasum ac foetidum mori. Nam pus album altera praeceps robur ostendit, & victoriam naturae.

Remedia sunt, ex eodem latere sanguinis missio, cucur-

*Iecoris inflammatio communia et necessaria signa.*

*Iecoris gibbarum inflammationis à cauis distinctio.*

*Musculorum abdominis inflammationis signa.*

bitulæ in coxis, clyfina, fyrupi, olea, vnguenta, cataplafmata. Galen. ad finem libri 7. Meth. in alteratione videndum præcipit, ne dum calorem extinguimus, temperiem naturalem labefacemus: & 13. topica initio nunquam adhibenda effe frigida. Magna ex parte bilis craffior fit in calore hepatis, fed tenuanda, temperanda, & fi in cauis, declinante morbo, vel etiam maturata phlegmone, per aluum purganda: in gibbis per renes fed primò leuioribus vtendum. Neque tamen, fi contrà fiat, tantus error eft, quantum Auicenna fcripfit.

Nam fi venofum genus per medicamenta purgari poteft, gibbæ quoque poterunt. Sed eò commodiùs, quò natura recipit. In cauis, clyfteribus, deiectoriis, cnico, polypodio. epithymo, mercuriali in ptifana, & iufculis, primùm vtimur, deinde fortioribus, centaurio, colocynthide. In gibbis à diureticis leuioribus ad fortiora paulatim tranfcundum, ne materia concrefcet in fcirrhum. Ad id maximè commoda habentur apozemata laxantia, quæ & humores præparant, & vacuant. In duritie videndum præter cæteras partes, vt moderatè molliamus. Vincant incidentia & tenuantia, aromata mifceantur. Seruandum enim robur partis.

# ANTO. VALETII EXERCIT. XXXV.

**I**Ecori, vti aliis vifceribus, morborum genus duplex accidit: à fola intemperie vnum, citra tumorem præter naturam: alterù, vbi vnà cum intemperie tumor quoque adefl, vt inflammatio, cryfipelas, *Hepatis inflammatio* fcirrhus, inflatio & obftructio à craffis & vifcidis humoribus. *caufa.* Inflammatione verò obfideretur hepar, dum fanguis vel exuperantia, vel tenuitate, vel feruore & acrimonia, vel externarum caufarum impulfu, percuffione, torfione, lapfu, ftrictione forti & cõtina, zonæ, diploidis, è venis immoderatiùs prorùpens, in vifceris corpus copiofior fcedit, & carnofam partis eius fubftantiã, in qua cunctando putrefcit, imbuir. Iecur inflammari ex dolore & gravitate dextri hy-

# DE MORB. INTERNIS

*Hepatitis  
signa.*

pochondrij cum febre acuta, coniunctis facilè quidem intelligimus: sed quia nunc gibbæ, nunc simæ partes phlegmoneprehenduntur, rotûmque continuum est hepatis parenchyma, maxima in illis distinguendis difficultas versatur: quæ tamen à Gale. cap. 6. libr. 5. de loc. mal. affect. diligenter excutitur. Inflammationi incipienti quàm citissimè occurrendum, enemate blando ad fæces deturbandas priùs iniecto, deinde copiosa sanguinis missione è basilica dextra, si vires ferant: alioqui pauca, sed repetita. Purgans autem medicamentum quanquam phlegmonosa habentibus hypochondria minùs est commodum, licebit tamen benignum aliquod imperare, corpore præsertim cacochymo existente vt.

*Hepatitis  
curatio.*

*Gal. comm.  
ad aph. 14.  
lib. 1.*

℥. syr. de cichor. compos. cum rh. ʒ. i. cum aq. stillatitia, aut decoct. cich. vel endiuidiæ, vel acetos. f. potio. Aut. ℥. cathol. dupl. senn. & rhab. ʒ. 6. syrup. laxatiui ros. pallid. & de cichor. simpl. an. ʒ. ʒ. cum aq. hord. vel decocto pectoral. f. dosis.

Topica interim repellentia & adstringentia, vt in aliis fieri solet inflammationibus, admovebuntur, sed quæ actu frigida nō sint: nam natura partis, quæ & princeps est, & publico officio fungitur, atque etiam situs repugnant.

℥. ol. ros. & cydon. an. ʒ. i. cum cerato santalino f. linimentum. Vel. ℥. oleorum eorund. vel mastichini & nenuphari. an. ʒ. 6. mucag. semin. psyl. & cydon. extract. in aq. plantag. & absynthij ʒ. i. puluer. calam. aromatic. & absynth. ana ʒ. i. cum cera flitus.

Cera pauca, vel nulla admiscetur, quia emplastica cùm sit, distillationem prohibendo maiorem inducit calorem. Ad eundē scopum facient syrupi sanguinē temperantes, vel apozemata è radicib. acetos. oxylapath. cichor. totius, plātag. totius, agrimon. lactuc.

portul.ros.endiu.scariol. capill.ven.feminib. frigid. floribus cardiacis, & similibus. Longiùs progressa inflammatione, sanies collecta detergeri vult: inflammatis quidem gibbis, magis per vrinas: simis verò, per secessus. Vrinæ ciebit hoc apozema.

℞. radic. gram. acetos. polypod. quer. petros. passul. mund. glycyrrh. ras. an. ʒ. i. cich. end. agrim. omnium capill. bipinell. b. rion. an. M. i. sem. quat. frigid. maior. an. ʒ. 2. flor. cardiac. ana p. i. f. decoct. ad lb. i. In colatur. dissol. syr. de althæa, syr. capill. ven. & syr. acetos. simpl. an. ʒ. i. f. apoz. clar. cōditū, vt est artis.

Cum fortioribus fuerit opus, addentur valeriana, petros. Macedonicum, & alia id genus diuretica valentiora. Quod attinet ad deiectoria medicamēta, quæ potiora cēsantur cauis hepatis inflammatis, ea mitiora esse debēt: nam vehemētioribus phlegmone augeretur. Quinetiam dum prouecto morbo istis locus est remediis, alia atq; alia particularia deligenda. In incremento digerētia repellētibus, mixta: vt ol. chamæmel. nardin. absynth. capparinum. At in statu sola satis sunt digerētia, nisi inflammatio pergat ad suppuratum. Vbi semper videndum ne emollientium vsu visceris robur dissoluamus. Digeret commodè hoc emplastrum.

℞. massæ emplastri de meliloto, & empl. de mucaginibus ana ʒ. i. cerati santalini ʒ. ʒ. Emolliantur cum oleo de absynt. aut cappar. f. emplastrum.

Id antequā applicetur, fouēda erit regio hepatis ex decocto absynt. flor. chamæ. ros. rubr. calam. arom. femin. anisi lini fœnic. Proderit tādē intēperiem à materia in hepate relictā digerere sūptis & admotis.

℞. specier. electarij diarhod. Abbat. & triasantal. ana ʒ. 2. vel ʒ. i. rasur. cboris, corn. ceru. an. ʒ. ʒ. sacchar. in aq. gra. vel agrim. vel capill. ven. dissol. q. s. f. electar. per lozēg. Cap. vnam singul. matutinis.

1 *Aqua debilitate nominatur hepatici,* Idem præstant cōseruæ ros. violar. cichor. Admo-  
*q̃ ipsa per se cōfistit sinetu* uebitur ceratum santal. cum oleo ros. emollitum.  
*mone, aut solu* Tādē verò abscessus si sequatur, vt plurimūm fu-  
*tione cōtinui.* nestus. Vt enim ab eo vita diutiū protrahatur, sen-  
 2 *Omni debilitatis in* tim tamen tabescēte corpore mors interuenit, quod  
*tēperies sobo-* videlicet vlcus hepatis agrē detergeatur, ob perpe-  
*les existit.* tuā partis humiditatē: vnde hæmatosis frustratur.  
 3 *Quā πικρὴ γλυκὺς Gra-* Attamen Claud. Rousselletius primariæ notæ Do-  
*ci vocāt, cuius est pro-* ctor Medicus, hepatidem ad suppuratum saluis æ-  
*priū munus hæmatosis.* gri rebus perductam obseruauit.

## De 1 debilitate hepatis. CAP. 36.

**D**ebilitatis hepatis 2 intemperies causa est, tū  
 4 *Qui aut qualitate,* substantiæ 3 visceris, 4 tum humorum, qui  
*aut copia pec-* venis & arteriis continentur. Atque imbecillis est  
*cant.* 5 *Ob* attractrix, retentrix, alteratrix, & excretix.

5 *Intemperiem frigidam.* Attractrice infirma liquida deiiciuntur per al-  
 6 *Hæc excre-* uum, vt alteratrice ventriculi infirma: sed hīc cruda  
*tio hepatica* & incocta. Infirma attractrice hepatis, non ita cru-  
*dyfenteria no-* da, sed ad chyli formā accedentia. Hepate verò at-  
*minatur, seu* trahente, sed nō alterante chylum, simile quid lotu-  
*rubra alui* ræ carniū aut sanguinis, quem aqua diluerit, 6 ex-  
*proluuies,* cernitur. Postea verò non rudimenta sanguinis, sed  
 7 *sect. 2. Primi* deteriore qualitate excrementa effluunt. Cuius rei  
*Prorrhethici.* causa hæc est. Frigidiorē hepate alteratrix infirma  
 7 *Vbi inchoa-* est. Itaque rudiorē sanguinem, quem à 7 me-  
*tur hæmatō-* senterio accepit, non cōficit. Vnde per interualla  
*sis. Gal. lib.* excernitur, 8 & loturam carniū repræsentat. Vbi  
 4. *de vsu par.* verò resistit, crassescit, tempore angustias hepatis  
 8 *Gal. cap. 7* intercipit. Cum non perspirat, suboritur febricula.  
*libr. 5. de loc.* Interceptus humor putrescit, atq; aduritur, quo tē-  
*malē affec. Et* pore non iam dilutus sanguis, sed veluti fæx sangui-  
 11. *8. de cōpos.*  
 12. *phar. local.*

nis excernitur. Excretio illa lucet, atque aliquando in atram bilem conuertitur. In frigida intemperie color faciei pallidus, 10 pulsus tardus, 11 vrina alba, aliàs tenuis, 12 aliàs crassa, non ita frequens, neque copiosa deiectio, neque grauitur olens, nisi cum iam corrumpitur. Appetentia aliquando corrumpitur, aliquando intenditur: nulla sitis.

Calidam verò intemperiem sequitur 13 color faciei flauus, celerior pulsus, vrina flauo calore saturata, 14 prostrata appetentia, 15 sitis vehemens, fastidium graue, agitatioque corporis, 16 insignis febris, excrementa alui olida, biliosa admodum, crassa, crocea, mordacia, vomitus quoque virulenti, æruginosi, ex 8. de compositione particularium medicamentorum, 7. cap. lib. 5. de locis affectis.

In calida dispositione fotu atque 17 irrigatione primum vtendum est, è cham. ros. mastichino oleo, in quo absynthij comæ vel dactyli incoxerint. Laudatum remedium Græcis & Arabibus, frequens vsus 18 cichorij, end. Oporjet autem hæc vel rescicata infriare aqua hordei, vel incoquere aqua purissima, & adiecta sexta vel octaua parte sacch. potiones conficere. Augebitur autem sacch. modus, vel minuetur pro ratione. Hæc eadem in frigida conueniunt, sed loco sacch. diluemus mel (aperit enim, terget, purgat, vrinam ciet) aut vtetur syrupo de cichorio simplici cum aqua absynthij, cuscute, & simi.

17 Fiat embroche ex oleo cydon. & rosaceo: linimentum ex cerato santalino in oleo cydon. dissoluto. Adnoueatur etiam ceratum santalinum toti hypo. hondrio dextro in formam lune crescentis. Inmisceri poterit pulvis cerule rub. aut ros. rub. 18 Vt conficietur potio quotidie manè ex decocto radic. cichorij in quo sub finem decoctionis absynthij Romani coma maduerit. Exhibetur iuxta dosi cum talibus electarij santalini,

9 Nam color humerum, si nō sint resus, similis est morborum Gal. cōm. ad apho. 2. lib 1.

10 Pigro motu dilatur arteria.

11 Hac cruditati index, ex apestia et cruditate in venis.

12 Ex perturbatione à flatu lēto spirituum..

13 Quale enim est alimentum, talis elucet color.

14 Quam calor resoluit.

15 A calore, & bilis in ventriculum affluxu.

16 Ex motu, putredine humoris, & synatriismo, quæ hepargignit.



# DE MORB. INTERNIS

Optimùmque fuerit eas aquas priùs condire modico cinamomo, aut adiciere aliquid eorum quæ aperiunt, quale hoc est. Interim roborabit iecur, atque eius incendium temperabit id electarium.

℥. puluer. diarrhod. Abbat. sine moscho, triasantal. diamargarit. frigid. ana ℥. i. rasuræ eboris ʒ. f. cinamom. elect. cornu cerui ana ℥. f. sacchari rosacei quantum satis sit, fiat electarium per lozengias auro cooperiendas, ponderis ʒ. 3.

℥. endiu. cich. sicc. & pul. an. ℥. 2. sem. securidacæ ℥. i. cin. ℥. β. fiat puluis, detur è vino albo tenui.

19 *Melicra-  
tus in ca-  
lida hepatis  
intemperie vi-  
tandus.* Laudant veteres 19 melicrarum è filicis radice detergendo & liberando, sine calfactione manifesta, aut refrigeratione.

℥. radi. chamæpytheos ʒ. 2. radices cichorij ʒ. i. schœnuanthi ʒ. 2. coquantur in quartariis tribus aquæ purissimæ ad dimidias. Colaturam percola per manicam Hippocratis cum sacchari albiss. ʒ. i. cinamomi ℥. β. sunt qui radices easdem siccant, tritas cribrant, & melle exceptas ad nucis ponticæ magnitudinem ex aqua conueniente exhibent.

Conferet quoque mirificè hic syrupus. ℥. scencionis, agrimonix, cicho. endiuix ana M. f. glycyrrhizæ ʒ. i. semin. anis. petros. fœnic. ana ʒ. 2. cinamo. spicæ Celtic. an. ʒ. i. f. decoctio ad quart. 3. In colatura dissolue mell. ʒ. 4. f. syrup. mediocriter coctus. In frigida & imbecilli retentrice atque cōcoctrice.

℥. nardi Celticæ ʒ. 6. absynthij ʒ. 2. cinamomi ʒ. β. cribrata melle excipe. 20 Fiat electarium, aut decoque in aqua, atque inde melicratū compara. Vel eupatorium, absynthium, & alia id genus hepatica vino & aq. incoquantur. Ad fotum eadem concisa

in oleo chamemelino & vino maluatico coquuntur, dum vinum sit absumptum : oleum seruatur ad licum.

Vinum, frigidiores & humidiores hepate, coquit, roborat, putredinem arcet, intemperiem corrigit. At si febris accesserit, subtrahendus penitus eius usus.

Vbi nullus febris metus, vinum præscribi potest eiusmodi. ℞. rosmarini M. i. rutæ p. i. spicæ Celticæ cinamomi ana ʒ. i. Hæc in vino macerata leuiter feruefiant : vinum propinetur.

In frigore & inde obstructionibus olea conueniunt, in quibus elenij, iridis, gentianæ, costæ radices coxerint. Eademque quoque radices infriantur, & insperguntur melicrato, vel exceptæ melle exhibentur. Cochleæ & lupinum iecur trita, & in puluerem redacta ex vino imperantur. Sic etiam ex pulpa passularum, myrobalanorum, hepate lupi, & electariis conuenientibus opiatæ finguntur.

*Electarium de vino Arabum, quod Xiphoides ab Andromacho, & aliis Græcis appellatur.*

℞. ʒ. i. passul. mundatarum ʒ. ʒ. croci ʒ. i. calami aromati. ʒ. ʒ. bdellij ʒ. ʒ. cassiæ ʒ. ʒ. cinamomi ʒ. ʒ. spicæ ʒ. ʒ. myrrhæ electæ ʒ. ʒ. terebinthi. ʒ. ʒ. schœnuanthi ʒ. ʒ. ʒ. filiquarum ʒ. ʒ. mellis ʒ. ʒ. vini subtilis, quod sufficit. Fiat electarium. Addebant alij in calidiore hepate seminis hyoscyami albi, opij ana ʒ. i.

Materia ferè conuenit, quæ penetrat, aperit, lenit, adstringendo roborat, absterget, incidit, putredinem prohibet, exiccat.

Vtimur ergo ad penetrationem cypero, schœnuantho, croco, iride, aromatibus. Eadem quoque

*Vel sic: ʒ. i. passul. damasc. mundatarum ʒ. ʒ. coquantur ad puluerem consistentiam in vino veteri & generoso. Trāsfundantur etiam eo. In cala, dissol. confer. anthos, cori. citr. conditi, cinamo. in ʒ. i. spec. arom. ros. diamar. cal. ana ʒ. ʒ. vel ʒ. ʒ. f. opiatæ, detar. quotidie mane sub horam somni ad ʒ. ʒ. cum vino veteri.*

## DE MORB. INTERNIS

aperiunt. Cui rei etiam pistacia, marrubium, absyn-  
thium, & alia, quæ capite de obstructione hepatis  
dicuntur. Leniunt ficus, passulæ, vinum granatorum  
dulcium, vinum subdulce & tenue. Abstergent mel,  
aqua mellis, terebinthina, & quæ inde distillantur  
aqua, aqua quoque hordei.

Incidit acetum, vinum granatorum maturo-  
rum, & acidorum.

Roborat schœnuanthum, absynthium, eupa-  
torium, rosæ, spicæ. Præseruant à putredine, & si  
quid est virulentum, corrigunt imprimis, cinamo-  
mum, deinde cassia lignea, nardus, iuncus odoratus,  
schœnuanthum, calamus aromaticus, crocus, myr-  
ra electa, aspalthum, passulæ, rasura eboris, cornu  
cerui, vnicornu, vinum, mel, terebinthina, aromata  
omnia. In exsiccando vtuntur spodio, cuius loco  
vti licet saccharo rosato, admixto cinere, facto ex  
ossibus elephantis.

A proprietate conuenire volunt rhabarbarum,  
spicam, passulas, iecur lupinum, carnes cochlearum.

### EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Ἡπατικὸι dicuntur, non vt veteribus, qui hepatis inflam-  
matione laborant: sed cum citra manifestum aliquem illius  
affectum imbecillitas sola acciderit ex intemperie. Cùm au-  
tem intemperies omnis nata sit, vt ait Galenus, actionem læ-  
dere, nō tamen omnis imbecillitatem hanc efficit, quam he-  
paticis tribuunt. Cuius proprium est, sanguinem probè non  
conficere, sed crudum, semicoctum, & aquæ modo liquidum  
generare, siue calida sit intēperies, siue frigida. Sed & in calida  
sæpè aduritur sanguis, tantùm abest, vt semicoctus maneat.  
Facilioris ergo doctrinæ gratiâ duplicem intemperiem con-  
stituere licebit: vnā, quæ iam ad iecinoris substantiā perue-  
nerit, illiusque vires & harmoniam dissoluerit, ita vt imbe-

*Gal. lib. de  
inaquali in-  
temperie.*

*Iecoris du-  
plex intem-  
peries.*

cillitate contracta suum officium non faciat, nisi diminutè. Alteram, circa imbecillitatem, intensa videlicet, aut remissa qualitate aliqua, ut calore & frigore, quæ tamen nondum naturalem constitutionem ita labefactarit, ut facultatis vires sint imminutæ, sed potiùs corruptæ. In priore perpetua est excretio sanguinis aquosi & semicocti, siue à calore sit, siue à frigore. Distinctio ex effectibus causarum. A calore enim cibi fastidium, sitis, febris, vitiosorum humorum vomitus.

*Iecoris in-  
temperierum  
ex causarum  
effectibus di-  
stinctio.*

A frigore, contraria. In posteriore, si calida sit, assatur chylus, in bilem vertitur, urina ruffa, alui excrementa crassa, biliosa, foetida, acria, ventris adstrictio, ob vehementem attractionem à nimio calore, oris amaritudo, sitis, interna manuum caliditas, pedum pulsus celer. In ambitu corporis pruritus, calidi fumi. Et, si bilis in ventriculum fluat, nausea, biliosa vomitio, & similia. Sanguis autem non crudus, ut in superiore, sed adustus potius cernitur. In frigida contraria omnia apparent, pituita, frigus totius corporis, color faciei albus, habitus corporis tumescens, nisi calor cordis impediatur, excrementa pauca, parùm olentia ob cruditatem, ventris profluuium certis temporibus. In sicca, corpus siccus, squalidus, sanguis paucus, crassus, venæ duriores. In humida contraria fit. Causæ externæ, internæ, quæcunque immodicè refrigerant, calfaciunt, siccant, humectant. Partium item consensus, intestinorum gracilium, venarum mesaraicarum, epiploï, splenis, folliculi fellis, renum, vesicæ, venarum, quæ omnes partes hepatis inseruiunt ad præparationem alimenti, excrementa recipienda, sanguinis delationem, vel coctionem iuuandam.

Ab intemperie cum imbecillitate vix curatur. Sed in eo laborandum ne augeatur, occurrendo causæ, & roborando. In calore remedia sunt aquæ potus, alimenta refrigerantia, syrupi, tabellæ, conferuæ, epithemata, vnguenta, cerata. In frigore, eadem, sed contrariis qualitatibus. In siccitate, humiditatem instaurantia, potus lactis, balnea, proprietatem occultam habentia, & quæ hæcticis conueniunt. In humiditate contrariis occurrendum. Valent hepar piscium, anserum, animalculorum, capreolorum, agnorum, terebinthus, pruna passulæ, acetosa. Possunt macerari in sero lactis, aqua hordei, lacte, vino, decocto cinamomi, & aliis, ut res postulat, dū tur-

*Hepatis in-  
temperies cum  
imbecillitate  
constituta vix  
curabilis.*

# DE MORB. INTERNIS

geant imaces, cochleæ, decocta hepatica. Vua pasta tantum astringit, quantum opus habet viscus affectum. Neque enim eget magna astrictione, neque tanta, quanta ventriculus, tota substantia hepatis familiaris. In calore usus mollis casei, cremoris lactis, & similium. Optima sunt, inquit, passim Galen. quæ virâ cum hoc, quod intemperiem curant, etiam alunt, familiari, scilicet, parti laboranti, vinum, mastiche, confectiones Andromachi. Hepar humidiores habet compagem. Itaque non fert remollientia, nisi moderata, oportetque in indurato hepate calfacientium & attenuantium modum statuere præter morem aliorum viscerum.

Bubula, & vini potus nimius Æstate hepatis infestissima sunt, & bilem ad hepar multam, collicunt. Hepatica sunt agnoscuntur, intybi species, fenecio chamæpytis, radix filicis, acetosa asparagi, plantago, eupatorium, absinthium, loncus, &c.

*Hepatica*

*simplicia.*

ANTO. VALETII EXERCIT. XXXVI.

*Hepatis imbecillitas duplex.*

**H**epatis imbecillitas, à qua hepatici nominantur, citra manifestum vllum visceris vitium fieri consuevit. Atque hæc vel natiua est, vel adscititia. In utraque imbecilla si fuerit hæmatosis, prodeunt alui excrementa loturæ carniū similia. Intemperierum autem, quæ huius affectus causæ accensentur, signa distinguuntur ex Galeno cap. 8. libr. 8. de compos. medicam.  $\chi\tau\iota$  τόπος

*Hepatis imbecillitas curat. o.*

Imbecillitas à quavis intemperie per contraria corrigitur, additis modicè adstringentibus, atque etiam aperientibus & detergentibus. Ferè fit enim, ut imbecillo in iecore excrementa colligantur, quæ obstructionem pariunt. Itaque imprimis rheii dilutum ex decocto aperiente præscribitur, vel hic bolus.

$\mathcal{L}$ . terebinth. Venetæ (quæ lenit, terget, vacuat) lotæ in aqua endiuivæ aut cichor. 3. 3. rheii electi puluerati 3. i. f. bol.

In calida

In calida causa conferunt remedia hepatis inflammationi dicata. In frigida verò, quæ obstructioni hepatis à pituitoso humore instituuntur.

De 1 morbo regio.

CAP. 37.

1 *A bile toto corpore suffusa.*

**R**Egius est verò signatus nomine morbus, Moliter hic quoniam celsa curadus in aula. Inquit Serenus. Hoc idem Cornelius Celsus.

Debet enim omnibus curis esse vacuus ac solutus ictericorum animus: quin & splendido conclauui, lasciuiis, cantu, iucundis quoque sermonibus laxandus est. Varro quia curatur mulsâ morbum regiû dictû existimat. Vocatur & hic morbus arquatus vel arcuatus. Icterus, quia ic̃tida, id est, viueram, animalculum, quo cuniculos excludût (vel *mustellam colore oculorum aureo*) vel Galbulam auem colore representat: qua ratione & aurigo dicitur.

Causa ferè 2 obstructio, nonnunquam inflammatio, aut intemperies 3 hepatis. Et obstructio quidem vel hepatis, vel pororum bilis: 4 lapillus aliquando concretus in folliculo fellis, aut adnatum tuberculum. Nonnunquam quia cystis fellis multitudine intercipitur, vel quia vis eius excretrix infirma est. Venena quoq; aut bibita 5 pharmaca, nec per aluum reddita, huius vitij causæ aliquando extiterunt.

2 *Etque vesicula fellis.*

3 *In quo est interdum m-*

*pressa venenosa quedã qualitas.*

4 *Imò multi per sepe.*

5 *Quæ à venis rarefactis rapiuntur.*

6 *Naturalẽ, criticam, aut symptomatice.*

Primùm itaque est, vt 6 causam agnoscas: deinde vt eandem tollas: postremò icterum cures. Interrogabis ægrum, num sentiat grauitatem, tensionem, dolorem in dextro hypochondrio. Manum quoq; admoue- bis, vt intelligas, num tumor & durities ali-

# DE MORB. INTERNIS

7 Et si hy-  
pocondrium  
λαπαρον, &  
omnino a-  
quale.

8 Unde nec  
villam subesse  
perēne icteri  
generationē.

9 Ut agri-  
monia, suma-  
ria, melilotū,  
furfur.

10 Vesicula  
felli & ve-  
narum hepa-  
tis. Tali e-  
nim obstru-  
ctione exitu  
& aditu pro-  
hibetur bilis  
in felle ves-  
iculam.

11 Vel 3. 10.  
ne illud ex-  
crementū vi-  
aperientium  
in venas fe-  
ratur, obstru-  
ctionē inque  
pariat.

12 Quod na-  
ture clyster  
naturalis de-  
negetur, ex  
eo quod bilis  
exitum non  
habet in in-  
testina.

qua subsistat. Quæ omnia si 7 absunt, & excremen-  
ta alui, urinae similiter, naturaliter habent, iudicabis  
8 incolume iecur esse: cæterum effusam in corpus  
bilem, quæ colorem cutis defœdat, quia crassior  
est, exhalare ac resolui non posse. His ergo victum  
liquidiorē atque humidiorē imperabis.

Balnea aquæ dulcis, in quibus quæ 9 detergent,  
atque resoluunt, decoxeris. Si verò adsunt, ventér-  
que subsistit, albida excrementa sunt, cineritia, &  
argillofa, urinae verò spissæ, colore croceo saturatæ,  
aut etiam nigræ, tum obstructionis certum indicatiū  
est. Inflammatio perpetuū cum febre est, de qua  
prius. Obstructio ergo prius curetur, deinde dele-  
bitur icterus.

Primum itaque aperientibus & detergentibus  
insigniter liberanda est 10 obstructio. Verum si su-  
spitio aliqua est excrementi in ventre & primis ve-  
nis, cassiæ aut catholici 11 ʒ. i. ex sero lactis impera-  
bis. Et quia in hoc morbo aluus 12 ferè adstricta est,  
vtilissimus est clyster, cuius materia sit ex iis, quæ  
stercus durius emolliant, quæ resistantem bilem ir-  
ritant, quæ musculos & instrumenta excretionis  
incitent. Sic enim placuisse veteribus Aphrodiseus  
scriptum reliquit.

℥. maluæ, bis maluæ, violariæ an. M. i. furfurum  
pinguium M. β. fiat decoctio ad ℥b. i. plus minúsue.  
In qua dissolue mellis communis, sacchar. rubr. ana  
ʒ. i. salis communis ʒ. 2. olei communis ʒ. 3. Hæc est  
formula, qua per intervalla vti oportebit, vbi diu-  
tius venter restiterit.

Postea si sanguis multus est, basilicam aperies, ac  
pro ratione sanguinem educes.

Solitæ quoque hæmorrhoides incitandæ sunt, & menses in mulieribus, venæ sub lingua, non nisi inclinante morbo aperiri debent. Tum enim ea phlebotomia répestiua est. Tum de 13 purgatione agendum est. Meminisse autem oportet nunquam vten-  
 dum purgationibus, obstructo hepate insigniter, nisi prius feceris viam aperientibus & detergentibus.

13 *Que sit huiusmodi, ut materiam morbum facientem radicem extirpet.*

Aperiunt autem oxalis, cichorium, endiuia, apiû, adianthum, calamintha, fœniculum, gentiana, anchusa, aristolochia, melanthium, securidaca, chamæpythis, rosmarinus, serpillum, hypericum, marrubium, asarum, anisum, petroselinum, amara omnia, aromata, terreni vermes, cornu cerui, ebur, cornu vnicornis. Quorum omnium herbas, radices, aqua incoques, aut vino tenui, atque inde cum saccharo aut melle portiones comparabis, aut redacta in puluerem ad 3. 2. mulsæ aut vini albi tenuis & similiū 3. 3. aut 4. insperges.

Syrupi in vñ sunt de cichorio, endiuia, capill. ven. de byzantiis, de duabus & quinq; radici. syrup. acetosus, de acetositate citri, oxymel simplex. Aquæ verò endiuia, cichorij, lupulorum, cuscutæ, fumarie, capil. ven. acetosæ, scolopédrij, raphani, apij, fœniculi, lappæ, rubeæ, lybistici, eryngij, rusci, asparagi, & similiū. Oportetque initio primū vti leuoribus, idque per interualla. Assiduus enim aperientium vsus vehementer lædit. Atque vbi his vsus fue-

rit, purgationes imperabis ex seri lactis 3. 4. in quibus per noctem maduerint 3. 2. carthami conuasati, cinamomi, vel ireos florentinæ 3. 3. Alioqui rhab. 3. 2. infusas in aqua endiuia cum modico cinamomi. Idem pōdus 14 hieræ picæ, hieræ diaco-

14 *Si pituita obstructio nem faciat, hieræ picam commode versipus.*



## DE MORB. INTERNIS

locynth.conuenire potest. Alioqui.

℞. pul. hieræ diaco. ℥. 4. rab. electi ℥. i. cornu cerui, rasuræ eboris, cinamomi ana ℥. β. Dabis hæc ex fero lactis, aut aqua hordei. Tum ad aperientia redeundum est, & iterum purgandum internallis.

Quòd si his malum non cedit, medicamentis vtendum erit, quæ fortiùs aperiunt & detergent. Atque iam dacrydio & colocynthide cathartica acuenda, vt proximis Gr.8.6.4. dacrydij admiscenda sunt. Alioqui.

℞. dacrydij ℥. i. florum anthos, borraginis, & violarum ana P. β. cinamomi, asari, rad. gentianæ ana Gr.8. Fiat infusio in fero lactis. In col. ℥. 4. dissolue sacchari ℥. β. fiat potus.

Vomitus quoque etiam cum elleboro, de quibus antea, probati sunt. Ita curato viscere, color fædus delendus est thermis siccis: deinde balneo ex chamemelo, anetho, calamentho, fœniculo, rosmarino, parietaria, & furfuribus. Statimque à balneo, linteis asperis, & materia balnei perfricandum corpus est.

Potiones ex supradictis aperientibus & detergentibus exhibendæ.

Sternutamenta & errhina, qualia priùs descripta, conueniunt.

Oculi & facies aceto albo, aqua hordei, succo granatorum, oxysacchara, succo coriandri, acetosæ, acetositate citri. His quidem tepidis fouēda sunt & contingenda. Nunquam autem venies ad fæditatem coloris, nisi sublata causa, & curato viscere. Quod si durum est, fouebis ex aceto, in quo althææ & lilij rælices, ficus, passulæ, coxerint: tum ℥. 3. em-

plastri de meliloto, vel dialthææ malaxat. cum oleo amygdalarum dulcium induces: vel ammoniaci ʒ.2. in aceto dissolutas applicabis. Superioribus remediis vteris, sed admixtis iis, quæ leniunt & emolliunt.

In matetia venenosa initio quidem vomitus, si eò materia vertitur. Si ad intestina, clyster acris. Si in habitum corporis, cucurbitulæ cum multa flamma conueniunt, & ea omnia, quæ foras materiam attrahunt. Ex quo, syrupo acetoso, de limonibus, oxysacchara, de acetositate citri, cum aquis acetosæ, endiuia, 15 calendulæ, papaueris rubri, dictamni, tormentillæ, seu succo granatorum, berberorum, limonum, citri, lacte acetoso, in quo flores cordiales leuiter bullierint, rasura cornu vnicornis, cornu cerui, eboris, electario de vino, & paulò antè descriptis capite de debilitate hepatis remediis vti oportebit.

15 *Melissæ quoque, mor- sus diaboli, cardui bene- dicti, & sim- mil. penta- phylli.*

Theriacæ & mythridatij vsus. Dantur quotidie ʒ.2. aut ʒ.1. cum ʒ.1. acetositatis citri aut liquore conuenienti.

Virginibus, quas hoc 16 vitium defœdat, purgatio ex hiera. Imperatur ʒ.1. ʒ. ex aqua halicacabi (vulgò Alkekengi) cuscutæ, endiuia, oxymelite. Alioqui.

16 *De huius curatione suffus in splenicis affectibus.*

℥. hieræ picræ ʒ.4. rhab. electi, agarici trochiscati, ana ʒ. ʒ. rasuræ eboris, & cornu cerui ana ʒ. ʒ. cinamomi Gr.8. croci Gr. 4. incorporentur omnia in 17 ʒ. ʒ. catho. Deinde dissolue in sero lactis, aqua cuscutæ, aut liquore simili.

17 *Vel ʒ.6. Exhibitur autē iis præmissis, quæ ad obstructa liberanda præscripta sunt.*

Imperetur quoque hoc electarium. ℥. tria fantali, diarhod Abb. ana ʒ. ʒ. vtriusque diamarg. an. ʒ.1. rasuræ eboris, cornu cerui an. ʒ. ʒ. sacchari in aqua cu-

# DE MORB. INTER NIS

18 *Diacur-  
cuma etiā &  
conf. Etio al-  
kermes miri-  
ficè profunt.*

scutæ & rosmarini dissoluti quantum sufficit. Fias elect. per lozengas pondere ʒ. i. 18 Dentur manè & vesperi per se, vel cum liquore conuenienti ex cochleari. Vel solum triasantalinum electariū cum duplicato aut triplicato rhabarbaro satis esse poterit. Alioqui.

Ammoniacum ad ʒ. 2. è mulso radicis capparis, vel aromatico vino, exhibitum tanta pollet facultate, vt multos iam ad hydropem properantes liberarit, vacuatis mirabiliter per ventrem visceris obstructionibus. Destillatur inde arte chymica oleum conuenientissimum.

℥. rad. gentianæ in puluer. redactæ ʒ. 4. cornu cerui & rasuræ eboris ana ʒ. 2. cinamomi ʒ. 1. sacchari ʒ. ʒ. detur sæpe medium cochlear ex vino albo tenui.

℥. semin. anis. apij, asar. absynth. amygdal. amarar. ana partes æquales: terantur. Ex quibus tritis cum aqua cuscutæ fingantur trochisci.

Vel etiam, ℥. cortic. radicis capparis ʒ. 9. seminis acetosæ. ʒ. 6. cortic. radic. fœnic. ʒ. 3. f. puluis detur ʒ. i. ex aqua conuenienti media nocte, vel in siti.

Vtatur quoque per interualla decocto cicerum rubrorum, in quo radices petroselini & cichorij coxerint. Epotis id genus medicamentis decumbat æger in latus ægrum.

## EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

*Icterus  
flauus & ni-  
ger*

Icterus iecinoris vitio flauus: lienis, niger: vterque, mixtus & virescens, vt puellis quibusdam. In omnibus

effunditur bilis in vniuersum corporis habitum. Differentiæ ex causarum varietate & modo sumuntur. Si obstruatur meatus à iecore in follicullum fellis, quia plena adhuc est vesicula, excrementa alui utcumque colorata erunt: sin alter à follicullo in ephysim, alba & cineritia, quia bili præclusus est aditus ad intestina. In vtróque affectu bilis non secernitur: reurgitat in iecur & venas: sanguini permiscetur: effunditur in totum corpus, vnde aureus color præcipuè oculorum, ob candorem. Pars per renes expulsa urinas aureas, crassas, impuras efficit. Si calida sit & sicca intemperies hepatis, multitudo bilis inde procreatæ icterum generabit. Sed excrementa quoque alui, ut cæteræ partes, bile perfusa apparebunt. Idem præstat imbecillitas secretriciis, quæ genitam bilem non separat à sanguine, ut in obstructione, scirrho, inflammatione, imbecillitate hepatis. Idem quoque facultas expultrix in morbis acutis per crism, vel læsa retentrix, & superata humoris copia, multitudine, malignitate. Sed quò distinctiùs & exactiùs causæ omnes discernantur, imprimis videto, an cum morbo acuto sit, an per se: si cum morbo acuto, an die critico factus fuerit apparentibus coctionis signis, iecore non indurato. Sic enim optimæ crisis indicium, superante expultrice facultate. Contrà, malum, præcipuè ante diem decretorium, superata retentrice. Anceps tamen præsagium, ut dicetur. Quòd si sine morbo acuto sit, imprimis excrementa inspicio. Nam si alba, vel parùm colorata, obstructio est. Si deiectio alba, urinae flauæ, nullus tumor in hypochondriis, neque tensio, & dolor qua parte porus cholagogus decliuus, obstructus est ille meatus. Si colorata deiectio, vel est imbecillitas iecoris, vel intemperies calida, vel morbus venenatorum animalium, vel pharmacorum deleteriorum potus, vel aqua corrupta, ut in expeditione Neapolitana. Duo priora distinguo ex propriis capitibus, in quibus agitur de imbecillitate, inflammatione, scirrho, obstructione hepatis. Nam ab his etiam tribus postremis fiunt icteri, auctore Galeno Aphor. 62. lib. 4. Verùm scirrhus diuturnus morbus existit. Inflammatio & obstructio repètè fieri possunt. Adde signum ex flatu in intestinis. Nam *πνδματώδεις*, id est, flatuosi fiunt, qui ex imbecillitate ictero vexantur. Cōtrario modo afficiuntur, qui ex calida intēperie. Non ignorare Hip-

*Aphylis id  
a di. Aphylis  
line p. 100  
diu alu  
multo sa-  
p. 100  
Hepatic in-  
temperies ca-  
lida & sicca  
bilis procrea-  
trix, & pro-  
pterea icteri.*

*Hippocrates  
aph. 64. li. 4.*

*Ictero ex im-  
becillitate de-  
teti flatuosi.*

## DE MORB. INTERNIS

pocratem scripsisse Apho. ultimo libris, regio morbo laborātes non multum ventosos esse. Quod cum experientia repugnet, quā flatibus ictericos abundare constat, interpretes in varias sententias distraxit. Sed flatu in ventre fieri certum est caloris natiui imbecillitate, vel multitudine & qualitate materiae. Ergo cum ferè morbus regius apud nos ex multitudine crudi humoris ortum habeat, qui imbecillitate caloris colligitur & obstruit, nec detergitur influente bile, necessariò ita affecti erunt *πνδματώδεις*. Quibus verò temperantior victus, multum exercitium, calidior morbus, vel hepar, crassior bilis, intemperies calida, nisi accesserit imbecillitas, flatuosos non esse consentaneum est, quod Hippocr. significat. Proinde non ineptè hoc signum adiecimus. Morsum venenatorum, aut pharmaci deleterij potum ex relatu ægri, vita antecedente coniecito.

*Flatuū pro-  
uentus vnde.*

*Ex ictero a-  
cuti superue-  
niente presagium fallax.*

In morbis acutis præsagium quàm sit fallax ex ictero superueniente, historiae multæ in Epid. demonstrant. Quibus adduntur quædam nostræ observationes. Inter cæteras, anno 1545. quidam sexto factus ictericus, commota aluo biliosa deiecit, vrinis nigris & multo felle tinctis. Febris exers iam ambulabat, quasi omninò liberatus. 14. recidua. 17. obiit. Aliis duobus idem accidit. Quidam admodum robustus ante 7. ictericus factus, ægerrimè & cum recidua euasit. Anno 1549. mensibus Aprili & Mayo (quo ferè tempore Lutetiae febres tertianæ exoriuntur) multis aureæ vrinæ, & morbus regius primis diebus. Cuidam nobili ita affecto detractus sanguis ter ad octo ferè vascula iteratis vicibus. Sanguis totus & spumâ, & consistentiâ flauus. Visus est conualuisse, 17. recidua, alui profluvium, bilis crassa & meracior, singultus levis. 21. obiit. Laborauerat aliquando lue venerea. Multos in Epid. ante septimum ictericos factos euasisse legimus. In Coacis Hippocr. *ἡ δὲ μὴ σκληρὸν ὑποχόνδριον*, salutarem esse, 7.9.11.14. Si induretur, ambiguum, *ἐνδίασπον* Galenus de rat. vict. in morbis acutis, in biliosa febre, ante 7. ictero cum rigore vel horrore morbum solui voluit. Si verò absque rigore, *ἔξω τῶν χειρῶν*, lethale Vbi criticum icterum sine tumore, aut inflammatione hepatis, & excretionem consequentem, horroris vel rigoris nomine intellexisse videtur. Sed de his alio loco.

Criticus non curandus. In febrem, inflammationem, scirrhum, obstructionem hepatis intentum esse oportet. In cæteris biliosa purganda, sine attractione vehemēti per aluum, renes, vomitum. Suppressa vacuatione, & in plenitudine, venæ sectio, à basilica, sub lingua. Hinc balnea, sudorem mouentia, masticatoria, errhina, regia vita, topica, denique omne purgationis genus, quia in totum corpus malum sparsum est, ut scribitur in lib. Quos purgare oporteat. Multos se curasse Romæ Galenus testatur antea præparatos incidentibus, aperientibus, deinde medicamentis cholagogis. Lege cap. 7. lib. 5. de locis affectis, & libellum de purgantium medicamentorum facultate. Conueniunt aperientia, detergentia, cuscuta, erinaceus, ammoniacum in mellito vino, vel aromatico, oleum inde distillatum, vermes terreni triti in *Gale. lib. de Theriaca.* melicrato (quibus curationem recepit Dom. Tronson, Senator Regius) aqua raphani Auicennæ (Sic rustici raphani succum ad 3. 4. cum meraci vini 3. i. β. exhibent) eupatorium, gentiana, apium, asarum, absynthium, amygdalæ amaræ, radix caparis, tria sunt. triplicato rhabarbaro, marrubij decoctum. Charadriion à voragine, vel voracitate, vilis auis, quæ credebatur visa icterum soluere. Propterea venditores occultabant, ne emptores conspecta aue curarentur, priusquam emissent. Inde nomen ei, qui rem vilem quasi magni pretij occultat & dissimulat. Succus fumiterræ, cichorij, inde syrupi cum sero lactis, lac, cremor lactis cum fragis, caseus mollis, iuscula ex hord. acetosa, lactuca, cichorio, scariola, ius prunorum, ex oleribus conuenientibus acetaria, ius pullastri alteratum cum oleribus conuenientibus, calidam hepatis intemperiem corrigunt. Si sola intemperies, tantum alterandum. In quibusdam oxymel cum decocto guaiaci. Viscum collectum in alba spina, vel etiam in quercu, zona è linteis confutis includitur, cingitur nouem diebus, experimento vulgi.

## ANTO. VALETII EXERCIT. XXXVII.

**I**cterus symptoma facultatis sanguificæ, vel excreticis, biliosi humoris est per summa corporis effusio, in adnata primùm oculi tunica apparens.

## DE MORB. INTERNIS

Ab hepate & liene quâquam promiscuè originem habet, quòd ea viscera in humorum procreatione, secretionéque plurimùm occupentur, sæpiùs tamè ab hepatis inflammatione calidam venarum intemperiem, bilis plurimæ procreatricem, accersente, intemperie, scirrho, obstructione, aut à similibus id genus affectibus cystim fellis, cysticósue meatus obsidentibus accidit. Sæpè fit icterus per crises biliosarum febrium, naturâ materiam noxiam ab alto corpore foras protrudente. Qui lienis vitio ingruit, niger est, humoris ideam melancholici referens: vt qui à bile est porracea, aut ab epoto veneno, itémque bestiarum virulentarum demorsu, viridis. Hippocrates albi etiam icteri commemorat.

*Hippoc. lib.  
de intern. aff-  
fect.*

*Icteri signa  
ab inuicem  
distincta.*

In icteri signis distinctione est opus, vt pars verè affecta dignoscatur. Iecoris affectum, hoc est intemperiem, ostendunt deiectiones & vrinæ biliosæ: quæ intemperies si coniunctam habeat inflammationem, grauitas in hypochondrio dextro fatigat. Vesiculæ autem obstructionem, vrinæ solæ bile plurima perfusæ, & deiectiones albicantes. Totius denique corporis habitus vitium incusamus, cum deiectionibus & vrina naturaliter habentibus, color & sudor bilis speciem cum pruritu resipiunt. At verò vbi venenata est causa, ad propria venenorum assumptorum signa recurrendum.

*Icteri cura-  
tio quàm v-  
ria.*

Vt sunt icteri causæ variæ, ita diuersa remedia. Vbi sola iecoris intemperies subsistit, sola contraria alterantia, vt assumpta zulapia, refrigerantia apoze-mata, & extrinsecus adhibita cerata, refrigeras Gal. santalinum, atque etiam epithemata, vsurpantur. Vbi inflammatio adest, remedia antè explicata vsui

erunt. Vbi obstructio cū iecoris ipsius, tum vesiculæ fellis, fortiores clysteres, qui ferri solitos ad cutim humores irritando retrahant, phlebotome, apozemata aperientia, incidentia, & tenuantia, cholagoga cathartica præscribentur. Clyster erit huiusmodi.

℞. hord. integr. fursur. macr. ana p. ij. quatuor remollientium, flor. chamæm. melil. ana M. i. β. semin. anis. alth. fœnic. & lini ana ʒ. 2. f. decoctio ad ℥b. i. vel tantundem seri lactis accipito. In colatura disso. cathol. & hieræ simplicis (si febris absit) ana ʒ. β. diaphœnici ʒ. 2. mell. ros. sacchar. rub. ana ʒ. i. olei viol. ʒ. 3. f. clyster.

Post reiectum clystêre pertunditur vena potissimum plethoricis corporibus. Deinde verò tali apozemate humor ad purgationē præparatur, quia hîc sæpè bilis etiam crassior sit, aut per se, aut humoris alterius, vt pituitosi vel melancholici, admixtione.

℞. radic. gram. apij, fœnic. oxylapath. cichor. cum toto ana ʒ. β. polypod. quern. passul. mund. sem. cartha. tamarind. ping. elect. ana ʒ. 6. fol. scolopend. chamædryos, chamæpyth. agrim. cuscut. summitat. absynth. lupul. & asparag. ana M. i. glycyrrhiz. ras. ʒ. i. quatuor sem. frigid. maior. ana ʒ. β. prun. damasc. n. 8. hord. integr. p. β. flor. cardiac. ana p. i. f. decoct. & colat. ad ℥b. i. In qua dissol. syrup. de cichor. simpl. syr. capill. ven. & oxymel. simplic ana ʒ. i. β. f. apozem. clar. conditum ʒ. β. cinamom. & ʒ. 2. tanta. citrini: sumat bis in die ʒ. 3. aut 4. horis duabus ante pastum.

Ab his sumat medicamentum sequens.

℞. decoct. pectoral. aperitiu. q. s. fol. sennę mund. ʒ. 2. f. decoct. In colat. pro vna dōs. infunde per noctē rh. elect. ʒ. 2. cinamom. ʒ. 2. In expressione dissol. cathol. & syrup. capill. ven. ana ʒ. β. diaphœnic. ʒ. 2. f. potio.

Pauperibus diaprun. solutium, electar. de succo rosar. dissoluuntur in decocto hepatico aperiente, in sero lactis, aut vino albo, aut aqua gram. aut



# DE MORB. INTERNIS

*Gal. initio  
li. 9. de cōpo.  
med. καὶ  
τόπος.*

endiuiæ. Paulò valentiora purgantia esse debent, quoniã in huiusmodi obstructione, & expultricis facultatis imbecillitate, difficilior purgatio: quæ tamen temperabuntur, si id febris suaserit faciûdum.

*1 Que vario  
rum morborû  
soboles & pa-  
rës est, agros  
alimento de-  
fraudat, &  
anadosim im-  
pedit.*

Postquam corpus sufficienter fuerit purgatum, & humorem cuti subiectum discutere oportebit, eger hoc balneum ingreditur, quod quatuor, aut quinque dies continuabit.

*2 Sacculi,  
emplast. ther-  
masmatu, li-  
tu &c.*

℞. radic. oxylapath. oxalid. radic. alth. lilior. an. 3. 4. enul. camp. 3. 2. viol. fol. malu. bisfmal. parietar. acetos. cichor. cum toto, bugloss. fumar. fol. vitis, hederæ terrestris an. M. 3. Bulliant simul pro balneo vniuersali. Coniiciatur sacculus plenus emplast. ther-  
furfuris, super quem sedeat.

*3 Hi enim nõ  
facile pepas-  
mû recipiunt.*

A balneo Galenus anethino oleo, aut chamæmelino corpus confricat.

*4 Ab humo-  
ris acrimonia  
tunicas velli-  
cantis.*

Et quidem solis ferè balneis cum frictionibus, aut litubus relaxantibus & discutientibus est opus, quãdo vitium in habitu tantum corporis insidet: vt fit in criticis icteris, qui septi. vndec. vel decimoquarto die febribus biliosis feliciter superueniunt. Si vene-

*5 Ab humori-  
bus lentis.*

nata sit, causa, alexiteriis oppugnabitur. Si niger icterus, valebunt remedia in affectibus lienis præscripta.

*6 Afatu.*

*De 1 oppilatione hepatis. CAP. 38.*

*7 Ob interce-  
ptam anado-  
sim, & prauo-  
rum humorû  
pleonexiam.*

**O**ppilatur hepar à crassis flatibus, sed facile 2 discutiuntur: non ita facile, si à 3 crassis viscidisque humoribus: ferèque sentitur lancinans 4 dolor aut 5 grauis, aliquando 6 tensio, facies 7 malè colorata est, squallor 8 cutis, pulsus 9 inæqualis, spiratio 10 etiam aliquando difficilis, excre-

*8 Prauitate  
succu, & calo-  
re diffuso cõ-  
tra naturã in  
prauis excre-*

mentis suffusione. 9 Motu, quiete, dilatatione arteria. 10 Compressione diaphragmati, aut sympathia tunica cistæ succingentis. 11 Non sunt enim deiectiones figuratæ: sed molles, ex feri copia, & præclusa anadosi.

Curatio magna ex parte ex proximo capite rependa est.

12 Incidendum, 13 aperiendum, 14 detergendū, à 15 quo purgandum est Et, si 16 cætera consentiunt, è basilica, aut venis extremæ manus sanguis educi debet, nisi suppressis mēsis, aut hæmorrhoidibus 17 malum natum est. Tum enim venæ ciuris potius 18 incidendæ sunt.

Materia incidentium, aperiendum, & detergentium proximo cap. descripta est. Peculiariter conueniunt syrupus acetosus, oxysacchara, syrup. capilli. ven. de cichorio, de endiuia, oxymel simplex, quibus initio, & vbi caloris suspitio, vtendum est. Item oxymelite scyllitico, syrupo de bizantiis, de duabus & quinque radicibus, cum aquis cuscute, fumarie, & aliis suprà descriptis. Probatū hoc est à 19 multis.

℥. 20 aquæ decoctionis hordei ℥. 8. aceti ℥. 8. vini granatorum ℥. 4. sacchari, mellis albi ana ℥. 1. Fiat zulapium clarificatum & aromatizatum cum modico cinamomi, vtatur ℥. 3. 21 manè & vespere.

Purgatio ex hieræ 3. 2. cum oxymelite, aut quæ in fœdis virginum coloribus scripta est, ex rhabarbaro & agar. addito aliquando dacrydij momento, quales hæ erunt pilulæ.

℥. rhabarbari 3. 1. agar. 3. 2. dacrydij Gra. 4. cum oxymelite formentur pilulæ, vel dissoluantur in liquore 23 conuenienti.

Contra obstructiones certissimum remedium esse volunt frequentem vsum huius pulueris.

nis hord. ℥. 8. vini granatum ℥. 4. mellis ℥. 1. aceti ad gustum f. zulapium.

22 Horis duabus ante cibum mane, itémque vespere duabus horis post cibum.

23 Vt aqua fumarie, agrimonie, cuscute, vel decoctio radicum aperiendum.

12 Si lenta sit materia.

13 Quod obstructum.

14 Quod adhaeret.

15 Vbi illis remediis factum fuerit

corpulentior, excitata natura vi.

16 Atas, robur agri, magnitudo morbi symptoma

tum v. he-

mentia.

17 Per palyn

ironè & refluxum hæ-

monis eò: vnde venerat.

18 Nisi re-

hemētia præ-

sentium sym-

ptomatiū, & grauiorū me-

tus axillaris

venæ sectionem suadet.

19 Si caloris est suspitio.

20 Vel 21 aqua decoctio

# DE MORB. INTERNIS

℞. electarij diarhod. Abbat. triafantali, rosatæ nouellæ ana ℥. 2. detur ℥. 1. ex cochleari cum sex granis mali granati.

℞. succi granati acidi & dulcis ana ℥. 1. β. resideāt per noctem in salubri loco : postridie addatur oxymelitis ℥. 1. fiat potus.

℞. succi end. cocti & depurati ℥. 1. oxysacch. simplicis ℥. 4. liberabis obstructionem, calorem temperabis, viscus roborabis, putrida excludes.

Filicis radix & semen securidacæ plurimum probantur antiquis.

Ad hæc præscribenda erit diætā ἀκριβὲς καὶ σκεπδὰ, quæ æquè naturæ studeat, & pugnet cum morbo.

## EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

*Hepatis obstructio quæ fit.*

Obstructio fit in venis capillaribus hepatis per caua & gibba disseminatis à vena porta, vel caua, ob earum angustiam, flatus, vel crassi & lenti humoris copiam; vt pituitæ in frigidiore temperamēto. Biliosis etiam temperatutis praua victus ratione vtentibus sæpè crudus humor in ventriculo & primis venis colligitur, qui calore hepatis attractus obstructiones parit. Vnde aliquando lenta febris, morbus regius, inflammatio, atrophia, calor præter naturam, sine quo rarò fit obstructio in hepate, nisi sit scirrhus. Causæ sunt frequentissimæ, victus ratio ex crassis & viscidis, exercitium à cibo, crassiora alimenta prima mensa assumpta, succedentibus calidis, & tenuiū partiū. Nam ex his crudus humor intra venas rapitur, sicuti plerunque medicamentorum aperientium vsu, ventriculo crudis humoribus referto. Ex dolore, tumore, calore, victu antecedente deprehenditur. Dolor hepatis ab obstructione mediocris cum quodam pondere. Ab inflammatione magna, flatu, suppuratione, fortis. Qui fit à flatibus interclusis & crassioribus febre superueniente soluitur, quia tenuat, coquit, resoluit. Inflammationem febris necessario comitatur. Dum

*Hepatis obstructi causa.*

*Hepatis dolor à flatu febre superueniente soluitur.*

pus conficitur, dolor & febris. Certissimum signum obstructionis, tensio vel tumor in hypochondrio dextro. Adde pulsus frequentem, calidius corpus, colorem flauum, vel pallidum.

Remedia ferè eadem cum ictero & lienis obstructione. Optima victus ratio, detergentia, alimenta medicamento-  
sa, iuscula ex decocto aperientium, pilulæ, syrupi, oxymel, purgatio, opiatæ, vnguenta, pulueres, frictio levis dextri hypochondrij. In scirrho, & à crassis & frigidis humoribus, calfacientia, tenuantia, tergentia, mollientia, quæ illa temperent, sed moderata sint, excellant reliqua. Periculum enim, ne nimium tenuando & siccando aliquid insanabile relinquatur, & nimium mollientibus, fundentibusque materiam, substantia visceris relaxetur. Itaque moderatè mollientibus, præter cæteras partes obnoxias scirrho, in hac excellere debet attenuantium, calfacientiumque mixtio. Fetus ex oleis, mixtis pulueribus aromatum, aceto, &c. Emplastra de meliloto, cerata, ammoniacum, decoctum ficuum, passularum recentium, chamæpytheos, alimenta saccharo condita, & aceto diu insolato, quo passulæ, ficus caryoph, &c. maduerint, aliquoties commutata. Laxatur aliquando hepar articulorum modo solutum nimia humiditate: cuius signa ex arte medica petenda. Hic vinum plurimum conuenit, aromaticum rosatum, diambra, dianifon, digalanga & similia, quæ ventriculo profunt, nisi quoddam minus adstringendum in hepate. Adstringendum tamen hic magis, quam in aliis affectibus hepatis, mixtis calidis, si frigiditas coniuncta est: frigidis, si calida. Fetus ex oleis adstringentibus, emplastrum de meliloto, diachylon commune, ireatum, additis aromatibus & adstringentibus. In calida causa ceratum santalinum cum cydonio, ceratum Galeni refrigerans. Rhabarbarum aiunt hepatis vitam esse. Calidiore tamen & sicciore hepate, mors potius dici debet.

*Rheum hepatis calidioris inimicum.*

## ANTO. VALETTII EXERC. XXXVIII.

**O**Mnium viscerum maximè opportunum obstructionibus est iecur, propter tenuium venularum, quæ in eius substantiam sparguntur pluri- *Gal. cap 17. lib. de constitut. art.*

# DE MORB. INTERNIS

1 Symptoma  
tis illius, qui  
à nimia hu-  
moris abun-  
dantia nomen  
habet.

2 Materia  
& loco di-  
stincta.

3 Exudante  
in spatium  
epiploï, peri-  
tonæi, & in-  
testinorū, tū  
ab infirmi-  
tate faculta-  
tis expultri-  
cis, tum ab

hepatis cōtu-  
mace obstru-  
ctione, tum à  
laxitate ve-  
narum & re-  
num infirmi-  
tate, aut eo-  
rundem ob-  
structione,  
atque iuber-  
culo.

4 Tunc e-  
nim adest san-  
guificationis  
privatio.

5 Propriè di-  
cta: quamvis  
hoc nomine

mæ, rarios, cū à caua vena, tum à porta expor-  
rectos: per quos quidem omne traduci, exporta-  
ri quæ debet alimentum. Obstructionis causæ, hu-  
mor crassus, aut lentus, aut multus. Signa, color  
flauus, ob distributum sanguinem biliosiore,  
qui præ sui tenuitate exilit, crassiore in viscerè re-  
stitante, hypochondrij grauitas, dolor, & (si gibba  
obstruatur) tensio, durities percipitur, spirandi  
difficultas, à diaphragmatis compressione. Obstru-  
cta simâ diarrhæa, ob chylum non distributum,  
contingit. Huic affectui eadem curatio debetur,  
quæ ictero ab obstructione oborto, de quo antè  
dictum est.

De 1 Hydrōpe.

CAP. 39.

**H**YDRŌPIS 2 tria genera, Ascites ab vtē, quia  
venter aqueo 3 humore & 4 seroso ple-  
nus vtē repræsentat. Commotus his venter flu-  
ctuat, quo modo vesica ex dimidio plena. Conti-  
netur aqua inter epiploon & peritonæon, quan-  
quam & portio excurrit in spatium epiploï & in-  
testini, cū à liene, colo, tenuique intestino, vel  
iis partibus, vnde epiploon nascitur, malum ortum  
est. Alterum genus hydrōpis, aqua 5 inter cutem,  
quæ & 6 leucophlegmatia, & 7 anasarca. Huius  
materia iam crassior, est effusa in cutem atque car-  
nosum genus totius corporis. Hic si digitum impri-  
mas, vestigium fit cauum. Tertium genus tympa-

tria hydrōpis genera contineantur apud Celsum, qui nominis huius author est.

6 Quod albescat cutis à pituita suffusione. 7 Quod per genus carnosum pi-  
tuita suffundatur, sitque assimilationis privatio.

nites,

nites, 8 in quo plurimus flatus humori commixtus est, unde ventris distentio, qui percussus instar tympani sonitum reddit.

Causa hepar est omnino 9 refrigeratum, vel primario, vel per consensum cum ventriculo, liene, lateribus, tenui intestino, colo, 10 renibus, 11 utero, 12 pulmone.

Nascitur hæc affectio ex 13 immodica vacuatione, aut eadem longius 14 suppressa. Communis ferè 15 curatio medicamenti 16 hydragogis, quæ aquas vel pituitam ducant, 17 diureticis, topicis, & 18 externis remediis, quæ humorem siccent ac resoluant: quibus si nihil proficitur, 19 ferro & igne utendum est.

Leucophlegmatix peculiariter conuenit 20 phlebotomia, & ea quæ magis incidunt, ut tympaniti, quæ flatus discutiant. Phlebotomia igitur in solo hoc genere aquæ inter cutem locum habet. Nec hoc quidem perpetuò, sed si otio & antea cta vita, si suppressa aliqua solenni vacuatione id vitium ortum est. Morbi initio, priusquam 21 in cachexiam abeat morbus, integris viribus, hoc Hipp. Aesclepiadi, & Galeno visum est. Oporteret autem ne-

8 *A tympano*  
nomē ducens,  
& vocatur  
ab Hippocrate

te siccus hydrops, aphor.

II. li. 4. aph.

9 *Simplicium*  
temperie, pri-

maria secundaria, vel tu-

more scirrhotoso. 10 Labef-

facta a visceri-

bus aut etiā a vis-

ceribus obstru-

ctis. II Per sup-

pressionem men-

struorum, eorūq. palin-

dromen: aut per frequētes

histericas aff-

ectiones a venenata aura

ex seminis suppressione.

12 Per trans-

lationem ma-

teriam in pulmonibus concepta ad ventrem. 13 Per hemorrhoidas, menstr. dys-

enteriam. 14 Per scirrhi in hepate generationem, aut visceris ipsius intemperiem

frigidam. 15 Quæ a symptomatis correctione auspicanda est, quod ipsum symptoma sit calamitosius causa ipsa. Et propterea hydropicos statim secandos esse

monet Hipp. 16 Ut decocto radicum verbasci scemina, succi ireos, syrup. ros. pallid lax. grani ebuli, diacarthamo, non item antimonio, quod venefici empirici

& periculatoribus usitatissimum. 17 Ut syrupo de radicibus de raphano. 18 Ut sudorificis, materiam digerentibus ut emplastro de baccis lauri. 19 Para-

centesim locum habet, si tantum in nimia humoris abundantia consistat hydrops sine perenni generatione, cuius perennitas posita sit in hepatis vitio insanabilis.

20 Hippo-  
lib. 4 de dia-  
ta in morbo.  
acut.

21 Priusquā  
materiā facta  
sit naturā po-  
tens, & habi-  
tum corporis  
immutarit.

22 Ut par hy-  
dropici mor-  
bi ~~est~~ cause  
ratio habeat-  
tur. 23 Nam

ut sunt gra-  
dus coctionis  
ita quoque est  
purgationis.

24 Raz. ad  
Almā forem,  
capite de hy-  
drope.

25 Vel. ℥. hi-  
era picr. rhei  
electi agar.  
tro. an. ℥. i.  
macerentur in  
oxymelite, in  
quo prius in-  
fusa fuerit  
laureola, aut  
turpethum,  
& formentur  
pilulæ. /

que semel, neque copiosè detrahare, sed 22 modi-  
cè, atque interuallis. Ferè que placuit, ut è malleolis  
detraheretur sanguis.

Purgatio leuibus pharmacis & per 23 interualla  
datis, ut octauo quoq; die, vel duodecimo, ut vires  
tolerant. ℥. benedictæ ℥. β. dissolue in sero lactis.  
Pilulæ de rhab. maximè laudantur, quæ aliter à Rha-  
ze, aliter à Mesue describuntur. Præferendæ sunt  
Rhazæ, 24 quæ recipiunt rhab. succi agrimonix,  
sem. endiuix an. ℥. 3. agar. ℥. 5. foliorum laureolæ in-  
fusorum in aceto, & siccorū ℥. 10. Fiant pilulæ. De-  
dit Rhazes ℥. 2. β. sed ℥. 1. satis esse potest. Leuiore  
sient, si sine foliis laureolæ formentur è succo ireos,  
in quo mesereon, laureola, vel euphorbiū madue-  
rit. Similiter ex 25 pul. hieræ ℥. 1. agarici trochis. ℥. 1.  
cum oxymelite formentur pilulæ. Quod si in oxy-  
melite proxymè dicta maduerint, fortiores sient.

Aliquando uti licet puluere hieræ diacol. ad ℥. 4.  
aut 3. 2. Leue est hoc pharmacum.

℥. sem. carthami conquassati ℥. 2. aut 3. ireos flo-  
rentiæ ℥. 1. cinamomi ℥. β. infundantur per noctem  
in ℥. 4. feri caprini. Frequentissimus vsus est succi ra-  
dicis ireos per residentiam depurati, ut eius, quod  
supernatat, capiantur ℥. 2. ℥. β. aut 3. vj. cum equali  
mensura aquæ mellis, aquæ distillatæ, è terebinthi-  
na, feri lactis. Quod si ab hepate metus, ne phar-  
maco lædatur, admiscendum aliquid, ut ℥. 1. elect.  
triasantali, vel diarhod. Abbatis, spice, aut cinamo-  
mi. Et hoc quoque laudatum est.

℥. polypodij querni ℥. 2. sem. carthami ℥. β. se. ani-  
si & fœniculi an. ℥. 1. conquassata omnia in nodum  
linteolo constringantur, & vnà cum gallo decrepi-

to coquantur. Ius galli sorbeat. Aqua extillata e purpureis floribus ireos data  $\mathfrak{z} . 6 .$  vel  $\mathfrak{z} . 1 .$  quantitate cum  $\mathfrak{d} . 1 .$  electarij triasantali, & Gr . 8. cinamomi, efficacissimè aquam hydropicorum ducit.

Sic vinum scylliticum ex vini lb. 6. scyllæ purgatæ lb. 6. coctis ad tertiæ partis consumptionem. Dosis erit ieiunis ab  $\mathfrak{z} . 6 .$  ad  $\mathfrak{z} . 1 .$  Acetum quoque scylliticum ieiunis datum morbum expedit & terminat per vrinas, tumores omnes deponit. Conditur melle, vel passo. Similiter oxymel scylliticum. Laudantur aquæ alkekengi, medij corticis sambuci, eiusdem radicis, ebuli, aut ex eorundē floribus, simlacis hortensis, iuniperi, raphani, cuscutæ. Cæterum catharticas eiusmodi aquas electariis triasantali, diarrhod. Abbatis, schænuantho, spica, santalis, meliores reddes.

Cucumer agrestis in frequenti vsu fuit & Græcis & Arabibus, quo sic vtendum.

$\mathfrak{z} .$  corticis rad. cucumeris agrestis  $\mathfrak{d} . 1 .$  infriatum insperge mulsæ. Sine molestia pituitam ducit, nec stomachum lædit. Ex Aëtio & Actuário.

*Secretum 26 non reuelandum.*

$\mathfrak{z} .$  succi cucumeris asinini & radicis eius, succi laureolæ, succi ireos purpurei, succi absynthij & eupatorii ana  $\mathfrak{z} . 3 .$  resideant: quæ supernatat aqua, abiiciatur. Crassiori verò parti insperge rhabbarbari, agarici ana  $\mathfrak{z} . 6 .$  spicæ nardi, sem. endiuix, scariolæ, portulacæ, mastiches, lappæ, tragacanthi, salis gemmæ ana  $\mathfrak{z} . 1 .$  mellis col.  $\mathfrak{z} . 6 .$  In vase vitreo reposita agitentur in sole, vt fiat veluti conferua. Detur  $\mathfrak{z} . 1 .$  per intervalla.

26 Huiusmodi thor fuisse dicitur Gordianus, vt sentit Valerius de Tharāia.

27 Valerius legit  $\mathfrak{z} . 1 .$  Que lectio magis arctior est.



# DE MORB. INTERNIS

Vel. 24. scyllæ, turpeth. radic. esulæ, radic. tenerri-  
mor. tithymall. polypod. ireos, chamædryos, mer-  
curial. folior. vrtic. an. 3. i. Distemperentur triduo in  
aquæ partibus duabus, vini vna: tum coque ad ter-  
tias, & cola. Deinde colaturæ insperge zinziberis,  
piperis nigri, anis. petros. seminis fœniculi an. 3. i. ci-  
nam. galangæ, spicæ, xylobalsam. asari an. 3. i. leuiter  
bulliant, reponantur. Alternatim dabis patienti 3. i.  
aut plus, proût primæ do seos effectus suaserit. Opti-  
mum est vti sero lactis caprini, in quo maduerit ca-  
cumen absynthij, cuscutæ, Gr. x. alkekengi, fumaria,  
semina maiora, schœnuanthum, spica. Non habet  
par remedium Rhazes. Syrupus acetosus cum aqua  
cuscutæ, vbi & sitis extinguenda est.

28 Hæc Cel-  
sus. pluribus  
perstrinxit  
cap. 21. li. 3.

(V

Nec calfaciendum 28 hepar, vbi obstructio li-  
beranda, & vrinæ deduci debent. Grauius sitiūt hy-  
dropici, quibus tamen potio largior danda non est,  
quàm quæ vitam sustineat. Vinum album, tenue,  
subausterum, in quo diuretica prius admixta fue-  
rint.

29 Nulla e-  
nim radix hu-  
mectandi fa-  
cultate gly-  
cyrrhizæ  
superat.

Oxycrati vsus est, cùm calor vehemens accessit.  
Glycyrrhiza, 29 ἀδύσος appellata, quòd prohibeat  
siti hydropicos. Probatum aliis Metrodori Epicuri  
discipuli factum, qui hydropicus plurimùm qui-  
dem bibebat, sed statim reuomebat. In iis igitur,  
qui faciliè & sine molestia vomunt, probari potest.  
Nam & vomitus utilis est hydropicis. Clysteribus  
quoque acribus & glandulis materia minuenda est.  
Diuretica conueniunt, berula, lauer: vulgò iuncus  
odoratus, spica nardi, asarum, phu, meum, carpo-  
balsamum, cassia, radix dulcis, rosa, semen hype-  
rici, dauc, smyrnij, petroselinij, calamus aromati-

cus, fefeli, cancrorum fluuiatilium 30 siccatorum 30 *Ac præfer-  
tim lapillorū,  
qui in capiti-  
bus cancrorū  
reperiuntur.*  
puluis, cum æquali parte afari. Ita etiam erinacei  
siccati in sole 3.1. mel scylliticum, cantharides inte-  
græ, & aliis diureticis commixtæ, sed 31 minima  
quantitate, vt ad Gr. 5. Hæc autem vel in puluerem  
redacta vel concocta dantur ex vino, oxymelite,  
mulsa, aquis 32 conuenientibus, quales prius enu-  
meratæ sunt capite de oppilatione hepatis.

Hydropicis ex antecedente frigore, & obstru-  
ctione iecoris, vel lienis, id imperari potest reme-  
dium.

℥. schœnuanthi, cinam. afari. mastich. absinth.  
anif. fœnicul. ana 3.6. rhabarb, spicæ, aristolochiæ  
longæ, petros. ana 3.4. caryophyll. croc. calam.  
aromatici, cardamomi ana 3.2. mellis quod sufficit.  
Dosis 3.4. cum tepida.

Abominabilis urinæ potus, sed maximè proba-  
rus Medicis. Tolerabilior, si ex puero impube di-  
stilletur cum melle, & aliis diureticis.

Nec fatis est phlebotomo, catharticis, diureticis  
vomitu clysteribus & glandibus vacuare materiam  
sed loca tumentia sacculis, vnctionibus, frictioni-  
bus duris, balneis, emplastris, aliisque eiusmodi re-  
bus resoluenda sunt.

Sacculi fiant è macribus furfuribus, milio, pani-  
co, sale, sulphure, calidis, & ita appositis.

Materia balneorum & vaporationum in ther-  
mis siccis: aquę naturales salse, sulphurose, & eius-  
modi reliquę: quę si desint, arte comparantur, li-  
quefacto sale subquadruplo, eoque plus minusue, vel  
sulphure in aqua dulci. Possunt quoque incoqui a-  
nethum, ruta, chamæmelum, calamentum, maio-

# DE MORB. INTERNIS

33 *Vt folia  
lauri itē bac-  
cæ laur. iuni-  
peri, radices  
cucumeris, a-  
finini, bryo-  
niæ, ireos.*

rana, rosmarin. pulegium, fœniculus, satureia, hyssopus, schœnuanthum, stœchas, & 33 similia.

Sunt qui veluti arcanum probant lapidem serpentis. Coluber aquaticus à cauda funiculo constringatur, atque ita suspendatur, vt sit subiectum vas aqua plenum. Euomet coluber lapidem, qui totam illam aquam consumet. Lapis è vinculo alligetur, & apprimatur ventri hydropici, paulatim aquam consumet.

34 *Quinetiā  
in arena sepe  
liendus hy-  
dropicus. Vi-  
de Gal. lib. 9.  
Simplic. cap.  
de Pyrite.*

Sacculi quoque 34 ex arena & sabulo, vel cineribus calfactis sæpius apprimantur. Laudatur oleum 35 scylliticū, vel in quo decima pars euphorbij, mede ferei, vel laureolæ coxerit. Sit autem oleum anethinum, aut simile.

35 *Efficacissi-  
mū erit oleū  
anethinū, in  
quo maduerit  
cuminum.*

℥. terebinthinæ lb. i. thuris mastiches, myrrhæ ana ℥. β. ladani, nucis moschatae, caryophyllorum, galangæ, zedoariæ, cubebæ ana ℥. β. foliorum laureolæ P. i. succi ebuli, & cucumeris asinini an. ℥.

36 *Hæc vul-  
go dicitur  
balsamum.*

3. Redigantur in puluerem, quæ redigi possunt. Miscantur. Fiat distillatio 36 in alembico, qua inungantur loca tumentia.

Vel. ℥. florum, foliorum, cortic. radic. ebuli & fabinae ana M. i. radic. ireos ℥. i. scyllæ ℥. 2. coquantur omnia in lb. 3. olei laurini, aquæ vitæ lb. i. expressa colatura dissolue saponis vnc. iiij. fiat linimentum. Item.

℥. olei ℥. 10. ceruss. ceræ ana ℥. 7. vitriol. nitr. aloës, ana vnc. 3. aceti acerrimi q. suff. Terenda terantur in mortario cum aceto deinceps affuso ad mellis crassitudinem: seorsim cerusa cum oleo coquatur, quibus mistis cera addatur. Transferantur in mortarium, & cum speciebus manibus

pinfantur, vniantur. Hydropicis, splenicis, & apostematibus præstat mirificos sanitatis fructus, materiam discutiendo, reprimendo.

Cochleis tritis vti licet, & emplastri modo affixis. 37 Hoc emplastrum valdè sũ, & frequens in vñ.

℥. 37 thuris, mastichis, myrrhæ ana ℥. 1. granorũ lauri. ℥. 2. 38 costi ℥. 3. cyperĩ ℥. 1. stercoreis caprini triti ℥. 4. mellis colati quantum sufficit, ad congelandum emplastrum. 38 Vel, radices angelice tantundem.

Sinapismi 39 diaspiratum, prius descripta. Stercora animalium calida conueniunt. 40 Frictiones ex sale in hydrelæo dissoluto, vel ex medicamentis calidis subtiliter comminutis. 39 De his vide cop. de attrahẽtibus in materia chirurgica.

Perseuerante malo, phœnigmi ex radice scrophulariæ, ranunculorum, & similibus emplastri modo impositis ad decem horas præscribendi sunt. 40 Fiant quoque mælagmata ex rad. cucumeris asinini, bryoniæ, treos costũ sub cineribus, dem demista cum stercore caprino, taci lauri, & melle. Præter a ex canibartib. & ipsis. ñ fermento admotis fiunt vesiculæ.

Oportetque vesicas configi, vlcera aperta conservari, superposito folio brassicæ vncto è butyro, vel oleo, grano ciceris, aut ceræ momento. Permittetur aqua fluere ad sexaginta dies. Alioqui cauteria inducenda ventri in ambitu vmbilici, & quibus partibus tumor est. Scarificationes quoque conueniunt, sed si nihil proficitur his remediis, extremum est 41 paracentesis.

De paracentesi magna olim controuersia, aliis Medicis omnino reprobantibus: aliis approbantibus. Vtriusque sectę argumenta colligit Aurelianus 3. Cronicon capite de hydrope.

Illos enim deterrebat, quod ferè moriuntur omnes, qui puncti fuerint.

Hi verò remedium temperabant, neque in omnibus utebantur, atque ita seruabant aliquos. Gale-

## DE MORB. INTERNIS

nus Paulus Albucaſis, Meſuæus in aſcite pungūt ad latera vmbilici, qua parte illa vacua & inania ſunt, & propemodum excarnes muſculi. Alij quidem dextra parte, ſi lien: ſiniſtra, ſi hepar in vitio eſt.

Alij verò ex eadem parte, qua viſcus eſt, à quo malum primùm ortum eſt. Si verò inteſtina in cauſa ſunt, quatuor digitis ſub vmbilico, ſed paululum reducto phlebotomo in latus. Hippocrates intercuteos pueros incidit libro de locis in homine. Aurelianus conſenſu veterum in intercute magis, quàm aſcite, paracenteſim probauit. In aqua intercute Aſclepiades quatuor digitis ſupra talum tibiã compungit interiori parte ea, profunditate, qua vena inciditur. Qui locus compunctus ſi parum aquæ reddit, femora, ſcrotum, pudenda, ſi quidem intumuerint, loca etiam ſupra manum, articulos, incidenda ſunt ex Leonide & Hippocrate. Formulam verò punſtionis ex lib. 6. Pauli & aliis collige.

Tempeſtiua autem eſt punſtio, priuſquam in cachexiam morbus abierit, firmis viribus, corpore iuuenili, ſi atra bilis hydrōpem non contraxit, ſi validus ſtomachus, ſi æger non febrit, aut ſi febrit, remiſſionis tempore. Hæc omnia prouidenda ſunt priuſquam de paracēteſi decernas. Alioqui temeraria eſt via. Quæ etiam ſi adſunt præmonēdi tamen amici ægri quanto cum periculo remedium tentetur. Tentari que debet, vbi aliis remediis nihil profectum eſt.

### E IVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Υδρωψ tumor eſt, vel totius corporis ab humore, vel ventris tum ab humore, tum à flatu. In toto corpore & venis, ὡνασάρκα, ὑποσάρκιδος, σαρκίτης, λευκοφλεγματίας dicitur. In vē-

tre aqua collecta, non tamen penitus sine flatu, ἀσκήτης. In eodem, flatus plurimo intercluso cum pauca aqua, ὑμπαρίας vel ὑμπαρίτης, Hippocrati Hydrops siccus nominatur. In omnibus causa antecedens, calor est, vel frigus. Coniuncta verò, *Hydropis causa anteceden- dentes & communē.* semper est frigus. Refrigeratur enim hepar, sanguificatio deprauatur, siue proprio ipsius iecoris vitio, vt phlegmone, scirrho, hydaridibus, intemperie: siue per consensum, vt folliculi fellis, lienis, ventriculi refrigerati, mesenterij, intestinorum gracilium, ieiuni, pulmonis, renum, septi transuersi. Ex his enim omnibus malum communicatur hepati. Vt si splen ob scirrhum non purget sanguinem, renes obstructi, aut imbecilliores serum non trahant, aut emulgentes, menses suppressi sint, aut immodicè fluant, aut hemorrhoides, cor non diffletur. In immodica enim vacuatione, spiritu cum sanguine exhausto calor extinguitur: in suppressione, sanguis vel excrementa refuunt in hepar, vnde suffocatur. Aliquando contactu chyli frigidioris læditur, vt aquæ frigidæ potu à calore & exercitio. Sic intemperie hepati à pulmone, aut alia parte communicata, Phthisici & Hectici hydrope magna ex parte corripuntur, nisi ventris fluxu intendant. Eodem modo asthmatici, aqua in spatio thoracis collecta, & in ventrem tandem effusa. Comitatur febricula, assidua, lenta, cum pulsu paruo, sitis, humore circum viscera torpescēte, falsedinem & putredinem colligente, spirandi difficultas à cibo etiā pauco, ob plenitudinem, & venarum distentionē, tumor, grauitas, color vitiosus, cibi fastidium. Ex retentione vrinæ (si verus hydrops dici debeat) subito fit, & repente. Sæpe enim pus vel crassamentum vrinæ, quod meiebatur, retentum, speciē quandam hydropis adfert, quæ apertis viis, & prioribus vrinis crassis euntibus sanatur. In cæteris sensim generatur.

Anasarca fit ex humore aquoso partim à iecinore, partim à tota carne corporis, veluti in aquam resoluta, sæpius post morbos diuturnos & febres pituitosas. Symptomata, tumor non ex æquo in toto corpore, sed partibus inferioribus magis ob humoris grauitatem, & partium frigus, corpus laxum, pallidum, emortuo simile. Initio dignoscitur partium extremarum perpetuo frigore, facie intumescēte post maciem, palpebris & pedibus crassioribus & calidioribus. Si fluxus

*Anasarca  
qui fiat, &  
quæ sint eius  
symptomata.*

## DE MORB. INTERNIS

immoderatus præcesserit, aquæ frigidissimæ potio, pedes intumuerint non à vigiliis, impregnatione, nocturna statione.

*Hydrops à causa calida curatu difficilior cur sit.*

*Ascite generatio, causa, & symptomata.*

Si cauitas remaneat impresso altius digito. A causa calida difficilior curatio, quia calidis ducitur aqua, siccatur, flatus absunt. In ascite humor aquosus, vel potius serum inter peritonæum & intestina colligitur tanquam in vtre, vnde morbo nomen. Spiritus aliquid admiscetur. Causa, maius frigus, quam in Tympanite, succedit cachexiæ, morbis hepatis calidis, obstructionibus, morbis lumborum, renum, vesicæ. Symptomata, tumor ventris, reliqui corporis alimentum non sentientis consumptio, inualecente morbo tumor ad femora, pedes, scrotum, sensim quasi cuniculis factis, maximè post inambulationem humore defluente. Aliquândo thoracem occupat. Exudat serum è iecore, intestinis, omento, & similibus. Initio fieri intelligemus, si multum vrinæ generetur, & reddatur, paulò post in venis remaneat: sitiunt, corpus contabescit. Signum certissimum, si cum è latere in latus mouentur, percipiatur sonus aquæ defluentis. Vitio hepatis ortum cognoscimus ex dolore & distentione partis, & si nullus ex morbis superiùs enumeratis præcesserit.

*Ascite signum certissimum.*

*Tympanite cause.*

In tympanite abdomen distenditur flatu. Causa, minor caloris mutatio. Succedit cruditatibus, flatibus ventris non discussis, distentioni venarum, dolori circa vmbilicum, qui nullis medicamentis cesserit. Initio veluti inflatio. Hinc flatus spissiores effecti in nubem, tandem in aquam, vt pluuiam, concresecunt aucto frigore, vel aqua è venis in spatium ventris, veluti per diapedesim effluit. Cognoscitur, quia venter tympani modo sonat. Facies minùs recedit à naturali habitu, maior ventris distentio.

*Tympanite signum pessimum.*

Non admodum formidabilis est aqua intercus, quæ nullo antecedente morbo: deinde quæ longo: omnium periculosissima, quæ ex acuto nascitur. A scirrho confirmato, non curatur, vix à resiccato nimis hepate: ab hydaridibus maximè. Signum pessimum, vbi vacuata, vel sponte, vel arte, materia, malum redit. Causa enim pertinax. Ergo quod scribitur Aph. 14. libri sexti. Hydrope correpto, si aqua è venis in ventrem defluerit, morbum solui, non est perpetuū. Multis enim sponte vel arte commoto ventre, & aquosis multis inde expurgatis,

non superfuit salus, quo modo sectis mors contingit, siue aqua fuerit in ventre, siue in thorace. Hoc in thorace annotauit Hippocr. libr. de morbis, quod & experientia confirmat. Nam etiamsi expurgeretur aqua naturæ sponte, vel arte, si viscera vel corrupta, vel syderata, celerius moriuntur. Multos obseruauimus, qui ex alui profluuiio melius habuerunt, sed paulò post manente causa morbus rediens interitum attulit.

Aliquando etiam in nimia effusione humoris vnà spiritus effunditur, quod Hippocrates monet in iis, qui secantur & vruntur. Ob idque oportet integris viribus, & priusquam viscera corrumpantur, remediis vti primùm purgantibus, deinde aliis. Libro de Iud. In hydropo derento, si aqua ad ventrem, aut vesicam fluat, solutio. In leucophlegmatia alui profluuium vehemens, solutio. Sed in Prædictionibus robusta viscera esse vult, si quis liberetur. Ex quo loco videndum antequam curationem aggrediamur, an sit spes salutis, necne. Addit Oribasius tussim signum esse mortis in hydropicis. Et Aphorif. 35. libr. 6. Aqua intercute laborantibus tussis superueniens, malum. Sed hoc distinctione quoque eget. Si videlicet id fiat ab aucto morbo, & aquæ ratione, quæ iam pulmonum arterias asperas occupet, vnde tussis. Nam si aliunde, non ita mala. Ex observationibus nostris hæ non videntur prætereunda. Ioanni Blanché negotiatori Parisiensi in Angliam profecto Hyeme tumor cum miraculo quodam subleuit, euauitque morbus, nec rediit. An quod integro, aut non ita læso viscere aqua partim calore natiuo excitato, partim aëre marino resoluta fuerit? Cuidam per sudores sponte excitatos & quasi distillantem aquam, curatio. Alteri mors, cum multo alui profluuiio tumor subsedisset, redeunte morbo. Hospiti leonis argentei in vico D. Iacobi inuenta sunt syderata intestina, & omnino corrupta, quasi sugillata, humor plurimus cruentus, & loturæ carniū saturatæ sanguine similis. Cuidam ad viuum resectis vnguibus pedum, exercitio & frictionibus paulatim humor illuc defluxit, conualuit. Domino Charon Abbati Sancti Petri, cum antea de renibus non conquereretur, febricula, infirmitas virium, inclinante ad exitum morbo, venter utrinque inflatus, dolens, obtigit. Vrina quos

*Hippocrates  
aph. 27. li. 6.*

*Tussis hydro-  
pi superue-  
niens nō sem-  
per mala.*

*Ioannes Blā-  
ché mirabili-  
ter hydropo  
liberatus.*

*Hydropico-  
rum historie.*



## DE MORB. INTERNIS

ante mortem dies suppressitur. Dissecto cadauere ren sinister totus absumptus reperi- tus est, vomica plenus, quæ cruentam saniem reddidit. Dexter verò ren calculo vreterem obstruente obfessus.

Remedia sunt syrupi, opiata, clysteres, admota, pulueres, phœnigmi, vésicatoria, cauteria, punctio, scarificatio cutis ad aponeuroses musculorum, diætia, digerentia, epispastica, cata- plasmata, vnguenta, pilulæ, diuretica, apozemata, aquæ distil- lata ob tenuitatem vtiliores, decocta herbarum conuenien- tium, sanguinis missio, suppressis mensibus aut hæmorrhoidi- bus, victus ratio exsiccans, abstinentia à iusculis, potu, fructi- bus exceptis passulis. In leucophlegmatia, resolutis partibus in pituitam, purgantia, vomitus, errhina, masticatoria, & simi- lia. In ascite aquam ducentia. Illigandus lino venter, & ita quotidie metiri conueniet, vt intelligatur, quid medicamenta profecerint. Cochlearum vsus, theriaca, iris siluestris, solda- nella, vnguentum arthanitæ (illitum enim aquas per ventrem purgat, & digerit) emplastrum ceroneum auctum sulphure, succi ireos & ebuli crudi potius, quàm cocti, aquæ sulphura- tæ, oleum de sulphure, decoctum guaiaci cum aqua terebin- thinæ, rasura pergameni (quæ ratione aluminis & calcis in li- xiuio ex rebus discutientibus comparato coquitur, ventri affigitur ad modum cataplasmatidis, cui & alia permisceri pos- sunt) pilosella (quæ maximè obstructa aperit) aqua distilla- tionis limacum, testudinum, cum alia materia. Sed mirum in modum potus abstinentia, vt & in ventriculo humidior.

*Cor. Celsus* Celsus laudat potum medium, qui vitam sustineat, & vrinas moueat. *cap. 21. lib. 3.* Metrodorus Epicuri discipulus coactus siti, bibere solebat, deinde vomere. Notanda historia Celsi. Apud Anti- gonum regem ex duobus Medicis vnus quendam eo morbo mediocriter implicitum negauit posse sanari. Alter se sanatu- rum pollicitus est. Prior respondit se respicere ad animum, alterum verò ad morbum ægri. Neque res fefellit. Cùm enim posset optima victus ratione seruata curari, ob intemperan- tiam perit.

*Celsus ibid.*

[*Paracentesis*] Erasistratus apud Celsum reprobat sectio- nem hydropicorum, quia semel effusa aqua, & affecto hepa- te, postea regeneratur. Si tamen priusquam putreat materia,

& vires concidant, grauiusque affectum hepar, & partes aliæ fuerint, adhibeatur, oprimè nutrito priùs agro, & confirmato, nihil peccatur. Sed extremum remedium est, & non nisi urgente necessitate vsurpandum, & cum magna Medici prudentia. Hippocrates non solum paracentesim, seu sectionem, sed vstionem etiam probat, puto vel pulmone affecto, vt in suppuratis, vel vt paretur via scalpello, queniadmodum deinceps docebimus. In eo igitur libro, cuius initium est, ἡν ἡ τὸ πλῆθος ἀρτηρίῃ, suppuratos, qua parte pus se prodit, in dorso & pectore vrit aut secat, alioqui enutritos priùs lacte. In hydropicis verò venas in scroto crassissimas secat: paulò pòst in eodem scroto, femoribus, ac tibiis frequentia vlculcula scalpello incurrit. Deinde qua parte magis fluctuat aqua, aut tertiam costam ab vltima ad os, ex quo terebra caua *τρυνά-νω* *τριπλητρίω* perforat, donec exeat aliquid aquæ, ex quo linamentum indit è lino crudo, spongiámque mollem alligat, ne excidat linamentum. Quotidie semel aliquid expurgat ad dies duodecim. 13. die reliquum aquæ emittitur, via relinquatur, vt quod supernascitur, effluat, venter cibus reficcatur. Si femur & scrotum intumuerint, vulnusculis audacter configito. Sæpè hepate maximo, & priùs lacte nutrito agro, non metallo, sed alia materia, inurit octo inde crustis factis. Nonnulli id faciendum censent buxeis fufis feruenti oleo tinctis, Libro de locis in homine tenuissimis ferramentis circa vmbilicum vrit, ac tantum aquæ quotidie trahit, quantum vires ferant. Hoc semper obseruato, vrendum aut secandum priùs, quàm pituita corrumpatur, viscera grauiùs lædantur, & vires concidant. Deinde vacuationem paulatim, id est, 12. diebus, vt priùs, faciendam. Galenus paracentesim in hydrope laudat, vstionem in suppuratis, duplicémque affert rationem, cur periculosa sit vniuersa vacuatio in hydropicis. Extinctionem, scilicet, caloris natiui, simul cum humore effluente spiritu, & pondus visceris: quod cùm non ampliùs sustentatur ab aqua, septum, & reliqua thoracis viscera trahit deorsum. Plura sunt apud Albucasim, Aurelianum, Paulum lib. 6. cap. 44. Recentiores tutiùs progrediuntur. Viam parant cauterio potenciali, deinde actuali. Hinc scalpello perforant, & cannula caua commodiore, quàm linum crudum

*Paracentesis  
non nisi ur-  
gente necessi-  
tate summa  
vsurpanda.  
Hippoc. lib.  
de inter. part.  
affectibus.*

## DE MORB. INTERNIS

Hippocratis, sensim educunt aquam. Aculeato scalpello vtuntur, vt minor fiat perforatio, locumque eligunt, vbi aqua deorsum in imum ventrem tendit, relicto hepate & hypochondriis, in medio musculorum obliquorum epigastrij. Partem materiæ medicamentis purgant, topicis discutiunt, siccante victu absument, vires diligenter fouent. Minus metuunt à peritonæo perforato, quàm à membrana succingente costas. Diligenter cauent, ne pungantur intestina, ne facultas hepatis sit emortua, scirrhus, aut splenis tumore, aut vlcere pulmonis, aut infirmis viribus, aut ætate senili æger laboret. His demptis minùs esse periculi, cum natura sæpè viam aquæ molietur per vmbilicum, & quibus vulneratus est venter, nisi vulnus ad gracilia intestina penetret, omnes euadant. Longè tamen turior scarificatio cutis totius ventris ad aponeuroses musculorum, paruis scissuris, quibus per ventrem serum refudet.

*Quæ diligenter cauenda, vt legitime fiat paracentesis, & valet.*

### ANTO. VALETII EXERCIT. XXXIX.

*Hydropum generationis modus.*

**A**D frigidam iecinoris intemperiem hydropes consequuntur, labefactata scilicet hæmatosi, & toto corpore refrigerato. Vnde vel pituitosus & serosus humor inter peritonæum, epiploon & intestina, transiens per mæsaraicas venas, quæ ad eadem intestina terminantur, colligitur, tumore ab ingrauescente malo ad femora progrediente, simulque in ventre, velut in vtre, fluctuationibus excitaris, & hinc ascites: vel eadem ventris loca spiritu flatuoso replentur, & cum flatu, ait Aëtius, quasi nebulosus est humor, vnde tympanias: vel sit aquosi sanguinis plurimi in vniuerso corpore collectio, in qua corporis habitus spongiæ instar intumescit, & fit anasarca. Ascites & tympanias à minore sunt frigore, quàm anasarca. Hydropum causæ fusissimè

traduntur ab Hollerio ex comment. Gal. in aphor. 11. libr. 4. Aphor. comment. 4. de rat. vict. in acut. 2. Prognost. Signis vix opus est aliis, vt discernantur: sed maximè spectandum, vtrum hydropisis sit ab hepate per se, an ab aliis partibus per consensum. Quando per se, tussis levis, siccaque molesta est, hepate mole sua pulmonem in angustiam trahente. Deiectiones paucae & aridae sunt, quia rapitur aliò aquosus humor, & illae in intestinis residues torrentur, praecipuè verò si inflammatio accesserit. At cum aliae primùm laborant partes, suis propriis internoscuntur signis.

Curatio in humorum praeparatione, vacuatione, & affectarum partium confirmatione est posita. Humores parabit id apozema.

℥. quinque radic. aper. in vino albo macerat. ana ℥. i. rad. rub. tinctor. valerian. enulae campan. ireos, cort. rad. fraxin. & thamarisc. similiter macerat. ana ℥. ss. omnium capill. end. agrim. cusc. cichorij, absynth. Rom. an. M. i. semin. anis. melon. cucumeris, card. bened. ana ℥. 2. flor. cardiac. antho. & genist. ana p. i. f. decoct. ad ℔b. i. In colatura dissol. syrup. capill. ven. & de bizantiis ana ℥. 2. fiat apozem. clar. & conditum, vt decet, pro dosib. 3.

Aduerte autem si febris adfuerit, vt plerunque esse solet, aut si hydrops calidam hepatis intemperiem consequatur, admisceri oportere frigidas herbas hepaticas, itémque semina frigida maiora & minora, quae alia contemperent. Si purgans esse volueris, in huius decocti ℔b. i. colata infundantur fol. fennae mund. ℥. 2. agarici ℥. i. cinam. vel puluer. electar. triasantal. vel zinziberis ℥. i. In expressione dissoluentur succ. ireos ℥. 2. syru. laxatiui ros. pallid. ℥. 2. sacch. q. s. fiet syr. perfectè coctus: de quo cap.

# DE MORB. INTERNIS

æger ℥. 2. ex cochleari, vel cum aqua cuscutæ, aut absynthij, aut cum decocto cicer. rubro. semel in hebdomade. Vel purgans medicamentum per se post sumptas apozematis superioris doses sic præscribitur.

℥. rad. gram. petros. & scenic. passul. mund. glycyrrh. ras. ana. 3. 2. agr. end. capill. ven. ana. M. β. semin. scenic. end. melon. ana 3. 1. fol. fennæ mund. 3. 2. f. decoct. & colatura ad dosim. In qua infunde rhei elect. 3. 1. agar. troc. 3. 4. cinam. 3. β. In expressione dissol. syr. capill. ven. & ros. pallid. laxativi an. 3. β. f. potio. Pauperibus diacarthamum, diaphœnicum, folia fennæ imperantur: vel pilul. assaieret, elephang. de rhab. agar. succis hydragogis exceptæ, duobus, aut tribus elaterij granis additis, si frigidior & humidior cœli constitutio permittat.

Saluberrimus erit clysterū vsus, qui modò leues erūt, modò acriores ex discutientibus flatus paratis in quibus dissolu. diaphœnic. benedict. laxat. mel anthos. ol. aneth. Sæpe verò ac sensim dum purgatur, hepar roborari debet, ne factum debilius, aquas denuò generet. Itaque tale electarium præcipiatur, cuius tabella vna dimidia hora ante pastū sumatur.

℥. puluer. electar. triasantal. dupl. rheo. 3. 1. spec. diarth. Abb. & lætific. Gal. ana 3. 2. ras. corn. ceru. ebor. ana 3. 1. margarit. electar. 3. β. sem. acetos. plantag. ana 3. 2. cum sacchar. in aq. absynth. aut agrimo. dissolut. f. electar. per lozeng. pond. 3. 2. vel adiecta conferu. rosa. capill. ven. f. conditum, cap. vt suprâ.

Atque superiora hæc remedia omni cōueniunt hydrōpi: præter quæ & sua sunt cuique peculiaria.

*Sect. 4. libr.  
de vict. rat.  
in acut.*

Cum enim tympanites & ascites nunquam sectio-  
ne venæ profligentur, cā tamen anasarca incipiens,  
integris adhuc viribus, & hapate non vsque adeò  
perfrigerato, iuuatur, quòd naturam leuet humo-  
rum copia grauata, maximè si talis hydrops à  
suppressis

appressis mēsis, aut hæmorrhoidibus fiat. Quæ  
 distinctio maximè obseruanda. Nam alia si subsit  
 causa, vitanda phlebotome, siquidem sanguinem  
 mittat laudabiliorem: prauum verò, qui in primis  
 renis circa mesenterium & iecur congeritur, in cor-  
 pus tapiat vniuersum. Sic etiam in ascitæ remediis  
 substitui debent quātitate maiore, quæ flatus discu-  
 iunt. His autem artibus postquam toti prospectū  
 est corpori, topica, quæ robur hepatis & ventriculo  
 concilient, materiāque resoluant, quæ talia sunt fo-  
 nementa & litus, vsurpantur.

℥. agrim. maioran. menth. sic. stæch. absynt. ana M. i.  
 radic. cyper. calam. arom. ana ʒ. 2. flor. chamæm. melilot. ros.  
 cub. ana p. i. f. decoct. in aq. & vin. rub. pro fotu hepatis cum  
 pong. Post fotum siccata pars illinenda. ℥. olei cappar. &  
 absynth. ana ʒ. i. pulu. calam. arom. & absynt. ana ʒ. i. cum cera  
 linimentum.

In tympanite vttiliora sunt cataplasmata ex fari-  
 nis diaphoreticis, orobi, lupinor. fœnugr. lolij, &  
 calid. herbis ac seminib. in vino, aut vrina pueri de-  
 coctis, adiecta portione emplastri de baccis lauri,  
 vel vngu. Agrippæ, vel Martiati. Huc faciet empla-  
 strum de bacc. laur. & de meliloto cum succo rutæ,  
 aut simili, & pauca aqua vitæ emollitū: vel emplast.  
 è stercore vaccino, caprino, aut colubino, sulphure,  
 baccis lauri, farin. lupinorum, axungia gallinæ &  
 oleo rutaceo additis.

Vel. ℥. origan. calamenth. rut. agrim. scœnuanth. ana M. 2.  
 baccar. laur. iuniper. femin. caru. anis. fœnic. ana ʒ. ʒ. flor.  
 chamæm. aneth & anth. ana p. 2. Impleantur sacculi duo: qui  
 bulliant in aq. & vino albo pro fotu. Hunc sequitur litus. ℥.  
 olei rut. & irini ana ʒ. i. pulu. radic. ir. ʒ. 2. cum pauco em-  
 plastro de melilot. f. linim.

Ad ascitem sacculi comparantur milio, semine

## DE MORB. INTERNIS

apij, cumin. carn. bacc. laur. contus. florib. chamæm. melil. torrefactis antè singulis in sartagine, & vino albo irrigati. In anasarca stuphæ siccæ meatus aperiendo, sudores proliciendo, discutiendo, magnum afferunt adiuumentum.

Vel humidus vapor decocti conuenientis toto corpore excipitur. Vt.

℞. radic. fœnic. ebuli, ireos, acor. enul camp. ana ℥. i. cortic. inter. vlmi. & cappar. ana ℥. ℞. hyss. rut. salu. agrim. rosm. calamenth. organ. absynth. ana M. i. semin. petros. rut. cyper. baccar. laur. & iuniper. ana ℥. ℞. flor. chamæm. aneth. anthos, & melil. ana p. i. f. decoct. in aqua & vin. alb. cum paulo aceto in fine addito. Lapides igniti in id decocti iniiciantur. Vapor toto corpore, vt dictum est, benè confecto recipiatur.

His præsidiiis si non cesserit hydrops, hydragoga medicamēta repetentur, itémq; topica supradicta. Sitis, quæ in hoc affectu premit maximè, tolerata, nonnullis remedio est. Id nobili constat historia. Rusticus, quem aqua inter cutem malè habebat, Antonij Beniuenij Medici clarissimi opem expostulat. Hic morbū iam inueteratū perspicies, subridens respōdit opus esse, vt non vltra biberet, quàm vt vitam sustineret. Discessit æger, & anno peracto medicum inuisit, & interrogat, an ipsum nosceret. Negauit hominem nosse. At ille, tua ope curatus, inquit, ad te reuertor, scire cupiens an adhuc mihi liceat aliquid bibere, cū haftenus per annum nihil biberim. Admiratus Medicus interrogat, cuius id consilio fecerit. Cui ille, tuo, inquit, & rem omnē ab initio narrat. Iussit tum paulatim vino assuescere, austero, ac tenuissimo. Discessit: & curiosa portione vsus pristinæ sanitati est restitutus.

Curatio lienis. CAP. 40.

**S**plenicos 1 appellant, quibus induruit 2 lien, <sup>1 Qui ex splene laborat, lib. 6. de locu male affecti et 9. κατὰ τόπος.</sup> 3 grauitas sinistra parte sentitur. Difficultas est 4 anhelitus, 5 sitis, oris siccitas, 6 pedum inflatio, 7 color plumbeus, decubitus in 8 sinistrum latus grauis, extat durities 9 oblonga, dolor ad 10 iugulum sinistrum tendit, pediculi scatent; nocte 11 sudor grauis, foetet 12 anima, pudenda 13 turgent, erumpit 14 sanguis, gingivæ 15 corrumpuntur, venæ ad lienem nigricant, & iqualescit cutis, vlcera maligna in tibiis nascuntur. Quorum aliqua vel omnia lienosos produnt. Lege quæ annotauimus in aphor. 43. lib. 6. & Celsum cap. 7. lib. 2.

Curatio.

Initio molliendus 16 venter cassia vel catholico. Quod si inferiori parte visceris scirrhus est, clysteribus vtendum erit. Post hæc phlebotomia conuenit è basilica sinistra, in duos dies diuisa vacuatione, amplo foramine. Quod si vires suspectæ sunt, venæ quæ ad medium digitum, vel minimum venit, incidenda est. Alij venam post aures 17 diuidunt, & <sup>2 A tumore contra naturam præsertim scirrhus.</sup> <sup>3 Dolor grauis, ex materiei copia & partis obuso sensu.</sup> <sup>4 Per oppressionem diaphragmatis; cui subiacet lien.</sup> <sup>5 Ex corrupti humoris in aluum effluxu, & omnis humoris exhausto.</sup>

6 Cum hydrops est in propinquo, & lien est κατὰ πόπον. 6 Color enim similis efflorescit humori, cuius dominatu corpus tenetur. Vnde sæpè icterus niger, elephantiasis. 8 Et in dextrâ molestior, ob μετὰ πρισμὸν & suspensionem. 9 Quæ præ se fert idæa partu obfessa, Sed tamen existit ἀνὰ πόπον καὶ κατὰ πόπον lien, atque tum rotundus est tumor. 10 Ad clauiculam, diaphragmatis sympatēia, qua tunica costarum succingenti communicatur. 11 Ex prauorum succorum pleonexia: vnde purgationis necessaria significatio fit. 12 Humor in aluo corruptione. 13 Ex flatulento spiritu. 14 Criticus, aut symptomaticus 15 Ex translatione materie, siue acerbi vaporis, per continuitatem interioris tunice, qua palato & stomacho communis est. 16 Expurganda prima regio corporis, vt splenica medicamenta ad lienem aditum habeant. Vt. ℞. cass. recēs extrac. 3. 6. cum saccharo singatur bolus. Deinde. ℞. fol. fenæ mund. 3. 3. vel 3. ℞. macerentur in decocto pru. damas. Et statim dilutum superbibatur. 17 Et quidem sine ratione, nec sine periculo.



## DE MORB. INTERNIS

sanguine, qui effluit, lienem inungunt. Veteres enim naturali quadam ratione atque beneficio constare crediderunt, superfusum sanguinem languēti membro præstare medicinam. Quòd & Veterinarij retinent. Constat quoque certo experimento venas apertas, quæ ad lienem nigricant, vehementer profuisse, ut inde inueteratum malum & cõtumax omnino curatum sit. Iisdem venis sanguisugæ & cucurbitulæ cū scarificatione affigi possunt. Sed hæc loca- lia remedia lienī, vacuato iam corpore conueniunt.

Purgandum quoque corpus est, idque interuallis, pharmaco quidem per os sumpto, si magnus tumor est, aut superiori visceris parte collocatus. Diuretica non ita prosunt, quia à liene ad renes non ita cõparata via est. Cæterum iuuare possunt alia ratione, quia videlicet incidunt, & aperiunt.

Potiones & melicrata ex cortice radicis 19 caparis, scolopendria, capillaribus, rosmarino, radice thamarisci, semine agni casti, endiuia, scariolæ, portulacæ, seminibus illis maioribus & minoribus, cortice & radice salicis, fraxini, genistæ, & aliis, quæ capite de oppilatione hepatis scripta sunt.

Purgationes ex epithymo, foliis fennæ, puluere hieræ 20 diacolocynthidos, & aliis, quæ cap. de melancholia descripta sunt. Ex sero caprino, aqua fabrorum, aut ea, in qua chalybem candentem sæpius extinxeris.

Laudatur aqua depurata, quæ è cotibus defluit, cum acuuntur enses. Lixiuu, oxymel, acetu scylliticum, syrupus acetosus, syrupus capill. ven. de pomis, aquæ, & cætera, quæ partim capite de oppilatione hepatis, partim cap. de hydrōpe dicta sunt.

18 Tamē se-  
cundo iudicio  
lien per vri-  
nas interdum  
vacuatur.

Hipp. lib. de  
internis affe-  
ctionibus.

19 Nā qua-  
le est hepatis  
absyuthium,  
talis est lienī  
cortex cappa-  
ri: & quale  
est hepatis eu-  
patoriū, tale

& lienī sco-  
lopendriū. Sic  
itaq; fiat me-  
licratum. 2f.

cort. rad. cap-  
par. 3. 6. po-  
lypod. querni  
tātundem: f.  
decoct. suffi-  
ciens: in cola-  
tura dissolue

mellis 3. 3. f.  
hydrom. Vt a-  
tur horis dua-  
bus ante pa-  
stum.

20 Præfer-  
oim ex descri-  
ptiōe Paschis  
apud Scribo.  
Largum.

Capparum 21 vsus ex oleo & aceto plurimum laudatur. Laudatur vas è ligno fraxini, quo vtantur, dum bibunt. Corallus quoque tritus ex syrupo aceroso. Optimum interim erit his vti trochiscis.  $\mathcal{L}$ . puluer. tamarisci, radic. cappar. ceterach, ana  $\mathfrak{z}$ . i. limaturæ chalybis  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . spicæ. cinamom. ana  $\mathfrak{z}$ . i. facchari borraginati vnc. i. cum oxymelite fiant trochisci.

21 Capparum vsus, sine defectu minimè est admittendus. Dum enim ex aceto sumuntur, oxymeliam pariunt. Adde quod humor melancholicus ab aceto fermentetur Hippoc. lib. 3. de vict. rat. in morb. ac. Sed tales ex vsu esse poterunt capparum  $\mathcal{L}$ . 3. passul. Corynthiac.  $\mathfrak{t}$ . i. reponantur in  $\mathfrak{t}$ . i. sacchar. fusi cū  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . cinamomi in vase, & affundatur aliquid aceti. Hæ

Ad vehementem etiam lienis dolorem, inflammationem, duritiem, puncturam, mirabilis est puluis diacapparum à veteribus si concinnatus.  $\mathcal{L}$ . cortic. radic. cappar. exag. 27. (est autem exagium Actuario sextula, sexta vncie pars) semin. aceto sæ exag. 18. cortic. radic. tamarisci exag. 9. trita in puluerè dentur cum aqua, vel oxymelite, exagij vnus ponder. Decumbat in sinistrum latus æger, & tres horas ieiunet. Sumendi tempus hora noctis media, vel cum sitis vrget.

Durities verò, quòd attinet ad topica, mollientibus, incidentibus, resoluentibus curanda est. Adstringentia quoque commiscenda, vt inde roboretur 22 viscus, plus minúsve, pro rationè fluxionis & infirmitatis visceris. Molles hoc vnguento, incides, ac resolves.

$\mathcal{L}$ . 23 olei de capparibus  $\mathfrak{z}$ . 6. medullæ vituli, pinguedinis anatis, ammoniaci in aceto dissoluti ana

ventriculo non oberunt. 22 Communi enim officio fungitur.

23 Vel.  $\mathcal{L}$ . medulla ceruī, aut crurū vituli, butyri recentis, olei de cappar. ana  $\mathfrak{t}$ . i. ammon. in aceto dissol.  $\mathfrak{z}$ . 2. aqua rosar.  $\mathfrak{t}$ .  $\beta$ . coquantur ad consumptionem prædictæ aqua in balneo maria, quo linatur lienis regio, leniter fricanda manu.

# DE MORB. INTERNIS

3.2. aceti 3.1. ceræ quantum sufficit, fiat emplastrum molle ad formam linguæ bubulæ.

Remollit butyrū, adipex ex cap. 7. lib. 5. de Simpl. & libro 5. de compositione pharmac. secundum genera.

Radix lilij, maluæ, bismaluæ, branca vrsinæ siue achanti. Scylla quoque & radices in oleo & vino austero coquantur, ad consumptionem vini. Deinde ad formam emplastri imponuntur.

Contra tumores & obstructions lienis præstâtissimum istud est vnguentum. ℞. mucagin. seminis althææ extractæ in vino albo tenui 3. 6. olei de capparib. 3. 1. adipis anatis 3. 3. puluer. ceterach. 3. 2. f. vnguētum. Aliud. ℞. olei rutacei, ol. de capparib. 3. 6. puluer. radic. cappar. 3. 1. ceræ & aceti scyllitici parum, fiat vnguentum. Vel. ℞. olibani, ammoniac. ana 3. 1. dissoluantur cum aceto ad crassitudinem; deinde cum succo brassicæ diu pinfantur, & apponantur ad duritiem splenis.

Ficus pingues similiter præparatæ, ammoniacum in aceto dissolutum, & ex oleo rosaceo, oleo in quo scolopendrium coxerit, oleo amygd. dulcium, de liliis, de cucumere asinino, de hyperico, de ben, de capparibus. Conuenit & emplastrum de meliloto, dialthæas, cerotum æsypi, diachylon sine gummi, cum mucaginibus radicis althææ, lini, scænogræci. Vbi iam remollita durities est, lapis molaris, pyrites, aut 24 lapis alioqui durissimus aceto acerrimo candens extinguitur: linteis inuoluitur, & sæpe apponitur. Alioqui fumus excipitur. Sed his vtendū est solūm, cum iam aliqua ex

24. Aut etiam  
lateres candentes aceto  
extincti par-  
te admouen-  
tur ad discu-  
piendum.

parte remollitus tumor est. A quorum usu ad remollientia redeundum est, oportetque per intervalla alternatim uti his remediis. Postea verò fortioribus utendum erit, ac primum quidem ammoniaco opopanax miscendus est. ℞. ammoniaci ℥. i. β. opopanax ℥. i. Dissoluantur gummi in aceto: deinde malaxentur cum oleo de cucumere asinino. Iam quoque miscebitur emplastrum Agrippæ: & ut minuetur tumor, veniemus ad emplastrum de fermento, ad dropaces, ad sinapismos, ad cauteria tum potentialia (ut vocant) tum actualia.

At si humorum inhibitioni sit eadem opera incumbendum, emplastrum eiusmodi convenientissimum erit.

℞. resinæ frixæ ℥. 12. ceræ, ammoniaci ana ℥. 6. auripigmenti, aluminis scissil. olei veter. ana ℥. i. faceti acrioris q. sufficit ammoniaco soluendo. Sacculis quoque uti oportebit resiccantibus ac resolventibus, nunquam tamen neglecto remollientium usu. Sacculi.

℞. milij parum conquassati P. 2. salis P. β. torrefiant in tegula calida. Fiant duo sacculi longitudine dimidij palmi, interpuncti in linteo trito & raro, & perfumigati cum aceto acerrimo, in quo lapis durissimus & igne candens extinctus sit.

Contra rugitus & fluctuantem 26 aquam è regione lienis probatum est hoc veterum remedium.

℞. piperis, cumini, rut. ana exag. 10. nitr. exag. 9. melle optimo excipe. Dentur manè & vesperti exag. 2. Vel.

℞. nigellæ Romanæ, seminis anis. apij, petroselin. cumini ana exag. 2. misceatur libr. i. farinæ,

Z. iij

26 Frequēs  
clysterum ex  
decocto capi-  
tis veruecini  
usus mirifice  
cōfert ad ru-  
gitus & flu-  
ctuantem a-  
quā è lienis  
regione.

# DE MORB. INTERNIS

pistoria arte, fiat panis. Possunt & species è vino dari. Melior panis, si ex aqua decoctionis fraxini pinsatur.

Frequens hoc malum est ortum à frigore, quod post plenilunia frigidiori cœlo post vsum aquæ & frigidorum magis apparet. In quo purgandum corpus est per intervalla ex hiera aliquando simplici, aliquando diacolocynth. Vel.

℞. aloës succotrinæ ʒ. 3. rhab. electi, agar. tro. ana ʒ. ʒ. ceterach, scolopendrij, sem. agni casti, & endiuixana ʒ. ʒ. cinamomi, asari, spicæ: rasuræ cornu cerui, rasuræ eboris, coralli ana Gra. 8. cum aceto scyllitico formentur pilulæ. Utatur drach. 1. singulis hebdomadibus. Exsiccanda quoque aqua sacculis.

℞. cumini. P. 2. sem. agni casti, sem. rutæ ana ʒ. 1. crassiusculè cōquassata, & in tegula siccata, duobus sacculis (vt priùs) includantur, & calidi sacculi alternatim apponantur.

Vaporatio quoque conuenit ex durissimo lapide candente extincto in aceto, in quo ebulus, folia salicis & scolopendrium coxerint.

Vnctiones, quæ in ascite. Radix acori in acri aceto cocta, tum addita octaua parte sem. nasturtij, emplastri modo imponitur.

Lepidium quoque per se tritum, & calido aceto mersum. Videndum tamen ne refrigescant.

Conueniunt spleni à proprietate splen asini domestici, & sylvestris, pulli equini, vespertilionis decolati corpus. Crementur hæc in vase testaceo: ʒ. 1. pulueris, vel eo plus, ex oxymelite imperatur.

*σπληνώδεις* Hippo. dicuntur, quibus diu obduruit lien. Sed & multi alij sunt lienis tumores, quorum sua signa sunt. De externis & internis lienosi describuntur, si vitiosi malè colorantur, halitus foetet, alijs adstringitur, tumet lien, semper æqualiter emanciantur, vlcera mala contrahunt. Pituitosi minùs hæc patiuntur. Tumor modò decrefcit. Obdurescit autem ab humore melancholico, vel phlegmone, nec concocta, nec digesta. Sequiturque sæpè humoris melancholici per intestina profusio. Lienem enim *κατάρροπον* vocat Hippoc. 6. Epidim. quia vel tumore durus deorsum vergit: vel eò sua excrementa abiicit. Purgatur enim per intestina & hæmorrhoidas, à quibus etiàm lienem durum sanari scripsit in eundem librum Galen. comm. 5. Vnde Medicus naturalem curationem sequutus, viam & rationem purgandi lienis instituire debet. Neque tamen negamus industria naturæ aliquando humorem melancholicum per renes & vesicam expurgari, & *περὶ παθῶν* id docetur. Sed capite de doloribus capitis annotauimus nullam esse viam communem, ex Galenò in Methodo medendi, & anatomia, nisi multiplici anfractu in venam cauam regurgitans humor eò perueniat. Hic affectus longus est & periculosus, præsertim superueniente intestinorum difficultate, tum quia intestina læduntur humoris transitu, & vires labefactantur: tum quia hepar simul cum omni venoso genere compatitur, vnde vel refrigerato calore natiuo sequitur hydrops, vel interitus. Nam quod Hippoc. 48. Aphor. lib. 6. scribit, Lienosis superuenire dysenteriam, bonum, intelligendum ratione vacuationis, quæ modum non excedit. In rugitu splenis aliquando impletur colum flatu: aliquando vas, quod à medio ascendit. Sed distinguitur, quia in splene dolor grauis, in vna parte fixus, & sinistra. In colo vero acutus, mobilis, & vagus.

*Lienis mori-  
bus cur per-  
iculosus.*

Eadem, quæ in hepate, remedia, sed valentiora conueniunt, incidentia, flatus discutientia, mollientia, aperientia, thamariscus, ebuli radix vel ireos, puluis scolopendriæ ceterach, brionia, cortex hederæ, radix capparis, diacapparon, olibanum, ammoniacum, oxymel de radicibus, torchisci de eupatorio, cerata, oleum laurinum, emplastra de meliloto dia-

*Lieni valen-  
tiora quàm  
hepatis reme-  
dia.*

## DE MORB. INTERNIS

chylon, lien bubulus, onagri, vespertilio siccatuſ, capite detracto, limatura chalybis, & ſimilia. Democrituſ thamaſiſci carboneſ ignitoſ in vino extinguebat. Ægri cum ſumunt medicamenta, in latuſ ſiniſtruſ decumbant.

### ANTO. VALETII EXERCIT. XL.

**I**ſdem fermè vitiis tentatur lien, quibuſ hepar, ſed ſæpiùſ obſtructione & ſcirrhu, propter alimentu, quod attrahit, ſpeciem. Craſſior enim ſanguis in illiuſ viſceriſ nutricaoem faceſſit. At talis quidè ſuccuſ nunc melancholicuſ, nunc pituituſuſ in liene imbecillo coaceruatur, neque commodè repurgatur: aut etiam miniſtratur ab hepate, propter eiſ naturæ alimentorum uſuſ, vel ob ſoleniſ cuiuſdam vacuationiſ, ut menſiuſ, hæmorroiduſ, ſuppreſſionem. Tumore ſiniſtri hypochondrij cum duritie coniuncto, graui dolore, difficultate ſpirandi, colore corporiſ ſubnigro & plumbeo ſatiſ hic affectuſ manifeſtuſ euadit. Hûc reuocantur remedia obſtructioni hepatiſ adhibita, ſed quæ ſint vehementiora. Imprimiſ igitur vacuata prima corporiſ regione mittitur ſanguis ex interna cubiti ſiniſtri: cuiuſ detrahendi quantitatem & vires, & ipſiuſ ſanguiniſ color indicabunt. Mox materia craſſa & viſcida parabitur hiſ zulaſiſ.

*℞.* ſyrup. capill. ven. oxymeliſ ſimpl. & ſyrup. de fumarina ana ꝑ. 1. aqua. gram. lupul. & borrag. ana ꝑ. 2. vel ꝑ. 3. f. zulaſ. pro doſib. 3. Sumat biſ in die duab. hor. antepaſtuſ. Vel. *℞.* ſyrup. de ſcolopendr. de bizantiſ & de epithymo ana ꝑ. 1. cum aquis prædictiſ vel cum decocto ſplenico f. zulaſ. quod condiatur pauc. cina. ſantal. citr. vel puluer. elect. triaſantalini.

Sed uſitatiora ſunt apozemata, cum ſimplicia ſuppetunt accommodata. Ut.

*Gal. libr. 13.  
Methodi, &  
li. 2. ad Glau.*

℥. cortic. radic. cappar. thamarisc. oxylapath. ana ℥. i. cichorij totius, fol. scolopend. cetherach. adianth. polytr. fumar. borrag. & bugloss. ana M. j. summit. lupul. thym. epith. cuscut. ana P. i. glycyrrhizæ rasæ ℥. 2. passul. mund. ℥. i. quat. sem. frigid. maior. an. ℥. i. sem. cuscut. anis. fœnic. fumar. ana ℥. i. fl. flor. genist. recent. & trium flor. cardiac. ana P. i. f. decoct. ad quart. ℥. 4. prædict. decoct. quart. 3. In colatura dissol. oxymel. simpl. vel scyllitic. ℥. 3. f. apozem. clar. & condit. f. art. cap. vt antè, bis in die.

In reliquo decocto infunduntur fol. sen. mund. ℥. 3. agar. troch. ℥. x. & addita sacchari quantitate sufficiente fit syrup. perfe. coct. cuius ℥. 2. β. cū decoct. passul. glycyrr. & anisi dissolutæ in hebdomade sumantur. Quæ si parū mouerint, iteratæ eiusdē syrupi dosi addetur aliquid electar. diacarth. cōfectionis hamech, aut diaphœnici. Vel in dosi conuenientis decocti, quale est apozematis superioris, infunde foliculor. sennæ mundator. ℥. 2. agar. troch. ℥. 4. cinam. ℥. 2. In expressione dissol. syr. de lupul. & cathol. ana ℥. β. f. potio. Et quoniā purgationes hīc sæpè ac sæpè repetuntur, & verendum est, nē natura vni aut alteri assuescat remedio, sequēs institui poterit pil. massa.

℥. massæ interioris pil. sine quibus pil. de fumo terræ ana ℥. i. β. rhei elect. ℥. 4. aloës hepatic. agar. recens troch. ana ℥. i. sal. gemm. zinziberis, cinamom. ana ℥. i. cum syr. de cichor. simpl. fingatur massa. Postea duplici aluta contegatur: reponatur in pyxide terrea. Sumat mensibus singulis circa plenilunium, maximè tempore humido & pluuiō, pilulas 5. pro drach. cum vino albo emollitas, manè hora quart. & si possit, illis superdormiat.

Topica erunt fomenta, linimenta, emplastra.

℥. flor. chamæm. melil. summit. aneth. prass. scolopend. absynth. parietar. hyssop. thym. bismal. totius violariæ, mercurialis, fumar. an. M. i. sem. lini, fœnugr. alth. ana ℥. i. f. decoct. in aqua & vino albo pro fotu lienis cum spongia vel filtro bis in die longè à cibo.



## DE MORB. INTERNIS

Deinde linimentum sit huiusmodi.

℞. olei cappar. ℥. 2. gummi ammoniac. in aceto scyllitico dissoluti ℥. 3. cassiæ odoratæ ʒ. 3. cum modica cera. f. litus pro liene manè & vesperi.

Honorato Castellano Regio Medico, quem miræ ac penè inimitabili dexteritate Medicinam facientem nobis inuiderunt fata, & morte præmatura sustulerunt, familiaris erat litus ex struthiocameli adipe, quo nullum efficacius remedium expersum se mihi de liene conquerenti amicè dixit.

Si inueterarit affectus, atque inceperit scirrhus, quod ex renitentia partis, duritie, pedum inflatione, & aliis eius generis signis dignoscet, huic tempestiuè occurrendum, metu cachexiæ, hydropis, scirrhi. Itaque incidentia magis, tenuantia, emollientia atque discutientia particularia aptari debent.

℞. radic. cucumer. agrest. alth. & lilior. ana ℥. 1. cortic. rad. cappar. & thamarif. ana ℥. ʒ. ʒ. mal. bism. ruth. scolop. ceth. absynth. ana M. 1. sem. fœnic. lini & fœnuigr. ana. ℥. ʒ. ʒ. flor. cham. melil. & genist. ana P. ʒ. f. decoct. in vino albo & aqua cum aceto pro fotu lienis cum spong.

Post fotum hoc cataplasma imponetur.

℞. far. sem. lini & fœnuigræci ana ℥. 1. farin. lupinor. ʒ. ʒ. puluer. radic. ireos & thamarif. ana ʒ. 2. adip. vitulini, & axung. cunicul. ana ℥. 1. olei cappar. q. s. cum magmate superioris decocti f. cataplasma.

Quibus cataplasma displicebit, imperabitur linimentum ex mucag. sem. fœnuigr. in aq. scolop. extr. olei cappa. & liliac. an. ℥. 1. ammoniac. in aceto forti & aqu. vitæ dissoluti ℥. ʒ. ʒ. puluer. radic. bryon. & ireos ana ʒ. 2. cum pauc. cera. Vel emplastr. aut ceratum ex eiusdem ammoniaci emolliti in vino albo ℥. ʒ. styrac. cal. ʒ. 2. puluer. rad. ireos Flor. cyper.

& aristoloch. rotund. ana ʒ. ʒ. axung. anser. & ol. amygdal. dulc. quantitate suffic. compingetur: & super alutam in formam linguæ bubulæ extendetur. Sed & quoniam huius visceris robur semper conseruandum, talis concinnabitur opiata.

℥. conseru. ros. ʒ. 2. conseru. anth. capill. ven. & bugloss. ana ʒ. 1. electarij lætificant. Gal. confectionis alker. aromat. ros. ana ʒ. 2. Mythridatij veteris ʒ. 4. cum syrupo de scolopendria, f. opiata: de qua capiat magnitudinem fabæ hora somni, & in exitu lecti.

His ita administratis si perseveret affectus, crebri iniicietur clystêres, maximè si interna parte lien magis intumeat. Fortioribus quoque purgationibus id visceris laceßemus, quòd (ait Gal. libr. 13. Method.) hac duntaxat via lienis superflua vacuentur. Quod controuersia non caret. Nam & annotauit Hollerius ex Hippocrate libr. de intern. affect. secundo iudicio lienem per vrinas expurgari: & scripsit Gal. cap. 2. libr. 2. de arte cur. ad Glauc. lienem cum renibus per vrinarios meatus vacuari. Noui ego religiosum virum, quo cum quotidie familiariter versor, cui ter<sup>i</sup>, aut quater in anno, maximè Vere & Autumno ineuntibus, intumescit lien: ac dum prominulus tumor instat, dolore hypochondrij infestatur, subliuidus toto fit corpore, sensimq; deterius habet. Sed tandem nigricantibus vrinis atramento simillimis, erumpentibus per 5. aut 7. dies, pristinam resumit incolumitatem, tumore & grauitate hypochondrij vanescentibus. Iam à 12. aut 15. annis repetito istiusmodi per interualla vrinatū profluuio detinetur, cum antè turgidas, sed minùs apertas habuisset hæmorrhoidas. Sed hæc parerga,

# DE MORB. INTERNIS

*De Colico 1 Dolor.* CAP. 41.

1 *Qui ab intestino colo-  
nomē habet,  
estque dolorū  
omn.ū sensif-  
simus. Cuius  
doloris mul-  
tiplex causa  
est: materia  
crassa & lē-  
ta, flatu, hu-  
morum acri-  
monia, Et in-  
flammatio.*

2 *Qui à pi-  
tuita vitrea  
intestino af-  
fixa ortum  
ducit.*

3 *Vt largio-  
re potu, &  
fluclū vsu.*

4 *Desidera-  
to naturali  
clystere, quē  
bilis est, quo  
pituita va-  
cuatur.*

5 *Galenus  
lib. 2. & 6.  
de locis malē  
affect.*

6 *Vnde simi-  
litudine sym-  
ptomatum in-  
incerto est,  
ut pars af-  
ficiatur.*

7 *Ab obstructione.*

**H**uius multiplex causa est. Ac primū de 2  
phlegmatica dicendum. Itaque colligitur pi-  
tuita crassa & frigida, atque aliquando vitrea, otio,  
intemperante 3 vita, obstructis viis, 4 per quas  
bilis in intestinum defluit. Hinc dolor excitatur  
5 quasi infixi pali, certōque loco insistit: sed vt plu-  
rimum ad inguem sinistrum, & utrūque renem,  
sursumque aliquando reuoluitur, & locum mutat,  
vt sunt fluxus coli intestini, quod relicto intestino  
recto in sinistrum inguem diuertit. Ad sinistrum  
renem ascendit, vbi angustius est. Quæ angustia ef-  
ficiunt aliquando, vt hac parte dolor 6 colicus gra-  
uis intendatur. Hinc ad splenem & ventriculum  
iam laxius extenditur, subitque hepar, hæretque a-  
liquando cysti fellis. Postremò in dextrum ilium  
descendit, vbi desinit in cæcum, quod ad renem  
dextrum positum est. Dolor hic fixus, vt in angu-  
stis, quæ ad sinistrum renem sunt, nephriticum  
dolorem repræsentat, vt etiam peritos Medicos fal-  
lat. Sed in nephritide urinae 7 tenues, albæ, postea  
etiam cum aspero atque sabuloso sedimento. Do-  
lor ad coxas 8 extenditur. Fomētis & cataplasma-  
tis mitigatur: inde laxatis viis non cōmutat locum:  
aut si commutat, perinæum, & viæ vrerum affli-  
guntur. In colico hoc dolore urinae tinctæ & igni-  
tæ, quæque biliosum falsò repræsentant. Imposu-  
ta fit, quia bilis, quæ ad intestinum defluebat, inter-  
ceptis viis ad renes diuertit. Præclusæ viæ sunt, vt  
neque ructus, neque strepitus ventris exire possit

8 *Obliquo enim ductu secundum ilia ad pubem fertur.*

Stercora sine succo, plena flatibus, similia bubulis, quæ injecta aquæ consistant, neque in fundum demergantur.

## Curatio

Causa mali humor ille frigidus affixus 9 intestino. Symptoma verò dolor, qui si vrget vehementius, prius quidem 10 leniendus est, quàm affectui consulas.

At quæ doloris gratiâ imperantur, ea prodesse solent, vel quia intemperiem 11 corrigunt, vel causam auferunt, vel leniunt atque contemperant, aut stupefaciunt.

Narcoticorum vsus in hoc genere colici doloris omninò suspectus 12 Græcis, permissus Arabibus. Optimum genus est, quod simul & causam 13 tollit, & dolorem attemperat. Secundum, quod solùm temperat.

Remedia verò multiplicia. 14 Phlebotomia, purgatio, balnea, exterius 15 admota medicamenta, cucurbitulæ, potiones, amuleta, quæque proprietate 16 quadam colicos curant.

Phlebotomia 17 omnibus ferè relicta est. Octavius approbat. Et nostra 18 memoria efficaci admodum remedio interim vsurpatur: multò magis, si dolor grauius vrit: si bene carnosum corpus est: si vires, ætas, & cætera permittunt. Remissionis tempore è basilica dextra, auersionis gratiâ, angusto fo-

9 Qui aut illic generationē habuit localem, aut aliud affluxit, aut cōtinēter affluit.  
10 Nihil enim aquē facit infirmum corpus, ac dolor. Hipp. li. 3. de fractur.  
11 Partem, & humorem ad equalitatem adducendo.  
12 Hitamen Philonium prescribunt.  
13 Purgando, digerendo temperamentum partis & habitum restituendo.  
14 Si causæ cōiunctæ vis excitet antecedentem, si phlegmone alsit, si humores doloris vis est incan-

duerint. 15 Quæ dolorem leniant, flatum dissipant, materiam coquant.  
16 Vt intestinum lupinum. 17 Quod nihil conferre posse videatur, neque ad affectum, neque ad symptomatis correctionem, præsertim cum materia sit vitæa pituita. 18 Cum doloris acerbitas causa magnitudinem superat, succeditque causa coniuncta antecedentes perennis affluxio ex vitio aliquo.

# DE MORB. INTERNIS

ramine, & modica vacuatione, nisi febris adsit. Tum enim multò liberius, atque etiam copiosius, sanguis depleri potest.

Quòd ad purgationem attinet, quia materia cò-  
tumax est, incidentibus primùm concoquentibus  
19 *Quæ sit* atque detergentibus vtendum est: tum 19. ratione  
*cruditate* vitæ, tum iis quæ clysteribus iniiciuntur, atque etiã  
*expers, ni-* exteriùs admouentur. Conueniunt ergò origanum,  
*miæque hu-* méthà, pulegium, marrubium, hyssopus, thymum,  
*moris abun-* maiorana, ammi, beta, rosmarinus, enula, radix pœ-  
*dantiæ, que-* onix, scordion, fefeli, ruta, lybistichum, anetú, cha-  
*que tenuis sit* mæmelum, asparagus, anisum, carui, & dauci semi-  
*Et exquisita.* na, vinum tenue, odoriferum, zedoaria, galanga, ca-  
storeum, gallia, aromaticum rosatum, puluis ducis,  
mythridatium, theriaca, confectio de baccis lauri,  
mel anthosatum. Secunda classis. Centaurea ma-  
ior, vrticæ semen, asarum, betæ succus, mercurialis,  
sal, sulphur, ius galli antiqui, ficus siccæ, carthamus.  
Sed hæc classis posterior simplicium deterget ma-  
gis. Iisdem quoque scopis hieram, polypodium, &  
serapinum commiscemus.

20 *Oleum*  
*etiam nucis.*  
21 *Vulgò di-*  
*citur oleum*  
*Philosopho-*  
*rum.*

Olea conueniunt anethinum, rutaceum, 20. &  
in quibus superiora coxerint. Fortius est 21. petro-  
leum, oleum de castoreo, euphorbio piperibus, sæ-  
pèque gummi in oleo dissoluimus, vt galbanum,  
serapinum, quale hoc est.

℥. galbani ℥. β. dissolue in olei rutacei. ℥. 3. aut  
circiter. Aliquando etiam & moschum, & algaliam,  
& ciuetam, sed minori modo, in oleo dissoluimus,  
Quale hoc est.

℥. ciuetæ Gr. 4. aut 6. dissolue in oleo rutaceo.  
Inunge. Vel fit illitus è pipere longo & vitello oui.

Sunt

Sunt qui addant oleum anethinum. Diuitibus moschū & algalia eodem modo dissoluantur. Eiusmodi olea vel cum 22 clysteribus iniiciuntur, aliquando quidem per se, aliquando cum decoctione conuenienti: iisdem ea pars, in qua 23 dolor est, inungitur.

22 Ex deco-  
cto rerum in-  
cidērium, ex-  
tenuantium,  
detergētium.

Cæterum oportet hoc in primis animaduerte-  
re, vt & incidamus, & concoquamus citra calorem  
vehementem, & iis quæ minimè inflant. Calidio-  
ra verò conuenient iam purgata materia, vt inde  
reliq̃ta intempesties corrigatur. Melicrata ex supra-  
dicta materia comparari possunt. Et hæ potiones  
plurimum laudantur.

23 Præfer-  
tim circum  
umbilicū,  
et virūn-  
que renem.

℞. summitatum absynthij vulg. P. i. sem. cumi-  
ni. ʒ. 2. feruefiant in vino tenui odorifero: expressio  
bibatur. Aliud.

℞. aquarum 24 cordialium ʒ. 2. aquæ nepetæ ʒ. i. 24 Vt car-  
In quibus dissolue theriacę aut mythridatij ʒ. 2. Vel. diu bened.

℞. menthæ viridis M. f. efferuefcat in vino albo  
tenui, aut vino mulso. Per tres dies bibitum omni-  
nò liberat. Item & matrubij decoctum. Aliud.

morsus dia-  
boli, & absosæ  
et simil.

℞. vini maluatici. ʒ. 2. calami aromatici. ʒ. ʒ. cro-  
ci Gr. 4. ferueant leuiter in calidis cineribus: colatu-  
ra bibatur. Similiter ex gulangæ & cumini ana ʒ. i.  
feruefacti cum vino albo tenui. Vinum absynthites  
ab Aëtio plurimum commēdatur: aluum enim ro-  
borat, bilem repurgat, eius generationem prohibet,  
deterget, ventos propellit, discutit, auertit, spiritus  
defecat. Alij, & rectè quidem, adiiciunt cumini mo-  
mentum, vt ʒ. i. quæ feruefiat in eo vino.

Probatum quoque & istud est certissimo ex-  
perimento remedium. Cortex aurengiorum in vi-

## DE MORB. INTERNIS

no albo coquitur ad tertias. Vinū quotidie ieiuno bibitur. Valet & ad præcautionem, & ad curationem. Sumunt alij, succi herbe veronicæ & vinialb. ana ʒ. 2. potui dant, & mirificè iuuant. Item illud.

℥. succ. maioranæ ʒ. 4. castor. ʒ. 2. cum vino Hippocratico bibantur.

Cucurbitula ampla, & cum multo igne medio 25 vmbilico affigi debet. Coquit enim. Sed vtilior vsus eius futurus est, si priùs impleatur vino calido, in quo aliquid ex supra dicta materia coxerit, & ita calida affigatur. Vtile quoq; fuerit alliorum succo, aut re simili inungere parte interiori.

Vbi materia iam attenuata, & ex parte cocta, partim clysteribus, partim 26 catharticis subducenda est. In clysteribus ex supradicta materia 27 comparatis mellis anthosati ʒ. 1. olei conuenientis, vt anethini, vel rutacei. ʒ. 3. dissolui debent. Aliquid quoque salis, vt ʒ. 2. potiùs quàm nitrum, quod ventrem subuertit, dissoluere oportet.

Procedente etiam malo. ʒ. 2. 3. aut. 4. pul. hieræ picræ, aut ʒ. 1. vel ʒ. 6. hieræ, diaphœnici quoq; ʒ. ʒ. aut tantundem terebinthinæ adiici potest. Veteres clysteres imperabant crassiore substantia, ex solo interim oleo, modumque faciebant ad heminas duas, id est, ad duas libras, aut nostro more ad quartaria sex. Purgatio per os leuis esse debet, quales sunt hæ pilulæ frequentatæ.

℥. hieræ picræ. ʒ. ʒ. cum vino albo tenui formetur tres pilulæ coopertæ 28 foliis auri. Paulò fortiores, si tantum addas rhabarbari, oportetque à leuioribus ad fortiores progredi.

Terebinthina quoque plurimùm laudatur. Da-

25 Ad resti-  
tuendum inte-  
stini habuū,  
et dolorem  
liniendum.  
Sed tamē cu-  
cubitula nō  
nisi ceteris  
administra-  
tis alhibēda.  
26 Sed mul-  
to magis cly-  
steribus.  
27 Vt. ℥. o-  
leor. rutæ. nu-  
cum, anethi,  
vini malua-  
ticæ an. quar-  
ta. I. cōfectio-  
nis de bacis  
lauri ʒ. ʒ.  
hieræ picræ  
tantundem,  
fiat clyster.  
28 Vel sine  
auro, cū pul-  
uere glycyrr-  
hiæ. Au-  
rū enim ven-  
triculo nego-  
tium faciesit.

tur ab  $\zeta$ .  $\beta$ . ad  $\zeta$ . i. inuoluta nebulis, vt fiant, quod aiunt, morselli.

Nonnunquam terebinthinæ 29 dimidium  $\zeta$ . 19 *Vt  $\mathcal{L}$ . terebinth.  $\zeta$ .  $\beta$ . hieræ picræ  $\mathcal{D}$ . 2. Misce,*  
hieræ, aut rhabarbari incorporatur, vt sint terebinthinæ  $\zeta$ . 2. vel. 3.

Fortioribus purgationibus vtendum non est, nisi vbi contumacius malum est. Tuncque vti licebit  $\zeta$ . i. pulueris hieræ diacolo. coacta in pilulas. Aliquando etiam adici possunt dacrydij Gr. 3. plus minusue.

Laudantur purgationes, quæ præterquam quod purgant, etiam dolorem stupefaciunt. Quibus vtendum erit nimium sæuiente malo, quales sunt.

$\mathcal{L}$ . pul. hieræ picræ  $\mathcal{D}$ . 4. opij, croci ana Gr. i. vel 2. pro viribus ægri. Cogantur pilulæ cum vino. Similiter supradictis catharticiis  $\mathcal{D}$ . i. philonij commiscebis.

Post purgationes clysteribus, fomentis, balneis vtendum est, iisque maximè, quæ dolorem leniant, qualia sunt chamæmelum, melilotum, anethum, althæa, semen lini, fœnugræci.

Tuncque vtendum erit amuletis, quæ à tota substantia conueniunt. Intestinum lupi siccatum, tritum datum  $\zeta$ . i. pondere aut  $\mathcal{D}$ . 4. cum vino albo tenui, in quo chamæmeli flos, vel anethi efferbuerit. Vtuntur variè pelle lupi. Alij cubilum stragulas contra hoc malum inde comparant. Alij cingulum gestant, aut partem pellis ventri admovent. Nonnulli stercus lapinum album tritum ex vino albo tenui propinant. Meliora putant, si ossa in stercore inuenta, vnà conterantur. Idem stercus nucula includunt perforata, suspendunt è collo, vt ad ventrem

*Ex Galeno  
lib. 10. Sim-  
plic.*



# DE MORB. INTERNIS

perueniat. Atque in id vtuntur ligula è corio ceruino, aut filo lanæ ouillæ, quæ à lupo interfecta sit, vel vt alij volunt, quæ à lupo euaserit.

Laudant & anguillæ sanguinem. Alaudæ genus cristatum (quod Galerita dicitur) vstum aut elixum cum iure galli. Stercus gallinæ, quæ exercetur & nutritur sicciore pabulo ex oxycrato. In capite limacum, qui colore sunt cineritio, pellucidus lapis inuenitur: qui tritus, & ex vino, vel aquis conuenientibus propinatus mirabile contra colicum dolorem remedium præstat. Tunicæ interiores ventriculi erinacei, masculi quidem, in viris: fœminæ, in mulieribus, adiecta tertia parte eorum, quæ incidunt, detergent, & alioqui colicæ conueniunt. Hæc probantur Græcis & Arabibus. Placandis doloribus internis, post omnia tentata remedia, vtimur decocto chamæmeli, aut aqua destillationis eius arte chymica facta, & in potu data. Acerbius verò vexante malo, neque cedente aliis remediis, narcotica permittunt Arabes mixta pharmacis, vt prius, vel aliter. Ac primùm quidem in clysteribus ex leniente materia capita papaueris concoquimus, quibus si nihil efficitur, vtimur flocculis, qualis hic est.

30 Vel potius  $\mathcal{D}$ .  $\beta$ . vel gran.  $\gamma$ .

31 Ne longa mora intestinum labefactet opij, atque adeo stuporis locove-  
 $\kappa\rho\omega\sigma\iota\nu$  inducat. Philonij descriptio alia est in cap. de spūto sanguinis.

$\mathcal{L}$ . olei anethini  $\mathcal{Z}$ . 2. castorei  $\mathcal{Z}$ .  $\beta$ . opij 30  $\mathcal{D}$ . i. misce, & in eo madefac flocculum lanæ, quem è filo suspendes: suspensum impelles in sedem, ac simul atq; acquieuerit dolor, 31 retrahes: vel clystere vtêris, cuiusmodi est veterum.

$\mathcal{L}$ . ol. rutacei lb. 1. opij, castorei an.  $\mathcal{D}$ . i. Sed posteritas Medicorum oleo admiscet castorei  $\mathcal{Z}$ .  $\beta$ . opij. Gr.  $\gamma$ . Per os verò conuenit philonium Rhazæ, cuius hæc descriptio.

℥. piperis, ameos, foliorum rutæ siccorum, menthaſtri, caſtorei, baccarum lauri, cumini ana ʒ. i. opij, mandragoræ, ſeminis albi hyoſcyami ana ʒ. ſſ. mellis. ʒ. i. in quo cætera incorporentur: datur. ʒ. i. Quòd ſi catharticum voles efficere, adicies dacrydij ʒ. i. Secretum Albucæſis ex aliis diſtillatis cum opio.

℥. capita alliorum n. 6. opij ʒ. 3. fiat diſtillatio in alembico, detur modicum eius aquæ.

Aliud Andromachi admirabile, lib. 9. de comp. med. *κτ' τ' οπ' 85.*

℥. piperis albi ʒ. i. opij ʒ. ſſ. croci Gr. 18. ſeminis hyoſcyami albi Gr. 15. ſpicæ nardi, pyrethri, caſtorei, euphorbij ana ʒ. i. vel ʒ. ſſ. excipe melle cocto. Doſis eſt ʒ. i. aut dimidium ʒ. cum aqua frigida: Ad eundem ſcopum facit maximè Caſſij medicamen, Celſo cap. 14. lib. 4. *κωλικον* dictum, quod & potui datum prodeſt, & impoſitum quoque extrinſecus, digerèdo ſpiritum, dolorem leuat. ℥. coſti. anif. caſtorei an. ʒ. i. petroſ. ʒ. i. piper. longi, rotundi myrrhæ, nardi ana ʒ. i. excipiantur melle.

*Curatio colicæ flatuoſæ.*

Eadem ferè curatio doloris colici nati è flatibus. Nam non alia re differt, quàm quòd in primo genere, plus eſt materiæ, ventorum minùs. Hîc verò inteſtina plurimis flatibus conturbantur, & vel nulla, vel exigua materia eſt.

Propterea minor grāuitas, diſtentio maior, vt aliquando parte aliqua venter in gibbum extuberet. Singulare remediũ hîc eſt, Cucurbitula ampla imbuta, vt priùs dictum eſt, medicamenti, quæ flatus diſcutiant, cum multa flamma medio vm-

32 Nulla nō  
potest eſſe co-  
lici doloris  
materia, quā-  
doquidē fla-  
tus ſuas in  
humoribus  
baſeis habet  
conſtitutas.

33 Vt gene-  
roſo vino, mal-  
lico foliorum  
& baccharū  
lauri. Vel al-  
io poterit ſi-  
lini.

34 *Vi 2℥. a-*  
*qua decoctio-*  
*nis summita-*  
*tum anethi*  
*quartar. 3.*  
*olei commu-*  
*ni vel viola-*  
*ti quartar. 1.*  
*ex hydrelæo*  
*fi. clyster.*

bilico affixa. Clysteribus primùm vtendum est, 34 qui stercus emolliant. Qualis ex hydrelæo, melle & sale modico. Sed melius fuerit in ea aqua, vnde hydrelæum paratur, priùs fuisse incocta, quæ flatus discutiunt. Sunt autem cuminum, ammi, amomum, fœseli, daucus, anisum, fœniculus, petroselinum, caruum, nigella, bacca iuniperi lauri, vrticæ semen, ruta, calamentum, pulegium zinziber, cariophylla, calamus aromaticus, cinamomum, piper, galanga. Hæc aromata vino tenui incocta, vel cum vino percolata plurimùm conueniunt. His autem colicis vina optima, quæ que tenui sunt substantia & odorifera, non solùm ægris, sed sanis etiam conueniunt.

35 *Tumenim*  
*vitanda ni-*  
*mia humoris*  
*abundantia,*  
*& calor na-*  
*tium excitat*  
*us, qui effa-*  
*tus languet.*

Abstineant aqua, diluto vino, 35 fructibus humidis, & oleribus: quæ ratio vitæ imperatur & viris & mulieribus frigidioribus, quibus plurimi flatus toto ventre colligi solent. Hic etiam aristolochia, castoreo euphorbio, quæ fortiora sunt, vti licet. Ex his omnibus & melicrata componi possunt vina quoque reddi efficaciora condiuntur cibi. Olea vngendo sunt, sacculi, & fomenta. Probatissimum mihi est istud linimentum. 2℥. olei rutacei & nardini ana 3. 6. galbani cum aqua vitæ dissoluti 3. 3. Liquefiât simul. Deinde cū ciuetæ gra. 4. croc. gr. 6. f. litus. Vel oleum anethinum cum vitello oui subigatur, piper tritum addatur, & vmbilico adhibeatur. Sed hic, vt & in reliquis generibus colici doloris, ratio habenda est mulierum grauidarû, ne quid iniiciamus, aut etiam applicemus, vel aliter imperemus, quod abortum faciat. Quale est castoreum, euphorbium, amara omnia.

Videndum rursus ne nimium aperientibus utamur. Sic enim fit, ut apertis orificiis vteri sanguis effluat, & sequatur abortus.

Præterea neq; remolliendum, neq; relaxandum nimis. Hinc enim dissolutis vteri vinculis abortio fit.

*Curatio colicæ biliosæ.*

Inedia 36 colicos iuuat à frigida, lædit 37 verò à calida. A materia acri vehementissimè cruciantur, vomitus biliosi, æruginosi, motus 38 conuulsionis, & animi 39 deliquia, sudores 40 interim frigidi, & febris, quibus phlebotomia exiguo 41 detractò sanguine cōuenire potest. Multò magis, si febris adest, aut inflammatio orta in intestino. Sed aliquando hîc & in aliis generibus vrina ita supprimitur, ut inde 42 periculum immineat. Qua in re è malleolo vena 43 secanda est. Læduntur hi omnibus acribus & calidis, egéntq; temperatis, deinde etiam frigidis.

Purgatio 44 conuenit non molesta, nec aceruatim facta, sed interuallis ex 3. s. pul. hieræ picræ, ʒ. 2. ad summum, 3. i. rhabarbari.

Cassia, catholicon ad 3. i. o. exhibetur: 45 manna ad 3. 2. eaque dissoluere oportet in aqua hordei, ptisana vulgari, sero lact. decocto passularum, prunorum, sebesten, violarum.

Et extinguendam inediam. 42 A suppressione vrinae, & eius ad nobiles partes palyndromæ. 43 Ad amotionem causæ conuulsæ, & materiae, qua in vultu est, vacuationem, cum verò ad vrinam κατάρροπὴν. 44 Ad collectionem biliosi humori, quàm colicæ intestini distentio sequitur, distentionem dolor. Ut. ʒ. tamarind. ping. passul. mund. ana 3. i. prun. damasc. num. 12. fol. end. scariol. borrag. flor. viol. recent. sun. mit. lupuli ana p. i. seminum end. melon. anisi fœnic. glycyrr. ras. ana 3. i. s. fi. decoct. in qua dissolue syrup. violac. multarum expressurionum. 3. i. f. potio. 45 Manna tutò exhiberi nequit, quòd huiusmodi colici ferè sint πικρόχολοι καὶ μεγάλωσπλάγχνοι.

# DE MORB. INTERNIS

46 *Vt* 24.

*radi. althææ*

3.1. *fol. viol.*

*mal. alth. pa-*

*riet. lactuc.*

*ana M. 8. se-*

*minus psilij,*

*cydoniorū, al-*

*thæa an. 3. 2.*

*furfur. macr.*

*hord. integr.*

*an. p. 1. prun.*

*10. fi. decoct.*

*In colatura*

*ad lb. 1. dis-*

*solue cathol.*

3.1. *vel 3. 6.*

*mell. violat.*

*sacchar. rub.*

*an. 3. 1. 8. olei*

*viol. 3. 3. vel*

*olei violati*

*& nenupha-*

*rini ana 3. 1.*

*8. fi. clyster.*

47. *Primum*

*temperamēto*

*frigida: vt*

*uscula ex de*

*cocto pullorū,*

*cum lactuca,*

*fortu. oxaly-*

*de: ptisana*

*seu hordea-*

*um, prancerū*

*damaſcenorū*

*usus, vini*

*abſtinentia,*

*ſyr. violaceo.*

Clysteres 46 ex radice & foliis althææ, maluæ, violariæ, mucagine feminis lini, althææ, psilij, cydoniorum, adiecto interim capite papaueris cū vitello oui, oleo violato, butyro recēti, adipe anseris, gallinæ, anatis, saccharo violato, aut melle violato.

Vrgente interim dolore, vtile erit hoc cataplasma ad mouere. 24. farinæ lini & hord. ana M. 2. conquantur in oleo chamæmel. fi. cataplasma. calidum apponatur. Vel ceratum sequens. 24. ceræ 3. 5. vitell. ouor. 2. farinæ fabar. 3. 8. olei chamæm. & ros. ana 3. 2. Vitellos ouorum cum mucagine feminis lini coniunge, & cerato misce.

Plerosque curauim lenticulâ, (vasis genere lentis figuram referente) decocto conuenienti plena, & plantis pedum admota, prouocato inde sudore. Admouetur quoque conuexa parte caua, è ferro albo, vel stanno.

Atque interim si suspitio est exulcerationis, tum plantago, rosæ, sumach, & similia decocto clysterum miscenda sunt.

Plurimum laudantur clysteres ex liquidiore hordeato, aut lacte amygdalarum dulcium ad quartaria quinque: in quibus dissolue butyri recentis 3. 3. sacchari violati 3. 1. Qui clysteres, quia leues sunt, si diutiùs retinentur, mel violatum loco sacchari, aut etiam commune miscendum erit.

Eadem 47 quoque alimēta sint. Panis, ex 48 autem, prancerū ſtero vino aquæ frigidæ potus, inunctio ex oleo violato, butyro recenti, oleo chamæmelino atque etiam anethino. Sacculi & fomenta ex proximè dicta materia, chamæmelo, anetho, &c.

Ter die comedat. Nam inedia talibus inimica. 48 *Vt ventriculus confirmetur.*

Balnea 49 aquæ dulcis. Narcotica in genere fe-  
rè necessaria. Verùm Arabes corrigunt non casto-  
reo, pipere & similibus, sed crocò & 50 stercore  
lupi. Quæ si medicamentis miscenda sunt, misce-  
buntur, vt priùs, hieræ, rhabarbaro, catholico, cæ-  
tera quoque & eadem ratione.

49 Ex deco-  
cto viol. agrî  
mon. parietæ.  
fol. vitæ.  
50 Vel con-  
dito borrag.  
citrin. myro-  
balani.

Sunt & alia genera colici doloris, vt ab aposte-  
mate, vermibus, intestini descensu, indurata fæce,  
de quibus alio loco.

## EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Primùm cum de dolore ventris æger conqueritur, an sit  
sublimis, necne, considerato. Galenus Aph. 7. lib. 6. subli-  
mem & non sublimem distinguit peritonæo, ita vt sublimis  
sit in mēbrana, & musculis abdominis. Hîc dolores leuiore  
sint, & minùs periculosi, facileque ex proprietate doloris,  
& differentiis causa discernitur, addito partium consensu.  
Quare cùm membrana & musculi viliores sint partes, & fa-  
ciliùs remediorum vim sentiant, de salute & remediorum in-  
uentione minùs dubitandum. Sin intra peritonæum, maius  
periculum. Primòque num ab utero, an renibus, distinguit.  
Solent enim mulieres à partu, aut quo tempore fluxuri sunt  
dolor magis est in ligamentis, ad inguina descendit, coxen-  
dicus videtur. Quibus adde partum antecedentem. Si ob  
difficultatem mensium fluentium, dolor magis circum re-  
nes, quàm in penitioribus partibus, qua parte venæ & vasa  
spermatICA ad uterum tendunt. In his enim distentio est ob  
plenitudinem, vnde dolor: qui magis torquet, cum men-  
struum tempus appetit. Si à renibus ibi dolor incipit, fixus  
est, diuturnus, in vesicam porrigitur, vrina aquosa, tenuis in  
principio, vel turbida, aut suppressa, & similia. Sic de calculo,  
aut pituita in renibus suspitio est: de inflammatione verò, si  
febris iuncta, & magna renum caliditas sentitur. Alioqui in  
intestinis affectio est. Mordentur, distenduntur flatu, absces-  
sum patiuntur, suprà vmbilicum periculosius. infra minùs.

Colici, dolo-  
ris sublimis,  
aut inferio-  
ris note.

Colicus dolo-  
ris ab utero  
ab eo, qui est  
à renibus, di-  
stinctus.

## DE MORB. INTERNIS

Morsus ab intemperie, inflammatione, pituita vitrea, materia calida. In inflammatione febris & calor. In intemperie cum pituita vitrea, dolor fixus in vna parte, intestinum perforari videtur. A materia calida, dolor acris mordicans, post morbum biliosum, retentam bilem, vt in ictero, calidis irritatur, signa bilis adsunt. A flatu, aut alterius pituitæ multitudine, dolor non ita fixus in vna parte. Iliacus magis fixus, magisque in circuitu vmbilici. Colicus in lateribus potius iuxta fundum ventriculi, siue crassus aut viscosus humor sit, siue flatuosus spiritus interclusus, nec habens exitum. Symptomata sunt, nausea, vomitus pituitosi atque corrupti humoris, multò grauiores, quam per nephriticos affectus, ob recursum flatuum & materiæ sursum ab intestinis, qui aliquando biliosi sunt, tamen si materia pituitosa, excrementorum retentio, vt ne flatus quidem aut ructus exeat. Sæpe vagus est dolor, modòque hanc, modò illam partem grauius torquet. Circa vmbilicum aliquando fiunt grauissima tormina, propter anfractus tenuis intestini sensus vegetioris, in quibus interclusus spiritus dolores facit circa lumbos propter cæcum & colum, quod illuc sæpe angustius. Deinde quia illuc vincula neruacea sunt, quibus colum & renes inter se alligantur, & renes lumbis. Hoc malum si diuturnum sit, & perseueret, nec remediis cedat, vt fomentis, clysteribus, sacculis vnguentis & similibus, confirmata est intemperies, & veluti hectica, quæ difficillimè remoueri potest, vnde imminet periculum hydropis sicci. Si à vacuatione critica, aut sola refrigeratione nondum confirmata, adhibitis remediis facilè sedatur. Si hæc non adsunt, non flatus, sed cæcer, aut abscessus aliquis dolorificus, metuendus, periculumque imminet, ne marcor hominem è medio tollat. Quod obseruatum est à nobis in D. Zolin Medico, & Aduocato Gilot, cui colum, qua parte vicinum est reni sinistro, collecta veluti cartilagine dura in scirrhum obduruerat, interiore cauitate eorum intercepta, vt nihil transcurreret. Itaque neque clysteribus, neque medicamentis iuuabatur, etiam fortibus. Parte dextra colum ad instar magnæ vesicæ dilatatum & extensum, medicamentis datis & potionibus plenum. Superiecti, viciniq; musculi abdominis, & peritoneum, saniosa. Post longa, & multorum annorum tormina, è quibus tamè non decubebat, sexto,

*Colic. dolor à calida causa.*

*Colicus à flatu.*

*Colica symptomata.*

*D. Zolin Medicus colico perēptus. collecta in colo cartilagine dura. Aduocatus Gilot colico morbo sublatos.*

à quo decubuit, die mortuus est sine febre, nisi quo die obiit, nimirum 5. Martij, 1555. Magister Hieronymus Germanus interna inflammatione, & putrilagine, colico morbum similem passus est: 4. die obiit, extremis antè frigescentibus, languescente pulsu, & sanguineis spectris ob oculos obuersantibus. Quod autem à veteribus scriptum est, colicum dolorem transire in Paralytim, id rarum apud nos familiare quibusdam populis, vt Bastonibus. Sacerdoti cuidam annorum 40. ex assiduo propè dolore colico Paralytis nata, dolorem soluit, sed mansit Paralytis annis aliquot. Vires ex pulsu non colligendæ, quia in dolore graui pulsus ferè paucus.

In vitrea pituita, vomitus, clysmata initio fortiora, pilulæ, vnguenta, syrapi. A viscido humore, & flatu eadem remedia conueniunt, sed imbecilliora, clyster emolliens, discutiens, relaxans. A bile aut influxu acris humoris, purgatio ex hiera, clysteres detergentes, fots, aliquando balneum, pulueres à pastu. In phlegmone metuenda cathartica, quæ humores trahunt ad partem affectam. In flatu cucurbitula repentè dolorem aliquando tollit. Rhabar. myrob. ob adstrictionem: senna, cassia, pruna, manna, dulcia, ob flatum minùs conueniunt: balneum quoque, quibus ad conuulsionem, paralytim, arthritidem, natura propensior. A nimium violentis inflammationis periculum imminet. Senibus, pueris, mulieribus grauidis, imbecillo calore & viribus, narcotica non exhibenda. In crassis & viscidis humoribus, inimicissima: in acris & calidis, apta, in crassis spiritibus conceduntur. Phlebotomia si febris, & sine hac, vbi acutissimus dolor, & omnia consentiunt, sed angusto foramine, pauca vacuatione. Veronica trixa è vino albo & bibita, alauda cristata in cinerem redacta, & esca, cortex mali granati, capita veruecis, fursures frixi, cingula è corio lupi, alia distillata, tunica interior ventriculi erinacei anguillæ, sanguis, ossa & stercus lupi cum aqua tepida apot., castoreum, auicula (vulgò Mesfange) coralli incisi, triti, & ieiuno dati ad cochlearia ij. per triduum, cornu cerui vsti, vmbilicus incisus recens nati infantis, vt si modicum de eo aurea, vel argentea armilla includatur, & circumferatur, cortex mali aurei. Sunt qui membranam inuolutam capiti pueri recens nati maximam vim habere contra colicum dolorem affirmant.

Propterea si quando id accadat (nam non omnibus accidit)

*Hieronymus Germanus morbo præhe sus colico simili occubuit.*

*Sacerdos ex assiduo colico dolore in paralytim incidit.*

*Quæ à proprietate colicis medentur.*



## DE MORB. INTERNIS

obstetrices seruant & experimento constare asseuerant. Vnde dicuntur(*non coëffez*) quod felicitatis præsagium dicunt. Natus est mihi filius Iacobus cum ea membrana, quare, quia insignis erat, statim substraxit, subduxitque anus obstetrix.

Phyfica quadam ratione mirum in modum profunt, si suo modo & tempore præparentur.

### ANTO. VALETII EXERCIT. XLI.

*Doloris colici causa ex cap. 7. li. 12. Meth.*

**F**Acta per distentionem in colo intestino continui solutione dolorprehendit ingens, qui ab affecta sede colicus nuncupatur. Huius causæ sunt, crassus & pituitosus humor intra coli membranas collectus, qui ventrem excruciat, & tormina facit, vnde aluus suppressa est, & nausea ac vomitus molestant: flatuosus spiritus, à quo tensio atque rugitus: inflammatio, cum qua febris adest, dolor in ventre pulsans, vrinæ retentio, bilis vomitiones, quæ alioqui nihil leuant, atque internus feruor: mordacium humorum collectio, à qua similia propemodum, sed paulò mitiora quàm in phlegmone, symptomata sequuntur. Fit interdum à fæcibus induratis: nonnunquam à lumbricis. Nephriticum dolorem colicus sæpè ementitur, quia colon renibus incumbit. Sed vtriùsque distinctio ex peculiaribus signis petenda habetur apud Gal. cap. 2. lib. 6. de loc. mal. affect.

*Colici doloris curatio.*

Vocatus ad ægrum Medicus hoc vnum imprimis studeat, antequam ad affectus causam tollendam aggrediatur, vt doloris vehementiam, quæ sæpiùs syncopem calamitosam inducit, summoueat. Sedatur dolor anodynis, clysteribus, potionibus, frictionibus abdominis, fomētis, litubus, cataplasmatibus, incessibus, affixis dolenti loco cucurbitulis. Pri-

morum clysterum quantitas minor esse debet, vt diutius retineantur. Maior enim grauidando vim irritaret expultricem. Sed & in dolore mitiore licebit eadem opera causam ipsam demoliri. Vt si crassus ac frigidus humor intestinum afficiat, hic imperatur clyster.

℥. mal. bism. violar. pariet. ana M. i. chamæm. summitat. aneth. origan. calamenth. abrot. ana M. ss. femin. anis. caru. cummin. ameos, fessel. ana ʒ. ss. baccar. laur. femin. rut. ana ʒ. 2. f. decoct. ad ℥b. i. In colatura dissol. cathol. & diaphœn. ana ʒ. ss. sacchar. rubr. mell. anthos. ana ʒ. ss. olei anethi & chamæm. an. ʒ. i. f. f. clyster.

Ast vbi flatus præualebunt, ita præscribetur.

℥. decoct. remollientis & carminatiæ ℥b. i. in qua dissol. cath. ʒ. i. confect. de baccis lauri. ʒ. 3. mell. anthos. sacchar. rub. ana ʒ. i. olei aneth. ʒ. 3. f. clyster.

Itē si perseveret dolor, denuò clyster alter iniiciatur.

℥. olei lini, olei nuc. ana ʒ. 3. olei aneth. ʒ. 4. terebinth. vnc. i. f. clyster.

Terebinthina tum maximè adiicitur, atque etiam oleum de scorpionibus, cum renum malè affectorum suspitio incidit. Quod si biliosa sit causa, comparabuntur clysteres non è solis calfacientibus, sed mistis refrigerantibus: vt si cum remollitiuis vulgò dictis cichor. endiu. violaria, femin. frigida decoquantur: cassia cum diaphœnic. sacchar. mel. viol. oleum viol. & aneth. dissoluantur. Neque verò omitterentur potiones ex phlegmagogis, aut cholagogis, vt erit materia, instituendæ: nec quæ assumpta aut admota prosunt, qualia ab Hollerio describuntur multa. Colicum dolorem quàm citissimè sedare, quæ ad amplissimum Ducem Aumallium misit Comes Rupefortius remedia, communi notum est experientia. Ea quamuis vulgaria, non grauabor

## DE MORB. INTERNIS

subiicere. ℞. malu. bis mal. mercurial. ana M. i. parietar. M. i. β. semin. rut. ℥. i. Bulliant in æquis vini & aquæ partibus, parca tamen quantitate adhibitis, ut liquoris plurimum per setaceum traiciendi supersit. Herbis & seminibus coctis adde butyr. recent. & olei chamem. quantum satis sit ad cataplasma. Excipiatut stuppis, dolenti parti applicandum.

Sed antequam cataplasma adhibeatur, sponsia decocto imbuta superiori, cui tantillum aceti, aut vini albi immistum sit, fouetur locus. Perseuerante dolore, panis recens cocti in clibano, & adhuc calentis mica imbuitur ol. scorpion. ℥. i. β. ol. aneth. & rut. ana ℥. 2. quæ puluere tenuissimo è seminibus cumini, anis & fœniculi parato sinapisata, ut loquuntur, calidè affectæ sedi apponitur. Cæterum si dolor sit à phlegmone, longè operosior ineunda curatio, metu ilei, in quem facilè degenerat. Valentibus ægri viribus mittitur sanguis. Mollientibus clysteribus sæpè sollicitatur aluus. Admouentur initio repellentia: deinde, ut in reliquis inflammationibus, sensim ad résoluentia venitur.

1 Intemperie,  
vitiata con-  
formatione,  
solutione con-  
tinui.

2 Criticè, vel  
symptomati-  
cè.

3 Per Apho.  
30. lib. 7.

4 Suppressa  
quoque cere-  
bri vacuatio-  
ne solita per  
nares.

*De alui fluxionibus. CAP. 42.*

**F**luxiones alui partim vitio 1 ventriculī & intestinorum, partim vitio materiæ excitari solent. Ea verò materia vel in ventre est concepta, vel aliunde 2 translata, ut à cerebro, in fluxu 3 cerebri. Eiusmodi fluxus solet euenire otiosis, intemperatis, iis qui somno nimium indulgent, quique 4 humidiores sunt cerebro, modò iuncta frigiditate, aliquando etiam caliditate. Humida aëris constitutione, Austrina, & maximè cum sequuntur

tur Aquilones, qui per Austos & cælum pluuium collectam materiam exprimunt in ventrem. Comouetur fluxio expergefactas, & periodica est. Ex ratione materiæ curatio instituenda est. Nam aliquando pituita dulcis est, aut expers qualitatis: aliquando salsa, acris & mordax, quæ distinguenda sunt & curanda, ex iis, quæ cap. de catarrho descripta sunt. Nam sistendus est catarrhus, roborandum caput & ventriculus. Roborabitur ventriculus ea ratione, quæ præscripta est cap. de debilitate stomachi. Influit aliquando ab hepate, liene, atque etiam vniuerso corpore, de quibus postea.

Quæ verò *leuenteria* appellatur, multas causas habet: infirmitatem contétricis non solum ventriculi, sed etiam primorum intestinorum, è quibus fit alimenti distributio. Infirmitas ex intemperie nascitur: intemperies alia simplex & sine materia: aliquando verò cum materia. Quæ, vt plurimum accidit, falsa & pituita est.

Fit *leuenteria* & ab acris, & humore, aut re alia eiusmodi vim expultricem irritate, vt abiiciat cibum, priusquam confectus sit.

Res autem eiusmodi vlcera sunt saniosa, quæ ab alimento vellicantur, quibus aliquando occasio est pharmaci portiuncula retēta in rugis & asperitatibus vētriculi. Quod ab agarico, colocynthide, metallicis, & rebus quibusdam venenatis, vel non satis comminutis, vel maligna qualitate, inferri solet. Duo hæc genera causarum Gal. annotauit 12. Aph. libr. 4. 22. libr. 3. & aliis quoque locis. Magna pars Græcorum, quique Arabes sequuntur, ventriculum putant viscida interim pituita illini, atque ita lubri-

*5 Vel etiam  
acida, eoque  
leuenteria co-  
mitem habet  
oxyregmēā.  
6 Facit a-  
crior ille hu-  
mor quædam  
veluti anth-  
thas, vide ex  
pultrix fœcul-  
tas irritatur.  
Quomodo in  
v sica stran-  
guria, in auo-  
tenesmo ex-  
citatur.*

## DE MORB. INTERNIS

cari, ut inde districta asperitate & rugis ventriculi læuor quidam sit, & via lubrica, unde celeriter cibus defluat, nec possit contineri, ex qua ratione læ enteriæ nomen factum est, quod non ita approbat Galenus comm. in Aph. 1. lib. 6.

Est & alia læ enteriæ causa. Post dysenterias & vlcera intestinorum, cicatrices fiunt, quæ si obducantur osculis vasorum, per quæ à tenui intestino ad portas hepatis inuehitur chylus, defluit alimentum aliqua quidem ex parte, sed non omninò confectum.

Est autem in genere læ enteria coctionis priuatio, cum celeriter alimenta externuntur, neque consistentia, neque colore, neque odore, neque alia qualitate immutata, sed subalbida, maximè aquosa & liquida, nulla commixta bile, aut sanguine.

Alimenti nomine non solum cibus, sed & potus audiendus est. In ea, quæ ab acri humore, doloris sensus est: qui si perseverat, dysenteria fit. In imbecillitate nullus doloris sensus, & meliùs eunte morbo, acidi ructus commouentur.

### Curatio læ enteriæ.

Curatio tota in duobus est. Materia 7 vitiosa (quam maximè arguit oris graueolentia, propter corruptum in stomacho humorem, aut cibum) primùm est vacuanda. Deinde roborandus ventriculus. Itaque si materia acris est, infarcta tunicis ventriculi & intestini, purgatione ex hiera, rhab. utendum est. Dissoluantur itaque 8 ʒ. 2. aut 3. hieræ, aut ʒ. 1. eius pulueris in sero caprino, decocto cicerum rub. vel absynthij. Et quia pulvis amarior est, adiicietur purgationi ex eo puluere ʒ. 1. oxyfacch. simplicis,

7 Antecedēs  
& cōiuncta,  
pituita acida,  
qua resolui-  
tur facultas  
retētrix: aut  
serum acre &  
pituita falsa,  
quæ aluū fa-  
cit aphthosā.  
8. Ut ʒ. ra-  
dic. cichor. ʒ.  
1. absynth. in  
fine decoctio-  
nis positi p. s.  
f. decoct. in  
qua infunde  
rhes electi ʒ.  
2. In expres-  
sione dissolue  
syrup. de ab-  
sint. ʒ. 6. aut  
de mentha  
tantundem,  
f. potio.

simplicis, aut 3.6. syrupi de absynthio. Rhabarbari 3.1. aut 3.4. infusi in aqua absynthij, aut liquoribus supradictis. Veteres dissolunt in mulla, cui & vis est detergendi, & leniendæ amaritudinis pharmacorum.

In crassiore bile & contumaciùs hærente veteres addebant 3.1. scammonij. Nunc verò satis fuerit, si Gr. 4. dacrydij misceantur.

10 Vacuata cacochymia, adstringentibus vtendū, sed modicè, multo etiā min⁹, si qua febris suspitio est *10 Nam adstringētibus venæ obstruuntur, & his mores tenaciùs adherescunt.*

Probatum remedium antiquis ex tribus partibus succi granatorum acidorum, & vna succi menthæ simul coctis: deinde adiecto melle, vt fieret eclegma. Nostro more vteremur 3.1. oxyfaccharæ simplici. 3.3. syrup. de mentha, vt per intervalla 2. aut 3. cochlearibus vteretur, aut vt esset liquidius medicamentum, 3.1. iulepi ros. admisceretur.

Laudatum & aliud remedium è cydoniis & malis granatis, vt esset vtriùsque æqualis modus, tum coquerentur ad putrilaginem, atque expresso succo tantum mellis misceretur, quantum satis esset ad eclegma. Nostro more licebit vti syr. de cydoniis, & oxyfacchara simplici, ii vtróq; ad 3.6. cum 3.1. *ii vt. 2. oxyfacchara simplici 3.1. syrup. den. 3.1. rha 3.3. v. a-tur ex cochlea*  
iulep. ros. Maximi est momenti diacodion cum sapia factum, quòd & somnum conciliet, & ventrem *si febris absit.*  
sistat. Simile huic est diaoporon Asclepiadis. 2. pi-  
ror immaturor. malor. cydon. mal granat. acidor. *si febris absit.*  
daclilor. immaturorum ana 3.1. Coquantur cum  
mellis rosac. lb. 1. donec inspissentur: subductis ab  
igne adde mac. acaciæ charyophyll. an. 3.6. cinamo-  
mi, balaustior. an. 3.2. Seruatur in vsus, & datur cum  
aqua cisternæ.

## DE MORB. INTERNIS

Exteriùs cataplasmata, quæ in debilitate stomachi à calore dicta sunt. His remediis celeriter curari scripsit Galen. in Meth.

12 Galenus  
lib. 8. metho.  
& 9. de comp.  
med. local.

In pituita eadem in genere conueniunt: quæ si crassa est, oxymelite & similibus primùm incidenda: tum ex hiera repurganda. Si verò tantùm conspersa tunicis ventriculi, solis siccantibus & calfacientibus opus est, vt confectionibus è succo cydoniorum cum aromatibus, quas priùs ex Græcis & Arabibus descripsimus, vino fortè antiquo, styptico, sed modica quantitate. Modus enim potus est, ne fluitet in ventriculo. Quòd si consuetudo est, diluatur vinum aqua ferrata, in qua vel cinamomum, vel mastiche, aut vtrùnque coxerit.

Proderit mirificè hic puluisculus. ℞. coriandr. præp. ʒ. 4. corall. rub. rosar. rubr. rasuræ ebor. cornu cerui, ossis de corde cerui ana ʒ. i. cinamomi ʒ. 2. sacchari rosati ʒ. 2. fiat pulvis subtilis, vtatur in pane tosto.

13 Vt fotus,  
linimenta, ha  
ps, empla-  
staa.

Mastichis Gr. 2. vel 3. in puluerem redact, & ouo forbili excepta, per interualla deuorantur. Chepulæ conditæ, nux quoque moschata cõdita, caro cydoniorum, gelatina ex iisdem confecta, diacytonium, zinziber conditum, & alia in debilitate stomachi à frigore enumerata. Similiter & quæ exterius 13 applicantur, ceratũ stomachicum Gal. car. cydonior. emplastr. de gallia.

In calido autem fluxu potest tale emplastrum imponari. Mica panis in oleo rosaceo subigitur: deinde cum succo semperuiui & lactucæ malaxatur, & imponitur.

Laudatur vomitus à cœna: & quia cibos non cõ-

finent, fixa ingenti cucurbitula, eo modo, quo cap.  
de cholera diximus, ventri affixa, vt contineatur ci-  
bus, procurandum est.

Rusticus quidam percuratus est quotidiano  
vfu coaguli vitulini fabæ parvæ magnitudine cum  
vino epoti. Sunt qui pulverem ex pudendo ce-  
rumo & taurino exsiccatâ parant, panî tosto oxya-  
canthæ succo, vel granatorum, præiùs imbuto in-  
spargunt, & vtiliter assumunt. Fiunt etiam è farina  
fabæ fræ siccata in clibano, dein pista cum aqua  
rosacea veteri, & saccharo rosato, nebulae. Eidem  
farinæ pasta Regia misceri potest. Quòd si nihil iis  
remediis proficimus, dropace atque sinapismo v-  
tendum.

# EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Enteria, Cæliaca affectio, diarrhæa, dysenteria, immo-  
deratas alui fluxiones significant, sed vt nominibus, ita natu-  
ra & causis distinctas, *λεῖον* Græcis læue significat, seu conti-  
nuum, & nulla ex parte diuulsum, sed sibi vndique cohæ-  
rens, æquabili superficie. Vnde *λεῖντερία*, quasi *λεῖον* τῶν  
*ἐντέρων*, læuitas intestinorum. *ἐστὶ δὲ ταχὺία διέξοδος τῶν προσφερο-  
μένων σιτίων ἀμεταβλήτων ἐκκρινόμενων*, cum cibo & potus, qua-  
lia sumpta sunt, celeriter & ante coctionem vllam, aut exi-  
guam, elabuntur è ventriculo & intestinis. Huic igitur duo  
propria sunt, quibus faciliè discernitur ab aliis: nempe ali-  
menta celeriter, postquam sumpta sunt, per aluum reddi,  
& mutationem ferè nullam coctione adeptâ esse. Id neces-  
se est fieri, vel ob imbecillitatem retentricis ab intemperie,  
vel irritationem excreticis. Intemperies siue sit in ventri-  
culo, siue in intestinis, quæ anadosi inseruiunt, siue in vtrius-  
que, aliquando hæctica est, & in habitu, quæ scilicet in ipso  
corporum habitu firmata est, sic vt calore suppresso coctio-  
nem prohibeat, & cibum diluat humiditate: aliquando  
propter acidam pituitam diutius inhærentem, vt vult

Gale. comm.  
ad aphor. I.  
lib. 6.

Enteria à  
cæteris alui  
fluxionibus  
distincta.



## DE MORB. INTERNIS

Oribasius, frigidam, crassam & lentam, quæ replet rugosas & sinuosas partes, unde inducta læuitate cibus effluit. Nunquam quoque à medicamento lubricante, aut alimentis pinguibus. Irritatur autem facultas expultrix multitudine materiæ & acrimonia. Multitudine quidem, vt alimentorum multorum, aut propter venarum mesaraicarum obstructionem non distributorum, aut humiditate aliunde confluyente dilutorum. Acrimonia verò humoris tenuis, aut alimenti corrupti, aut exulceratione aliqua. Partes enim exulceratæ ex permeante cibo dolorem percipientes, eum à se propellunt.

Sequitur sæpè alios fluxus, diarrhæam, dysenteriam, aut longum morbum, tuncque ferè lethalis est. Quòd si excrementa non egerantur cruda, & imputrefacta, sed semicocta, fœtida, neque statim post cibi assumptionem, Cœliaca affectio dicitur, sitque ab iisdem causis, sed præcipuè à cibi corruptione ac cacochymia, & intemperie ventriculi, siue frigida, siue calida. Vnde Paulus scripsit Cœliacam con-

*Cœliaca affectio quæ.*

*Paulus Æg. cap. 40. li. 3.*

*Gal. ibidem.*

*Alui fluxus curatur quoque consideranda.*

Merito ergo Galen. reprehendit veteres, qui in his affectibus cibos effluere ob læuitatem intestinorum existimarent. Et si enim hæc quoque causa est, non tamen præcipua, & propria, sed imbecillitas potius, ob quam ventriculus & intestina grauata à cibis assumptis, ipsos confestim excernunt. In medicina facienda, tria imprimis cognito morbo spectanda sunt, An sit obstructio in venis mesaraicis, an humor acris, aut pituitosus, & an à capite fluat. Obstructionem indicabunt præter cætera grauitas in hypochondriis, excrementa chylosa, vrinæ tenues. In acrimonia & exulceratione seu abrasa superficie partium, cuiusdam morbus inerit sensus. In imbecillitate, deiectio nullum dolorem efficit. Humorem autem è capite defluere Hippocrates colligi vult ex spumosis excrementis. Quibus (inquit Aphor. 30. lib. 7.) in alui profluuiis excrementa spumosa sunt, iis ex capite pituita defluit. Sed hoc non est necessarium, vt Galenus monet. Nam cum causæ continentes spumæ sint spiritus humori mixtus, & motus inæqualitas, unde frangitur humor in multas partes, siue ob multitudinem calo-

ris, vt in iis, quæ elixantur, siue agitationem, vt in mari: potest à venis proximis, aut ventriculo, aucto feruore, aut agitatione humor cum spiritu mixtus excrementa reddere spumosa. Et in dysenterijs materia commota, & calore æstuante agitata videmus spumosas deiectiones fieri. Alia igitur signa adiicienda sunt ex his, quæ circa caput apparent, vt grauitas, multitudo sputi, quod manè & noctu vehementius fluat, ægri somnolenti sint, pituita defluente ad ventriculum molestiam quandam sentiant, & similia. Solent autem, quasi periodis quibusdam, à somno nocturna spumosa excrementa deicere, quibus faciliè cerebrum repletur & ventriculus humidior est. Est enim, vt Hippoc. scribit 4. de morbis, cerebrum pituitæ veluti fons quidam: quia velut cucurbitula incumbens corpori ex vniuerso corpore attrahat, ex quo fluxiones fiunt. Acidi ructus in principio demonstrant pituitam in ventriculo, aut frigidam intemperiem, nec dum prostratas esse vires, sed aliquo tempore cibos retineri, & veluti initium quoddam coctionis fieri. Sed aucta passione cessant, quod malum est. Bonum verò, cum post longum tempus superueniunt, ob eandem causam. Hæc igitur propria natura est, & essentia lænteriæ & celiacæ fluxionis. A quibus diarrhæa distinguitur, quia non alimenta, sed humores prauis, multa liquida excrementa, pituita, vel bilis altera, syncera vel mixta, vacuantur, siue ex toto corpore, siue ex aliqua parte.

*Cerebrum pi  
tuitæ fons  
Hippocrati*

*Diarrhæa à*

Natura enim sese exonerante, si orificium, supremæque partes valentiores sint, pylorus autem languidior, excrementa deorsum abiciuntur. Sin contrà, sursum repunt, & pro diarrhæa vomitiones excitant. Modus autem propulsionis eodem modo fit, quo in superiore, irritata excretrice, aut retentrica imbecilla. Symptoma est multorum morborum. Fit enim sæpe in declinatione alicuius morbi acuti, vel post morbos diuturnos, cum varij & diuersi humores purgantur, vel à cure astricta, à medicamentis constriquentibus, aëre, si post medicamentum purgans æger aëri se exponat, vel medicamentum sit violentius, aut si singulis annis bis aut ter ita soleat expurgari. Ab intemperie certè frigidior ventriculi multitudinem cibi non coquente, lænteriam creari potius quam

*lænteria &  
celiaca di-  
stincta.*

## DE MORB. INTERNIS

diarrhæam, consentaneum est. De dysenteria dicetur sequenti capite. Fiunt & multæ aliæ fluxiones, vitio alicuius visceris, vt inflammatione hepatis, tumore lienis, & similibus quæ ad alia capita referri debent. Memini me fluxum quendam diuturnum in multis obseruasse, in quo varia, opima, nigra, cœrulea, viridia, satis corpulenta excernebantur. Ex quo alios euasisse, vt Aduocatum De la Vergne Anglum Pædagogum filij legati Angliæ, & alios, vidimus alios interiisse, vt Malicornium Ducem celebrem peditatus in exercitu. Haultemanum fabrum argentarium, & similes. Omnibus

*Leientericorum historia*

ferè vitium in visceribus, & vlcus in postremo intestino. Dominus Datchy in vico Templi post sextum annum, quo eo morbo laborauerat, interiit obfessio hepate multis vomitis, syderata parte mesenterij. Goræus eo morbo in secundum annum functus conualuit. His, qui conualuerunt, interuallis idem morbus rediit, vel dysenterica excrementa. Anno 1558. Autumno dysenterix salutes iisdem excrementis. In fine purulenta egerebant, de quibus sequente capite. In omnibus cerrè Aphorismus Hipp. notandus. Si qualia purgari, &c. Et cum duobus modis vacuatio moueatur in nobis, primùm beneficio naturæ, vt in acutis morbis, diebus criticis: in longis autem & hominibus sanis, statis temporibus & periodis; deinde à qualitate quadam morbosa, & vi morbi, inordinatè & sine periodis: Medicus his fluxionibus obfistere debet: illas sequi, & tardiores iuuare, materiamque naturæ cõparare, & comparatam, si natura cessit, vacuare: si vacuatione nimia offendatur, compescere, vt & si sit periculum vel ex transitu humoris, vel læsione alicuius partis, vt in Phthisicis pulmonum inflammatione & costarum, longa difficultate intestinorum ex scirrho lienis, & similibus.

*Vacuatio duobus modis in nobis mouetur.*

In diarrhæa, leuiora initio, ne quid in gracilioribus intestinis retineatur, lac, topica, sacculi, vnguenta, fofus, cataplasmata, purgatio, clysteres, opiatæ, cucurbitulæ, fumigia, pulueres. In lænteria, purgantia, confectiones, emplastra, vnguenta, pilulæ, inunctiones, in aluo iusto humidior, parcior potus, isque ad vesicam diuertendus. Vbi aluus siccior, largior potus, isque ab anadofi prohibendus. Vinum tenue & calidum, medicamenta diuretica, mo-

rus criticus, multas vrinas faciunt, vnde parua deiection, quia materiæ pars, quæ per aluum fluere, ad vrinas diuertitur. Sicuti multa eunte deiectione vrina pauca, aquosa, humore ad intestina conuerso. Sudor minuit & deiectionem & vrinam.

## ANTO. VALETII EXERCIT. XLII.

**A**lui fluor, qui communi nomine diarrhæa appellatur, tres causas potissimas, præter intesti-  
Diarrhæa nomine omnis alui fluor significatur.  
 norum & ventriculi intemperiem, agnoscit: humoris nimirum molesti copiam, qualitatem, vel vtrâ-  
 que. Fit autem vel ventriculo & intestinis primariò affectis, vel per consensum cerebri, hepatis, corporis totius. A cerebro quidem fluor est spumofus: ab  
Fluor alui summa curatio.  
 hepate chylofus: à liene niger: à toto corpore pinguis & graue olens. Si à cerebro fiat, vt pote catarrhò in aluum ruente, fons mali primùm cathartici humori accommodatis ex capite de catarrhò re-  
1 Quæ tempestas humor, qui in peculiari cunctisque natura redundare cõsuevit, exitum non habet.  
 petendis exhauritur, nisi fortè naturæ satis per se exercernenti totum negotium committatur. Deinde verò excipiente parte confirmata sæpe viribus exolutis consulitur. Quod idem in fluxione alui à reliquis causis procurandum. Quæ ventriculum roborant sumpta & admota, ex capite de ventriculi imbecillitate petantur.

De Dysenteria. CAP. 43.

**H**yme 1 aquilonia, Vere 2 australi & plu-  
3 Vt viri et mulieribus præhumidis, quibus nõ est perspirabile corpus.  
 uioso, calida Æstate, Æstatis fine & Autumno dysenteria fiunt otiosis, intemperatis, & quibusdam 3 naturis peculiariter, vt lentiginosis.

Nam antecedentibus anni partibus pituita cras-

# DE MORB. INTERNIS

4 Cū pituita  
viscida ad  
sphincterem  
adhærescit,  
& rectum in-  
testinū exul-  
cerat.

5 A tenuibus  
quidem, san-  
guis faci om-  
ni ex parte  
permixtus: à  
crassū, nullo

modo, aut in-  
æqualiter.  
6 Unde de-  
fectiones opi-  
ma, pauca &  
albe.

7 Proprie  
dicta, cū  
vltus serpit  
per omnes in-  
testini an-  
fractus.

8 Lenienti-  
bus, detergen-  
tibus adstrin-  
gentibus, & ci-  
scatricē indu-  
centibus.

9 Vt hamor-  
rhoidum, aut  
menstruorū.

10. Unde in-  
firmi tatis,  
& syncopes  
metus adser-  
par.

fa & viscida in intestinis colligitur. Quòd si bilis non pro ratione è cysti fellis in intestinum defluit, nec eam pitu tam pro consuetudine deterget, multò copiosior pituita in intestino, & bilis toto corpore aceruatur, acceditque cruditas. Hac omnia æstiuo calore putrescunt. Primùmque illa pituita acris euadit: intestinū vellicat: fit deiiciendi 4 appetentia inanis aliquādo, at interim pauca, vel cum maximo conatu mucosa, & similia albuminibus ouorum egeruntur.

Fit etiam aliquando, vt acrimonia eius humo- ris clausulæ venarum intestini referentur, & ita ali- quid sanguinis vnà cum mucosis illis excrementis 5 deiicitur. Hoc malum non dysenteriam, sed te- nesmum appellari volunt. Tum dysenteria est, cum bilis illa putris magno impetu in intestinum con- fluit, & grauius exulcerat. Radit primùm 6 pin- guia, quæ intestina adnata sunt: deinde ramenta: postremò etiam sanies effluit. Excrementa illa fe- rè spumosa sunt, quia in dysenteria & febris, & in- flammatio est. Itaque motu & calore spuma exci- tatur.

Omnis 7 dysenteria exulceratio est intestini, aliquando totius quidem, aliquando huius vel il- lius: quod ad curationem distingui oportet, ex cap. 43. lib. 9. Aëtij.

Curatio est in phlebotomia, purgatione, clyste- ribus, 8 potionibus, & externis remediis.

Corpore beñe carnosio, graui febre atque inflā- matione, suppressa aliqua solenni 9 vacuatione, sanguine multo 10 cum excremētis abeunte, con- sentiente ætate & viribus, vena secari potest, etiam si

Gal. in Comment. ad Glauco. & lib. 4. de ratione  
 victus in acutis repugnare <sup>11</sup> videatur. Verum quia <sup>11</sup> Imò nō re-  
 assidua egestione, perpetua <sup>12</sup> vigilia, febre atque <sup>12</sup> pugnat Gal.  
 inflammatione vires maximè laborant, temperan- <sup>12</sup> dum venase-  
 dum vacuandi consilium est. Itaque alij humera- <sup>12</sup> ctionem in  
 lem, alij venas extremæ manus aperiri volunt, quia <sup>12</sup> diarrhæa pro  
 hinc minus virium cum sanguine effunditur. Potest <sup>12</sup> hibet, non  
 & basilica aperiri, sed angusto foramine, & paula- <sup>12</sup> item in dy-  
 tim reuulsa atque etiam vacuata materia. In sup- <sup>12</sup> senteria.  
 pressis purgationibus inferioribus <sup>13</sup> venas mal- <sup>12</sup> Ob fre-  
 leoli aperiri iubent. Quod si fit, èò magis tempe- <sup>12</sup> quẽtem dei-  
 randa vacuatio, quòd hinc ductus sanguis <sup>14</sup> plus <sup>12</sup> ciendi cupi-  
 virium, quàm è manu exhaurit. <sup>14</sup> <sup>12</sup> ditatem, &  
<sup>14</sup> <sup>12</sup> anathymia-  
<sup>14</sup> <sup>12</sup> seos somni fe-  
<sup>14</sup> <sup>12</sup> re inopiam.

Eadem quoque controuersia de purgatione.  
 Sed iam indubitatum est, vbi & morbi magnitu- <sup>13</sup> Vi fiat hu-  
 do, & <sup>15</sup> cætera non repugnant. Nullum autem <sup>13</sup> mor κατάρ-  
 præstantius pharmacum <sup>16</sup> rhabarbaro, à quo pur- <sup>13</sup> ρος, qui e-  
 gatio non solùm semel conuenit, sed si res exigit, & <sup>13</sup> rat ἀνάρρ-  
 vires permittunt, sapiùs <sup>17</sup> repetenda est. <sup>13</sup> ρος, viām-  
<sup>17</sup> <sup>13</sup> que ad loca  
<sup>17</sup> <sup>13</sup> commoda aj-  
<sup>17</sup> <sup>13</sup> fectet.

In purgatione consilium esse debet, vt obstru- <sup>14</sup> Tū quòd  
 ctiones liberentur, & via facta, redundans materia <sup>14</sup> partes supe-  
 vacuetur. <sup>14</sup> riores plus  
<sup>14</sup> <sup>14</sup> habeant san-  
<sup>14</sup> <sup>14</sup> guinis, quàm  
<sup>14</sup> <sup>14</sup> inferiores.

Nec <sup>18</sup> de adstrictione initio cogitandum est. <sup>15</sup> Vt neque  
 Itaque <sup>Δ.4.</sup> plus aut minus rhabarbari imperentur. <sup>15</sup> vires, neque  
 Infundantur in aqua endiuix, aut simili, quæ vim <sup>15</sup> atas, neque  
 habeat liberandæ obstructionis. Aliquando <sup>5</sup> 6. <sup>15</sup> anni cōditio.  
 syrup. ros. de siccis, nō tam adstringendo, quā robo- <sup>16</sup> Neque  
 rando commiscantur. Nonnunquā aromata, cornu <sup>16</sup> enim nature  
 cerui, vnicornis, admiscenda putant. Multò ma- <sup>16</sup> studet & pu-  
<sup>16</sup> <sup>16</sup> gnat cum morbo.

<sup>17</sup> Ob perennem humoris morbifici generationem.  
<sup>18</sup> Me u inflammationis febris, & translationis symptomatica humoris morbifi-  
 ci ad nobiles partes, vnde pleuritis, peripneumonia, epilepsia.

# DE MORB. INTERNIS

19 Initio  
hac poterit  
prescribi po-  
tio, cum va-  
cuandi consi-  
lium aderit.  
℞. rhei elec.  
3 2. macerē-  
tur in liquo-  
re stillitio  
endiuiæ &  
cichorij. f. le-  
uis expressio:  
cui misce 3. i.  
syrupi viola-  
f. potio.

20 Præsta-  
bit dilutum  
exhibere cum  
fortis expres-  
sione. Sic etiā  
partes quāf-  
que subibit  
rhabarba-  
rum, cum a-  
liquo torre-  
factum pri-  
mas tantum  
venas per-  
meat. Adde  
quod rheum  
torrefactum  
acrimoniam  
acquirat, pro-  
pterea que in-  
testinis ini-

gis, ubi popularis dysenteria est, & suspitio virulen-  
tæ materiæ. Cornu ceruinum crematum prius, de-  
inde elotū, dysenterias scribit sanare Galenus. Nec  
alia vis est vnicornis, nisi quod arbitrantur valere  
contra venena omnia. Itaque 19 potioni è rhabar-  
baro Gr. 4. vnicornis, aut plura, aut cornu cerui ad  
℥. i. misceri possunt. Practici plurimum vtuntur  
myrobalanis. Dioscorides manifesta quidem ratio-  
ne agarici 3. i. imperat, ubi mucosa & pituitosa de-  
iiciuntur. Neque à ratione alienum, ubi non ita vi-  
tiosa sunt excrementa, & obstructions multæ sunt,  
descenduntque muculenta, expressioni 3. i. rhabar-  
bari infusi in aqua endiuia aut cichorij adiicere ex-  
pressionem agarici trochiscati pondere ℥. i. infusi  
in melle rosato colato. Practici loco agarici expres-  
sione 3. 2. aut 3. carthami in sero lactis infusi, aut  
melle rosato, vtendum putant. Nonnunquam po-  
lypodio. Sed præ cæteris rhabarbari vsus proban-  
dus est. Procedente morbo infusioni 3. i. rhabar-  
bari ℥. i. eiusdem in puluerem redacti admiscere  
licet. Postremò etiam 20 torrefaciunt, cum iam ad-  
stringendi consilium nascitur. Maximè confert ma-  
stichina aqua è tb. β. aqu. & 3. i. mastich. simul co-  
ctis vinum diluere. Vel deligetur aqua cysternæ, in  
qua incandens aurum fuerit extinctum.

Quod ad clysteres, & ad cætera remedia attinet,  
videndum ne initio adstringentibus vtamur. Ad-  
stringentia febrem augent & inflammationem, vi-  
tiosam materiam prohibent ne effluat, eaque pro-  
micum. Itaque cum adstringendum erit, sic imperabis. ℞. rhei electi in tenuiss  
puluerem redacti 3. 2. macerentur in liquore conuenienti: f. fortis expressio: adde  
syrupi ros. de siccis 3. i. f. potio.

hibita regurgitat in partes superiores.

Hinc grauior febris incenditur, epilepsiæ fiunt & conuulsiones, aliâque eiusmodi mala enascuntur. Adde quòd adstringentia intestinorum vlcera exasperant.

Sed adstringentium tempestiuus vsus est iam vacuata in totum, vel magna ex parte, vitiosa materia, quòque tempore iam excernitur cum vitioso frugiflucus, & inde virium casus metuitur.

In adstringentibus, quæ leniùs id præstant, meliora sunt, deinde ad fortiora progredi licet. Videntumque est, vt adstringentibus partim lenientia misceamus, partim etiam, si per os sumuntur, ea <sup>21</sup> quæ vrinas ducant. Sic enim fit, vt nullo periculo materia prohibita ad vrinas diuertat, nec refluat in partes nobiles & superiores. Quo tempore confirmandum hepar est, ne tam facilè humores è corpore reliquo recipiat. Quod efficiunt cerati santalini <sup>21</sup> *Videh- stor. 2. vni- uersal lib. 1. τῶν ἐπιθυμ. vbi de strangu- riosis agit Hipp. deri- uatione ab aluo ad renes facta.* <sup>3.</sup> 3. malaxatæ cum oleo rosaceo, extensæ in aluta, vt fiat scutum ad modum crescentis pro hepate. Cætera quoque, quæ capite de debilitate hepatis à calida causâ dicta sunt. Eadem ratio stomachi & ventriculi habenda est ex iis, quæ propriis capitibus descripta sunt. <sup>22</sup> *Nam initio potior esse debet materie cura, quàm vlceris inchoati.*

Clysteres primùm leniant: deinde detergeant & abluant: postea etiam carnem regenerent, & consolident. In quibus si oleum dissoluatur, dulce <sup>23</sup> sit, non falsum: aut si falsum est, priùs abluatur, vt falsuginem deponat, & omnem alienam qualitatem. <sup>23</sup> *Vt oleum cōmane, violac. amigdal. duic.*

Clysteribus lenientibus optimum est admisceri



24 *Vel rosa-  
rū p. ij. viol.  
M. i. Velle-  
nientem cly-  
sterē sic præ-  
scribes. ℥.*  
quod intestinum roboret. In detergentibus & re-  
liquiis intestinorum sensus, & nuditas prius cogno-  
scenda est. Alia enim intestina vegetiore sensu sunt,  
nec ita inducta pituita, non ita carnosa, quibus cle-  
mentiores clysteres conueniunt.

*Clysteres lenientes.*

*violariæ, al-  
th. lactuc. pa-  
riet. summi-  
tatum anethi  
an. M. i. pru-  
nor. n. 14 fur-  
furis macer.  
hord. integr.  
ros. ana p. i.  
seminis alth.  
psil. & cydo.  
ana ʒ. 2. rad.  
althææ ʒ. i.*  
℥. 24 ros. M. i. Fiat decoctio in lacte recens mul-  
cto ad lb. i. β. Colatura fundatur tepida, diu retinea-  
tur. Dolorem mitigabis, temperabis ardorem, vlce-  
ra ablues & detergebis, illines intestinum, solidabis,  
roborabis, vim acrium humorum obtundes. Gale-  
nus. Oribasius, Aëtius, solo lacte recens multo vsi  
sunt. Aliud.

*psil. & cydo.  
ana ʒ. 2. rad.  
althææ ʒ. i.*  
℥. 25 ol. ros. ad lb. i. leuiter calidum pluribus ho-  
ris retentum dolorem & inflammationem mitiga-  
bit. Poteris addere semissi libræ olei rosarum, deco-  
ctionem maluæ & fœnugræci, seminis lini, althææ  
& cydoniorum, aut horum mucagines pari mensu-  
ra commiscere.

*yr. recentis,  
vel ol. amyg.  
dulc. ʒ. 2. mel-  
lis rosati ℥.  
facchari rub.  
an. ʒ. i. β. vi-  
tellos ouorum  
duos f. clyst.*  
Alij lb. i. olei amygdalarum dulcium, mucaginis  
sem. cydoniorum extractæ in lacte ʒ. 4. adiiciunt.

*Quod si ro-  
borandi con-  
silium est, ad-  
de mucaginis  
fragacanthæ extractæ in aqua plantag. ʒ. 3. aut ʒ. 6.*  
Conuenit amygdaloga, vel orizoga, hordea-  
tum, auenatum, liquidiora ad lb. i. infusa cum buty-  
ri recentis ʒ. 3. aut pari pondere adipis anatis, anse-  
tis, gallinæ, pinguedinis hirci, caprarū. His enim tu-  
tius vtemur, si quia olei qualitas suspecta est. Amyg-  
daloga & orizoga leniunt magis, & contempe-  
rant. Hordeatum etiam refrigerat. Auenatum sic-  
cat. Conuenitque magis in tenuibus fluxionibus.  
Ad easdem valet syrupus rosa. de siccis, diacodyon  
25 *Hæc ad materiam,  
non ad vlcus, præscribuntur.*

sine speciebus: horâ somni datur.

Rhazes non habere parem scribit in dolore ab *Rhazes lib. 9 ad Al-*  
 acrimonia, olei rosati lb. i. ss. muscillaginis sem. psilij *mans. cap. de*  
 3. 4. Laudatur & hic clyster. *dysenter.*

℥. sem. lini, althææ, psilij, conquassatorum ana 3.  
 ss. sem. cydoniorum, orizæ & tritici in regula tosto-  
 rum ana p. i. fiat decoctio in lacte ad lb. i. ss. In co-  
 latura fortiter expressa dissolue sæui hirci, aut pin-  
 guedinis rasæ ex abdomine arietis 3. 2. butyri recen-  
 tis 3. i. sacchari violati 3. i. ss. ouorû vitella 2. Vitella  
 miscemus leniendo, & vt diutiùs inhæreat intesti-  
 no, quod infusum est. Similiter & sepum, & quic-  
 quid pingue est, saccharum & mel detergendo. Vti-  
 mur albissimo saccharo, vt lenissimo: gressu verò  
 appellato, vt magis detergente.

Hoc etiam magis melle rosato & communi.  
 Celsus hoc clystere dolorem mitigat, appetentiam

26 *Ab humo-  
ris acrimo-  
nia, statu, ut  
affect. de qua-  
dam int. stini  
camerofa.*

℥. decocti foliorum rosatum quartaria v. vitella  
 ouorum 2. In Dysenteria ferè 26 tormina sunt &  
 flatus. Qua in re summitatû anethi & chamæmeli,  
 florum anthos & meliloti aliquid miscendum est.  
 Contrà verò sanguinis excretiones taxo barbaro,  
 plâtagine, bursa pastoris, cētīnodia, fragaria vtimur.  
*Clysteres 27 detergentes.*

27 *Quibus  
pugnatur cū  
ulcere et acri-  
monia mate-  
rie.*

Aqua hordei, serum 28 lactis cum melle, aut sac-  
 charo ros. Similiter hydromel. decoctum cicerum  
 rub. parietariæ, furfurum, vinum rubrum, deco-  
 ctum betæ, 29 centaureæ, radicis cucumeris agre-  
 stis, ficuum pinguium, absynthij, lupinorum. Ho-  
 rum vnus quartaria quinque aut libra. In quibus  
 dissolue mell. ros. sacchari. rub. ana 3. i. ss. Aliquâdo

28 *Aut etiâ  
lacrimum,  
quod multum  
habet feri, in  
quo vñ est  
detergendi.*

29 *Minorū,  
si inflamatio  
nulla sit.*

# DE MORB. INTERNIS

30 *In aqua semuncia terebinthinæ 30 liquidæ cum 3.2. salis 31 plantag. aut communis. Aut vt detergeas & lenias, detergentia rosarū lota. coquuntur in lacte.*  
 31 *Ad pituitam contumacem.* Vel. ʒ. aqu. hord. lb. 1. succ. plantag. ʒ. 4. vitella ouor. 3. f. clyster.

Fuerit quoque vtile rosas, plantaginem & similia adstringentia admiscere, vt robores. Vt materia cōtumax est, quæ inhæret intestino, plus minúsve detergebis.

Fortiores sunt clysteres ex vrina, lixiuio, muria, falsugine, aqua fassarum oliuarum. Fortioribus vtêris, vbi leuioribus nihil effectum est. Detergentibus dolor interim exasperatur. Itaque reddito clysterē detergente, lac recens mulctum iniicies, aut clysterem qui leniat.

In carnosis intestinis regeneranda caro: in membranosis consolidandum est. Carnem regenerabis clystere, qui primū abluit, deinde impleat carne. Ablues ē sero lactis & saccharo, ex vino calido, austeriusculo, mulsâ, & similibus.

32 *Sunt hi pulueres sacrotici.* Deinde commiscebis ʒ. 2. pul. 32 gentianæ, thuris, enulæ: tetrapharmaci ʒ. 1. vel eo plus: aut liquori commiscebis mellis, terebinthinæ & butyri ana ʒ. 6. Optimūque fuerit hos clysteres 33 diutiùs retineri, crassiores fieri additis ouorum vitellis.

33 *Ad leniendū, cōfirmandum & detergendum.* Consolidant & cicatricem ducunt decoctiones adstringentiū, in quibus terræ sigillatæ, boli armen. sanguinis draconis, thuris aut similium ʒ. 2. vel eo plus misceantur.

Sunt autem adstringentia alia calida, alia frigida. Calida, nardi spica, absynthium, cinamomum, caryophyllum, calamus aromaticus, lignum aloë,

galla, thus, mastiche, manna, aloë, myrrha, viscum.  
 iris, gentiana, aristolochia, enula, styrax, 34 propo- 34 *Hæc ta-*  
 lis, salvia, arthemisia, thymum, origanum, rosmari- *men ex Ga-*  
 nus pœonia, anisum, ammi, cuminum, nasturtium, *leno vim ha-*  
 coagulū hædi & leporis, caseus inueteratus in aqua *bet attrahens*  
*di.*  
 coctus, siccatus, & in puluerem redactus.

Frigida, hyoscyamus, portulaca, lenticula palu-  
 stris, plillium, semperuium, cichorium, polygonū,  
 lactuca, vmbilicus veneris, oxalis, violaria, cucurbi-  
 ta, atriplex, solanum. Sed hæc non ita adstringunt,  
 35 quia humidiora sunt: quæ sequuntur magis. 35 *Omnia*

Vitis capreoli, arnoglossum, rubus, myrthus, ba- *enim quæ*  
 laustia, malicorium, rosa sicca, corna, sorba, pruna *adstringunt,*  
 sylvestria & pira, mespila, galla, thus, berberis, aca- *crassiora*  
 cia, hypocystis, terra sigillata, hæmarites, bolus ar- *sunt.*  
 na. sang. draconis, salix, coriandrum in aceto mace-  
 ratum, carabe, caphura, corallus, margarita, cornu  
 cerui, santali, spongia ex aceto expressa, imbuta pi-  
 ce, deinde cremata. Interior tunica ventriculi galli-  
 narum, erinaceorū, papauer, hyoscyamus, opium.

Aliud est genus clysterum in putridis ac serpen-  
 tibus vlceribus intestinorum, in quibus caustica  
 dissoluuntur. Fiunt pastilli caustici ex arrhenico,  
 calce viua, auripigmento rubro, mixta acacia, & iis  
 quæ adstringunt. Coguntur ex succo plantaginis,  
 ex vino cocto, fiuntque pondere 3. i. 2. aut 3. Dissol- 36 *Vt ℥.*  
 uuntur autem in ℥. i. vini diluti, in lacte & aliis de- *pastillorū de-*  
 coctis lenientibus. *scriptorū 3.*

Sunt 36 qui addant singulis 3. eorum pastillo- 2. opii. 5. an.  
 rum singula Grana opij, antequam infundantur. *I Dissoluan-*  
 Bucella panis ex aqua frigida, lacte, aut diluto vino *tur in lib. i.*  
 exhibenda est. *lact. f. ene-*  
*ma.*

# DE MORB. INTERNIS

37 *Quod per  
sympateriam  
intestini la-  
befactatur.  
38 Ut masti-  
chino, men-  
tha, cydonio-  
rum, absyn-  
thij.*

Stomachus 37 myrthino oleo, aut 38 simili ro-  
borandus est. Præterea muniendum caput, ne ar-  
dore clysteris offendatur. Quod si infuso stoma-  
chus exurit, detur frigida ad ʒ. 4. lectuæ cauli-  
culi ex aceto. Retineri oportet quod infusum est  
ad horam, quod minimum sit, vel duas, quod plu-  
rimum. Si verò non retinent, sed statim eiciunt  
clysteres, muria prius, aqua marina, lixiuium, vrina  
cum sale iniicienda.

Anus ex decocto adstringentium fouetur, vel  
sacculo è milio & sale expresso in vino nigro ad-  
stringente. Post hos clysteres, lac recens emulctum  
iniiciendum est.

39 *Ad ex-  
purgationem  
materie, par-  
tium ro' ur, &  
meatum lu-  
bertatem.*

Clysterum vsus, vbi exulceratio in inferioribus  
intestinis. Si verò in superioribus, potiones conue-  
niunt magis. Quanquam perpetuò 39 vtrisque re-  
mediis vti licet. Et potionibus 40 quidem eo ordi-  
ne, qui in clysteribus præscriptus est, exceptis cau-  
sticis.

40 *Ut primò  
lenientibus.  
mox deter-  
gentibus, po-  
stremo ad-  
stringentibus.*

Ad adstringendum conueniunt potiones om-  
phacomeli veterum. Nunc syrupus de agresta, de  
myrthilis, de ribes, succus cornorum, mespilorum,  
cotoneorum, sorborum, prunorum sylvestrium.  
Coquantur succi, & aliquid sacchari rosati admi-  
sceatur. Aqua decoctionis sumach, mastiches, & re-  
rum adstringentium. Alumen tritum ʒ. i. pondere ex  
ouo. Similiter symphyti radix, pumex tenuissimè  
tritum cum vino austero, saluie decoctum, lac vstu-  
latum, cum ʒ. i. stercoris canini, aut in quo radices  
quinquefolij, consolidæ maioris, & similia coxe-  
rint, vel in quo calculi, vel fluuiatiles, vel marini  
igniti prius extincti sint.

Coagulum

Coagulum leporis vel hædi 3. 1. pondere è vino veteri abluitur. Datur cum aqua decoctionis sumach, mastiche, succo plantaginis depurato. Pulvis factus è turture cum bolo armena, sanguis draconis, & mummia contusa vase testaceo benè lutato, & ita cremata. Dantur 3. 2. ex lacte ouillo cocto.

Conueniunt cydoniatum, conserua rosarum, cornorum, symphiti, & similes. In aquæ rosar. lb. 1. bulliant mastiches, sumach, caryophyl. ana 3. 1. β. fiat decoctio ad 3. 8. pro tribus dosibus. Ouum 41 ex aceto frigitur: deinde conspergitur pulu. adstringente.

Ossa femoris bouilli trita, alumen in succo plantaginis dissoluitur. In eo linteolum immergitur, sicatur, vritur, fit pulvis cōueniens. Succus expressus ex stercore asinino. Est aliquando, cum multum sanguinem fundunt. Frigida cibaria iis conueniunt vt aliis dysentericis tepida ac calida. Clysteres itaque, vt priùs. Hæc verò potio, macis, balaustiorum ana 3. 1. Dato 3. 1. aut 3. 4. ex vino adstringente, aliisque remediis vttere, quæ sanguinem sistunt capite de sputo sanguinis.

41 Acid vetricula nocet.

Experimentum cuiusdam est, vt herba Verrucaria, quam Sancti Fiacrij vocât, cum bursæ pastoriæ æquis partibus, aceto & sale additis, tundatur & plantis ægri admoveatur. Atque vbi exsiccatur innouantur. Alij centinodio ita vtuntur.

Sudor excitatus plurimùm prodest viribus valentibus, balneo aut suffumigio ex rebus sudores mouentibus.

42 Aut etiã vasculū aqua feruente plenum, nisi resolutionis hepaticæ metus aliquis immineat.

Later calfactus, & vino albo conspersus, inuolutus pannis adhibetur 42 plantis pedum.

## DE MORB. INTERNIS

Narcotica conueniunt nondum deiectis viribus. Syrupus de papauere, aqua ros. tepida, in qua coxerint semina papaueris albi.

Suppositoria, vt priùs. In clysteribus dissolue 3 i. trochiscorum de carabe, aut philonij perfici. Quibus si nihil proficimus, dabimus ʒ. i. aut 3. ʒ. ex decoctione mastiches. Philonium capite de colico dolore proximè descriptum, & alia iam multis locis descripta.

Inungendus est venter primùm quidem iis, quæ leniunt: deinde quæ adstringunt, vt oleo de cydoniis, de spica: aut cydoniorum carnes in aceto coquendæ sunt, detractis interioribus, deinde malaxatis. Adde trochiscorum de carabe 3. i. mastiches 3. i. ʒ. Fiat emplastrum, quod fumigetur cum ligno aloës.

Consulendum viribus ex iis, quæ dicta sunt de sputo sanguinis. Ratio vitæ instituenda pro rei necessitate. Leniendum enim, detergendum & adstringendum.

### EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

*Dysenteria  
differentia  
quatuor ex  
Hippoc. &  
Galen.*

Apud Hippocratē & Galenum dysenterix differentix quatuor reperiuntur, sed tres priores improprie dictæ. Vna, à copia sanguinis toto corpore redundantis, qui è venenarum orificiis apertis in intestina effunditur, vt in hæmorrhoidibus, è venis ani. Vbi vi morbi & vitio corporis, non prouidentia naturæ excernitur, malum: itaque etiam quoties demittitur sanguis per vias alienas. Sed quædam est naturalis vacuatio sanguinis, vt per vterum mulieribus: quibusdam per nares: aliis in crisi nonnullis per hæmorrhoidas, naturâ expurgante vitium grauioris mali. His vacuationibus suppressis, aut intermissa exercitatione, aut truncato membro, certis interuallis solet huiusmodi dysenteria contingere, quam

eruentiam vocant, Græci αἵματι δὴ. In hac sæpe etiam sanguis niger pici liquidæ similis excernitur. Nam cum hepar sanguinem conficit, eius crassiorem partem lien attrahit, & alimento tenuiori inde sumpto reliquias deiecit deorsum. Si verò hepar multum limosi sanguinis colligat, lien non expurget, neque attrahat, aut attrahat quidem, sed præcopia, aut debilitate non conficiat, aut excrementa sua non expurget, utroque viscere copia oppresso & debili factò, fiunt deiectiones nigrae: aut cum antè solita essent expurgari per hæmorrhoidas, vterum, aut hæmorrhagiam, si supprimatur solennis purgatio, acervatur humor, & per intestina vacuatur. Sed cum triplex sit materia atræ bilis, sanguis crassior, ut vinum crassum deposita sæce, limus & sæx sanguinis crassioris: & bilis flava: de his deiectionibus intelligimus, quæ nigrae sunt, neque grumescunt, nec quicquam acre, corrodens, vel acidum habent, nec effusæ in terram, feruent, aut fermentant terram, sed sunt veluti sanguis niger, aut limus sanguinis, qui salubriter è corpore sæpe expellitur, & si retineatur diutiùs, in atram bilem exquisitam transit, & extra vasa nigrescit ac corrumpitur, unde multis interitus contingit. Ob idque optimè de similibus vacuationibus Hippoc. Sanguinem quidem supra ferri qualiscunque sit, malum: infra autem, bonum: cum niger deiecitur. Nā partes inferiores superioribus minùs principes. Deinde leuatur natura excremento melancholico, unde & morbi graues solui possunt, & declinari. Sed reuera multis distinctionibus est opus: nū vi symptomatica, naturā, arte exeat, quid inde fructus, quidque sequatur incommodi: num signum, an causa, an utrumque. Altera dysenteriae species à Paulo sub priore comprehensa, à Galeno 3. de Sympt. causis distincta, sit non propter sanguinis copiam, sed acrimoniam, bile flava vel atra permixta, unde stimolata venarum orificia aperiuntur. Potest initium esse à causā frigida, quando crassa & viscida materia, interceptis angustis hepatis, putredinem quandam contrahit, unde cruentæ ac saniosæ deiectiones prodeunt aucto feruore. Hæc priore periculosior, aliquando tamen salutaris. Morbo inclinate, à pharmaco expellente nihil periculi. Si verò pri-

Hippo. apho.  
25. lib. 5.

Paul. Aeg.  
neta cap. 42.  
lib. 3.



## DE MORB. INTERNIS

cipio & incremento febris, periculum denunciat. Melius autem quando parcius, quam cum copiosius effunditur. Multos ipse observauit stantes & sapius deicientes, nigra etiam feci aut pici liquidæ similia salutariter, & in febre, sed natura superante, & non in principio. Natura enim initio coquit, non vacuat, in coctis separat vtilia ab inutilibus. Hæc victrix excernit. Ea enim est naturæ cœconomia. Acrimoniâ autem irritante, excrementisque magnam viscerum adustionem & putredinem indicantibus, visceribus nobilibus grauer laborantibus, superaffato crassiore sanguine vel bile, putredine quadam contracta, lethale, quia superior morbus. Bonum verò, cum natura vi medicamenti adiuta ruffi aliquid, vt à Rhabarbaro: nigri, à cassia & Cathol. aliisque id genus excernit, vitio cuncto. Cauendū etiam hoc loco, ne frequentius permeante acri humore, vlcus in intestinis contrahatur, semperque à bile deiectiones synceræ metuendæ, & vt causæ, & vt signa grauiorum affectionum. Tertia species est hepatica dysenteria, cum aquosus sanguis deiicitur, loturæ carniū persimilis ab imbecillitate retentricis & alteratricis in hepate, de qua superius dictum est capite de morbis hepatis. Quarta maximè propriè dicta facta in intestinis ab vlcere cum torminibus ventris & dolore, præsertim cum fluunt, vel redduntur excrementa alui. Aliæque à tenesmo, aliæ à diarrhœa incipiunt. Et in aliis acris materia, in aliis mucosa erigitur. Quærit Galen. §. de vsu partium. Quomodo illic fieri possit vlcus. Nam cum sentiant intestina, & vel naturalem bilem, aut leuiter atram statim expellant, qui sit vt descendente materia acri, & celerius expulsa, fiat vlcus? Respondet transitu per anfractus & circumuolutiones id fieri, bile acriore vtrâque, pituitâ verò sæpe inhærente intestino. Putrescit enim, & falsuginem contrahit, sicque exulcerat. Vnde etiam sequitur à quolibet humore dysenteriam veram fieri posse, sanguine acriore (qui aliquando in intestinis concretus refert etiam bilem) pituita, bile vtrâque. Periculum intelligitur ex natura vlceris & humoris vitiosi. In vlcere enim primò videndum quousque progressum sit ex recrementis abrasis ab intestino, vt intelligatur

*Dysenteria  
hepatica.*

*Dysenteria  
maximè propriè  
dicta.*

an adhuc sit, an factum sit. Interior tunica intestinorum carnosior : exterior magis membranosa : tertia è peritoneo. Constant fibris circularibus & transuersis, additis rectis, vt non sine ratione quibusdam visum est, ad attrahendum, & ad firmamentum aliarum, præcipuè in recto : quod, quia magis laborat in egerendo stercore duro, pluribus fibris præditum est. Canibus eadem ratione plures fibræ in intestinis, quia non nisi magno conatu excernunt. Sua ergò intestinis, carnosæ substantia, quæ semel exesa & crassa eò grauius periculum denunciat, quò profundius abraditur. Primum pinguedo quædam & mucus apparet. Deinde effloratio quædam & ramenta ex superficie, vt in epidermide cutis. Postremo substantia corpulenta intestini. Est autem veluti caro, non vt musculorum, sed peculiaris intestino. Cum qua cruenta deiectio sequitur, interdum vlcera crustulæ, & puris magna quantitas. Abraduntur enim primò intestina : deinde exeduntur : postremò vlcera. Magna ergò parte exempta huius substantiæ membranosæ, ea neque renasci potest, neque cicatrice tegi. Vnde desperatio. Galenus quidem scribit multos fuisse seruatos putrefacta interiore tunica, integra exteriore. Sed hoc in eorum numero Gal. lib. 4. merum referatur, quæ accidunt aliquando. In iudicando de vsu part. tamen multi decipiuntur, quòd sæpe pingue aliquid similitudine fallat, vt albida caruncula videatur. Sed pingue iniectum carbonibus liquatur, & nidorem pinguedinis effundit. Caro nigrescit & siccatur. Cruor & ramenta cum excrementis mixta, nec statim à dolore reiecta, in tenuioribus : supernatantia, & statim post dolorem reiecta, in inferioribus intestinis & crassis esse ostendunt. Quod attinet ad humorem, qui deiicitur, Hippocrates sinceræ omnes deiectiones periculosas esse vult. Tales sunt, impermixtæ Gal. commēt. aquosæ humiditati, quando solus humor qui vacuatur, de ad aphor. 23. iicitur, siue sit biliosus, siue melancholicus, siue porri coloris lib. 7. rem præ se ferat, siue bilis eruginosæ. Sed id in febræ intelligo. Nam deiectiones huiusmodi exustam esse omnem naturam humiditatem à febre demonstrant. Quæ ab atra bile fit, Galenus insanabilem dixit, quia non differt à cancro. Qui in superficie non curatur : quantò minùs in intestinis, vbi nec medicamenta adhærent, & semper superfluitate ali-

# DE MORB. INTERNIS

*Gal.com. in* menti irruente tangitur vlcus? In libro quoque de atra bile,  
*Aphor. 24.* omnem exulcerationem ab atra bile infanabilem facit, nisi  
*lib. 4.* quis circunciso loco omnem vim eius abscindat, sublata etiam  
vicinia cum vlcerata parte. Aëtius tamen; si per crissim  
excreta atra bilis dysenteriam mouit non esse desperandum  
ait. Si sponte, & non criticè, id est, nulla Naturæ, aut Medici  
*Aëtius Te-* prouidentia, desperatio. Sed caue, ne sanguinem concretum  
*rab. 3. Serm.* in intestinis referas ad atram bilem. Vidimus qui simile quid  
*1. cap. 43.* crassiori pici nullo periculo & sine febre deiecerent. Alios cum  
febre & periculo. Monachus quidem apud D. Genouefam  
dysenteria laborans, cum vi morbi frigerent extrema, nigra,  
*Monachus* liquidæ pici similia, deieceret, spiraret difficulter, & iam de fu-  
*dysentericus.* nere disputaretur, conualuit. Anno 1557. Autumno, tempore  
benè constituto, pestilentissimæ febres extiterunt, & quæ plu-  
rimos sustulerant: dysenterix salutare. Nemo enim, in  
multis, quos vidi, interiit. Curabantur clysteribus lenibus &  
rheo. Erant enim ab acri fluxione. Sæpe quidem, sed pauca,  
egerebant. Parùm febricitabant, ac rheo dato conquiescebat  
dolor. Sicque breui liberabantur. Anno sequente, Autum-  
no quoque dysenterix multæ, in quibus viridia, cœrulea, ni-  
gra, biliosa, cruenta, deiciebantur, & qualia scribuntur le-  
thalia. Tamen omnes propè euaserunt, cura etiam parùm se-  
dulò adhibita. Annus fuerat bene constitutus. Hyeme Aquil-  
onia, Vere Australi & pluuioso, Æstate calida, Autumno  
dysenterix. Aliæ ex victus ratione. Verginosis & ruffis magis  
periculosæ. Luterix humidior anno periculosiores, quam  
æstuoso & sicco. In sicco statu anni, materia sæpius bilis  
utræque. In pluuioso pituita putris. Cum cibi fastidium ac-  
cedit, quibus prius non erat, malum est, & vt signum, quia  
vitium intestini ad orificium ventriculi peruenisse significat:  
& vt causa, quia non instauratur, quare maximè egent. Sæpè  
etiam latius peruagatur affectio, quam ad intestina. Adoles-  
cens anno 12. natus bilioso profluuiio cum febre correptus  
deiciebat frequenter similia dysentericis, nigrum sangui-  
nem. Sitis, manus frigida, vigilia, vini magna appetentia.  
Nihil adiutus remediis obiit die 9. Apertus œsophago in-  
feriore ad ventriculi os superius & ad medium thoracem,  
nigro, corrupto, epiploo similiter corrupto, pulmonibus alte-  
ratis, recto intestino exulcerato. Dolor fuerat in sinistro late-

*Dysenteria  
humidior  
anno Luteria  
periculosiores*

*Cibi fastidium  
dysenteria su-  
perueniens,  
malum.*

re, imo ventre & stomacho. Alteri febris, vomitio, ventris dolor, deiectiones pici & nigro sanguini similes: 20. die mors. *Dysenterico- Secto corpore inuentum vlcus vitulatum, in ambitu exesit tur- rñ historia.* nicis omnibus ventriculi, qua parte decliuus est in pylorum. Huic procidit anus ferè toto morbo.

In huius morbi curatione duobus sapiùs modis peccatur vulgò: celerius suppressa aluo, & adstringentium vsu impacto pure in inuolucris intestinorum. Suppressa intempestiuè *Indysenteria curatione duplex vitium committitur.* dysenteria vidi insanum factum. Mulierem quoque, cui in perpetuam vitam ita constricta aluus, vt septimo quoque die tantum excerneret, & inde ore & naribus grauiter oleret. Galenus de venæ sectione contra Erasist. non paucos vidisse scribit, qui dysenteria, varicibus, hæmorrhoidibus suppressis in insaniam, apoplexiam, atram bilem, nephritidem, pleuritidem, hydropisim, sanguinis vomitionem & hæmoptoicam passionem inciderint. Nobilis quidam pictor in scabiem fœdam. Corpore enim pleno materia feruida sursum fertur. Alioqui ita resiccatur intestinum, vt maneat perpetua alui adstrictio. Si sursum & deorsum obseratur, in inuolucris intestinorum aceruat magna puris quantitas, quæ tandem interficit: Quod nos cuiusdam corpore dissecto obseruauimus. *Pictor nobis fluxus acris & malignus moderandus hordeatis, clysteribus è lã ex suppressa dysenteria in scabiem natura sustineat. Aliis materia acris, aliis mucosa egeritur, quibus non eadem remedia conueniunt. Quæ à diarrhæa fœdâ lapsus.* incipit, purgatione, confirmatione partium, diuersione: quæ à tenesmo, expulsionem stercoreis, detergentibus, lenientibusque clysteribus opus habet. Conueniunt cholagoga, quæ adstrictionem aliquam relinquunt. Clysteres, abluentes, detergentes, astringentes, cicatricem obducentes, linimenta, fots, portiones ad somnum conciliandum, syrupi, iulepi, condita. Quantitas clysterum augenda ad ℥b. i. s. aut 2. quia inanita intestina sunt, & melius tergentur. In pulueribus periculum, ne remaneant in parte affecta, & pungant. Sanguinis quoque missio vitanda, quia vires deiicit, neque bilem trahit, neque curat vlcus. In cruenta laudatur.

**D**ysenteria, seu intestinorum ab ulcere difficultas, inuadit, cum paulatim & breuibus interuallis, non affatim & repente, deiectio fit: quo nomine ab improprie dicta hepatica dysenteria se iugatur. Illius verò deiectionis hi gradus obseruantur, qui magnitudinem ulceris designant. Adiposa primum cum sanguine, dein ramentosa quædam, denique penitiùs grassante ulcere, carunculæ excernuntur. Excitatur hic affectus à bilis, aut pituitæ falsæ prouentu, isque vel in supernis & tenuibus, vel in infernis & crassis intestinis. Itaque vtriùsque dignotio maximum habet ad curationem momentū. Si intestinis à superioribus vniuersus sanguis excernatur, reliquis excrementis erit perfecte permixtus. Si à crassioribus, non tam benè permiscebitur, sed supernabit. Deinde vbi ramenta sola eiciuntur, si pingue quippiam habeant, à crassis: si tale nihil, à tenuioribus secedunt intestinis. Spectandum quoque an infra, an supra vmbilicum sit dolor. Qui enim infra, crassiora indicat affici intestina: qui supra, tenuiora, quanquā non necessariò. Quærendum item ab ægro, an statim à dolore, an longo pòst tempore excernat.

Curatio in recta victus ratione magna ex parte consistit. Confert hordeatū ex hordeo torrefacto, & in aq. chalybeata cocto, adiectis mali punici acidi granis, semine papaueris albi, & id genus reliquis feminibus frigidis ad temperationem bilis opportunis. Carnes in virium deiectione conceduntur: &

*Ulcera tenuiorum & crassiorum intestinorum deiectionis.*

*De his pluribus Gal. cap. 2. libr. 6. de loc. mal. aff.*

*Dysenteria curatio.*

elixæ quidem cum portulac. lactuc. plantag. end. Aſſæ verò aqua roſacea irrorantur, myrthi germinibus configuntur, adſtringentibus farciuntur. Vſui ſunt fructus, paſſulæ integr. meſpila, ſorba, cydonia, & reliqui aſteri fructus. Ex aqua chalybeata, ſaccharo roſaceo, & pauco granatorum acidorum ſucco paratur potus. Hora ſitis Zulapium roſatum per ſe cum aqua chalybeata, deinde cum ſyrupo cydoniorum exhibetur. Mox autem humor inteſtina vel. *Gal. ibid. & lib. 4. Meth.* licans atque exulcerans vacuandus, aut alio deriuandus: porione quidem, ſi tenuia infeſtet inteſtina: clyſtere magis, ſi craſſa.

℞. rh. elect. ʒ. 2. cinam. ʒ. 1. infunde in aqu. endiuix quantitate ſuffic. In expreſſione diſſolue rh. puluerati ʒ. 1. ſyrup. de cich. & cydon. ana ʒ. ʒ. f. potus. Vel. ℞. agrim. centinod. plantag. ana M. ʒ. granor. berber. ʒ. 2. ſemin. plantag. & cydon. ana ʒ. 1. cortic. myrobal. Cepul. ʒ. 2. f. decoct. & colatura ad doſim. In qua infunde rhei elect. ʒ. 2. cum pauco ſantal. citr. In colatura diſſolues ſyr. myrtil. vel ſyr. roſ. ſiccar. vel zulapij roſacei ʒ. ʒ. cum ʒ. ʒ. rh. puluerati. *Hæc ad dyſenteriam tenuium inteſtinor.*

Additur aliquando ʒ. 1. raſuræ cornu cerui, aliquando gra. ʒ. aut 4. vnicornis. Sunt qui rheum aſſant, ſiue uſtulant, vt catharticam vim minuant, & adſtringentem augeant. Quod multi non probant: ſed vel fortiſſimam eius adſtrictionem præferunt, aut ipſum rheum totum in ſubſtantia præſcribunt. Pauperibus catholici ʒ. 6. cum rhabarbari, vt priùs, in decocto adſtringente infuſi ʒ. 2. diſſoluentur. Inter purgandum cauendum perpetuo ab omnibus acrioribus & ſcammoniatis medicamentis. Poſt purgationem, venæ ſectio reuellendo, ſanguinis etiam decurrentis acrimoniam retundendo, mirificè prodeſt. Sed conſulendæ antè ſunt vires: quæ ſi de-

## DE MORB. INTERNIS

iectæ ac infirmæ, vt sæpè sunt, propter copiosam vacuationem, & vehementiam doloris, phlebotome abstinendum. Iuuabunt etiam apozemata refrigerantia in biliosa cephalagia præscripta: quæ etiam salubriora sunt futura, si per vrinas materiam morbificam detinent. Cui scopo inservient, vini albi vsus, syrupus cydon, semina frigida maiora. Sed laborantibus crassioribus intestinis plus est auxilij in clysteribus. Qui primi iniiciuntur, detergent, ac repurgant intestina iis sordibus, quæ residues & affixæ sua acrimoniâ frequentem desidendi cupiditatem inducunt. Vt.

℞. ros. rubr. tapf. barb. plantag. furfur. hord. ana p. 2. f. decoct. in lacte pro duab. injectionibus. ℞. prædictæ decoct. ℥b. i. vel quart. 5. In colatura dissol. mell. ros. colati, sacchari albi ana ʒ. i. ʒ. syr. ros. siccar. ʒ. i. f. enema, additis ouorum duorum vitellis. ℞. decoctionis eiusdem quart. 3. in q. dissol. sacch. ros. ʒ. ʒ. syr. cydon. & ros. siccar. ana ʒ. i. succi plantag. ʒ. i. vitellum oui vnus, f. clyst.

Maior clysterum quantitas assumitur, cum eluenda & detergenda sunt intestina, quia tum impleri debent: minor, cum adstringēdi, glutinandi & consolidandi consilium præponderat: si quidem, id vt præstent, longiore opus habeant retentione. Olea, ac pingua omnia, quæ sordidiora reddunt vlcera, non immiscentur, nisi ineunte dysenteria sedandus sit dolor. Tum enim ol. rosaceum addi poterit. Cùm tergendum simul & adstringendum fuerit, talis imperabitur clyster.

℞. furfur. macr. paleæ hord. tapf. barb. flor. chamæmel. & summitat. aneth. ana M. i. f. decoct. vel ex aqu. pluuiæ, vel chalybeata, vel hydromelite, vel lacte vstulato ad libr. i. ʒ. i. In colatura dissolu. syr. ros. siccar. & syr. myrtill. ana ʒ. 2. vitell. ouor. 3. butyr. recent. ʒ. 3. pulu. mastich. & sang. drac. ana

§.3. fiant duæ iniectiones, vna manè, altera vesperi.

Parabitur quoque adstringens & consolidans clyster ex farinæ amyli §.2. in lacte vstularo (quod cōsumpto sero terget minùs & adstringit magis) coctis: additis butyri recēt. §.2. adip. hirc. cum butyro liquati §.1. bol. arme. §.2. vitell. ouor. 2. In eum finē sumuntur oua dura cum aceto cocta, zulap. rosaceum, syrup. sidoniorum. Vt.

℥. syrup. cydon. §.3. vtatur cum tripl. aqu. chalybeata longè à pastu.

Imminutæ autem vires roborabútur cōdītis, opiatīs, instauratitiis destillatis. hæc opiata omniū huius generis remediorum instar esse poterit.

℥. conferru. symph. conferru. antiq. ros. & conferru. borraginis ana §. β. electar. diarthod. Abbatis, & diamargar. frigid. ana §.1. β. cortic. citr. conditi §.2. cum syrup. ros. siccar. aut cydon. f. opiata.

Confirmabitur etiam vētricus ad motis: vt litu ex oleis cydon. & mastichino: emplastro è carne cydo. mastich. & cerato stomachico Galeni cū oleo myrtillor. emollitis cōfecto, & aliis similibus. Quod si, vt ferè fit, humorū acrimonia spinctêrem musculū exerceat, hoc vnguento commodè retundetur.

℥. mucag. sem. cydon. & psilij extractæ in aq. plantag. vng. popul. ana §.1. vitell. oui vnus, ceræ q. s. f. vng. quod è gossipio in modum glandis efformatum, & filo appensum, in anum immittatur.

Eidem ano præ imbellicitate à frequēti deiectione orta, hianti, ac velut procidenti, vtile erit hoc fomētum instituere. ℥. tapf. barba. ros. rub. centinod. & plantag. ana M. 1. f. decoct. in aq. fabr. & vini rub. æquis partib. pro foru ani cū spongiis. Alij imperāt puluerem ex thur. ros. rub. mastich. qui igni impositus fumum reddit ægro per annum excipiendum.



# DE MORB. INTERNIS

*De Tenefmo. C A P. 44.*

1 *Ab ulcere  
superfite à  
dysenteria.  
vel ab omni  
materia que  
dysenteriam  
facit.*

2 *Referatū  
vasorū oscu-  
li ab acris  
materia, aut  
superfite vl-  
cere.*

3 *Tempesta-  
te præsertim  
austrina, quæ  
pituita falsæ  
parens est.*

4 *Generatio-  
ne multa, aut  
excretrice vi  
imbecilla,  
aut disidera-  
to naturali  
clysterc ob  
folliculi  
felli obstru-  
ctionem.*

**T**enesmus irritatio 1 est vltimæ partis intesti-  
ni, id est, recti, in quo sæpius libet sine causa  
desurgere. Excernuntur omninò pauca, mucosa,  
idque maximo conatu, insidentque stercori gut-  
tæ 2 sanguinis. Hic si præter mucosa stercora  
excernuntur, ea cocta ferè sunt. Nascitur hæc af-  
fectio magna ex parte in 3 in pituitosis. 4 Acerua-  
tur enim pituita recto intestino crassa & viscida:  
putrescit, tempore acrimoniam contrahit, irritat in-  
testinum: hinc deiiciendi libido. Sed quia contu-  
maciùs inhæret pituita, non nisi magno conatu ex-  
cerni potest. Hoc tenesmi genus dysenteriam ferè  
præcedit.

Aliud verò genus hanc sequitur. A dysenteria  
relinquuntur ulcera, in quibus acris sanies intesti-  
num vellicat, ex quo fit tenesmus, inanis desidendi  
cupiditas.

Post phar. si quid intestino hæsit, vt malè infria-  
ta coloc. aga. aut similibus, eadem affectio nascetur.  
Vlceribus quoque in ea parte sponte natis idem ac-  
cidit. Abcessus in recto intestino natus eandem ap-  
petentiam inuehit nonnunquam.

*Curatio.*

Initio causa cognoscenda est. Quòd si præcessit  
frigus, & pituita crassa in causa est, rutam, hyssopū,  
origanum, calamentum, rosmarinū, maioranam,  
lauri folia, stœchades, anethum, melilotum, cha-  
mæmelum, vino incoques: hinc fouebis sedem: ma-  
teriam calidam emplastri modo toti perinæo in-  
duces.

Iuuent fots 5 ex oleo rutaceo, chamæmelino, 5 *His im-*  
 anethino, ſefamino. In vehementi 6 frigore oleo, *buetur hap-*  
 in quo decima pars caſtorei aut bituminis diſſolu- *ſus ex goſſi-*  
 ta ſit. In dolore anetino & irino vtendum erit. E- *pro caprio, et*  
 iuſmodi oleis fouere & vngere oportet perinæum *per inæo ad-*  
 & imum ventrem, iſſque calidis. Deinde contegen- *monetur.*  
 dæ partes duplici aut triplici linteo calfacto. *6 It in ac-*  
*cidit, qui ſine*  
*ſubligaculis*

Laterem veterem denigratum fumo cōfringes, per nubes de-  
 & comminues: aceto feruenti immerges: inuolues *amittantur,*  
 linteo, & calidum ſedi totique perinæo applicabis. *aut lapidi*  
 Molle filtrum, aut cotonem, vel ſpongiam mollio- *infederunt.*  
 rem ſæpius immerges vino calido, in quo ruta, fœ- *7 Ex his*  
 niculus & quædam ex ſupradicta materia coxerint. *ſunt, cruchi-*  
 Deinde expreſſa, ſed calida, ſedi ac perinæo applica- *ſci, quorum*  
 bis. Poſt fotum linteis calētibus muniendæ partes, *halitus ſeu*  
*fumus ſede*  
*exapiendus.*  
 omninoque videndum eſt, ne refrigeſcant. Lau-  
 dantur hac in re ſuffumigia ex reſina pini iniecta  
 carbonibus, nuce pinea, bene reſinoſa, aliquando *8 Vt ſi cau-*  
 addito ſemine rutæ, cumini, aniſi, fœniculi, vel hoc *ſe magni-  
tudinē n vinct*  
 modo. *doloris relie-*

℥. 7 picis ſiccæ ℥. i. bituminis ℥. ſ. liquentur in *metta, inflā-*  
 aceto: liquatis inſperge ſulphuris in puluerem re- *mationis, ſe-*  
 ducti ℥. ſ. *me. ſi offerat.*

Clyſteres ad quartaria 2. vel 3. ex iis comparen- *9 It Philo-*  
 tur, quæ calefaciunt, incidunt, detergent, leniunt, *no in laſſe*  
 quales proximo capite deſcripti ſunt in dyſſenteria. *diſſoluit, aut*  
*ſapa. Aut*

Similiter ſuppoſitoria ex labdano, ſtyrace, oleo *coquetur fur-*  
 rutaceo, adiectis ſeminibus fœniculi, rutæ, aniſi, cu- *fur cum ſapa*  
 mini, & ſimilibus. *ad pulvis cō-*  
*ſiſſentiā hinc*

Si dolor vrget 8 vehementiùs, narcoticis 9 v- *diſſoluitur*  
 tendum erit, vt priùs. *opij gra. 3.*  
*aut 4. Iuri-*

Sacculi fouendæ ſedi & perinæo ex milio, fur- *ciatur.*

## DE MORB. INTERNIS

furibus, sale, rutâ, & descripta materia frixis in sartagine, deinde sacculo inclusis. Quòd si inflammatio est, & cætera consentiunt, vena brachij interna secanda est.

10 Ob im-  
pensum calo-  
rem, quem  
facile con-  
trahit.

Probatum quoque Arabibus purgatio levis è castia, manna 10 suspecta Græcis. Vrina & sudor prouocari possunt ad diuersionem, victus refrigerans. Clysteres lenientes è lacte, hordeato, oleo rosaceo tepidis, & aliis, vt prius.

Infusiones in decocto maluæ, bismaluæ, seminis lini, violariæ, adiecta portiunculâ florum chamæmeli & meliloti.

Olea conuenient, rosaceum, violatum & nenupharinum, in quo folia salicis coxeris. Deinde etiam axungia, butyrum recens, ex quibus & vnguentum fiunt: quale hoc est.

℥. olei rosati ℥. i. olei salicis & violarum ana ℥. β. mucaginis quatuor seminum frigidorum in aqua

11 Vt. ℥. de- cydoniorum extractæ ℥. 6. ceræ modicum, fiat vn-  
guentum.

aut aqua  
mulse (si non  
sit ardor) ℥.

6. Mell. ros.

colati ℥. i. his  
commissis fiat  
enema.

12 Vel ℥. a-  
xungia suis-  
le ℥. i. cerus-

sa. pōpholy-  
gin lotæ ana  
℥. i. cum a-

qua plantag.  
f. vnguentū.

Molli gossipio in aceto albo feruente partes fouendæ sunt, id est, imus venter & perinaeum.

Vlcera si qua sunt, abluenda 11 primùm sero lactis, vino austero, mulsâ, etiam lixiuio, si sanies contumacior est, aut vino austeriusculo tepido, & sexta parte mellis rosati, quibus postea adiiciatur aliquid rosarum, thuris, mastichis, gummi arabici, tragacanthi, & similium. Aut fiant hæc vnguenta.

12 ℥. cerussæ plumbi ℥. i. mucagi. gummi arabici extractæ in aqua rosarum ℥. β. corticis thuris ℥. i. olei rosacei quantum sufficit ad impinguandum.

Aliud.

*Mucaginis gummi tragacanthi & arabici, mucaginis feminis psilij ana ꝑ. ʒ. ʒ. aloës lotæ ꝑ. 2. olei rosarum, quod sufficit. Cum modico ceræ fiat unguentum. Hæc inunguntur vlceribus, si quidem apparent. Alioqui commiscentur clysteribus iis, qui ad consolidandum descripti sunt, cap. de dysenteria. Potus lactis caprini primùm quidem ad lb. i. quæ paulatim bibitur, non aceruatim. Postridie verò ad lb. ʒ. remedio est tenesmo. Oportet primo die recens mulctum bibere. Postridie decoctum ad dimidias, & despumatum.*

*Decoctum betonicæ in vino albo tenui, laudatur ab antiquis.*

#### EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

*Tenesmus affectus est præter naturam in recto intestino, in quo assidua & implacabili desidendi cupiditate ager tenetur: vel, ut alij, irritatio vltimæ partis intestini, in qua sæpius lubet sine causa desiderare. Initio excernuntur pauca, mucosa magno conatu, aliquando cõspersa sanguine, sitque velut præcæmium dysentericæ. Hic necesse est naturam stimulari in intestino ab aliqua causâ præter naturam, quam excernere nititur, quasi illic esset excrementum. Ea est vel sine materia, vel cum materia: & si cum materia, vel in cauitate intestini continetur, vel extrinsecus comprimit meatum. Sine materia intelligimus, ut cum frigus partem illam constringit & inordicat, ut si ager in folio frigido, aut lapide sederit, aëre, vento frigidior. Aliquando reduplicatur intestinum, vel musculus, ut nec clysteres, nec alia auxilia excipiat pars implicata, sæpèque efficiat, ut lateat vlcus. Materiam vero dicimus, quicquid interiorem illam cauitatem irritare potest, vel vlcus (nisi tum dysenteriam esse velis) vel abscessus, vel hæmorrhoides interiores, aut vermes, aut humor acris, aut stercus induratum & coactum. Quæ omnia tum ex relatu ægri, tum excrementis & doloris*

*Tenesmus causatus vel cum materia, vel sine materia.*

## DE MORB. INTERNIS

proprietate artificiosa coniectura discernere licebit. In vlcere excernitur sanies aut sanguis, dolor acutus, humor acris relictus post dysenteriam, & si nihil perspici potest, profundum esse suspicamur, sitque aliquando cacoëthes. Vidimus vermium globulos assidue reiici, ac subinde renasci. Ante dysenteriam ferè fit à pituita putri: in dysenteria, ab acrimonia, vel medicamento malè infriato, vel glande immissa. Aliquando iecur plus iusto calefactum acriorem materiam perpetuò generat, quæ ad partem affectam defluit. Reiicitur, sentitur morsus, quandoque sequitur febris quasi hectica, & paulatim atrophia. Stercus induratum coniicimus, si diu æger nihil reddiderit, aut non nisi crecrementa dura, sicca, sine mucositate. Extrinsecus comprimitur & pungitur vel à magno & inæquali vesicæ calculo, quia vesica recto intestino incumbit, vel inflammatione parastatum. Hic adest penis distentio, ardor urinæ. Illic calculi signa adiicienda, urina retenta, turbulenta, sanguinolenta, & similia. In gravidis minatur abortum, ut scripsit Hippocr. Vterus enim inter vesicam & rectum intestinum situs est, foetusque concepto amplior, & vesicam (vnde assidue meiendi cupiditas) & intestinum premit. Quo fit ut etiam in laboribus partus, & alio quoque tempore teneismi cuiusdam imago illis eueniat, & si hoc morbo vehementius corripiantur, in vehementi illo conatu necesse est laborare utrum, foetum quoque deprimi assiduo decessu, & vires lædi. Vnde abortus. Interdum tam vehemens affectus est, ut dysenteria similis videatur.

*Teneismus  
gravidis ab-  
ortum minatur.*

Curatur sublata causâ & affectu, vnde nascitur, clysteres ex hydromelite probè cocto cum rebus coquentibus, carminantibus, detergentibus. Omnes in minima quantitate ad ʒ.ʒ. aut lb.ʒ. quia intestinum ferè strictum, & vltima tantum pars abluenda. Infusus in decoctione pingui, inunctio, in vlcere vnguentum Ægyptiacum, fons ex vino, in quo ruta, vel quæ coquant, incidant, confirmant, coxerint. Later vetus fumo denigratus aceto furuenti, ut excipiat fumus, linteo conuolutus, admotus, & similia.

ANTO.

## ANTO. VALETII EXERCIT. XLIII.

**T***ενεσμός*, seu *τενεσμός* affectus est à sympto-  
mate nomen habens, videlicet à tensione, quæ  
recti intestini extremitatibus incumbit. Causis & *Gal. lib. 3. de*  
symptomatis cum dysenteria cōuenit: & propterea *sympt. causis.*  
scripsit Galenus tenesimum quandam constituere  
dysenteriae differentiam. A bile igitur, aut pituita  
falsa si ortum habeat, huc reuocantur remedia ad  
dysenteriam imperata, cathartica, enemata, tum e-  
tiam ea, quæ refrigerando humores contemperat,  
quæque per vrinas materiam deriuant, apozema-  
ta, & zulapia. Quod si frigori aut flatibus accepta  
referatur causa, fomenta calida satis esse poterunt.

*Decurratione hepatici i fluxus.* CAP. 45.

1 Hunc he-  
paticam dy-  
senteriam vo-  
cant.

**H**epate calidiore excrementa durissima & si-  
mililia pilulis caprarum, vnde *πεπρατωδὴ* à  
Græcis, nisi iuncta sit imbecillitas. Hic enim biliosa  
liquidiora, & vt 2 augetur calor, insigniter flaua, 2  
crassiora, grauiter olentia, æruginosa, nigricantia 3  
affatis humoribus, & postremo colliquata hepatis  
substantia. Hic sitis, ardor deiecta appetentia, 3  
assidua corporis iactatio, difficilis 3 curatio. 3  
In infirmitate attractricis hepatis, chylosa. In in-  
firmitate alteratricis primùm quidem loturæ car-  
nium similia, & sanguini diluto aqua: deinde varia  
qualitate & consistentia, interim quasi limus san-  
guinis & grumus. Integra ferè appetentia, sitis nul-  
la, frigoris sensus, fœtor exiguus. Hepatici fluxus  
nocte excitantur magis, longioribus 4 interuallis.

2 Humoris  
suppressione  
est astu.

3 Vehemen-  
tia sympto-  
matum, hu-  
moris contu-

macia, reso-  
luta hepatis  
vi ac substā-  
tia.

4 Gale cap.  
2. lib. 6 de lo-  
ci malè af-  
fect.

# DE MORB. INTERNIS

Horum curatio ex capite de debilitate hepatis pendenda est.

In summa vtendum est refrigerantibus, si infirmitas à calido est: calefaciētibus, si à frigido. In vtrifque vitanda sunt, quæ obstruunt. In calida.

℞ electarij triasant. 3. 2. coriandri præparati 3. i. semin. acetosæ & portulacæ ana ʒ. i. coralli rubri ʒ. ʒ. sacchari rosati 3. 6. misce, vtatur in iusculis, in hordeatis, in potu.

Syrupi conueniunt, rosatus, de ribes, myrthinus, cydoniorum, vel iulepus cum multa aqua ferrata. Spodium, semē portulacæ, acetosæ, corall. rubr. flos rosarum, & semen arilli, lappæ, cichorium, endiuia, sonchus, coriandrum præparatum, acetositas citri, ptisana, & similia conueniunt. Ceratum 6 santalinum subactum è rosacco, ceratū ex oleo rosarum, deinde subactum cum succo cichorij, endiuia, sonchi, plātaginis, & tantillo succi absynthij, vel eupatorij. Ceratis inspergi possunt pulueres ex proximè dicta materia.

In 7 frigida, vnde lotura carniū, electarium de vino prius descriptum, mel passulatum hoc modo præparatum.

℞. passularum benè pinguium M. 2. fiat decoctio ad ʒ. i. ʒ. vini optimi austeriusculi. Coquantur dum crassescat vinum. Deinde passulæ in supradictum vinum fortiter exprimantur per setaceum, idque satis rarum. Expressio cum vino rursus coquatur ad crassitudinem. Cui adde aromatici rosati 3. i. sem. nasturtij & securidacæ affati & infriati, cina-momi electi ana 3. ʒ. misce, vtatur sæpe. Hinc eun-

*Arabum his omnibus pollet commemoratis dotibus.*

6 Vt. 2. 4. ce-  
rata sunt ali-  
ni 3. 3 pulue.  
subtilissimi  
corall. rub.  
ʒ. 4. mala-  
xentur cum  
oleo cytonio-  
rū. f. empla-  
st. ut in fir-  
mā lunā cre-  
scentis, &  
dextro hypo-  
chondrio ad-  
moneatur.  
7 Materia  
scilicet cōue-  
nit, quæ pe-  
netrat, & cy-  
perus, schæ-  
nuanth quæ  
aperit, vt ab-  
synth. cicho-  
rium: lenit,  
vt p ʒ. ʒ. ʒ. ʒ.  
v: num gra-  
natorū: dulc.  
abstergit, vt  
mel: incidit,  
vt vinū gra-  
natorum ma-  
turatorū: præ-  
seruat à pu-  
tredine, vt  
calam. aroma-  
ticus, cina-  
momū, lignū  
aloes. Cate-  
rūm electa-  
rium de vino

dem puluerem seorsum acruabis, insperges ꝯ. 1. lactis vstulati ꝯ. 4. cum vitello oui, fiet pulticula.

Poterit inspergi & lacti amygdalarum benè cocto. In hoc fluxu lac ouillum coctum & vstulatum conuenit, sed inspergere oportet aliquid supradicti pulueris, vel hunc.

℥. corticis thuris ꝯ. 2. caryophyllorum, cinamomi an. ꝯ. ꝯ. Orizogala, pulli gallinarū & columborum, perdices, auiculæ assatæ, vinum tenue, odoriferum, subadstringens. Inungatur hepar cum oleo mastichino, de spica, de absynthio, & aliis dictis prius. Deinde superaspergatur pul. mastichis ꝯ. 1. styracis calamit. Gr. 16. thuris albi & nigri an. Gr. 6.

Fotus è spongia expressa in vino decoctionis mastichis, thuris, styracis calaminthæ, rosarū, absynthij, florum cupressi, eupatorij, asari.

Si superueniat febricula (quod sæpè fit) proximè dicta remedia calfacientia temperanda sunt prius dictis refrigerantibus.

#### EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

De hoc affectu lege Galenum cap. 2. libr. 6. & cap. 7. libr. 5. de Locis affectis: capite 8. & 6. lib. de Morbis & symptomatibus. Maior sanguinis quantitas reiecta ab hepate necessariò oritur. Sanguis vel rubet: vel aquosus est: vel ater & niger. Is duplex, vel sanguis crassior, ut in bobus: vel limus & sæx sanguinis. Hic rursus duplex siue adustus sit, siue naturalis: crassus nimirum, à quo vlcera profunda fiunt, & eiusdem veluti serum seu pars tenuior. Rubens *αιματηρ* dysenteriam efficit: niger, tenuis & splendescens, lotium fluxum, quem vulgò vocant, & quem prima dysenteriae differentiâ complexi sumus: crassus tum hanc, tum etiam secundam. Sed tenuior magis è venis mesaraicis & ramis venæ portæ, quæ incoctum



## DE MORB. INTERNIS.

sanguinem & serosum continent: crassior ab hepate, vel liene. Si cum torminibus, dysenteria est. Si in fine februm quar-  
 tanarum, morbis à melancholia, & aliquando in peste, non  
 malum. Si sanguis aquosus, tertia est dysenteriae improprie  
 dictae species. Nonnullis etiam lotius fluxus dicitur. Læ-  
 so hepate, rupta aut aperta venâ, sanguis niger, velut crassum  
 atramentum, deinde rubens aliquando excernitur, & moriun-  
 tur. Quales duos ipse vidi. Vtérque vix sentiens periculum,  
 animi deliquio paulatim extinctus est. Sunt & aliae multae dif-  
 ferentiae deiectionum alui ex variis causis apud Hippocrat.  
 ὡς ξύσµατα, interpreti strigmenta, veluti linamenta, πελιδναί,  
 liuidæ, δυσώδεις, foetidae ex corruptione partium, vnde exeunt:  
 χολώδεις, χολὴν ἄκρατον, bilem synceram significantes, non  
 multam, ut vult Musa, & similes. In quibus hæc duo genera-  
 lia præcepta tenenda sunt: omnem synceram excretionem  
 metuendam in morbis, quia cruditatem significat: omnem  
 quoque corruptam, si die non critico, crudo adhuc morbo,  
 cum labore ægri, non leuat, aut tantum ad tempus. Ab ini-  
 tio quidem (inquit Galenus de omnibus) nunquam ad bo-  
 num fiunt huiusmodi deiectiones, ut pote magnam visceris  
 læsionem ostendentes: ad morbos quidem consistentes se-  
 quuntur sæpius, naturâ superfluitates expurgante. Et paulò  
 post. Multi deiectionum colores præter naturam, sponte qui-  
 dam euacuati, multarum atque malarum in corpore dispo-  
 sitionum sunt signa. A medicamento autem ducti vim ha-  
 bente plures humorum species euacuandi, nihil absurdum  
 significant. Sed de his multa superiore capite. Varia autem  
 illa excrementa, quæ deiiciuntur, cruditatibus ventriculi re-  
 spondent, quæ retenta corruptelam quandam & vitium con-  
 trahunt.

Pro varietate causarum multiplex curatio. Quibus san-  
 guis excernitur, rupta, aut exesa venâ, si vires firmæ, sanguis  
 modicus è basilica detrahendus, rhabarb. in substantia, cum  
 syrup. ros. aqua arnoglossi, tabulæ ex iis, quæ sanguinem sup-  
 primunt, syrupus ex succo arnoglossi, centinodia, bursa pa-  
 storis, millefolio, yrtica Græca, vino granatorum, cum sacch.  
 ros. embroche ex oxycrato parato ex aqua plantaginis, &c.  
 Vitanda in cæteris quæ obstruunt: vitendum roborantibus,  
 redeundum ad caput de debilitate hepatis, aperiendum robo-

rando, aqua decoctionis passularum, Gallina cum cydoniis & conferuis adstringentibus cocta in balneo mariae, donec ius concreasca in causa conueniente, gelatina ex rebus corroborantibus, cinamomo & aliis, aqua distillationis mastichis, coralli, seminis cydoniorum, vnde diluatur vinum.

## ANTO. VALETII EXERCIT XLV.

**H**Epatici fluxus pauci meminerunt Practici, quod affectio istiusmodi vel ad hepatis intemperie aliquam, calidam, frigidam, à qua attractrix, vel re-  
trentrix facultas imbecilla, aut ob visceris eiusdem obstructionem, fiat: vnde & communem habet illis cum affectibus curationem. Auicennas in ob-  
structorum reseratione, & hepatis confirmatione summa medendi præsidia collocauit. Vide cap. 10. lib. 3. Fen. 16. Tract. 2.

*De fluxu 1 Pestilentiali.* CAP. 46.

**G**Aleno olida insigniter, fulua & crassa excer-  
nuntur, aliis subalbida, Autumno ferè: liuescit  
facies, grauatur corpus, pulsus 2 concidit 4. 7.  
vel 9. moriuntur, aut agrè conualescunt. Alii tota  
cute 3 commutantur. Aliis decidunt 4 vngues.  
Fluxus hic periculose adstringitur. Præter remedia  
supradicta in dysenteria, vtatur auro in decoctis  
pullorum, perdicum & similibum, syrupo de ribes,  
de cydoniis, de myrtillis, de limonibus, aceto-  
sitate citri, vino granatorum, syrupo acetoso sim-  
plici cum iulepo rosato. Atque aliquando in auro-  
ra. 3. β. bonæ theriacæ in vino granato, acetositate  
citri, aut re simili dissolues. Iuscula alterentur cum

1 Quod est  
luis pestifera  
symptoma.

2 Hippocr.  
sect. 3. lib. 3.  
τῶν ἐπισήμων.

3 Diffusa pe-  
stilentia pu-  
redine per  
habitum cor-  
poris.

4 Ex atro-  
phia partiū,  
& venenata  
humorū qua-  
litate.

## DE MORB. INTERNIS

multa acetosa, & nodulo de berberis. Colatitiis inspergatur pulvis hic.

℞. limaturæ auri ℥. i. diamargariti recens facti ℥. β. nucis moschatae ℥. β. margaritarum, smaragdorum, saphyrorum ana ℥. β. panis sacchari ℥. β. fiat pulvis. Interim quoque utatur pulvere vnicornis & cornu cerui, vino tenui, odorifero, diluto aqua, in qua aurum extinctum sit. § Utatur interim hoc electario.

§ Interim etiam vi poterit pulvis  
℞. ex aloë,  
myrrha &  
croco.

℞. conseruæ ros. ℥. i. β. conseruæ corticum citri conditi cum saccharo ℥. i. corticum citri ℥. i. β. margaritarum electarum ℥. i. hyacinthorum, smaragdorum ana ℥. β. serici crudi ℥. i. seminis citri mundati ℥. 2. β. acetosæ ℥. β. boli armenæ, terræ sigillatæ ana ℥. 2. limaturæ auri ℥. i. cornu cerui & vnicornis, rasuræ eboris ana ℥. i. sacchari albiss. ℥. 19. folia auri numero decem. Fiat conditum ad formam sacchari rosati cum aqua rosata moscata.

### EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Pestilentis huius constitutionis Galenus meminit pluribus locis, ut Aph. 21. libr. 4. & in lib. de atra bile. Excernebant nigra ferè 7. 9. 11. Quibus deiectionis talis non fuit, pustulæ nigrae toto corpore excitatæ. Nullus autem seruatus, qui atram bilem exactam deiecerit. Primis diebus deiectiones erant ruffæ & collicationis indices, vel ut alio loco κατὰ τόπους, vitellinæ, crassæ, acres, fœtidæ, spumosæ. Postea verò, ut scribitur in eundem Aphorismum, nigrae, vel superassato sanguine vel putredine quadam contracta & corruptela. Sed an fuerit pestis peculiariter appellata, an Epidemius, morbus qui multos interfecerit, dubitari potest. Nam pustulæ illæ nigrae rarò in peste apparent, quin sequatur mors. Et multos ipse obseruaui pestilenti febre laborantes, quibus eruperunt infiniti propè carbunculi, aut furunculi similes carbuncu-

lis, quorum nullus euasit. Cutim & vngues decidere nonnulli à veneno putant.

Non temerè suppressendus fluxus, sed bezoardicis vtendum, syrupis, cordialibus conseruis, opiatis, rasura vnicornis, & similibus.

## ANTO. VALETII EXERCIT. XLVI.

**S**ymptomaticus huiusmodi fluxus pestilentialis appellatus, biliosus est, ratione febroris hepatis, vt plurimum, proueniens. Ita grauis esse solet, vt vires quàm celerrimè prosterнат. Si non vsque adeò sit efferus, soluenti medicamento, vt rheo, curatur.

*℞. polipod. quern. contus. cum paucō semine scenic. 3. ss. herb. scariol. cichor. & oxalid. totius ana M. i. thamarind. ping. 3. 5. prun. acid. num. 5. passul. mundatar. 3. 3. sem. scariol. & anis. ana 3. ss. flor. cardiac. p. 1. f. decoct. ad dos. Infunde ih. elect. 3. 2. cinam. 3. ss. Factæ post sex horas forti expressioni adde zupaij ros. aut syrup. cydon. 3. 6. fiat potio.*

Aliàs optimum erit bolum armenam, aut terram sigillatam, vt in peste dicetur, exhibere. Empirici in hunc scopum imperant puluerem, aut succum scordij, felici nonnunquam successu: quia fortasse simplicis id medicaminis feruida viscera, maximè que iecur, alterat, atque immutat.

*De difficultate meiendi.*

*CAP. 47.*

**V**esica interiorē membranā habet contextam omni genere fibrarum, quas dum intendit, vrinam continet. Si solū transuerfis, agit, exprimit. Eius actio in totum naturalis.

Eiusdem collo musculus est obliquus. Agit hic transuerfis fibris arbitrario quidem motu, ne vrina intempestiuè effluat. Itaque cum plena est vesica, & quantitate vel qualitate irritatur, transuersas fibras

## DE MORB. INTERNIS

intendit : musculus cessat ab officio , atque ita vrina emingitur. Nervi à lumbis & osse sacro ad vesicam perueniunt. Resolutis nervis aliquando torpescit sensus vesicæ: aliquando musculus sphincter, qui collo vesicæ adnatus est, resolvitur, atque ita vrina intempestiuè effluit. Galen. cap. 4. libr. 6. de loc. malè affect.

Aut si sensum perdidit vesica, retinetur. Aliis nascitur inflammatio læsis vertebrae, vnde nervi oriuntur: quod & dolore, & calore loci intelligitur. Aliis rupta vena sanguis emingitur. Grumus fit, qui meatum intercipit, quo vrina expurgatur. Idem meatus & lapillis, & tuberculis, & inflammationibus, crasso pure, vel humore aliquando præcluditur, atque hinc vrina exprimitur.

Vitiata verò mictionis tria sunt genera: dysuria, id est, difficultas vrinæ: stranguria, stillicidium, aut substillum malum: ischuria, cum omninò vrina suppressitur. Dysuria libidinem meiendi facit, sed ægrè & vi quadam: aliquando etiam cum dolore vrina excernitur.

In stranguria assidua meiendi cupiditas, sed vrina guttatim effluit. Ischuria impropriè quidem fit perdita renum actione attrahente. Si enim serum sanguinis non attrahitur, vrina non fit. Propriè verò meatu vrinariq præcluso, aut infirma excretrice vesicæ, quæ transuersis fibris exprimere non possit. Idque propter intemperiem, vt siccitatem, in ardentissimis febribus: aliquando resolutis vesicæ nervis, & musculo incolumi. Nam si musculus vna resolutus est, vrina præter voluntatem effluit. Dysuriam & stranguriam facit retentricis

imbecillitas, quæ ferè fit à frigido. Frigidum enim vesicæ corpus, & frigido facilè euincitur. Altera causa est vrinæ acrimonia. Adiunge cætera, vt inflammationem, grumos, vlcera, calculos, & cætera.

*Curatio dysuriæ & stranguriæ.*

Si à frigore infirmitas, calorificis vtendum est, vnctione perinæi & pectinis, fomentis, balneis, clysteribus, potionibus, alijsque remedijs. Vnguento olea 2 conueniunt rutaceum, anethinum, chamæmelinum, balsaminum, de scorpionibus, de keiri, de lilio, de cucumere asinino, in quo decima pars castorei, sexta galbani vel opopanacis coxeris. Ex eiusmodi oleis fiunt cerata. Ceratis consperguntur 3 aromata, quæ calefaciant, & partium tenuitate facilè penetrent.

Fomenta fiunt ex decocto maioranæ, rosmari- ni, arthemisiæ, origani, calamenthi, thymi, hyssopi, parietariæ, sylibrij, berulæ & cressonum, ex quibus & balnea comparari debêt. Alioqui has 4 herbas friget in sartagine ex oleo vel butyro, & em- plastri modo femori superiori, pectini & perinæo calida admouebis. Omentum arietinum calidum, iisdem locis admotum iuuat, vel recens detracta pellis cuniculi. Cuius axungia in eundem vsum plurimum commendatur.

Clysteribus & glandibus ex supradictis herbis, oleis & materia, adiecto sale & melle, ad irritandum, confici debent.

Decoctum radicis eringij, cyperi, radicis lappæ, ameos, cinamomi, nepithæ, myrrhæ, opopanacis,

1 Expultri-  
cu scilicet sa-  
uitatu vesti-  
ca, quæ dy-  
suriam facit:  
aut retentri-  
cu, quæ strā-  
gur am.

2 Cōmenda-  
tur præterea  
terra oleum de  
scorpionibus  
cū anethino.

Vt. ℞. olei  
ane hini, olei  
de scorpionibus  
an. 3. 10.  
castorei 3. 2.  
galban. 3. 3.

Coquātur in  
balneo ma-  
rie, f. lini-  
mentum.

3 Vt caryo-  
phyll. macis,  
cyperus, an-  
gelica.

4 Vt. ℞. ra-  
phani contu-  
si, parietariæ,  
cressonis an.

M. i. Ex his  
cū suo illo adi-  
pe frictu, vel  
axungia fæ-

niculi, f. cata-  
plasma admo-  
uendum publi-  
cæ permæo.

## DE MORB. INTERNIS

cretæ marinæ, carthami, extremitatum caulium, & alia, quæ postea dicentur cap. de lapide.

Aquæ conueniunt tribulorum, raphani, cretæ marinæ, pentaphylli, alliorum, acori, florum maluæ, cyperi, erytrodani, sabina, fabaceorum, scolopendrij, alkekengi. Grana alkekengi trita & expressa succum reddunt, vtilem cum vino albo tenui, terebinthina, parietaria, acetosa, acetum album.

Conueniunt à proprietate viuerræ genitale, cinis scorpionum crematorum, testa oui repurgata, è qua pullus exierit, aselli, vermes terreni, erinacei siccati, aut eorundem testiculor. puluis, vesica tauri & capræ.

Conuenit & theriacæ potus, vocatum lithontribon, electarium Ducis, aurea Alexandrina, cucurbitulæ natibus affixæ. Pediculus inditus formini virgæ, aut cimex, vel loco horum fila croci, granulum salis, cathæter, algalia, syringua, aut candela cerea oleo priùs illita.

Vbi verò vrina 5 acrior est, si quidem corpus benè carnosum est, si inflammationis suspitio, vena basilica 6 secanda est.

Purgandam cum 3. 10. cassiæ dissolutæ in sero caprino, vel liquore 7 cōuenienti. Vomitus, si quidem consuetudo est, plurimùm prodest. Clysteres è lacte, 8 sudoris prouocatio.

Galenus 9 ex Hippocrate, phlebotomiam è crure magis probâsse visus est, quàm è brachio. Arabes priùs è brachio, quàm è crure, quod & aliquot locis Galeni non repugnat.

Hîc olea conueniunt, violatum, nenupharinum, de papauere, ex quibus cerata fiunt, admixta

5 Naturalis  
œconomia vi-  
tio, excremē-  
ti suppressio-  
ne, quod in  
peculiari cu-  
râsque natu-  
ra redundare  
cōsuevit, aut  
improba vi-  
ctus ratione.  
6 Ad sedan-  
dum ardorē,  
materiæ eua-  
cuationē, &  
faciendum  
perspirabile  
corpus.  
7 Vt aqua  
decoctionis  
glycyrrhizæ  
8 Vt exitum  
habeat ichor,  
cuius acrimo-  
nia fit stran-  
guria.  
9 Libro 6.  
Aphori. aph.  
36. & sent. 5.  
sect. 1. lib. 6.  
αὐτὸ ἐν πρῶτῳ.

modica quantitate caphuræ, gran. 3. aut 4. ad singulas ℥. cerati.

Balnea & forus in decocto sem. lini, scænugræci, althææ, psilij. Nec peccaueris, si quid chamæmeli adieceris.

Aqua distillata ex acetosa, plantagine, laureola, pentaphyllo, syrupus de iuibis, de papauere, decoctum glycyrrhizæ, portul. lactucæ, quatuor seminum communium, lac asinæ, vel capræ, serum lactis, lac amygdalarum, hordeatum cum semin. lini, melonum, cucumeris, 4. sem. communibus frigidis, quale hoc.

℥. feminum psilij, melonum, cucumeris ana 3. 2. feminum althææ, cydoniorum ana 3. 1. feminum lactucæ, hyoscyami albi, papaueris albi ana 3. 8. gummi tragacanthi 3. 2. fiat decoctio: cum qua dissolue amygdala dulcia. Fiat lac amygdalarum cum saccharo violato. Quod si suspitio est vlceris, iam bolus armena, terra sigillata, sanguis draconis, pulu. equiseti cum lacte vstulato, syrupo myrtillorum, iulepo rosato conueniunt. Similiter saccharum rosatum, triasantalum, tragacanthum frigidum, cydoniatum sine speciebus factum cum saccharo. Iniicitur in virgam lac recens emulctum, maxime muliebre, cui si calor maior est & dolor, addatur mucago feminis papaueris, cucumeris, psilij, & similium cum modico caphuræ. Vbi verò consolidandum.

℥. lactis mulieris, vel bubuli vstulati 3. 3. sarcocollæ nutritæ, amyli, cerussæ ana 3. 1. fiat iniectio ter aut quater in die. Laudatur hic puluis, quo mane & vesperi vtatur.



## DE MORB. INTERNIS

℥.sem.melonum excorticatorum ʒ.2.semin.citruli, cucurbitæ, portulacæ, papaueris albi ana ʒ.ß. sem.hyoſcyami albi ʒ.ß.& Gr.6.panis ſacchari ʒ.3. fiat pul.detur ad ʒ.2.cum iulepo violato, aut liquore conuenienti. Drachma vna trochiſcorum alkekengi cum liquore conuenienti plurimùm commendatur.

Grumi decocto ſtæchados, ſarmentorum vitis, mummiâ, oxymelite, rebuſque eiufmodi incidentibus diſſolui debent. Hinc graue periculum eſt. Sequitur enim animi defectio, coloris fæditas, pulſus paruus, frequens, obſcurus, anxietas, & vt plurimùm mors.

Sanies & pituita ſi craſſior eſt, incidenda. Inflammationes & vlcera ſuo modo curanda ſunt. Ita & calculus. Plenior veſica manibus comprimenda eſt, & qua parte tumor eminet.

### EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

*Vrina ſupprimitur vacua, aut plena veſica.* Urina vel ſupprimitur: vel parùm & frequenter mingitur: vel ſeruat naturalem excretionis modum, ſed veſica cum diſcultate aliqua aut dolore operatur. Supprimitur autem vel vacua, vel plena veſica. Si vacua, argumentum eſt vrinam non tranſire ad veſicam. Vitium igitur erit vel in vreticibus, vel renibus, aut reſolutis, aut interceptis. Philoth.in Aphor. obſtructionem addit in craſſioribus inteſtiniſ à cràſſa & viſcida pituita, quæ prohibet ἀνάδωσιν ad hepar, & conſequutione quadam ſuccorum generationem, & vrinæ ſecretionem. Si verò veſica plena ſit, in ea affectionem morboſam eſſe neceſſe eſt. Suppreſſio vrinæ ſiue renum vitio, ſiue veſicæ fiat, quibuſdam dicitur ἰσχυρία. Propriè tamen hoc nomen uſurpari debet in ea tantum affectione, in qua vrina ſupprimitur, læſione in veſica exiſtente. Cum autem parùm

& frequenter, siue guttatim & maturius, quàm pro naturali excretionem emittitur, *σπασμογρία*: quando tempore conuenienti, sed cum difficili motu, aut dolore, *δυσουρία* nominatur. Hæc est vera distinctio inter has affectiones breuissimè ex multis Galeni locis comprehensa. In quem acerbius tanquam tenebras offundentem, nobis inuehi videntur, qui nuper Commentarios in Aphor. scripserunt. Aiunt enim in dysuria semper dolorem fieri, ut in dysenteria: nunquam in stranguria. Sicque hæc sola differentia dysuriam differre à stranguria, siue guttatim emittatur, siue contrà. In quo & sibi & experientiæ repugnant, ut qui alio loco scribant stranguriam fieri eo modo, quo dysenteriam ab acri humore confertim ad vesicam irruente, & alibi ardorem urinx adiungant, imò producant aphor. 55. libr. 5. Vbi Hippocr. ait stranguriam fieri à magna inflammatione vteri, aut intestini, aut renibus purulentis. Quo pacto hic dolor ad stranguriam nihil pertinebit? Neque ad mixtionem duarum affectionum recurrendum; nisi maiorem multò confusionem in omnibus & Hippocratis, & Galeni scriptis, de industria mutatis pro arbitrio vocabulorum significationibus, inducere velimus. Vnicuique enim libenter concesserim rem quamlibet, ut velit, nominare, modò aut à seipso, aut ab aliis intelligatur. At in veterum scriptis interpretandis non idem licet. Illi enim perspicuitatem sequuti propriis, & suo tempore vsitatis dictionibus conceptiones animi expresserunt, parùm admodum solliciti, quo quisque idiomate deinceps loqueretur, aut in quam significationem vocabula traduceret, modò sententiam non peruerteret. Accertè nescio an vlla vnquam maior in grauiotibus scientiis exorta sit confusio ex præstigiis quibusdam & captionibus tum verborum, tum dialecticarum ratiocinationum, quàm quæ imminere videtur, neglecta vera illa antiquorum methodo, solo nomine plerisque, etiam doctioribus nota. Cùm igitur perspicuum sit, non solum in dysuria, sed & in stranguria & ischuria dolorem sæpè fieri, actionem tamen vesicæ diuerso modo lædi, num satius fuerit à rei natura, & læsionis in excretionem varietate harum affectionum distinctionem sumere, quàm ex dolore, qui omnibus communis esse potest? Ut igitur aluus in lænteria, ita vesica in stranguria, siue urinx stilli-

*Fuschiana  
tatur.*

# DE MORB. INTERNIS

*Gale. cap. 4. lib. 6 de loc. mal. aff.* cidio non expectat, vt vrina tota colligatur, sed statim, tanquam grauantem (vt ait Galenus) aut mordentem expellit. In dysuria siue difficultate vrinæ expectat quidem, atque aliquando diutius, quàm oporteat: sed cum excernenda est, percipit æger dolorem, aut tantam difficultatem, vt sæpè, nisi locum vesicæ comprimat manu, aut diu & magno conatu enitatur, liberè non profluat. Et si in totum supprimatur, iam erit *ισχυρία*. His positis causæ faciliè inuestigari possunt. In stranguria primùm vesicam stimulari ad excretionem ante tempus perspicuum est. Id igitur vel vrinæ mordentis acrimonia fieri necesse est, vel imbecillitate retentricis, quæ minimo etiam onere grauatur, vel ab vlcere, erysipelate, abscessu, inflammatione. Acrior vrina redditur vel admixtione acris alicuius humoris, vt pituitæ falsæ, aut bilis, puris per vesicam euacuati, vt à renibus suppuratis, vel quia talis ex venis effluit ex praua victus ratione, aut intemperiem calidam, & humidam, vel humidam acquisiuit. Idque aliquando per consensum vicinitatis ratione. Participat enim intemperie & inflammatione partium proximarum, à quarum etiam tumoribus premitur, vt intestini & vteri. Retentrix imbecilla redditur ab intemperie qualibet, sed præsertim frigida. Musculus vesicam claudens quandoque resoluitur, vt in senibus. Sed propriè non est stranguria. Hæ sunt in vniuersum causæ huius præcipitis excretionis, propriis signis distinguendæ, & ex relatu ægri, quas diuersis locis Hippocr. exposuit. Vt cum scribit in siccitatibus vrinæ stillicidia fieri: alio loco, Recto intestino, aut vtero inflammationem patiente, & renibus purulentis, curari quoque vini potione, & sectis venis interioribus. *δυσουρίας*, si dolorem pro symptomate habeat, causa erit inflammatio, vel abscessus, vel vlceratio, vt ab vsu medicamentorum acrium, vel spiritus flatuosus, vel inæqualis intemperies. Si verò difficilem aliquem motum, imbecillitas potentiae excrettricis, vt ob frigus vesicæ, aut colli: vel tumor præter naturam, vel obstructio à crassis & viscidis humoribus infarctis, aut adhærentibus ceruici vesicæ, aut vrinæ permixtis. *Ισχυρία* nascitur obstructione meatus vrinarij, imbecillitate excrettricis, intemperie. Obstructio, vel cum collum vesicæ tumescit & induratur extra naturam, adeò vt via vrinæ claudatur: vel cum ibi aliquid præter naturam ge-

*Stranguria causa.*

*Aphor. 16. lib. 3. § 8. 5. 48. 7.*

*Ischuria causa.*

neratur, vt tophus, caruncula, tuberculum : vel aliunde confluit aliquid in illam cavitatem, vt grumus, lapis. Imbecillitas ab intemperie, morbo organico, solutione continui, sæpè neglecta meiendi occasione, velut eueria expultrice ob copiam vrinæ immodicam, vnde etiam obturatur meatus. Sic nec vesica sese contrahere potest ad expellendum: nec si id fecerit, præcluso aditu vrina exire. Intemperies à multa siccitate idem efficit, vt in febribus ardentissimis & siccissimis. Si lapis exitum prohibeat, sitque insignis magnitudinis, cognoscitur, quoniam ægro supino, si concutiat, vrina prodit: si paruus extiterit, cathetere immisso sentitur in collo vesicæ. Si arena, dignoscitur exitu, quanquam rarò obstruat, nisi lentus humor adsit. Si sanguis concretus, liquidus solet antè effluere: si pituita, apparet dum excernitur. Si imbecillitas, præcessit aut diuturna retentio, aut frigus vehemens, aut alia intemperies. Si abscessus, dolores, & febres præcesserunt. Tophus, callus, tubercula solent sequi ardorem vrinæ, fluxum seminis, morbum gallicum, ulcerationem à cathetere. In cathetere cauendum ne fallamur, quòd aliquando pure aut crassitie pituitæ officium intercipiatur, & os catheteris angustius, aut quia nihil lotij in vesica, interceptis superioribus. Constat experientia vrinam supprimi à calculo in ventriculo renum sine dolore. Sed ubi incidit in vretas, acerbissimus dolor excitatur. Plerisque suppurantur renes calculosi, & colliquantur, vt tantùm maneat pellicula, sicuti D. de Mancy, cui ren dexter colliquatus, sinister calculum habebat, vreter & partes reliquæ siccatae. Subita resolutione vesicæ cuidam cum subitus dolor motus esset in ossè sacro & coccyge, vrinæ suppressio sequuta est, quam tamen reddebat tussiens, & sese comprimens, manu admota pubi. Sensus amissus in recto intestino, vt neque clysterem injectum sentiret, neque cum redderetur. Admotis fomentis, & emplastris ossi sacro contra Paralytim, rediit sensus & conualuit. Viro nobili in pueritia secto aderant signa omnia calculi, nisi quòd cathetere non inueniebatur. Mortuo à malè curata cicatrice abscessus & gangræna in vesica & vicinia inuenta est. Inflam-

*Domino de  
Mancy ren  
dexter colli-  
quatus, sini-  
stro calculo  
occluso.*

*Inflammati-  
onis vesicæ  
notæ.*

## DE MORB. INTERNIS

lum, vsum medicamentorum acrium, dolorem vehementem.

Varia curandi ratio. Pro causarum diuersitate conueniunt clysteres ex materia conuenienti, quia collum vesicæ incidet recto intestino, fots, infessus, veronicæ succus, cuculorum esus, qui iuniperum oleant, candela cerea, iniectiones per virgam, cassia cum tantillo rhab. terebinthina, iniectio ex oleo nardino & succo ocimi, aqua theriacalis, gallus cum parietaria, radicibus, herbis, seminibus conuenientibus coctus, aqua ligustri, herniaria, sacculi, vinum dilutum aqua parietariæ, intinctus ciborum in oxymelite, vel succo limonum, sectio venarum interiorum iuxta Hipp. A materia frigida vini potio, fots ex decocto apij, illitus ex vnguento Agrippæ, Martiato & similibus, vinum enulatum, sterqus grandioris muris.

### ANTO. VALETH EXERC. XLVII.

**V**Rina guttatim & sæpè reddita stranguriam facit: excreta magno cum dolore & nisu, aut etiam manu firmiter appressa, dysuriam: suppressa seu cohibita ischuriam. Stranguria duas cum habeat causas, acrimoniam vrinæ, ab humorum corporis totius mordacitate, aut aliquo renum vitio, vt vlcere & abscessu, itémque facultatis vesicæ retétricis imbecillitatem, à morbo, vt intemperie, aut humore præter naturam, si quidem ab illa fiat, dolorifica est, ab hac minimè. Dysuria verò atq; ischuria maioris tantùm & minoris ratione distinctæ affectiones iisdem innituntur causis. Aut enim fiunt ex partium aliarum consensu, vt resolutorum renum, serum non attrahentium, vreterum interceptorum, crassorum intestinorum inflammatorum: aut per protopatheiam vesicæ, vel plus æquo frigidæ, vnde expultrix facultas imbecilla, vel obsessæ phlegmone, tumore aut obstructione, sanguinis grumo, pure,

*Dysuria & ischuria non tantum inter se distincta.*

re, caruncula, topho, lapide, copia vrinæ, aut deniq;  
 re quauis alia vrinam exitu prohibēte. Horum cau-  
 sæ & signa affectuum à Galeno describuntur lib. 3. *Non omnis*  
 de sympt. caus. & lib. 6. de loc. mal. affectis. *vrinæ sup-*  
 Quin- *pressio est is-*  
 etiam plerunque in morbis acutis instante crisi vri-  
 næ suppressio interuenit ad crisim apparens, per su-  
 dores, aut alui profluuium futuram. Aliquando iis- *Hipp. sent.*  
 dem in morbis per resolutionem caloris insiti vesi- *16. sect. 2.*  
 cæ vrina intercipitur ad mortem. Sed hæ suppress- *Prophet. 1.*  
 siones ischuriæ nō sunt, quia vesica plena nō sunt.  
 Vt causę sunt varię ita curādi ratio diuersa. At prius  
 quam de remediis decernas, affectam partem ex-  
 plorabis, & si tensio, tumórque nullus sensu perci-  
 piatur, fistulam vrinariam, cathēterem vocāt, in pe-  
 nem immittes. Vbi constiterit vrinæ acrimoniam,  
 aut vlcus & abscessum renum, stranguriam excita-  
 re, opportunum fuerit ad ea præsidia, quæ cap. de  
 ardore vrinæ & de inflāmatione renum traduntur,  
 recurrere. Quòd si ab intemperie frigida vesicæ id  
 mali acciderit, calorificis remediis, præsertim admo-  
 tis, sanatur. Cum autem meiendi difficultas, vele-  
 tiam ischuria vitio renum serum non attrahentium  
 fiunt, quia fusione & secretionem est opus, compa-  
 randa sunt ex simplicibus calidioribus & acriori-  
 bus apozemata, quæ sanguinem fundant, & se-  
 rum segregent, sed præmissa tamen purgatione  
 blanda.

℥. cassiæ recens è canna extractæ drach. 6. pulpæ sebesten  
 drach. 1. rhe. elect. puluerati ℥. 4. vel 3. 1. cum puluere gly-  
 cyrrhiæ, f. bolus. Vel.

℥. terebinth. Venet. claræ, in aqua rosac. & alkekeng.  
 lot. drach. 3. rhe. elect. pulu. ℥. 2. cum diatragacanth. fri-  
 gido, f. bolus. Hic vtilior est, cum detergendi consilium

ſuſcipitur.

Clyſteres ſubinde repetiti, materiam aliò deriuando, nec in affectam partem adducendo, magis conferunt. Apozema verò vrinas ciens erit huiusmodi.

℞. radic. quinque aper. rad. valerian. rub. tinct. maioris eringij ana ꝑ. 1. hepar. capill. cich. chamædr. chamæpyth. ſcariol. agrim. eupator. abſynth. hyſſop. ana M. 1. femin. apij, petroſ. azar. ſeſel. halicacab. ana ꝑ. 2. paſſul. integr. ꝑ. 1. f. flor. genift. ſambuc. ana ꝑ. 2. cicer. rub. vnc. 2. herniariæ vnc. ſ. decoctio ad lb. 1. in colatura diſſolue ſyr. capill. ven. & de bizantiis ana ꝑ. 2. ſ. f.

Apozema conditum, vt decet. Vbi ſanguinis grumus, caruncula, & tophus ſeu callus in veſica affuerint, vſurpanda erunt mollientia, digerentia, exedentia. Molliet hic litus.

℞. ol. amygdal. dulc. & de ſcorpionibus in aq. parietar. lotor. mucag. ſem. alth. lini, & ſœnugr. in aq. ſaxifrag. extract. & axung. cuniculi ana ꝑ. 3. ſ. cum pauca cera in aq. bipinellæ emollita ſ. linimentum.

Fomentum ex oxymelite cum ſpongia ad incidendum accommodatiſſimum. Vel eius generis incidentia, vt hydromel, oxymel, in quibus quæ calida ſunt, incocta ſint, intromittuntur per cathæterem. Exedentia poſtulât caruncula, callus, ſed quæ minimum habeant eroſionis. De his conſule Al-

phonſum Ferrium Neapolitanum Medicum longè doctiſſimum, qui pulcherrimum de caruncula tractatum edidit. Si lapis in veſica ſuppreſſionis vrinæ cauſa ſit, quærenda remedia ex capite de calculo veſicæ.

De 1 calculo.

C A P. 48.

**C**alculum gignunt calor renum 2 immodicus, aliquando etiam tepidus, & humor craſſior, qui calore lapideſcit. Generatur aliquando

1 Delithiaſi, ſiue lapide renum.

2 Si tenuis ſiſit humor, aut acor, vnaque expulſrix renum facultas languidior, & meatus anguſtiores.

in renum stomacho: aliquando in substantia. In vesica 3 quoque generari verisimile est, & maxime pueris.

Signa, dolor 4 fixus, in renibus grauitas, vrinæ initio tenues. Primum quidem cum arenis & exigua asperitate: deinde cum multo sabulo & crassiores excernuntur. \* Primum igitur clystere molliendus venter est. Renes enim oppressi stercore grauius dolent: liberati leuius, & ex eo calculus minori negotio excluditur.

In dolore vehementi sanguis detrahi potest è poplite vel malleolo. Aluus quoque leni medicamento ducenda est, vt cassia ad 3.1. cum saccharo violato, vel glycyrr. decocto. Optimum quoque fuerit interim, dum Medicus laborat excludendo calculo, alternis diebus 6 Cassiæ 3.ß. aut 3.3. cum saccharo violato imperare horæ dimidio ante cibum. Posteaquam vero 7 stercus depulsum est, secta vena est, & lenita aluus, vnctionibus, fomentis, balneis & remediis lenientibus atque laxantibus vtendum est. Conueniet itaque oleum viol. amygd. dulc. butyrum recens, oleum in quo radices althææ coxeris. Vnguentum dialthææ, cæsyphus, hyeme etiam oleum liliorum, & cham. fotus & balnea ex malua, bismalua, violaria, cham. meliloto, lini semine & fœnuigr. aliisque eiusmodi.

Iuscula 8 quædam ex malua, bismalua, adiectis ciceribus rubris cum multo butyro & modico sale. Postea verò remediis 9 vtendum est, quæ calculum excludunt, Primum quidem lenioribus, deinde

3 *Primæ generatione, aut secundaria.*

4 *Non vagus, vt in colico dolore.*

5 *Ab obstru-  
ctione vasis  
vriarij Aut  
etiā vrinarij  
suppressio cū  
dolore renum*

*repente obor-  
to. Ex Hipp.  
in Coactu an-  
maduers.*

\* *Pituita ro-  
mitio, deinde  
etiam bilis  
aruginosa,  
femoris quod  
è directo est,  
stupor.*

6 *Vt nephri-  
tica remedia  
inoffenso cur-  
su ad renes  
perueniant.*

7 *Stercoris  
enim copia  
nephritici  
damni augē-  
tur, compres-  
sis à colo feci-  
bus disten-  
to renibus.*

8 *Vt. ℥. summitatum bismaluæ M. i. fi. iusculum cum multo butyro & cochleari  
vino mellis Narbonensis.* 9 *Si subsistat calculus, & ad vesicam viam affe-  
ctet.*



# DE MORB. INTERNIS

fortioribus. Conuenit initio oxymel simplex cum decocto liquiritiæ. Betonica, lupulus, capparis, scolopendrium, capillares herbæ, radix graminis, chamæbati, & similia. Fortiora sunt scylla, iris, enula, aristolochia, & similia. Oportet autē interuallis repetere hæc remedia leniendo, laxando, excludendo.

Sanguis 10 hircinus è iugulato hirco iuvene, quo tempore vuæ maturescunt : medius quidem excipitur, relicto eo, qui primus fluit, & postremus fictili vase excipitur. Insolatur, 11 exsiccat, reseruaturque fideliter. Cùm vsus fuerit, accipies pul. 3. i. s. cum vino tenui.

Aurelianus à balneo, aut iam laxatis viis, renes, pubem, interfœmineum, calido hirci sanguine inungit. Lapis Iudaicus tritus & potui datus 3. i. pondere. Solinus, Dioscorides & alij Medici tum renum, tum vesicæ lapides frangere hunc scribunt. Galenus non vesicæ, sed renum. Author libelli de calculo duplex 12 genus facit, scribitque marem è renibus, fœminam è vesica calculum educere.

Datur cum oxymelite tritus in cote, vel cum 3. 3. aquæ conuenientis. Oleum 13 chamæmelinum fictili vase concluditur, mistis floribus genistæ. Vas fideliter clausum stercorario fimo sepelitur, illicque, vt efferuescat, aliquot dies relinquitur. Eo oleo renes, pubes, perinæum inunguntur.

Bestiolæ in lapidariis, fodinis, quasi verrucæ lapidibus obhærescunt, quæ si quinque numero ex aqua 3. 3. sumantur, mirabiliter iuant. Pellis 14 lepo-

tem aptè conficies ex radic. petro. rad. saxifrag. & lapillis qui in astacorum capitibus reperiuntur. Conferet mirifice ad lapidem confringendum cum vino albo aqua fœnicul. scolopend. aut petroselinis diluto exhibitus.

10 Hæc ex ætlio. Obseruabis verò sanguinē illum efficaciorē futurū, si postremis diebus hircus diureticis altus fuerit.

11 Obducto linteo, ne solis ardore vis euanescat.

12 Gal. lib. 9. Simplic. vnum lapidis Iudaici genus tantum statuit. Vnde colligas libell. de calculo falso Galenotribui.

13 Huiusmodi oleum tenendum & incidendi in die 3. 3. vim habet.

14 Hæc propter inextinguibilem diuturnitatem esse nephritica. Pul-

ris cremata, lepus decolatus, alioqui integer cum croco & carnibus vase fictili crematur. Eiusdem renes siccati & inueterati pondere  $\mathfrak{z}$ . 4. ex vino tenui propinantur. Cinis vngulæ equi, plumarum palumborum, testæ cochlearum, cæcorum, vermium terrenorum, asellorum, passeruli, quam caudam tremulam vocant, stercus murium in aceto tritum. Calculus, quem quis primùm excluserit. Lotium capræ montanæ, cicadæ, & alia eiusmodi à proprietate calculum excludunt.

Corticis raphani acerrimi  $\mathfrak{z}$ . 6. horis 12. in 15 vini albi tennis  $\mathfrak{z}$ . 8. madeant. Colatura duabus dosibus sumitur.

Terebinthina 16 ad cautionem calculi potiùs, quàm ad exclusionem, imperanda est, cæque multis modis vtimur.

$\mathcal{L}$ . terebinthinæ  $\mathfrak{z}$ . 4. inuratur in lamina ferrea candente, vt possit infriari. Dabis  $\mathfrak{z}$ . 2. eius pulueris cum  $\mathfrak{z}$ . 2. aquæ saxifragiæ, chamæmeli, vel genistæ, &  $\mathfrak{z}$ . 1. oxymelitis. Hoc medicamentum 17 excludendo calculo satis esse potest, vbi priùs lenieris, & relaxaueris. Vt

$\mathcal{L}$ . terebinthinæ.  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . lithontribi  $\mathfrak{z}$ . 2. misce, fiat bolus. Aliud.

$\mathcal{L}$ . terebinthinæ lotæ decies in aqua saxifragiæ  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . cum saccharo fiat bolus. Hoc verò datur tempore paroxysmi.

$\mathcal{L}$ . terebinthinæ lotæ in aqua violarum  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . 18 benedictæ  $\mathfrak{z}$ . 2. Aliud.

$\mathcal{L}$ . 19 terebinthinæ lotæ in aqua halicacabi  $\mathfrak{z}$ . 2. pul. tragacanthi & glycyrrhizæ ana  $\mathfrak{z}$ . 1.  $\beta$ . incorporantur in  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . cassiæ, cum saccharo fiat bolus. Aqua

15 Vini albi  
vsus in calculi  
genesis non  
probatius,  
quod ad renes  
humores deducit  
excrementios.

16 Imò potius  
ad cautionem, quam  
ad prouisionem  
terebinthina  
prescribenda.

17 Idem facit  
terebinthina aqua  
stillatitia.

18 Ex Rhaphan.  
descriptio  
ne, quæ tur-  
bith. nō recipit,  
Attamen  
huius loco re-  
cte substitues  
hieræ pic.  $\mathfrak{z}$ . 2

19 Hoc medi-  
camentū pari  
facilitate le-  
nuendi & te-  
nuandi pollet,  
propterea qd;  
ad paroxys-  
mū dīeētōs  
imperari po-  
test.

distillata è terebinthina.

Iustinianum excludendo calculo ad ʒ. 3. dissoluitur in glycyrrhizæ decocto, vel cū saccharo violato in bolum cogitur. Lithontribon per se ʒ. 3. pondere, vel cum ʒ. Iustiniani ex decocto glycyrr. aqua violarum, chamæmeli, aut simili. Aliud.

℥. cornu cerui vsti & puluerisati, gummi tragacanthi similiter, pul. ana ʒ. i. terebinthinæ in lapide terrea, vt prius, crematæ ʒ. β. lapidis Iudaici, vermium terrenorū ana ʒ. i. incorporentur omnia in Iustiniani ʒ. i. β. Deinde in decocto glycyrrhizæ dissoluantur, & fiat potus.

Sunt qui singulare præsidium putant frangendo lapidi lignum 20 guaiacum: iusta quidem ratione, virtute videlicet incidente, adstringente & leniente. Talia enim esse oportet, quæ calculosis imperantur. Vitanda tamen sunt, quæ nimium siccant, quæ crassiorum partium.

20 Guaiacinum decoctū diureticū est, vnaque cum vrinis sudores citet maximè: sed potius in prouisione confert, quàm excludit.

21 Quod renes habeant angustas

Ratio quoque habitus corporis ineunda est. Obesum corpus magis 21 tenuantia, gracile verò minus perferre potest. Sic loci, temporis, anni, ætatum & similia meminisse oportet. Laudatur & hæc distillatio.

22 Vt pulueris polygoni minoris, betonicae, lapillorum astacinarum, pulueris coriici c. β. i.

℥. mellis ros. terebinthinæ an lb. i. iuiubarum, sebesten, nucleorum pini ana ʒ. 4. Granorum alkekengi, seminis cucumeris, nigellæ, apij ana ʒ. 2. succi raphani per residentiam depurati lb. 2. Semina, & reliqua materia solida, conquassentur: cum cæteris in alembico ponantur, fiat distillatio. In distillationis vnc. 3. dissolue ʒ. i. aut ʒ. 4. 22 eorum, quæ à proprietate calculum excludunt. Qualia sunt antea descripta, cinis scorpionum, scarabeorum, hepatis

asini, testæ ouorum, ex qua exclusus recenter pullus est, hirundinum, testarum auellana.

Limonum succus à multis commendatur. Item & cinis vitri combusti. In vehementi siti & calore, si quidem prius vacuatum corpus est, si debilitas visceris, aut consuetudo non prohibet, aquæ frigida potus largiter exhibitus aliquando calculum excludit. Aliud remedium.

℥. rad. asparagi, rad. rubi humilis ana M. 2. foliorum betonica, polij montani ana M. 2. cicerum nigrorum M. 1. fiat decoctio in aqua pluuiali secundum artem. In fine decoctionis adde aceti scyllitici ℥. 1. fiat colatura. Dosis ℥. 4. cum ℥. 1. lapidis Iudaici, aut similibus.

Frangendo calculo non est remedium inuenire forsitan isto accommodatius. ℥. succi limon. ℔. 2. succ. raphan. ℔. 3. succ. bipinell. beton. saxifrag. parietar. alkekeng. alth. cretium ana ℔. 6. Misceantur simul. Quibus adde tribulor. cortic. bruce spinæ, radic. fœnic. petrosf. acor. enulæ, veronica, gentian. ireos Florent. an. ℥. 2. seminis melon. ocymi, bardan. milij solis, seminis petrosel. Macedonici ana ℥. 1. semin. cucumeris, portulac. citrul. ana ℥. 6. fol. & flor. beton. scolopend. aspleni, flor. viol. alth. bugloss. tapf. barb. ana M. 2. f. infusio, deinde fortis expressio. In qua dissolue mell. optimi despumati ℔. 2. rebinthinæ ℔. 1. aceti alb. quart. 1. specier. electar. Duc. aureæ Alexandrinæ, lithontr. ana ℥. 1. f. distillatio in alembico ex arte. ℥. supradictæ distillationis ℥. 3. sacch. violacei ℥. 1. cinam. ℥. 6. Detur bis in die horis 4. à cibo, neque comedat post horas quatuor.

Sunt qui agripalmæ manipulos duos contrun-

## DE MORB. INTERNIS

dant, sensim affundendo vini alb.  $\zeta$ . 4. salis subtilissimè triti  $\zeta$ . 1. & factam expressionem potui dent. Alij aquam argentinæ commendant, aquam chamæmeli, itémque lappæ radic. decoctum.

*Remedium Porphyrij & Octauij.*

$\mathcal{L}$ . brassicæ siccae & in puluerem redactæ  $\zeta$ . 2. piperis  $\zeta$ .  $\beta$ . misce. Dato  $\zeta$ . 1. ex aqua, aut aqua alkekengi, aut simili.

Gallus lassatus flagris cum polytrico, trichomane, lupulo, asparagis, aliisque eiusmodi ad putrilaginem coquitur: ius sorbetur. Conueniunt præterea scolopendrium, portulacæ succus, cucurbitæ cinis, valeriana, semen personatæ, cardui & damosonij radix, lini, cucumeris, maluæ, fœnugræci, apij, feseleos, hederæ semina, cyperi radix, asari, rusci, cynosbati fructus detracta interiori lanuginæ, & spongiolæ in cynosbato natæ, gummi, nuclei cerasorû, persicorum, cortex medius corilli, sarmenta vitis combusta, & extincta in vino tenui, aut liquore conuenienti, vt bibatur colatura.

Electri, lapidis spongiæ, pul. saxifragiæ ana  $\zeta$ .  $\beta$ . ex aqua genistæ, aut simili.

Cucurbitula, lenito priùs dolore, remollitis ac relaxatis partibus, iam non vrgente inflammatione, renibus primùm, deinde perinæo & inguinibus affigi debet.

In summa clystere mollienda aluus, leniendus venter è cassia. Detrahendus sanguis è crure, nisi plenitudo sit totius corporis: sic enim è cubito priùs. Lenientibus atque laxantibus, deinde etiam leuiter incidentibus calculus ad exclusionem præparandus est, paulatimque faciendus gradus ad ea,

quæ detergent, attenuant, expellunt, atque etiam  
 yrinas mouent: multò maximè cum iam remittitur  
 dolor, & calculus commutat locum. Quòd si iis,  
 quæ bibuntur, nihil efficitur, cucurbitulis vtendum  
 est. Si verò neque hoc remedio exit calculus, ad <sup>23</sup> *Vt ad ca-*  
 relaxantia, lenientia, & initium curationis redeun- *taplasmata*  
 dum est. Relaxabunt & leniunt fomenta, cataplas- *ex raphano,*  
 mata. vt. ℥. fol. malu. bismal. parietariæ ana M. i. *na sturtio a-*  
 summitat. aneth. flor. chamæm. & melilot. ana p. i. *quatico, pa-*  
 semin. alth. lini, fœnugr. anis. ana ℥. β. bulliant in a- *rietaria in a-*  
 qua & vino albo pro fotu. Ex huius decocti mag- *dipe cuniculi*  
 mate fingetur cataplasma, additis ol. scorpion. & cu- *frxis confe-*  
 niculi axungia. Auena, berula, gallitricum, melilo- *cta.*  
 tum & similia è vino albo, aut butyro friguntur, &  
 inde fiunt sacculi & emplastra minori apparatu. Si  
 verò translatus est calcûlus in vesicam, nec aliter ex-  
 trahi potest, ad incisionem confugere oportet. Cu-  
 ius rationem repetes ex 6. Pauli, Chirurgia Albucasi.  
 & aliis Chirurgis.

In hoc morbo dolor intolerabilis facit, vt aliquân-  
 do vtendum sit narcoticis. De quibus multa antea.

*Descriptio 24 olei de scorpionibus.*

℥. aristolochiæ rotundæ, gentianæ, cyperi, cor- <sup>24</sup> *Quod ad*  
 ticum radiceis capparis ana ℥. i. Bulliant omnia in *comminuen-*  
 lb. i. olei amygdalarum amararum. *dum calculi*  
*in renibus*

Sunt qui addant succi raphani lb. β. vt fiat deco- *valere putar-*  
 ctio ad succi consumptionem. Alij aquam. Per heb- *tur.*  
 domadem insolentur.

Singulis libris colaturæ adijce duos scorpiones,  
 & rursus insolentur dies 15. Gutta eius olei virgè in-  
 funditur: eodem oleo pectem & perinæum inun-  
 guntur.

# DE MORB. INTERNIS

Probatum quoque multis balneum sulphureum, ex aquis naturalibus, vel subquadruplo sulphure liquato in quadrupla aqua. Alij in eiusmodi aquam calidam lintea immergunt, & calida perinaeo ac pectini apponunt.

## EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

*Calculi in capite concret.* Multis in partibus corporis humani calculi generari possunt. Obseruauimus concretos in capite & vtero mulieris, cui diffecandæ in Scholis publicè præfuius. Multis in folliculo fellis leues, nigri, flauī, innatantes, aquæ, qui quandóque excluduntur deorsum. In nobilissima muliere 53. repertos, secto folliculo, videre licuit in Auernia. Puero cuiusdam sutoris in mesenterio inuenti: duabus mulieribus in pulmonibus: multis in articulis, iecore, liene, ventriculo. Adhærent sæpè vesicæ, cranio, vtero. Galenus de humoribus meminit calculi in vtero. Musa mulierem refert ex ano quinque lapides reddidisse. Quod verissimile est. Nam pituita sæpè lentissima intestino hæret, quæ potest concreescere, dum satis non detergitur. Galenus s. de locis affectis meminit cuiusdam, qui è thorace velut grandines expuebat. Alberto Sabona-  
*Lapides ex ano redditi.* uonærolæ mortuo decem calculi inuenti in vesica magnitudine oui columbæ & figurâ, singuli pendentes plus quam 3. v. omnes simul 3. vi. vt scripsit Musa. Pituita putris & pus crassum aliquando repræsentant calculi signa, vt in Præfide quodam multa mucosa, viscida, longo tempore quotidie expurgante. Sed de materia, causa efficiente, & generationis modo in vesica & renibus non eadem omnium sententia. Alij aiunt multam materiam crassam ac terream primum cogi in vnum in vesica, cuius pars intima concreescit, tandemque, si non eiciatur, calore & frigore parte tenui consumpta in lapillum coalescere. Hinc voluitur ab vrina, & semper sibi adiungit atque sic augetur. Causam autem efficientem esse tum calorem, tum frigus, vnde in senibus & pueris generantur, non in iuuenibus. Alij ex Hippocr. materiam faciunt vrinam adustam à feruore & ardore. Quorum enim alius fluida est ac

fana, & vesica, aut vesicæ os, non ardet, his facile vrinam effluere, & in vesica nihil congregari. Quorum verò alius ardens & feruida fuerit, in his etiam necesse esse vesicam idem perpeti. Cum enim magis, quàm pro natura, fuerit calefacta, stomachus eius inflammatur. Vbi verò hæc perpetitur, vrinam non demittit, sed in seipsa concoquit & adurit: & quod quidem tenuissimum in ipsa est, excernitur: quod purissimum transit ac emingitur. Indicio esse vrinam splendidissimam excerni instar feri. Brasauolus tertium modum affert ex eodem Hippocr. 4. de morbis. Fieri enim ex arenis, sedimento, velut glutine, copulante. Hoc quibusdam non placet, quia natura vt statim arenam senserit, protinus eiicit. Et cum renum calculus nudus sit, adeo vesicam vexat, vt diu non possit retineri, quare nec augeti. Contrà nonnulli nullum in vesica lapidem generari aiunt, quin in renibus acceperit principium & rudimentum. Indicia esse nephriticos dolores, qui in omnibus præcedunt, & in omnibus calculis medium quasi nucleum reperiri, verum rudimentum à renibus exturbatum. Philot. contrà, sæpiùs in vesica propter capacitatem calculos generari. Respondent capacitatem iustum argumentum non esse, & experienciâ doceri contrarium. Tantam controuersiam neque nostrum est conciliare, neque breuibus scholiis id potest præstari. Sitamen licet ex iis, quæ apparent, quicquam efficere, cum lapides renum & vesicæ, neque eodem colore, neque eadem figura, neque eadem substantiâ, nec in eodem sexu aut ætate similiter concreescere sensus doceat, omnibus eandem causam, aut generationis modum tribuere, aut locum, non minus absurdum videtur, quàm si in metallis & lapidibus terrenis idem fieret. Vesicæ enim calculi ferè maiores, rarò alio colore, quàm albo, aut cinereo, in pueris frequentius ob edacitatem, vt ait Galenus, vnde crudi humores generantur, qui calore concreescunt. Sed fusam crassitiem, exceptam ob robur natiui caloris & virtutis naturalis in vesicam renes excernunt. Adde si vis mollia & humida corpora puerorum & fluxilia, quod plurimum facit ad excretionem materiæ crassæ. Quæ quia in senibus & adultis non adsunt, in illis frequentius generantur in renibus. In mulieribus rariùs propter menstrua, & laxitatem mollitiemque viarum.

*Hæc Fernely est opinio  
ca. 43. lib. 6.  
Pathologici.*

*Philosoph. cõment. in aph.  
80. lib. 4.*

*Calculi inueniuntur cur mulieribus rariùs generentur.*



## DE MORB. INTERNIS

Aceruantur lactis, casei, vinorum crassiorum usu, vt Ferraria: aquarum limosarum, vt Lutetia: alimentorum crassi succi, vbicūque sit. Vrinae aliquando arenosae ex vesica: aliquando contrā. Ex his omnibus in vesica & ab arenulis, & à materia terrea atque adusta, sed multò frequentius ex crudo succo, limoso ac viscido, quo etiam coguntur arenulae, calculos oriri consentaneum est, aliquandòque arenulas ex renibus in vesicam labi, sed & ex ipsius urinae faece resolutò humore posse fieri, à calore stomachi ipsius, vt ait Hippocrates, quales in matulae fundo apparent. Crassities materiae intelligitur ex corticibus veluti caprarum, quibus lapides vesicae integuntur, & ex compacta substantia ac duritie. A viscido humore frigus, à superueniente calore induratio, coctio & quasi assatio, vt in lateribus ex luto: vnde neque calore liquantur, neque frigore. In renibus verò ferè tinguntur rubro, vt rubrum intelligas, & flauum, & rufum iusta ratione, quod & in arenis videre licet. Nam à sanguine, calore loci, & partis colore tingi solent. Minùs duri, iperiri, & magis friabiles, quàm in vesica. Ergo magis ex arenulis coalescunt. Cur igitur multi arenas, mingunt, neque calculosi sunt? Causa in promptu est. Non enim coguntur, nisi viscido aliquo, & crudo humore, tanquam glutine. Opus est tempore. Vbi igitur obstructio à crassis & viscidis humoribus, & acrior urina ac magis faeculenta, angustiores meatus, calore superueniente à quacūque parte, vt hepate, corde, renibus, quod diu impactum fuit in meatu, induratur & lapidescit, figuramque accipit à sinu, in quo est. Neque impedimento est, quod nonnulli respondent, ex calculo arenulas fieri, non contrā. Cur enim qui generantur in vesica, in arenulas rarò dissoluuntur? Neque etiam ob id necesse est in calculo renum semper arenulas excerni cum urina. Nam in multis dissectis probatum contrarium, qui calculosi sunt inuenti, cum neque arenas meierent, neque laborarent urinae difficultate, in fossio calculo in substantia renum. Archigenes & Philagrius arenas reddi volunt, cum iam calculus è rene in vesicam descendit. Rudimentum quoque in renibus quandòque accipi, accretionem verò in vesica non est negandum. Cuiusmodi calculi in medio sunt friabiles, in superficie duriores & magis compacti, dolorésque nephritici praecedunt.

*Cur multi  
arenulas fun-  
dunt, cum cal-  
culosi nō sint.*

Quæ omnia plurimum conferre videntur ad curationem & prædictionem, vt in quibusdam potius ad arenularum generationem respicere, in aliis ad crudorum humorum copiam oporteat, certumque sit in renibus, & ex arenulis facilius posse comminui. Calculus renum exactè describitur his signis. Dolor renum acutus adest. Sexto tamen Epid. grauis in renem dolor, cum cibo replentur. Quod ita distinguendum censemus. Cum enim in ventriculo renum figitur, vel sine dolore est, vel cum graui. Vbi incidit in vreteras, vel etiam intra renem, pungit pelliculam in exortu vreterum dolor acerbissimus. Cum etiam mouentur vehementius, aut spinam flectunt, dolorem acutum percipiunt, & stuporem circa lumbos & crura ob compressionem nerui à lumbis, vel, vt alij volunt, venæ cauæ. Proinde additur ab Hippocr. & in lumbos, & in testem secundum renem situm. Videtur enim quibusdam testis sursum trahi. Dolor ille fixus est, nec locum mutat, vt in colico. Frequenter mingunt. Sed paulatim adstringitur & supprimitur vrina. Vrinam enim frequenter fluere non est sufficiens argumentum liberos esse calculis vreteras, cum vno clauso per alterum reddi queat. Suppressa vrina regurgitat, vnde alui tumor, singultus, animi deliquia, coma, dyspnœa, Cataphora, &c. Non semper arenulæ rubræ prodeunt, sed sæpius, præsertim vbi è renibus emotus est lapis. Vomunt pituitam inualecente dolore, & æruginosa, fastidium cibi, alui excretio difficilis. Ex libr. 6. τῶν ἐπιδημιῶν. Sæpè sanguis excernitur ob violentiam calculi.

*Renum calculi facilius atteruntur, quàm vesicæ.*

*Vrine quantumvis fluitans liberos calculis vreteras non arguit.*

Clyster lenis, fomentum, vnguentum, bolus, phlebotomia. Molliuntur viæ cassiâ cum rhab. cessante dolore & vomitu. Deinde terebinthina: postea oleo amygdal. dulc. cum alphenico, vel diatrag. hinc cataplasma molliens. Postremò quæ comminuunt. Inueteratus calculus paulatim atterendus. Alioqui frustrâ contendimus excindere. Vbi iam durior & maior substantiæ reni impactus, & quasi actis digitis & radicibus inhæsit, frustrâ oppugnatur. Recens natius mollior. Ille tamen atterendus paulatim, & confringendus. Alia enim remedia excludunt, alia atterunt & frangunt. Regurgitante vrina ad ventriculum vomitus cien-

## DE MORB. INTERNIS

duis, aliis subducenda. Alioqui vis medicamentorum hebetatur, licet ab hepate & renibus eorum quoque vis infringatur. Vehemens impulsio, commotio, affricatio, qua parte vteret explantantur, è renibus urinam & calculum promouent. In excludendo calculo renum videtur quædam periodus. Multis quieto dolore, nec opinantibus, excidit. Infinita propè sunt remedia in veterum libris, sed cum iudicio & delectu eligenda. Quidam nobilis Lutetiæ lapidem habuit mollem, laxum, efformatum ad instar mortarij, per quem transcolata aqua & epota mirum in modum iuuabat calculosos, & urinam suppressam. Cauendum à nimia refrigeratione renum, quia inde angustiora vasa redduntur, & aliquando gignendi impotentia consequitur.

### ANTO. VALETII EXERCIT. XLVIII.

**C**alculi, lapides, arenulæ, sæpè præter naturam in renibus coguntur, humore scilicet aqueo ac terreo, tenaci præsertim & glutinoso, eò confluyente, cuius portio tenuior caloris accessione exhalet, crassior exusta, exsiccatâque spatio temporis in substantiam topheo similem & lapidosam conuertatur. Vide Galen. comment. ad sent. 6. sectio. I. libr. 6. Epidem. Vnde deprompta reperias, quæ de calculi causis & signis fusiùs ab Hollerio memorantur.

*Calculi re-* De calculo atterendo cum cogitat medicus, præ-  
*num curatio.* purgata prima corporis regione blâdo cathartico, aut iniecto clystère, toti prospicit corpori sectione venæ, si plenitudo adsit, si fluxionis metus & inflammationis in propinquo sit, si dolor intolerabilis, atque adeò grauis febris vrgeant, viribus alioqui constantibus. Pertunditur vena axillaris interna cubiti è directo: quanquam Galen. in nephritico dolore

*Gal. cap. 17.  
lib. de curâd.  
rat. per sang.  
missionem.*

venam poplitis, aut malleoli secat. Quod non fit, nisi inflammatio, fluxio, aut copia sanguinis aliud suadeat. Mox conueniet purgare, vias lenire, ac laxare. Purgatio ergo sit eiusmodi.

℞. cassi. fist. recēs ē canna extr. ʒ. 6. rh. elect. pul. ʒ. i. diaphœnic. ʒ. β. cum puluere glycyrrh. & tragacanth. f. bol. parui, obelii inuoluti. Vel. ℞. rh. elect. ʒ. i. β. agar. troch. ʒ. i. infundatur seorsim in aqua parietar. vel vino albo, vel cicer. rub. decoct. cum tantillo cinam. Factis express. adde syr. de alth. vel de scolop. aut glycyrrh. & cathol. ana ʒ. β. f. potio.

Pauperibus in oxymelite Galeni, aqua parietaria, aut decocto radic. aperientium dissoluitur ʒ. i. cathol. cum ʒ. 2. diaphœnic. Syluius putabat clysteres maiorem habere vim, quàm quæ per os sumuntur, quia integris viribus ad renes perueniunt, ipsos onere magno leuant, ac velut fomento quodam dolorem mitigant. Sic autem parantur.

℞. malu. bis mal. parietar. berul. ana M. i. flor. chamæ. melil. ana p. 2. semin. anis. fœnic. ana ʒ. 2. f. decoct. & colatura ad ℔. i. In qua dissol. benedict. laxatiu. & hieræ ana ʒ. 6. terebinth. Venetæ ʒ. 3. mell. ros. colati, sacchar. rub. ana ʒ. i. olei rutæ. & aneth. ana ʒ. i. β. f. clyster. Vel. ℞. decoct. remol. addita ʒ. β. semin. fœnic. vel hydromelitis bene coct. ℔. i. In qua dissolue quæ suprà.

Quòd si leniendus tantùm sit dolor, ex ol. amygd. dulc. lini, & chamæm. ana quart. i. f. clyster. Reiecto clystere hæc imperentur.

℞. ol. amygdal. dulc. ʒ. 2. vini maluatic. ʒ. 4. Cap. post clysterem. ℞. parietar. M. 3. frigrantur cum oleo de scorp. & amygd. dulc. f. cataplasma pro renibus.

Si calidiores fuerint renes, illinetur eorum regio oleis ros. & violaceo lotis in aqu. plantaginis, aceto tantulo addito. Ab his præscribetur apozema ad

## DE MORB. INTERNIS

calculus conterendū, quale hoc est, quod Hollerio & Syluio fuit familiarissimum.

℥.radic.althææ, gram. acetos. petros. ana. ʒ. i. brugespinæ & ramusculor. eiusdem, ferraturæ ligni guaiaci ana ʒ. i. cortic. radic. cappar. thamarisc. & fœnic. ana ʒ. β. femin. anis. fœnic. milij sol. hyper. femin. cucum. cusc. citr. ana ʒ. 2. folior. bismal. M. 4. beton. viol. maluæ ana M. i. end. scariol. agrim. ana M. β. fol. pariet. capill. vener. ceterach, scolopendr. cusc. ana M. i. passul. mundat. iuiub. ana num. 12. fruct. alkekeng. num. 30. flor. beton. hyperic. bismal. malu. tapf. barb. viol. borrag. ana p. 2. aquar. stillatit. halicac. parietar. end. portul. acetos. chamæmel. succ. limon. ana ʒ. 2. aqu. fontanæ puriss. q. sem. fi. decoct. ad t̄b. 2. In colatura dissolue syrup. de althæa & de limonibus ana ʒ. 4. f. apozema conditum ex arte. Vel in colatura dissoluta t̄b. i. facch. & syrupor. prædictor. ana ʒ. 2. fi. syrup. perfectè coctus, vtendus per se, vcl cum vino albo. Vel. ℥. rad. petro fœn. apij, temperatar in aceto fortissi. per noctem, cordibus abiectis, ana ʒ. β. rub. maioris ʒ. i. capill. ven. ceterach. adianth. bardan. ana M. i. femin. anis. alth. milij sol. ameos ana ʒ. β. femin. melon. ʒ. i. vuar. passar. ʒ. β. glycyrrh. ras. ʒ. 2. cicer. rub. trium. flor. cardiac. ana p. i. aqu. font. q. suffi. vini alb. t̄b. β. f. decoct. ad t̄b. i. In colatura dissol. syr. capill. ven. & oxymelitis simplicis ana ʒ. 2. f. apoz. in treis dos.

Vulgò probatur decoctum cicer. rubrorū. Ioannes Vassæus Medicus celeberrimus improbabat, quod renes vlcerare contenderet ex Dioscoride. Eius loco aiebat saluberrimū esse remedium decoctum summitatum althææ, brassic. rub. cum melle optimo, & butyro recenti. Huius decocti vsus esse debet per dimidiam horam ante pastum.

Alij iuscula instituunt ex malu. bismal. bipinell. faxifrag. berul. herniaria, violaria, radic. lappæ maioris, asparag. quinq. foliis cupressi, ciceribus rub. radic. petros. fœnic. in aq. fontana ad mediæ partis cōsumptionem, quorum vsus sit ante pastū. Obesis corporibus,

corporibus, iisque prius benè purgatis, guaiaci decoctum conferet. Honoratus Castellanus maximè probabat decoctum vrticæ nouellæ, sed præsertim veris initio vsque ad Maium. Efficacius fuerit, si sumpta electarij sequētis tabella vna superbibatur.

℥. nucl. persic. 3. 2. lapil. lync. Iudaic. ana ʒ. i. milij sol gran. a' kekeng. gram. ana 3. ʒ. polypod. 3. i genist. asparag. semin. basilic. ana ʒ. 2. nucl. mespilor. ana 3. i. ʒ. semin. apij, saxifrag. scænuigr. ana 3. i. semin. bismal. dauc. ana ʒ. i. electarij lithontr. 3. ʒ. Puluerata singula excipiantur saccharo anthosato in aqua parietariæ, siue saxifrag. dissoluto, fiântque tabellæ ponder. 3. 3.

In præscribendis eius generis remediis habeatur ratio naturæ ægri, & aëris. Vbi enim frigus dominatur, semin. apij, petros. Macedon. saxifrag. aspar. addi possunt: vbi verò calor, semen. acetos. end. pep. melon. pulu. diatragacanth. frigid. Ad comminuendum & deturbādum calculum sunt qui gallinæ ventrem exenteratum malo citrio vno minutissimas in partes dissecto, sem. bardan. melon. alth. ana 3. ʒ. & cicer. rub. p. 2. infarciunt, elixant, iusculum sorbendum exhibent, idque continuant per aliquot dies, post terebinthinæ vsum.

Alij has pilulas maximè commendant.

℥. lapid. Iudaici, linc. ana 3. i. nucleor. mespilor. 3. ʒ. tragacanth. gumm. cerasor. & persic. ana ʒ. i. teruntur omnia, & incorporantur in 3. i. terebinth. pro dosib. 3.

Hoc quoque vulgi experimentum minimè contemnendum.

℥. radic. enul. 3. ʒ. granor. alkekeng. 3. 2. baccar. iuniperi 3. i. glycyrrhiz. 3. 6. omnia tusa in vino albo bulliant: colatura detur.

Lignei ramusculi, vel cortices radicum brugespiniæ siccantur in clibano, vt teri possint in mortario.

# DE MORB. INTERNIS

Pulvis transfunditur per setaceum, vt sit tenuissimus. Exhibentur eius pulueris ℥. 4. cum ꝑ. 4. vini alb. bis in mense, aliis opportunis calculo, arenulis, semel. Infinita alia reperiuntur remedia, in quibus præscribendis eam cautionem seruare nos oportet, vt nimium acria & calida diuretica (quæ alioquin vrinæ cohibitio huic affectu familiaris exposcit) declinemus. Hæc enim calculum cogerent magis, & indurarent. Si ex deciduo calculo renibus vlcus impingatur, proderit terebinth. emulsio amygdal. ex aqua hordei, vel mulsæ, vel plantag. decocto, addito syrupo de althæa. Si calculus in vreteribus resistat, fots, balnea, femicup. vias dilatando præsentaneo erunt remedio.

*Galen. lib. 5.  
Simp. & lib.  
10. de cōpos.  
pharma. καὶ τὸ πῶς.*

## De lapide vesicæ.

CAP. 49

*Calculus vesicæ si per fistulā vrinariam exitum non habeat, sola chirurgia curatur.*

**C**alculus vesicæ curatur eodem modo, quo calculus renum. Nihilominus tamen in calculo vesicæ fortioribus opus est medicamentis, quàm renum.

## EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Signa lapidis in pueris sunt, vrina aquea, similis lactis sero, sedimentum arenosum & tensio virgæ, alioqui non conueniens illi ætati. Cum factus est, difficultas meiendi, vrina subcruëta, dolor in eius excretionem, pruritus in præputio ex motu lapidis & arena, vel etiam lapilli parui ex attritu. Certissimum signum, si meiendo aliquid egerunt, aut egerendi cupiditate tenentur. Cum sedent repente, vel sedendo concutiunt vehementer alterum pedem, dolorem sentiunt iuxta anum, in ima parte pudendi. Nonnulli iubent ad certio rem distinctionem ægrum equitari, saltare, exerceri que vehementius. Inde exhiberi lapidem comminuentia, & subsidentia in vrina inspicere. In qua si tribus aut quatuor diebus pulvis appa-

reât, lapidem esse durum: si lapidum frustra, & quasi arenæ tophum: si nihil horum appareat, lapidem proculdubio non esse. Sed cauendum, ne exercendo in ardorem vrinæ incendant. Ponunt autem tripliciter in vesica lapidem generari. Ex arena, sed rarò, vnde fit tophus: ex lapide iam in renibus concreto: & ex facie vrinæ. Cùm verò lapis iam vlcus excitaucrit, aut carnem, signa confundi. Omnibus tamen certiora signa digiti in rectum intestinum, cui vesica incumbit, immissio, & cathæter, sed quæ non sine dolore adhibentur. Suppressa vrina corpore supino & condussio si prodeat, lapis meatum occludebat. Neque cathæteri semper fidendum. Mercatori cuidam omnia calculi vesicæ signa aderant. Cathætere probari non potuit. Mortuo duo magni calculi inuenti sunt, singuli 3.ij.℥. membranâ inclusi, vtrique sua. Vbi concreuit in vesica, ferè maior euadit ob maiorem capacitatem vesicæ, & colluuiem. Tum non mutatione ætatis, sed sola Chirurgia curatur. Atque aliquando liber est, interdum hæret vesicæ, nec nisi vi extrahitur. Nam vt matula excrementa hærentia contrahit, ita vesica imbecillior. Deinde imbecillitate vesicæ & angustis viarum impeditur exclusio. Hinc mors, quia febris & inflammatio sequuntur. In consilio secandi videndum qua parte sit, & an sine periculo eximi possit, an pertinaciter hæreat, an sit in meatu virgæ, & anfractu colli eiusdem. Contusio ab asperiore & longiore operatione inflammationem, gangrenam, mortem denique infinitis adfert. Sunt, qui inieccto oleo scorpionum & aliis per penem contendunt frangi posse. Vidimus mulierem, quæ inunctionibus & suctu penis multos liberauit. Sunt qui napo orbiculato oleum accommodatum immittunt. Napum coquant: deinde ad modum emplastri pubi admouent.

Sunt, qui aperto vesicæ collo, quomodo Lithotomi faciunt, viam aperiant, nulla vi eiusmodi illata, quæ inferri solet à vario genere feramentorum, vbi calculus extrahitur. Atque ea ratione facta viâ, aliquando sponte naturæ calculus, nisi grandior sit, excluditur. Hoc in mulieribus facîle ob breuitatem & rectitudinem colli vesicæ, vix tamen sine læsione aut laceratione sphincteris, vnde sequitur inuoluntarius vrinæ exitus. In viris difficilius ob reflexionem, quæ fit in modum literæ S. Tutior tamen videtur hæc ratio. Sed si



## DE MORB. INTERNIS

lapis grandior sit, instrumentis intrâ frangendus. Deinde sectio facienda paulò supra anum, qua parte est sphincter secundum fibras rectas.

### ANTO. VALETII EXERCIT. XLIX.

*Lapis vesicæ causæ ex  
Gallen. cõm.  
ad senten. 15.  
sect. 3. lib. 6.  
Epid.*

*Signa lapidis vesicæ.*

**L**apis vesicæ causa est morbi, nempe obstructio-  
nis vrinæ excretionem præpedientis. Morbus  
tamen in numero esse potest, si videlicet adeò sit  
ingens, ut vesicæ ipsius circa vrinam obuolutio-  
nem fieri vetet. Huius quoque causa crassius est &  
crudus succus per venas cum vrina in vesicæ capa-  
citatem delatus, qui tanquam fex subsidens sensim  
lapidescit. Quam ad causam accedunt innata vesi-  
cæ frigiditas (neruosa enim est & exanguis) am-  
plissima eius cauitas (vnde non necesse statim hu-  
morem illum excerni) longior in vesica eiusdem  
humoris cunctatio. Sæpè tamen lapis ille è renibus  
per nephriticos dolores excidit. Signa sunt assidua  
penè pudendi frictio, erectio cum meiendi deside-  
rio, incessens alui soluédæ libido, vrinæ crudæ, &c.  
Quòd si calculus in vesicæ ceruicem se intruserit,  
vel vrina continuò propellitur, & guttatim emit-  
titur, vel supprimitur omninò. Curatu difficilis est  
vesicæ lapis, quia medicamenta integris viribus,  
ob longitudinem viæ, eò non pertingunt, & durior  
est in vesica, quàm qui concrevit in renibus, lapis.  
Si tamen non ita sit magnus & prædurus, post va-  
cuatum, si fuerit opus, per venæ sectionem corpus,  
& redundantem humorem perpurgatum, fient in-  
iectiones per fistulam argenteam in vesicam: qua-  
les ex succo limonum, saxifragiæ & similium, vel  
ex decocto conuenienti & oleo scorpionum con-  
cinnantur.

Vel. *℥*. creffion. parietar. ana *M. i.* petrof. cum radic. p.  
*z. f.* decoct. in aqu. pariet. & vino alb. ad *℥b. i.* ex qua cum  
melle Narbonenfi f. hydromel. colatum & clarificatum pro  
iniectione.

Satius etiam fuerit, maximè si fufpirio fit calcu-  
lum eſſe in meatu vrinario, huius decoctionis va-  
porem in veſicâ recipi per infundibulum oris an-  
guſtiſſimi, vt caculum, aut materiam craſſam, viſci-  
dam, ipſi hærentem diſſoluat. Ex uſu quoque erunt  
inunctiones pubis & perinæi ex axungia cuniculi,  
ol. ſcorpion. itē emplaſtra ex gummi ammoniaco,  
bdellio, ſagapeno, diſſolutis in aq. ſaxifrag. oleo ſcor-  
pionum, additis pulueribus lapidis Iudaici, lyncis,  
& ſimilium antè explicatorum. His ſi nihil profici-  
tur, tota ſpes curationis ad lithotomiâ conuertēda.  
Rarum eſt, & miraculo plenum naturæ opus: quæ  
nonnunquam viam ſibi molitur, per quam calcu-  
lum excludat. Id mihi aliàs, dum Burdegalæ age-  
rem, videre datum eſt vnà cum. Emanuelle Phauo-  
rino, Medico & Philoſopho eminentiſſimo, Præ-  
ceptore meo mihi multis nominibus ſemper ob-  
ſeruando, colendo & memorādo. Erat in ſuburbiiſ  
Diui Seuerini lignarius faber, qui calculo vexaba-  
tur, figura, vt poſtea ex conſpectu conſtitit, lōgiore.  
Hi cū ab ima parte acutior & aſperior eſſet, ve-  
ſicam prærupit: tum & teſticulorum tunica præ-  
fracta poſt multos ac penè intolerabiles dolores,  
tandem in conſpectum venit: quo facilè deducto  
cū multi hominem moriturum iudicarent, ille  
tamen præter opinionem conualuit: hoc ſolum ex  
tanto malo homini incommodo relicto, quod inde  
ſemper vrinam reddit. Idem de quodam Nicolao

1 Et diuturnarum, nec nō crisi propria partu alicuius affecta, aut etiā materia auersione, vt in parotidibus Et surditate.

2 Abraden- do, exasperando, & inflammando.

3 Quia est symptomati- cus ipsi vesicæ, non autem ipsius vesicæ symptoma.

4 Si serum in vitio sit, & aëtu incanduerit: aut si à mistione bilis ardor vrinæ fiat.

5 Humorem ad intestina deriuādo, qui sequebatur ad renes.

**I**N iudiciis acutarum 1 febrium & bilis plurima aliquando excernitur à natura, quæ si diffluit in vesicam, ardorem 2 vrinæ facit. Vrina sero sanguinis & bile constat. Cū autem alterum acrius, vel augetur proportio bilis, ardor vrinæ fit. Vrina omnis acris est, sed multo maximè sentitur acrimonia, si pars vlcerata est, effluit. Ad vesicam glandulosa sunt corpora, quæ humorem reddunt, vnde vrinæ acrimonia temperari potest. Ea exsiccantur immodico coitu, morbo aut medicamento, quæ causa ardorem vrinæ gignit. Sanies quoque acris ex superiori corpore in vesicam defluit, quæ vrinæ mixta ardorem facit. Cognita causa de phlebotomia, purgatione, & aliis remediis cogitandum. Phlebotomia 4 tum conuenit, cum calidius corpus est, è brachio.

Purgatio 5 & diuertendo, & acriorem humorem repurgando conuenit. Sed prius considerandum est, an solū leniendum, an etiam detergendum. Vbi sola humoris acrimonia est, leniendum solū. Vbi vlcus, etiam detergendum.

Leniendo conuenit Cassia: detergendo, terebinthina. Vtriūsq; virtus augetur, aut temperatur iis, in quibus dissoluitur. Itaque si leniendum, imperabis ʒ. 10. cassiæ, aut ʒ. 1. dissoluēsq; in decocto iuiubarū, passularum mundatarum, sebesten, prunorū & similium. Si detergendū simul & leniendū, dissolues in aqua hordei, in sero caprino, in iulepo violata,

qui & lenit & deterget. Terebinthina, vt priùs dictum est, vtêris. Aliquando rhabarbari ℥. aut ꝑ. 4. 6. ℥. 2. cassiæ commiscebis, atque ita dissolues, vel cum saccharo coges in bolum.

Quod attinet ad reliqua remedia, reuocanda sunt in hunc locum, quæ de Stranguria ab vrinæ acrimonia dicta sunt. Si tantum humoris acrimonia est, leniendum: si etiam vlcus præterea, detergendum & consolidandum. Leniunt iulepus & syrupus de violis, maluæ & bismaluæ frequens vsus. Aqua ex iisdem distillata. Decoctum glycyrrhizæ rasæ, passularum mundatarum, prunorum, iuiubarum, sem. communium frigidorum, psilij, cydoniorum, lac muliebre, oua & similia. Imperabis ergo.

℥. aquæ maluæ ℥. 4. iulepi violati ℥. 1. β. Atque vbi leniter detergendum, vtêris syrupo viol. de iuibis, de nenuphare, de papauere. Et his quidem magis, si maior ardor est, hosque syropos dissolues in supradictis decoct.

Semina melonum excorticata & mundata ℥. pondere, aut ex iisdem feminibus, semine cucumeris & cucurbitæ cum amygdalis dulcibus imperabis lac amygdalinum, aut hoc ipsum iubebis comparari, dissolutis amygdalis in decocto prædictorum feminum: atque vbi vigeat ardor, semina hyoscyami albi & papaueris albi & psilij commiscebis. Sem. lini, althææ & cydoniorum, eidem vsui esse possunt, si parentur, vt dictum est, vt vel hordeatis, vel lacti amygdalarum misceantur. Deterget iulep, id est, aqua sacchari: sed leniet magis, si saccharum violatum sit. Plurimum laudatur medicamentum ex trochiscorum alkekengi ℥. 1. iulepi violati ℥. 3. Hocque

## DE MORB. INTERNIS

utendum erit, ubi maior ardor est. Lac muliebre & bubulum leniens magis. Ouillum confirmat. Caprinum & asininum detergent magis. Serum separatum ab his generibus lactis magis detergebit. Sed quia ardoris sensus magna ex parte sentitur ad col- lum vesicæ & extremitatem glandis, propterea in- iectionibus in colem, turundis quoque in foramen virgæ utendum est. Leniendo lac muliebre iniicien- dum est.

Liquor tenuis albuminis oui agitati, atque despu- mati, vel hoc.

℞. mucagi. sem. psilij & cydoniorum extractæ in aqua cucurbitæ, violarum, maluæ ana ℥. β. lactis muliebris vnc. i. liquoris oui drach. 2. misce pro in- iectione.

In maximo ardore mucagines seminis hyoscya- mi & papaveris commisceri possunt, vel caphu- ræ Gr. 6. aut plura, vel opij Gra. 2. aut i. Turunda in- tingi debet cerato rosaceo Galeni, quod ita compa- rabis.

℞. olei rosarum ℥. 6. lauetur sexies ex aqua rosa- rum. Deinde cum ℥. 2. ceræ lotæ fiat ceratum liqui- dum in duplici vase.

Potest & hoc ceratum refrigeratum affundi suc- co plantaginis. Et hoc magis, ubi extremitas virgæ ulcerata est.

In dolore vehementi dissolues caphuræ ℥. i. in aquæ rosarum aut violarum ℥. i. vel in vino dolci: opij Gra. 2. atque ita linamentum, id est turundam, in his liquoribus madefacies, & molliter indes in virgam.

Si detergendum, supradictis iniectionibus addes

faccharum, vt non solum lenias, sed etiam detergeas, vel aquam hordei, vel serum lactis cum modico faccharo. Cum vero vlcera deterfa sunt, conueniunt, quæ consolidant, vt.

℞. sarcocollæ ℥. i. amydi, cerussæ lotæ ana ℥. β. nutriantur in lactis muliebris aut caprini, vel ouilli ℥. 2. Fiat iniectio in virgam, quæ ter aut quater in die reperatur. Aliud.

℞. aluminis plumæ (scissile vocatur à Galeno) facchari ana ℥. i. mellis ℥. i. β. vini albi austeriusculi ℥. 2. leuiter bulliant. De colatura fiat iniectio. Conueniunt & hæc.

℞. succi virgæ pastoris depurati, succi plantaginis ana ℥. i. boli armenæ, mummiæ ana ℥. β. misce pro iniectione consolidante.

Trochisci de carabe, de terra sigillata, bolus armena, tragacanthum, trochisci de spodio ℥. i. pondere dissoluuntur in ℥. 2. succi equiseti, plantaginis iulepi violati, syrupi myrtillorum, diluti, vbi consolidandum est. Sed trochiscis de carabe in maiori ardore vtendum est.

In curatione ardoris vrinæ clysteres 6 ex iis, quæ leniunt, iniici debent. Quales multos habes de dysenteria. Atque vbi humoris acrimonia causa est, sudoris prouocatio & vomitus ex vsu sunt. Inunctiones pectinis & perinæi, è descripto cerato, rosaceo, oleo violato, de nuphate, de mandragora, de salice, cucurbita & cucumere.

Balnea, immersio pudendi in 7 decocto leniente.

Laudatur à multis iulepus ex aqua acetosæ & quarta parte facchari violati. Postremo partes affectæ roborandæ, de quo in Gonorrhea.

6 Vt ex decocto maluæ, altheæ, violariæ, decocto capitis veruicini.

7 Vt in lacte in quo decoctum fuerit verbascum.

# DE MORB. INTERNIS

## EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Per penem redduntur vrina, ramenta, pituita, vermes, pus, semen & sanguis. Vrina duabus partibus constat, sero & bile. Hæc si superat, aut serum sit acrius, fit vrinæ ardor aliquando etiam per crism. Sunt & glandulæ ac parastatæ humore quodam tanquam saliuâ confertæ, quæ vrinam temperant. His resiccatis aut malè affectis idem quoque ardor excitatur, id est, dolor quidam, qui sentitur inter meiendum. Multæ quoque sunt aliæ causæ, quæ ad dysuriam pertinent. Sæpè pituita putris, aut salsa, vt in senibus, aut pus acre permiscetur vrinæ. eamque acrem reddit, aut illa omnia cum vrina exeuntia dolorem excitant, præsertim si qua sit exulceratio, aut inflammatio. Sed in vlceratione ramenta quædam simul conspiciuntur. Non erit inutile sigillatim de singulis agere, non solum ad huius affectus distinctionem, sed multorum etiam aliorum, quibus hic permiscetur, aut similitudine quadam respondet. Puris & pituitæ differentia obseruanda, tum ex iis, quæ præcedunt, tum ex natura rei. Pus præcedit dolor, cruor, grauius olet, minus viscosum est. Contraria in pituita. Nam raro dolor, nisi cum putris, salsa, frigidior. Memini frequenter vidisse interceptam vrinam crassa pituitâ, quæ dolorem & ardorem, vt in calculo, excitaret. Vidi & intolerabili cruciatu aliquot diebus affectum, qui pituitæ partes velut crystalli, aut concocti succi, quem gelatinam vocant, globulos colore aqueo pellucidos eminxit. Duos itidem, quibus pituita putrescens in vermes vertebatur, quos emingebant. Beaucler Aduocatus post dolores renum magnum vermem eminxit. Quidam literas ad Hispanum scriptas ostendit, quibus consilium petebatur pro calculoso, cui eiectis calculis aliquot & arenulis prodierant duo vermiculi acuto capite, corniculato, ventre & dorso testula inductis instar testudinis, nigri, nisi quod rubebant ventre. In quo videtur generatio quædam esse à putredine pituitæ, calore multo totius venosi generis eam pituitam ita conformante. Quemadmodum cum sit *αρογίασις*, id est, capillitium illud, de quo agit Galen. Aphor. 76. libr. 4. id est, pituita, quæ in longum diducta à calore exurente capillos repræsentat aliquando ad dimidium cubitum,

*Vermes per  
vrinas ex-  
creti.*

exusu crassioris alimenti genita, quæ cum vrina crassa excernitur. Viscidior enim fit, & resiccatur non omninò quidem, sed vt in longitudinem produci possit. Aliquando animatur, vt cætera animalia, quæ ex putredine ortum habent. Archigenes fieri putauit à fluxione mucosa, vnde & foliacea, & veluti pili, aliquando implexi, breues, longi, & materia quædam è venis ad renes, vbi cogitur. Galenus scribit, in quibus talia exeunt, semper vrinam esse crassam. Contrarium experientia docuit. Quidam annis plusquam vigin- *Vrina cum*  
 tiales vrinas cum capillitio emisit ruffas, mediocri consi- *capillitio*  
 stentia, non crassas. Temperamentum illi erat biliosum, sa- *emissa.*  
 tis tamen quadratum & carnosum corpus. Multis idem contingit: aliis cum crassa vrina. In Præside Longueil pituita lenta, corrupta, quam incredibili quantitate multis mensibus eminxit & deiecit, quoties sumpsit medicamentum, cum vrina tenui, serosa, simili sero lactis. Opportunus erat arthritidi & calculo. Sed utròque affectu liberatus, vigiliis, frequenti mictu dolorifico torquebatur. Malum modò remissius, modò acerbis per frigora & humidum cælum. Modò stillicidium, mictus exiguus & frequens, modò vrina largior. Remittebatur dolor, tum acerbior redibat. Penis & crura condolebant. Vrina modò mordax, modo contrà. Eadem omninò apparuerunt in Procuratore ad Paruum pontem. Vtrique ætas annotum circiter 52. hepar calidius, sitis multa. Sed Præses naribus nihil expurgabat: alter contrà. In sacerdote Normano multa mucosa per vrinam prodibant, sæpè emingebat. In his omnibus cum pituita acris, falsa, putris, frigidior erat, dolor excitabatur. Creditur tamen pituita viscida & parum permixta, cum dolore excreta & magno conatu in vlcere renum aut vesicæ calculo tantum emitti. In asthma aut simili affectu, morbi vel magnitudinem, vel mutationem significat. Quæ omninò sine dolore exit, & in fundo crassiori farinæ similis apparet, crudus succus est. Quem sæpè sequitur renum aut articulorum dolor aut calculus, aut morbi longitudo, aut corporis consumptio. Pus resudat & effluit ab abscessu, inflammatione, vlcere. Non semper sanguini permiscetur. Multi enim renum abscessus reperiuntur, in quibus pus solùm, certis intervallis cum vrina excernitur, vt in duabus mulieri-



## DE MORB. INTERNIS

bus, altera vxore Senatorij Consulij Claudij Fabri: altera vxore Vincentij Fabri negotiatoris. In alijs quoque, qui inde tabidi mortui sunt. Sanguinolentum aliquando. Vtrûmque exactè vrinæ permixtum, aut residens, sed post longum tempus, vrina etiam inde crassiore reddita, è renibus est, præsertim si dolor fixus in lumbis præcesserit, aut calculus reiectus fuerit, aut ex vreteribus vlceratis transitu calculi, vel in illorum cavitare orta post vlcus caruncula. Sed copiosius è renibus, quàm vreteribus. Cito subsidens, viscidum, mucosum permixtum, cum scammulis minimè carnosus, è vesica, si nullus dolor in lumbis aut circa pubem grauitas præcesserit. Sine vrina profluit è pene, vt dicemus. Neque tamen è renibus, aut vesica semper exit. Ab omnibus enim ferè partibus superioribus miro naturæ artificio, & per corpus confluxile facta exudatione modò in intestina, modò in vesicam exoneratur. Mulieri cuidam intolerabili cruciatu vrina purulenta profluebat. Mortua post quartum mensem, & dissecta, duo calculi in corde cum multis abscessibus paruis inuenti, renibus integris & viis vrinæ. In qua verisimile est, aut potius necessarium, pus acre per vrinas naturam expurgasse, quoad fieri potuit. Carnosa ramenta à renibus: furfuracea non semper à vesica. In febris enim ardente & colliquante à tunica venarum ita exesarum acrimonia (quo modo à cutis superficie pituita salsa & mordente crosa) furfures redduntur. Aliquando in eadem febre ardente ab adusto sanguine, præsertim crassiore & melancholico, ac veluti in cinerem resolutum. At in vrina mediocriter habente, ægroto non febricitante, à vesicæ scabie & prurigne oriuntur. Semen præter naturam & voluntatem effluit vasis relaxatis, imbecillibus post immodicum coïtum, colliquato corpore, vlcere irritante, frigidis flatus generantibus, acriore semine, retento ob contortionem pudendi. Si nihil horum neque renes neque vesica patiantur, frequentius Parastatæ, aut glandulæ semen retinentes, quæ sunt in vasis circulatorijs in parastatas desinentibus, aliquando præter naturam affectu laborant. Sunt autem multi, vt inflammatio, vlcera, scissuræ, resiccatio. Inflammatio sine coïtu à semine retento, & illic putrescente, vnde puris reiectio, pudendi mador, erectio, aliquando etiam à partibus vicinis inflam-

*Calculi in  
corde inuen-  
ti cum ab-  
scessibus.*

matis, vt in hæmorrhoidibus: nonnunquam defluxu humo-  
 rum post equitationem longam, celerem, acrium nimium  
 vsum. In vlceribus maior puris quantitas, minor ardor,  
 quàm in inflammatione. In scissuris, solus vrinæ ardor abs-  
 que puris emissionem. Si post coitum præsertim cum infecta,  
 Parastatæ aut glandulæ inanitæ & calfactæ halitum quen-  
 dam tetrum contraxerunt à concubitu, efficitur ardor vrinæ,  
 quem vulgò propriè vocant *Chaudes-pissis*. Erigitur vre-  
 thrum, vrina cum maximo dolore redditur, sanies liuida,  
 virefcens, mordicatio in meatu. In erectione pudendi fit  
 etiam contractio cum dolore, non in neruo cauo, vt nuper  
 nonnulli scripserunt. Nam sic erigeretur potius, quàm in-  
 flecteretur: sed ob plenitudinem, vel inflammationem, vel  
 inanitionem in meatu vrinæ. Vnde sæpè fit, vt qui tum vtun-  
 tur coitu, vt erecto membro illis scissura fiat, aut vlcus. Hinc  
 vel exitus vrinæ quasi cuniculis factis per anum, aut aliquam  
 aliam vicinam partem, vel carunculæ, tanquam fungi con-  
 crescentes, aut tubercula in anfractu colli vesicæ, aliquando  
 reliqua fistula penis, à quibus & *ισχυρία*, & dolor grauis  
 in meiando. Oribasius calore loci scribit huiusmodi *φύματα*  
 celeriter suppurari ex Hippocrate. Experientia tamen do-  
 cet sapiùs carnem absumentibus curari. Sæpè hic decipi-  
 mur specie calculi: vt in nobilissimo viro post vrinæ cru-  
 citatum in octauum mensem ambigentibus Medicis & Chi-  
 rurgis de calculo, adhibitis frustra remediis tandem aper-  
 tio facta, vt solent Lithotomi. Liberatus omninò dolo-  
 re non inuento calculo, sed carne in collo vesicæ, quæ pau-  
 latim consumpta est conuenientibus remediis. Harum  
 omnium affectionum curationem exponere non est huius  
 instituti.

ADMIRA-  
 LI D'AN-  
 NEBAULT.  
*Caruncula*  
*in vesicæ col-*  
*lo calculum*  
*ementia.*

## ANTO. VALETTI EXERCIT. I.

**A**rdor vrinæ vesicæ potissimùm ceruicem, at-  
 que adeò pudendi meatum infestat, puncti-  
 les inferens cruciatus. Causam habet pituitam sal-  
 sam, aut bile acri commixtam, iecoris & renum  
 calore vehementiore genitam. Ad hanc noxam

*Ardoris v-*  
*rinæ causa et*  
*curatio.*

## DE MORB. INTERNIS

quàm diligentissimè attentum Medicum esse oportet: siquidem vrinæ acrimonia, dum perseverat, vesicæ & vrinæ meatuum exulcerationem creare solet. Quamprimùm igitur humor acris vacuatur, calorque iecoris & renum restinguitur. Blanda purgatio sit huiusmodi.

℞ glycyrrh. ras. polypod. quern. radic. oxylapath. ana ʒ. 2. fol. lactuc. & portul. ana M. ss. sebest. n. 4. semin. melon. & cucumeris ana ʒ. 1. flor. viol. p. 1. f. decoct. & colatura ad dos. Infunde rh. elect. ʒ. 2. santal. citr. ʒ. 2. In express. dissol. cathol. & syrup. viol. ana ʒ. ss. f. potio.

Ex cassia sola, vel cum rheo, ex catholico, vel terebinthina in aqua refrigerante lota, commoda quoque purgatio. Sanguinis missio calorem minuendo, & partem materiæ auertendo atque vacuando mirificè prodest. Secatur vena cubiti, maxime vbi plethora, tum deinde poplitis, si chirurgum nacti sumus in artis operibus exercitatum. Iuuat vtrisque natibus deriuationis ergo cucurbitulas affigere. Dein verò humorum acrimonia obtundetur emulsionibus vulgò appellatis.

Vt. ℞. semin. melon. cucurb. papau. alb. ana ʒ. 3. amygdal. dulc. recentes & mundat. n. 10. contundantur in mortario lapideo, sensim affundendo aquæ decoct. hord. ʒ. 1. ss. f. emulsio, quæ edulcetur sacchar. ʒ. 1. syrup. violacei ʒ. 1. ss. pro dosib. 4.

Alij imperant oleum recens amygdal. dulc. cum aq. hord. syrup. viol. vel iuiubino, vel papauerino. Licebit & iisdem vti syrupis in decocto semin. refrigerantium solutis. Nec omittenda, quæ admoventur. Iecur calidius temperetur litu ex oleo ros. & absynth. pauco, aceti etiam rosacci tantillo addito. Renes cerato refrigerante Gal. cum aceto emollito.

Interim vesicæ regio cum toto pudendo decocto tepido fouebitur, ex floribus viol. nymphææ & frigidis seminibus instituto. Si vlcus relinquatur, tergetur iniecta per syringuam aqua hordei, aut saccharo rosaceo. Vnietur denique lacte vaccino, addita pompholyge, bolo armenica, aut similibus pulueratis.

*De inflammatione renum. C A P. 51.*

**R**enes inflammari contingit vlnerè, attritu, assidua equitatione, corruptelâ & affluxu humorum, potis pharmacis. Dolor pulsatilis in lumbis, & superiùs ad nothas & hepar, si ren dexter, inferiùs ad vesicam & femur, pestinem, pudendum: stupor cruris respondentis. Sternutatione, concussione corporis & vehementi motu lancinatio vehemens. Extrema suræ præcipuè & pedes, frigent, febris vehemens. Urinæ primùm retinentur, aut tenues fluunt & aquosæ. Procedente morbo in peius, rubræ: deinde crassæ & mucosæ: quæ, vt augetur malum, ita augentur. Nausea, vomitus biliosus, cordis morsus. Quibusdam animi deliquia & sudores syncopales. Sistitur venter: vnde inflatio & ructus. Breuibus aut maioribus interuallis exacerbationes.

Initio molli clystere pauca quantitate leniatur alius: detrahatur sanguis: frugaliter viuatur. Hordeato satis liquido, & iusculis mitigantibus vtatur. Vino, mellitis, diureticis abstineat. Iniiciatur cum clysteribus, iam puro intestino, quæ leniant. Exacerbata inflâmatione iterum phlebotomia, cataplasinata è farina hordei primùm in mulla, deinde passo ex

## DE MORB. INTERNIS

farina dicta, & iis quæ leniendo discutiant & roborant. Cataplasmatibus non cedente morbo cucurbitulæ cum scarificatione applicentur lumbis & ilibus. Infectiones deinde parentur ex decocto lenientium & resolventium, roborantium. Prius tamen cum vesica hydrelæo plena cum spongiis foueatur locus. Tum ad cerata & malagmata ex eadē materia eiusdem virtutis. Utendum quoque potionibus narcoticis, & cocta inflammatione (quod vrinīs crassiscuntibus & boni sedimenti intelliges) diureticis. Mesuæus initio ex farina hordei, rosæ & similibus repellentibus, deinde mixtis detergentibus chamæmelo, &c. Emplastrum de muscullaginibus, deinde de meliloto. Lactis asinini vsus cum modico melle efficacissimus renibus exulceratis.

### ANTO. VALETII EXERCIT. LI.

*Renum inflammatorū  
nota.*

**R**enes phlegmone tentari indicant febris inordinata, nec vsque adeo ardens, sed cum horrore & rigore insultans, mictio frequens, grauis dorsalium partium dolor, iisdemque in partibus pondus veluti propendens. Remedia sunt, venæ sectio (si modò nihil aliud prohibeat) citra cunctationem in principio celebrata, admota topica mediocriter refrigerantia. His si non cesserit phlegmone, neque symptomata conquieuerint, pus hac in parte colligi indicium est. Atque tum suppuratio, quæ alioqui fuerat declinanda, vitæ impendio calidis, promouebitur cataplasmate è mollientibus herbis, semin. lini, floribus chamæ. & similib. Prodeunte pure assumpta tergentia vsui erunt.

*De mictu*

De mictu 1 sanguinis.

CAP. 52.

1 Sincerè,  
mixti, atque  
serosi.

**Q**uibusdam 2 naturis eodem modo sanguis per  
vias urinarias excernitur, quo aliis per nares,  
3 venas sedis, aut 4 vomitum. Hoc ipsum præter  
5 naturam est, debetque anteverti fecta vena è  
brachio dextro. Eiusmodi excretiones sanguinis ex-  
citantur ferè inclinante Vere. Veris itaque initio an-  
teuertendum est.

2 Ut sangui-  
nem, vel etiã  
propriæ excre-  
mentis & so-  
litæ vacua-  
tionis suppres-  
sione, aut mē-  
bro aliquo  
mutatis.

Aliis 6 cruenta est vrina, similisque diluto san-  
guini ex laxitate atque amplitudine venarum, quæ  
à caua renibus inferuntur.

3 Ut melan-  
cholicis.

Renum quoque infirmitas hoc idem efficit.

4 Vi mulie-  
ribus, à sup-  
pressis men-  
struis.

Scriptum autem ab 7 Hippocrate, *Quicumque sponte*

*sanguinem mingunt, iis à renibus venula rupta est.*

5 Quod san-  
guis per com-  
moda loca vò  
feratur. Ad-  
de quod ex-  
se, aperta,  
aut rupta ve-

Sponte, hoc est, & repentè, & sine manifesta causâ.

Rupta verò vena propter humorum multitudinē

ac crassitudinem, vnde venæ quæ renum ventres

subintrant, disrumpuntur, aut aliquando aperiun-

tur. Ex casu, saltu, ictu, aut vehementiore motu idē

potest contingere. Rupta vena confertim effluit

sanguis: aperta, paulatim. Laxioribus venis emulge-

tibus, infirma vi renum contentrice aut discretrice,

na, infirmie-  
tiã renis sym-  
ptoma est.

statim à cibo serum sanguinis purum post coctio-

nem cum 8 spongioso sedimento excernitur. In

6 Talis u. f.  
festio hepatis  
ca dysenteria  
consimilis est.

infirmitate vasorum seminalium aliquândo excerni-

tur sanguis non cū vrina, sed in 9 coitu aliter, quàm

7 Aphor.  
78. lib. 4.  
Aphor.

vesica exulcerata. Hîc enim cum vrina sanguis e-

mingitur quibusdam corpusculis immixtis. Nec in

8 Hoc spon-  
giosum sedi-

mentum flatulenti spiritus est soboles: ex quo efficitur vim renum liceat colligere.  
9 Ut in iis, qui laborant fœda colluvie, aut quibus immoderato venereorum usus  
imbecillia sunt vasa seminalia.

# DE MORB. INTERNIS

10 *Adstringentium sci-*  
*licet & glo-*  
*tinatiū, qui-*  
*bz cum ve-*  
*narum ana-*  
*stomosi pu-*  
*gnandū. Sūt*  
*autē adstrin-*  
*gentia, plan-*  
*tago, halau-*  
*sia, &c.*  
*Glutinantia*  
*verò bol. ar-*  
*mena, terra*  
*sigilla: a sāg.*  
*drac. gummi*  
*arab. traga-*  
*canth. Sed*  
*trochisci Gor-*  
*donii cum la-*  
*cte ouillo re-*  
*cens multo*  
*propinati ho-*  
*rum omnium*  
*instar esse po-*  
*terunt. Inte-*  
*rim sit pur-*  
*gandi & tem-*  
*peradi vici-*  
*situdo semel*  
*aut bis in heb-*  
*domade per*  
*catharticum:*  
*vt ex diluto*  
*rhei cum mul-*  
*to syrup. vio-*

vesica solūm, sed etiam in cole, exulceratio esse po-  
 test. Sed vlceris sanies & dolor indicia sunt. In im-  
 becillitate primum cognoscendum est, an à frigido,  
 ferèque à calido esse volunt. Quod malum adstrin-  
 gentibus, refrigerantibus atque supprimētibus cor-  
 rigi debet: quæ quia propter tardum motum non  
 facilè penetrant ad renes, diureticis, maximè aro-  
 matibus, commiscenda sunt. Sed diureticorum mi-  
 nima sit portio. Non enim vt vrinæ moueant, sed  
 vt adstringentia ad renes deducant, commiscuntur.  
 10 Materia in sputo sanguinis, in hæmorrhagia è  
 naribus, descripta est, & aliis locis.

Auicennas nihil melius existimat confirmandis  
 renibus lacte ouillo. Datur iciunis ad ʒ. 6. quibus a-  
 liqui admiscunt boli armenæ, aut similis medica-  
 menti ʒ. 1. alij etiam ʒ. ʒ. spicæ, aut cinamomi.

℥. lactis ouilli ʒ. 4. aquæ millefolij ʒ. 1. boli ar-  
 mæ. ʒ. 2. spicæ. ʒ. ʒ. Aliud.

℥. lapidis hæmatitis ʒ. 1. dissolue in aqua plan-  
 taginis ʒ. 4. Quod si ardor sentitur in renibus.

℥. aquar. plantaginis & portulacæ ana ʒ. 2. phi-  
 lonij ʒ. 1. Aliud.

℥. mucaginis sem. papaueris albi ʒ. ʒ. trochisco-  
 rum de carabe ʒ. ʒ. rasuræ eboris & cornu cerui an.  
 ʒ. ʒ. Omnia incorporentur carne cydoniorum cõ-  
 dita sine speciebus. Dentur auellanæ magnitudine,  
 duabus horis ante pastum.

Conueniunt radix consolidæ maioris, gummi  
 arabicum, tragacanth. macerata prius, deinde ferue.

laceo, ne labefactata vi retentrice ac secretrice renum, excrementis onerentur, &  
 augeantur symptomatis. Vt. ℥. cassia recens extracta ʒ. 6. pulueri diatracanth.  
 frig. ʒ. 1. cum saccharo f. bolus.

facta in vino austeriusculo: colatura bibitur. Maximè vbi solidandum est, & hoc quoque laudatum ab antiquis.

℞. aluminis plumæ 3. i. gummi arabici 3. s. tragacanthi 3. 2. cum vino adstringente fiant trochisci pondere ʒ. 2. dentur vt prius. Ad deterfionem vlcerum & consolidationem repetenda sunt, quæ proximo capite. Aliud remedium.

℞. spodij 3. s. berberorum 3. 3. sem. lactucæ 3. 5. cum succo cydoniorum fiant trochisci. Detur 3. i. ex decocto sumach. Pulvis sem. lactucæ inspergitur vitello oui manè. In hæmorrhagia vesicæ, ilibus ac lumbis, atque etiam natibus & coxendici exteriori cucurbitula affigi debet. Inunctiones 12 renum, perinæ & pectinis ex oleo rosato, myrtillorum, de cydoniis, aut 13 oleo in quo adstringentia coxeris. Hinc fiunt cerota liquida, quibus conspergi possunt fantali, bolus arme. cortex thuris, & similia commisceri, acacia, hypocystis.

Hic summum periculum est, vbi grumescit sanguis. Nam hinc sequuntur, quæ capite de difficultate meiendi dicta sunt. Conandumque est, vt incidantur grumi oxymelite, arthemisiâ, stæchade, assa odorata, conizâ, sem. raphani, coagulo, summatim iis, quæ lapides comminuunt, datis ex oxymelite. Quibus si nihil efficitur, 14 inciso perinæo, quo modo calculi educi debent, molienda curatio.

# EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Sanguinis nomine non intelligimus sanguinem purum, exquisitum, syncerum, mingi, sed aliquando serum, aliquan-

11 Ad reuulsionē hæmorrhagiæ, non ad diuersionē amotionem.

12 Ad inflammationem prohibendā, & perennem arcēdum affluxum.

13 Diastichinum oleū, in quo fuerit decoct. myrr. ad id mirificè confert.

14 Ad vitandā ischuriā, syncopem, & vesicæ gangrænam.



## DE MORB. INTERNIS

do suo sero mixtum, & cum vrina, aliquando cum pure. Ab vlcere id fit, aut læsione vasis alicuius. Sed vlcera intelliguntur tum ex dolore, tum ex pure & corpusculis simul prodeuntibus, vt squamulis è vesica. Pus ergò cum sanguine exit per vrinam, renibus, vreribus mediis & vesicâ exulceratis. Nam si in pene exulceratio sit, sine vrinis & pus exit, & sanguis. Exeunt quoque è renibus sanguinis grumi in febribus affati. Nonnunquam carunculae, veræ renum partes, licet in Aphor. Galenus id se vidisse neget. Sexto tamen de locis affectis, & initio primi videtur agnoscere, vbi iam vlceris acrimonia erasit particulas renum: quo modo & in pulmonariis tabidis contingit particulas pulmonis expui, & in dysenteria partes intestini. In Aduocato Perrot vidimus minimas carunculas, vt nō ab re *σφαρία μικρά* dici deberent, quas sæpè emingebat, neque reuera erat grumus. Has carunculas præcedit dolor pulsatilis, qui ad lumbos & nothas costas extenditur, & signa exulcerati renis. In concreto sanguine & orobeis vrinis, non præcedit. In vtròque, hepate incolumi, possunt vrinae naturaliter cætera habere. Si in aliis partibus fuerit exulceratio, ex dolore quoque & simul exeuntibus corpusculis dignoscendum, hoc tanquam generali axiomate notato in his omnibus affectibus, à renibus colorem & sensum quemlibet à lumbis ad nothas costas extendi: ab vreribus per illa oblique descendere: à vesica, in pestine: à vesicæ collo, in perinæo. Potest seorsum pus exire, vt diximus superiore capite. Potest quoque & sanguis solus, aut cum vrina. De quo præcipuè hic agitur. Si ergò vlcus nullum sit, huius cruentæ excretionis causæ multæ esse possunt. Est quidam mictus sanguinis criticus & interuallis quibusdam motus, qualis fuit in Moniali muliere, cuius meminit Musa, quæ singulis mensibus, suppressis menstruis, multum sanguinem emingebat. Archembault aduocatus per aluum, vomitum, vrinam interuallis sanguinem reddebat ætate virili. Quibusdam inclinante Vere multus emingitur. Id ab Archigene scriptum reperio, quibusdam per circuitus, vt in hæmorrhoidibus, sanguinem multum collectum renibus emingi, vnde subleuentur, idque accidere iuuenibus, qui maiori licentia veneri indulgent. Milesius quidam apud Aurel. 5. *χρονίων* sanguinem emi-

*Sanguinis grumi per febres affati interdum è renibus secedunt.*

*Exigua caruncula è renibus excreta.*

*Monialis mulier singulis mensibus multum sanguinem emingens Archembault aduocat<sup>9</sup> per aluum, vomitum, vrinam, sanguinem emingens*

*Sanguis  
multus e' co-  
itu effusus.*

Etum affirmabat esse ex infinitate seminalium vasorum Ab Aureliano reprehenditur. Sed cum experientia doceat è renibus per vasa spermatica defluere, & ab his, & à renibus exire certum est. Vidimus, qui à coitu multum sanguinem effunderent, quique non facile reprimeretur, laxatis nimium vasis, & imbecillioribus redditis profuso omni semine. Animaduertendum igitur, num grauitas renum & calor præcesserint, an immodicus coitus, an solita sit excretio. Quod si repente, & nulla causa antecedente profluat, è renibus & vteribus excidit. Neque enim à venis vesicæ id accidere potest duabus de causis. Vna, quia non ita multum sanguinem ut renum, excipiunt. Altera, quia renum venulæ nudæ sunt, inuestes & expositæ rptioni. Quod contra fit in venis ad vesicam perreptantibus. Ex illis igitur sanguinem tribus de causis exoriri consentaneum est, ut & in cæteris omnibus hæmorrhagiis: orificij venarum apertione: erosione: rptione. Apertio fit ob nimiam laxitatem & amplitudinem venarum, quæ ad cauam renum pertinent, & ob imbecillitatem retentricis, vel discreticis in renibus. Hæc enim duo sæpe efficiunt ut calfactis, & exercitio commotis cruentæ vrinæ profluant. Sed in laxitate, crassiores: in imbecillitate, tinctura est à fero. A cibo quoque serosus sanguis: post coctionem spongioso sedimento. Aperta enim & hiantia orificia venarum, nec confertim, sed paulatim, non crassum sanguinem, sed tenuem, & quasi percolatum, reddunt, præsertim ubi apertio est parua. Maior crassiorem reddit. Rupta autem vena *ἀσρόως*, id est, copiose & repente prodit, estque crassior. In erosione denique *ἐπὶ δὲ ἀναστροφῆς ὀλίγως*: ut in anastomosi non sanguis, sed quid *αἷμα ἰσθῆς*, ut vult Philot. Erosionis causæ sunt, quæcunque acriorem sanguinem reddunt & tenuiorem, aut quæ exulcerant, ut cantharides, quibus assumptis sanguis mingitur, penis distenditur, & quodammodo ager ad venerem irritatur. Rptionis causas Galenus facit multitudinem & crassitudinem sanguinis interclusi in venis renum. Hoc etiam fit ictu, casu & vulnere, ut in rustico quodam ense transosso vidimus. Inde sæpe nascitur vlcus, nisi occurratur: ut in puero quodam, qui in ludo graui, Britone insultante, sanguinem minxit primum: deinde pus annis sequen-

## DE MORB. INTERNIS

tibus. Ita aliis multis. Sed vlceris ratio distinguenda, vt aliorum vlcerum, quia putre, callosum, &c. In vniuersum ergo per penem sanguis exit à renibus, vteribus, vasis spermaticis, vesica, aut vesicæ collo. Sine vrina, è collo: cum vrina statim subsidens, & cum dolore in pectine, è vesica: cum dolore in lumbis multus, nec nisi post multum tempus subsidens, è renibus manat. In apertione, serofus: in ruptione multus & crassus: in erosione, paucus & tenuis. Singulis causis sua debetur curatio ex aliis locis petenda.

### ANTO. VALETII EXERCIT LII.

*Cruentæ mi-  
ctionis causæ.*

**C**Ruenti mictus causæ sunt externæ, aut internæ. Externæ, ictus, lapsus, casus, coïtus immoderatus. Internæ, sanguinis copia, qualitas, vrâque simul (vnde venarum ruptio, apertio, vel erosio) renum calculus, vlcus eorundem, itémque vesicæ, & aliarum partium vreticarû. Quinetiam inter huius generis causas reponunt imbecillitatem renû, qui sanguinem retinere nequeunt, sed cum vrina simul excolari sinunt, iecoris infirmitatem, solennis alicuius vacuationis suppressionẽ. Fernelio interna causa vnica est, calculus videlicet, qui per corporis laborem, præsertim per exercitationem validam, veluti equitationem asperiozem, renes eorûque venas obterens, sanguinem ciet. A cuius autem partis vitio fiat, distinguendum dolore affectæ sedis, & sanguinis cum vrina permixtione. A renibus enim qui excidit sanguis, copiosior est, & vrinæ toti, propter longitudinem viæ, exquisitè permixtus: qui mox in fundo matulæ subsidet liquidus & rubicundus. At qui à vesica defluit, vrinam nõ æquabiliter perfundit, & in ima matula in grumos cogitur. Adde quod paucus elabitur, propter venarû vesicæ

*Fernel. cap.  
23. lib. 6.  
Patholog.*

angustias, nisi fortè à sphinctere cervicis musculo dimānet.

Præsentaneum remedium est venæ sectio, vbi plethora huic malo causam præbet, aut cohibita vacuatio. Vbi humorum acrimonia, purgatio ex cholagogis: ex hydragogis, cùm dilutior & seriosior fuerit sanguis.

Exhibendi interim syrupi rosar. sicc. granat. cydo. myrtill. zulap. ros. cum aq. chalyb. plantag. portul. aut decocto adstringente. Valebunt trochisci, de carabe, de terra sigillata. Vbi sanguis à vesica flueret, posteriori coxendici, vel natibus vtiliter cucurbitulæ affiguntur. Quod si à lapsu sit, aut casu, cruentus mictus, linetur affecta pars vnguëto ex bol. armen. sang. drac. terr. sigill. hypocystide, cum oui albumine, vel oleo rosaceo & aceto.

*De I Diabete & similibus. C A P. 53.*

**O**ΥΡΗΤΙΚΟΣ Græci vocant, qui sæpiùs mingunt. Vitia, quæ in sæpiùs meiando contingunt, vrinæ 2 multitudo efficit, renum vitium, resolutio vel infirmitas muscoli, qui collum vesicæ claudit.

Diabetes proprium est 3 renum vitium. Nasctur primùm humoribus 4 vitiosis substantiæ renū imbibitis. Vnde 5 insatiabilis appetentia potus, vt in canina appetentia insatiabilis ciborum cupiditas, ex vitioso humore, qui stomacho imbibitus est.

Sequitur perpetua renum attractio. Sed cùm infirma sit alteratrix & contentrix, quicquid hîc bibitur, statim per vrinam effluit, quo modo in leuenteria potus cum cibis.

*Cruenti mictus curatis.*

1 De profluvio urinae virenum ruptæ, vbi portione concolor est ipsa urina.

2 Fusa toto corpore materia, aut à capite, aut seri copia.

3 Depravata alteratrice renum facultate & infirma retentrice.

4 Ut bile, aut pituita salsa.

5 Eo enim humore renibus imbutus repentinè fit vrinae nullo modo coacta attractio.

## DE MORB. INTERNIS

6 *Experien-  
ti & violen-  
ta feri attra-  
ctione*

7 *Defrauda-  
tis sero humo-  
ribus.*

8 *Hanc bis  
tādiū rilif-  
se se comme-  
morat Gal.  
cap. 3. libr. 6.  
de ioc. malè  
affect.*

Hic ardent 6 viscera, atque adeo vniuersum corpus, propterea quod quicquid aquosum est & serosum in venis, vnde videlicet sanguis temperatur, attrahitur in renes & emingitur. Ex quo fit, vt & humores solidatum partium exugant venæ, quod deinceps renibus attrahentibus emingitur. Rara hæc 8 affectio, & in ardoribus nascens, vbi vrina aquæ omnino similis est.

Alius affectus est vesicæ, cùm vel defluxione, vel frigore, ictu, casu, vulnere aut aliis eiusmodi causis, netui, qui vesicæ muscolum claudunt, resoluuntur. In qua affectione & noctu & interdiu præter voluntatem vrina effluit. Cui & alia affectio vicina est eorum, qui non satis vrinam continent, sed stragulas noctu permingunt. Quod vitium familiare senibus & pueris. Senibus quidem propter siccitatem: pueris autem, propter laxitatem & molitiem.

### Curatio.

9 *Partium  
solidarū ex-  
hausto.*

10 *Magni-  
tudine cause,  
symptomati  
vehementia,  
& curandi  
difficultate,  
libefactata  
omni natura-  
li & conomia.*

In ardente febre diabetes 9 incurabilis. In aliis ægrè 10 curari potest, quia non facilè initio deprehendi potest. Quòd si initio deprehenditur, mittendus sanguis est è cubito, sed moderatè.

Deinde vtendum iis est, quæ refrigerant, con-temperant, & paulatim vitium renum corrigunt. Vitæ ratio omnino frigida, tum actu, tum potentiâ.

Cataplasmata quoque refrigerantia tum renibus, tum visceribus applicanda. Vomitus eius quod bibitum fuerit.

Sudor excitatus in dolio, vt tantùm exeratur caput.

Conueniunt cibi, lactuca, endiuia, qua forbilia,

recens caseus sine sale, lac in quo chalybs, vel calculus fluuiatilis sæpiùs extinctus sit. Pulli gallinarum hordeo mundato, vel quatuor sem. maioribus frigidis infarcti, hordeatum, lac amygdalarum, præparata cum refrigerantibus. Et quia hîc viribus plurimùm detrahitur, 11 suilla caro, vinum crassum, rubrum, aqua frigidissima dilutum, concedi possunt.

11 Vel potiùs vitulina carnis atque pul-  
lorum st. lla-  
titia.

12 Præfer-  
tim hordei.

13 Vt cera-  
tū refrigerās  
Galenī cum

caphura, yn-  
guentū rosa-  
iū Mesuæi,  
mucagines se-  
minis psilij & t-

cydoniorum,  
lamina plu-  
bi tenuissima  
sæpè mutata.

14 Ex sup-  
pressiōe feri;  
aut potu lar-  
giore, aut pi-  
tuitæ colla-  
quatione.

15 Vt decocto  
radicū iūca-  
tæ, abstinen-  
tiæ iusculo-  
rum.

16 Cuiusmo-  
di sunt ca-  
thartica, quæ  
leniendo aut

trahēdo pur-  
gant.

12 Farinam oxyrhodino subactā, emplastri modo, & renibus, & hypochondriis applicabis. Vitis & rosarum foliā, ea in summa, quæ 13 refrigerant, & adstringendo roborant, renibus applicabis.

Cerata comparabis lumbis & pectini ex rosaceo, subigēsque cum lactucæ succo & similibus. Aliquando etiam in maiori ardore expresso succo ē foliis papaueris cerota subiges, aut populeum vocatum cerato commiscebis. Erūntque 3. 2. populei ad singulas 3. cerati.

Laudatur & infusio ex oleo, in quo vermes terreni fuerint cocti. Mirum est, quòd theriaca ex natura sua calida & sicca sitim diabetis extinguit, data interuallis. Leges vltimum problema primi Aphrodisæi. Hunc morbum appellant syphonem, urinæ profluuium, intercutem matulæ, dipsacum.

*In paralyfi, diabetæ curatio.*

Si paralyfis ex luxatione vertebrarum, non facile curatur. Alioqui balneis sulphureis, frictionibus asperis, inunctionibus dictis cap. de Paralyfi, dropace & sinapismis vti oportet, vt vim medicamento- rum percipiant lumbi, perinæum & pecten.

Quòd si urinæ multitudo in 14 causa est, victus 15 ratione exsiccante, iis quæ ad 16 intestina di-

## DE MORB. INTERNIS

uertunt, vtendum est. Ad alios verò, quibus infirmitas claudentis musculi causa est, conueniunt caro ericij cerebrum aquilæ, cerebellum, renes, testiculi leporis, pulmo hædi, lingua anseris, galli guttur, vesica fuilla, tauri, capræ, ouis, enula, thus, myrobalani, cyperus, coriandrum præparatum, myrrha, métha, calamentum, galbanum, castoreum, fefeli, lac ouillum & caprillū, oleum de ben, de spica, ruthaceum, mastichinum.

Vulgare remedium est esus murium. Oleis itaque vel inde comparatis cerotis pecten & perinaeum inungenda sunt. Reliqua ex vino odoro, senibus: ex aqua, pueris ebibenda sunt. Laudantur & hæc.

℞. cinamomi electi ʒ. i. spicæ nardi ʒ. β. cyperi. coriandri præparati ana ʒ. i. vesicæ fuillæ siccæ, testiculorum leporis siccorum ana ʒ. β. Omnia incorporentur conseruâ enulæ campanæ prius conquassata & subacta. Aliud.

℞. glandium ʒ. 2. corticis thuris ʒ. i. sem. coriandri præparati, boli arm. gumm. arabici ana ʒ. 2. spicæ, cinamomi ana ʒ. i. testiculorum leporis, vesicæ fuillæ ana ʒ. β. misce, fiat puluis, vtatur sæpè.

Laudatur & lac ouillum & caprillum cum modico saccharo, vel cum medicamentis descriptis.

Ne permingant stragula, vesica tauri vel suis prius madefacta oleo interiori parte debet è cole suspendi, & ita alligari, vt quicquid meitur, excipiatur vesicâ.

## EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Vrina secundum naturam habens quantitate potui respondere debet, aut ab eo paululum distare, & tempore con-

uenienti excerni. Ob id frequens, aut pauca, aut plurima mi-  
ctio præter naturam est. Frequens fit tum ob causas superiùs  
dictas, tum ob resolutionem muscoli orificium vesicæ motu  
voluntario claudentis & aperientis, quæ sæpè fit luxatis ver-  
tebris, referturque ad Paralyfim. Pueris quoque molliores  
nerui, senibus sicciores, vnde permungunt lectum, neque  
diu vrinam continent. Pauca autem fit æstate ob sudorem *Vrinam cur*  
& exhalationem: vel ob multam & humidam deiectionem, *pueri & se-*  
quia materiæ pars, quæ per vrinam flueret, ad intestina diuer- *nes contine-*  
titur: vel ob resolutionem & exiccationem, vt exardente cor- *re nequeant.*  
pore in febribus: vel ob ascitem. Multa, frequens & copio-  
sa multis de causis contingere potest. Alimento & potu co-  
piofiore: colliquatione aut dissolutione totius corporis: in-  
temperie vel renum, vel hepatis, & crisi. Largior ergo po- *Vrinæ largio*  
tus vini tennis & calidi, & medicamenta diuretica multas *ris et frequē-*  
vrinas faciunt. Cruditas quoque multam efficit mictionem *tioris causæ.*  
& deiectionem, & statim à cibo tractus sine mora succus  
ab hepate calidiore, aut inanito. Quod si hepar adhuc cali-  
diore intemperie teneatur, robustum tamen sit & valens fæ-  
cem, quæ est in intestinis, omnem fugit, vnde sicca & pau-  
ca remanet, serum autem augetur, sicque fit plurima mictio,  
& pauca deiectio. Nonnunquam quoque ob imbecillita-  
tem naturæ partes frigidiores alimenti transmutari non pos-  
sunt, in quibus quoque plus iusto vrinæ apparet. In his om-  
nibus nondum veteres diabeticam passionem posuerunt, sed  
in affectis renibus & vesicæ per consensum. Harum enim  
partium morbus est διαβήτης, ἀπὸ τῆ διαβαίνειναι, id est, per-  
transeundo, quod humor corporis subinde mutet locum, &  
veluti tantum per renes percoletur potus. Multum enim &  
frequenter mingunt agri, & statim à potu vrinam aquosam  
& tenuem profundunt. Vnde ὕδρον ἐς αἶμα, & διάρρηξις  
ὑρᾶς, & διακρῆσις Græcis etiam dicitur. Habet enim hæc affe-  
ctio aliquid simile cum leienteria & canina appetentia. Cum  
illa quidem, quia potus omnis subito per vrinas effluit: cum  
hac verò, quia perpetua sitis, ob inexplibilem cupiditatem  
attrahendæ vrinæ in renibus, & ejusdem retinendæ impo-  
tentiam. Si igitur huius vehementioris attractionis causam  
intellexerimus, natura huius morbi perspicua fiet. Tres au-  
tē in vniuersum causæ videntur. Calida & sicca renum in-

*Diabete quid  
commune sit  
cum leiente-  
ria, & cum  
canina appet-  
tentia.  
Diabete tres  
causæ.*



## DE MORB. INTERNIS

temperies : humor biliosus acris, salus, renibus impactus, quos assiduè irritat ad tractionem : & venenum aliquod deleterium. Quibus adde seri tenuitatem & biliosum temperamentum. Ex his igitur sitis ingens excitatur, ob quam æger assiduè bibit. Potum hunc audè renes attrahunt, antequam coquatur in ventriculo, sed propter imbecillitatem non retinent. Hinc etiam vrina aquosa & tenuis redditur, licet sit ingens calor, quia breuiore morâ retinetur, quàm vt coctionem & tincturam accipiat. Sunt tamen aliæ huius affectus species duæ, colliquatione renum, & totius corporis dissolutione. Huius meminit Aretæus, sitque frequenter in febribus, quam sequitur macies totius corporis. Cum dolore meiunt ægri, viscera aduri illis videntur, omnia fastidiunt, animo sunt dubio, saliuam habent albam & spumeam, præcordia graua. Increfcente morbo calor mordax in visceribus, abdomen corrugatur, venæ intumescunt, fit tabes. Si vel modico tempore à meiendo abstinuerint, tumet lumbi, testes, & ilia. Rarus affectus, & bis tantum à Galeno visus, à nobis sæpius. Anno 1558. Augusti fine in vico vetere Templi Consuli du Val, in febre continuâ non ita ardente, ad sensum lingua scabra, arida, nigra. Quotidie sex pintas (quas vocant Lutetiæ) vrinæ mingebat, non ita siticulosus, constabat mente. Sub septimum diem obiit. Consuli Quelain nephritico, in febre profluuium vrinæ motum, in quo serosa vrina ad duas quartas emingebatur, ex quo euasit. Eodem morbo paulò ante eius pater obierat. Alter ab eodem profluuiò obiit in vico Sancti Ioannis Bellouacensis. Quibusdam diutius vrina suppressa, sequitur vrinæ profluuium, aut morbus aliquis acutus per crism, qui malignitatem suam in renes deponit, vt ait Aretæus.

In ardente febre rarò curatur, sicuti & in colliquatione. In aliis difficilè, nisi statim initio deprehenso morbo occurratur. Secatur vena in cubito, sed moderatè. Refrigerantur renes & confirmantur. Alimenta crassa, emplastica, minimè calida, vnguenta circa renes, inunctio spinæ, opiata.

*Gal. cap. 3.  
lib. 6. de loc.  
mal. affect.*

## ANTO. VALETII EXERCIT. LIII.

**D**iabetes proprium est symptoma renum, in quibus calor ingens, aut impactus humor ardentissimus, trahendi ex omnibus partibus feri vim vehementer atque continenter vrget: quod tamen præ retentricis facultatis imbecillitare, & alteratricis deprauatione continuò prolabitur in vesicam, indèque excernitur. Hinc inexplebilis sitis, quæ nimio cruciatu clamorem ægrotanti excitat. Per initia diabetæ, viribus adhuc integris, missio sanguinis è cubito, reuellendo, & ardorem temperando, maximopere confert. Dein verò vtilia sunt vretica frigida ad eum, qui renibus est imbibitus, detergendum & expurgandum humorem: quorum materia ex cap. de vrinæ ardore repetenda. Refrænabuntur quoque humores, & cohibebitur sitis, syrupis de agresta, de oxalide, granatorum, in decocto refrigerantium & adstringentium dissolutis. Cacochymum si fuerit corpus, purgabitur cassia, myrobalanis, thamarindis. syrup. laxatiuo rosar. pallid. Interea topica instituentur. Hepati quidem tale epithema.

℥. aqu. cichor. end. plantag. solan. ros. ana ℥. 2. santal. citr. puluerati ℥. 2. aceti ℥. 1. f. miscella, qua imbuta lintea hepati applicentur.

Renes verò inungentur oleo ros. cydon. myrtill. addito pauco populeo, aut cerato refrigerante Gal. vel fiet cataplasma ex farina hordeacea cum succo plantag. adiecto, si velis, puluere malicorij, balau-  
stij, sumach, vel caphuræ modico. Sanabitur eodem modo inuoluntarius mictus, seu vrinæ incontinen-  
tia, quæ ab hepatis & renum calida fuerit intempe-

*Gal cap. 3.  
lib. 6 de loc.  
mal. affect.*

*Diabetæ  
curatio.*

*Mictus in-  
uoluntarij  
curatio.*

# DE MORB. INTERNIS

ric. Quòd si sit à resolutò sphinctère cervicis vesi-  
cæ, atque iis nervis paralyfi affectis, qui è lumbis in-  
cum musculum inferuntur, potiores erunt infessus  
& fomenta, ex saluix, iux arthriticæ, ruthæ, cortic.  
querc. mespil. pin. nuc. cupress. ros. rub. decocto ex  
vino austero factò, adiectò sub finem alumine.

1 Hippocrat.  
lib. 4. de mor-  
bis.

2 Acrotundi

quidem signa  
sunt cardiog-  
mus, syncope  
stomachica,

cum ad stoma-  
chum serpit,  
pruritus nar-  
rium, tussicu-

latica, suffu-  
sio ruborù in  
facie fugax

cum vicissi-  
tudine calo-  
rù, tormina

in aluo Et sy-  
strophæ, den-  
tium stridor

pueris dormi-  
entibus. Lati

canina appe-  
tentia, buli-  
mus, & ver-

miculorù, qui  
eucurbita se-  
men referunt,

excretio. As-  
caridù verò,  
ani pruritus,

tenesmus, pro-  
lapsus.

De Vermibus.

CAP. 54.

**V**ermium 1 tria sunt genera. Ascarides infima  
parte recti intestini adultioribus pueris fami-  
liares. Rotundi, qui pueris superiore ferè intestino  
generantur. Latus vermis per totum intestinum ali-  
quando extenditur, rarò admodum, & paucis gen-  
tibus generatur: nunquam Atheniensibus, Thra-  
cibus, vt scribit Teophrastus. De eo tum antea,  
cap. de canina appetentia. Horum omnium gene-  
ratio, putris materia & calor. Signa 2 ex Paulo &  
Aëtio colligenda sunt. Verminam hunc morbum,  
& verminationem appellarunt, non solùm homi-  
nibus, sed iumentis familiarem.

In genere conueniunt, quæ enecant vermes &  
excludunt, acria, amara, quæ vias lubricant, quæ à  
proprietate hoc efficiunt.

In ascaridibus, quia infimo intestino hærent,  
glandibus potiùs vtendum est, quàm potionibus.

Fiunt glandulæ ex carne falsa, filo appensa: fiunt ex  
lardo priùs in aqua frigida macerato. Item ex mel-

le, mixta aloë, & iis, quæ interficiunt vermes: qua-  
lia sunt coriandri semen & caulium, decoctum thy-

mi, allium, absynthium, hyssopus, mentha, bouis  
astragalus vstus, vermes terreni vsti, chamæmelum,  
zedoaria, absynth. Santonicum, myrrha, puluis cõ-

tra vermes, securidacæ semen, succus portulacæ & endiuia, oleum omphacinum, medulla cerui, folia persicorum, rutæ, rasura eboris, vnicornis, rhabarbarum, cornu ceruinum. Superstitiosum est, quod scribit Scribonius, oportere è cornu cerui scobem fieri lima lignea: nam aliter iuuare potest. Plurimum laudatur decoctio sebesten. Alia quoque, quæcunque qualitate aliqua 3 vniuersali vermes

3 *Vt decoctio*

*graminis cum*

*rasura cornu*

*ceruini, pue-*

*ris poterit*

*prescribi.*

*Vel hic pului-*

*sculus. 4. ab*

*absynthii. San-*

*ton. 3. R. rhei*

*el. 3. 2. rasu-*

*ra cornu cer-*

*ui 3. 1. f. pul-*

*uisculus. cap.*

*ad 3. 1. cum*

*in sculo capi.*

Aquæ conueniunt graminis, absynthij, portulacæ & rerum amararum. Purgatio quoque an conueniat, quæstio est, de qua non dubitandum. Repurgata enim materia, vnde vermes generantur, vnâ cum ea vermes excluduntur. Laudantur rhabarbarum, hiera tum simplex, tum diacolocynthidos. Veteres etiam Medici scammonio vsi sunt. Nunc licebit vti granis quatuor dacrydij, cum aqua absynthij, aut simili. Sed purgatio commodior, vbi in superiore intestino vermes sunt.

4. decocti sebesten 3. 3. cornu cerui 3. 1. menthæ siccæ & piperis tritana 3. 2. Latos etiam expellit rhabarbari 3. 1. aquæ graminis aut absynthij 3. 2. spicæ nardi Gr. 4. Clysteres ex vini lib. 1. olei absynthij 3. 4. pulueris hieræ 3. 2. Poterit etiam adiici 3. 1. mellis, & 3. 1. salis. Nam & sal deglutitum ascendentes vermes ad stomachum deorsum pellit.

Videndum tamen, ne odiosa vermibus per sedem iniiciamus, cum ad superiora eorum motus est.

Tum 4 enim iucunda potius, vt mellita & dulcia, iniicienda sunt, aut eiusmodi glandulæ subiiciendæ. Bibenda verò, quæ eosdem vermes deorsum pellant. Nam aliquando ad ventrem vsque ascendunt,

4 *Dum hæc*

*fiunt, cati-*

*plasma ex a-*

*loë, absynth.*

*Sant. & felle*

*fieri poterit,*

*umbilico ad-*

*monendum.*

## DE MORB. INTERNIS

& stomachum lancinant, vnde syncope, conuulsio, mors.

Emplastra & cerota ex cerato facto è tribus partibus olei absynthij, amygdalarum amararum, nucleorum perfici, & vna ceræ amaræ. Deinde vbi refrixerint, subigi debet ex succo amaro, vt absynthij. Adiciendum quoque aliquod genus fellis. Nam fel insigni amore enecat vermes, ex quo & glandulas felle illinimus. Medullâ cerui venter, lumbi & perinaeum inungi possunt. Mirum est, quod contingit aliquando vermes per inguina prorupisse, viâ exedendo facta. Aliis per umbilicum.

Nonnullis quoque contingit, vt multitudo vermium tunicam sibi contexerit extensam toto intestino, & omnino similem veri intestini.

Vbi coniunctus est alui fluor, eligenda sunt, quæ præterquam quod vermes enecant, etiam alui fluxionem retineant, quale est rhab. & plantago.

Et quia pueri ferè vermibus infestantur, refugiunt autem quæcunque amara sunt, diductis dentibus, clysterio, aut curuata fistula, medicamenta in œsophagum infundenda sunt.

Fiunt clysteria ex muria, aqua oliuarum, centaurio, absynthij decocto. Sed vbi vermes exclusi sunt, roborandum intestinum, instituenda vitæ ratio, ne in posterum regenerentur.

Theriaca & mythridatium, si nulla febris, vermes enecant & excludunt.

### EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Ex multis humani corporis partibus reiiciuntur vermes, ventriculo, intestinis, vesica, utero, dentibus, vlceribus

ribus Puella quædam quæ in laterna ad portas D. Iaco- *Vermis latius*  
bi decumbebat, album vermem, latum, palmo maiorem, *naribus cise-*  
satis crassum reiecit per nares nulla tussi, nullo vomitu an- *ctus.*  
tecedente, 9. Aprillis, anno 1553. In quodam è renibus  
longi, præcedente magno dolore lumborum, per vrinam  
reiecti sunt, in aliis duobus parui. Musa Aphor. 49. libr. 4.  
scribit quendam tussi expuisse vermem, nescio an à ven- *Vermes longi*  
triculo, an à pulmonibus. De generibus vermium, materia, *è renibus re-*  
generationis modo in intestinis, non eadem est omnium *iecti.*  
sententia. Vulgò tria genera genera faciunt, *ἑλμυνθας στρο-*  
φύλας, id est, teretes & rotundos, qui in superioribus &  
gracilibus intestinis nascuntur, ventriculum subeunt, & *Vermium ge-*  
per os sæpe, aut nares reiciuntur: *ἑλμυνθας πλασείας*, id est, *nera tria.*  
latos, & longos, qui aliquando per tota intestina exten-  
duntur, à quibus oriuntur cucurbitui, quod semina cucur-  
bitæ referant. Tertium genus ascaridum, qui exigui sunt,  
teretes, vermibus casei similes, & in recto intestino con-  
tinentur. Alij præter latos quartum longissimum adiiciunt,  
eumque tineam nominant, quanquam sub latis comprehen-  
di potest. Cucurbituos etiam à latis separant, quod neque  
illius tineæ fœtus esse possint, neque partes animalis,  
cùm ipsi sint animalia: Sicque in vniuersum erunt, rotundi  
in superioribus intestinis, tineæ, longi, lati, cucurbitui ex-  
tensi per intestina, & ascarides iuxta anum. In qua diui-  
sione, cùm ex rei natura sumpta non sit, & membra si-  
mul permisceri queant, nihil mirum confusionem reperiri,  
& controuersiam. Experientia tamen omnia facilia. Con-  
stat enim longos & rotundos in superioribus intestinis  
contineri & per os reici. Anno 1553. in Collegio D.  
Barbaræ puer annos 12. natus interuallis vomere solebat  
longos vermes, albos, è ventriculo. Sentiebat motum,  
morsum & commotionem. Dum vrgebant, stiebat, an-  
gebatur. Nutritus fuerat lacte, & fructibus. Tineam voca-  
tum vermem Arelatæ vidit F. Valeriola longitudine, si bene  
memini, nouem pedum, aut etiam amplius: cuius vir ille *Vermes longi*  
doctissimus in suis Observationibus copiosè meminit, & *per interual-*  
quæ ad eius generationem intelligendam pertinent, accu- *la è ventricu-*  
ratè docuit. Cucurbituos quoque vermes esse certum est, *lo exclusi.*  
vt iam quinque genera inter se vel loco, vel figura, vel ma-

## DE MORB. INTERNIS

*Vermes an  
ab utero sus-  
ducant semi-  
naria.*

gnitudine distincta constitui eadem ratione possint. Ascarides quibusdam quasi sacculo inclusi & membrana inuoluti latitant in fœcibus. Quod ad materiam pertinet, nonnulli ex Hippocrate 4. de morbis ab utero seminaria accipi vo-  
lunt. Generari enim in utero matris, quoniam tunc fœtus non expurgatur à fœce. Non apparere autem, nisi ad id tem-  
pus, quo infans incipit vesci cibo, tum ob benignius lactis nutrimentum, tum quòd humidiora, & minùs calida sint illorum corpora. Quod certè principium longius petitum videtur, cum in grandioribus, atque adeò senibus frequen-  
ter, ut in pueris, nascantur. Mafsa scribit senem annorum 82. in extremis positum accidentibus, quæ vermiculosis pueris accidunt, & cum graui halitu, qualis pueris esse solet, plures 500. excreuisse medicamento è scordio, & corallina. Rusticæ cuidam mulieri plures prodierunt, cum antè incredibili palpitatione & fluctuatione ventris laborasset inde assurgentis & tumentis, ut in grauidis consuevit, robusto fœtu. Græci alios à bile, alios à pituita quosdam à melancholia generari volunt. Aëtius latum vermem, siue tineam, nihil aliud esse vult, quàm mutationem membranæ interioris tenuium intestinorum in corpus quoddam viuum animatum, mobile. Quæ omnia parùm probabilia videntur. Bilis enim & melancholia humores sunt tota natura ad hanc generationem ineptissimi, nisi temperentur ab aliquo alio longè superante. Et Galenus tanquam admirandum proponit in dysenteria, hominem abrafa interiore tunica intestinorum viuere posse, cum tamen expulsis huiusmodi latis vermibus ægri longè melius habeant. Rationi magis consentaneum & experientiæ, vel ex chyloso succo, vel pituita ortum habere, quæ tamen aliquando aliis humoribus tingi potest. Hoc intelligitur ex cruditate & alimentis eorum, in quibus reperiuntur. Deinde facilè in gluten resoluuntur, & secti rursus vniuntur. Neque alius generationis modus videtur, quàm per corruptionem & putredinem, in qua natura, id quod benignius est, calore viuifico tanquam opifice, efformat in animal, qualecunque possit effingi, ut Arist. docet in Meteoris. Id perspicuum est ex fœtore excrementorū, & halitu. Varia inducūt symptomata.

*Ætius Te-  
trab. 3. ferm.  
l. cap. 40.*

Nam chylum consumendo corpus minuunt: in ventriculo vomitum, famem, syncopem mordendo, instimulant & aliquando iugulare videntur. In recto intestino pruritum excitant & tenesinum. In ventre medio fluorem alui, leienteriam ventris inflationem. In omnibus aliquando febres quotidianis similes, inordinatæ & horrificæ, &, si arrodant intestina, sæpè interficiunt. Hæc eadem vermium signa sunt, sicuti anhelitus fœtens, tussicula inanis & sicca. Cum clamore expirant, ægri, arctius dormiunt, stridēt quodammodo dentibus, morsus, nausea, fastidium, & similia. Latus rarò generatur, & paucis gentibus, nunquam Atheniensibus, ut dictum est. In intestinis obiectum rapit alimentum, ut alio statim opus sit. Inde erosio, fames canina, gracillitas, imbecillitas, sine manifesta occasione. Certissimum signum esse volunt, in recrementis similia quædam cucurbitæ seminibus reiecta. In omnibus nihil certius, quàm si vermes aliqui reiecti sint.

Ascarides glandibus siue suppositoriis: rotundi potionibus: utrisque latè curantur, ex materia, ut est scopus necandi, alliciendi, purgandi. Conveniunt syrupi, topica suprà umbilicum, cataplasmata, vnguenta, inunctiones, clysteres, & similia.

## ANTO. VALETII EXERCIT. LIIII.

**O**Mnium trium generum vermium origo, lumbricorum, teretum & ascaridum, ex cruda, *Gal. comm. ad aphor. 26 lib. 3. Aph.* crassa, pituitosaque materia putredini accommoda existit, vehementi calore intestinatorum accedente. Teretes & longi, etsi descendant atque ascendat, in ileo, plerunque gignuntur: in colo lati: ascarides, teretes & breves, in fine recti intestini. Habent vermes interdū morbi rationem, ut cum quiddam toto genere præter naturam, quod est auferendum, adest: nonnunquam causæ, quam morbi excipiunt, febres, epilepsiæ consentiente cerebro, spasmi, vertigines, dentium stridores: alias signi solius, quatenus

*Vermes quæ  
variè consi-  
derentur.*



## DE MORB. INTERNIS

considerantur, ut excrementa. Sic quando in initiis febrium eiiciuntur, malum indicant, putridæ scilicet materiæ multitudinem: sicut & in vigore symptomatice expulsi, eius malignitatem. In declinatione autem, quum critica comitatur excretio, sanitatis spem portendunt. Vermium malignitas ex colore dignoscenda. Qui vnius sunt coloris, ut albi, minus censentur mali: qui versicolores deteriores, quia putredinem arguunt maiorem. Varia sunt vermium signa. Turbatur somnus, & vociferatio editur, ab excitatis à vermibus malignis vaporibus cerebrum petentibus. Pueri (qui propter lactis usum & edacitatem in hunc affectum crebrius incurrunt) dormientes quasi cibum, vel lac ore trahunt, quia vermes humiditatem exugunt. Tussis adest sicca, propter partium spiritalium consensum cum naturalibus, à quibus putridi vapores attolluntur: qui cum lædunt os ventriculi, singultum mouent: cum caput conscendunt, narium pruritus ruborem genarum, oculorum suffusionem leuem. Vermes, siquidem febris absit, imprimis necandi sunt, quod viui intestinis adhærentes resistent: at mortui cum fæcibus excludantur. Vulgaris est usus rheii infusi in aqu. gram. cichor. absynth. cardui, portul. vel plantaginis, si alui profluuium accesserit: cui expresso adiiciatur syr. de portul. vel de absynth. Vel.

℞. radic. gram. & cichor. ana ʒ. ss. radic. petros. ʒ. 2. sebesten ʒ. 2. f. decoct. ad ℥b. ss. In qua infunde summitat. absynth. Rom. & fumar. ana p. i. Deinde è colatura cum saccharo sufficienti f. syrup. Detur ʒ. i. ss. cum ʒ. 2. aqu. portul. in quibus ponatur corn. ceru. præpar. puluer. contra vermes ana ʒ. ss.

*Vermium malignitatis ex colore dignoscenda.*

*Vermium signa.*

*Gal. sub finē lib. 4. Meth.*

Diuitibus rasura vnicornis imperatur. Vermes ve-  
rò vt ad superiora intestina, & ventriculum non  
perreptent, alliciuntur dulcibus clysteribus, ex lacte,  
oleo non addito, eo enim fugantur. Interea extrin-  
secus, vt vmbilico, linimenta, emplastra, ex amaris  
comparata admouentur.

℥. ol. ruthac. amygd. amar. & absynth. ana ʒ. ʒ. ʒ. myrrh.  
aloës ana ʒ. ʒ. ʒ. f. litus pro vmbilico. Vel. ℥. aloës elect.  
ʒ. ʒ. flor. tanacet. puluerator. ʒ. 2. mythridat. ʒ. 1. cum oleo  
amygd. amar. & felle bubulo, addita cera & farin. lupinor. f.  
emplastr.

Vel semincia massæ interioris pilul. communium  
malaxatur cum oleo ruthaceo & felle bubulo, & su-  
per alutam extensa vmbilico adhibetur. Sed aduer-  
tendum, vt si febris adsit, minùs amara vsurpentur:  
vt si ex farinæ hord. & lupin. ana ʒ. 6. succ. limon.  
& portul. ana ʒ. ʒ. ʒ. aceti ʒ. 1. cū oleo amygdal. amar.  
cataplasma fingatur.

*De Hemorrhoidibus.* CAP. 55.

**H**æmorrhoides vniuersum 2 corpus vacuant,  
aliquando 3 cacochymia, aliquando 4 pu-  
ro sanguine, quique 5 sola quantitate peccat. It  
autem per venas, quæ à 6 vena caua explantata  
vtero, pudendis & sedì implantantur. Hoc enim  
verisimilius est, quàm per venam, quæ à portis he-  
patis in extremum rectum intestinum porrigitur.  
Neque admodum verisimile hæmorrhoidum ma-  
teriam per venam à liene repurgari. Ramus enim  
venæ, quæ à medio liene descendit, desinit in o-  
mentum. Hæc vacuatio in genere præter naturam  
est. Ideoque periculosa, propterea que non facien-

1 *De sangui-*  
*nis, aut humo-*  
*ris melanco-*  
*licis fluxu, qui*  
*fit per venas*  
*ad podæ. ē per-*  
*tingētes, quæ*  
*ab ea aff. Etio-*  
*ne nomen ha-*  
*bent.*  
2 *Cacochy-*  
*miā pūgan-*  
*do, aut pertha-*  
*ram deplēdo.*  
3 *Melanco-*  
*licas, per me-*  
*ntericas ve-*  
*nas.*  
4 *Per venā*  
*hypogastri cū*  
*quæ musculis*  
*intestini re-*  
*cti, cernit<sup>9</sup>*  
*vesicæ ac vte-*  
*ri sanguinem*  
*imperit, atq.*  
*etiā pudēdo.*  
5 *Vt in gravi-*  
*dis, in nimia*  
*sanguinis a-*  
*bundantia,*  
*mulieribz,*  
*quibus sup-*  
*pressi sunt mē-*  
*ses, aliquo e-*  
*tiam membro*  
*mutu.* 6 *A*  
*ramis distri-*  
*ci inferiores*  
*venæ caue.*

# DE MORB. INTERNIS

da eius consuetudo. Quibusdam tamen naturis fit naturali cōsuetudine, & incolumis valetudinis causa est. Tale est, quod scribit Hippocrates. 7 Atra bile vexatis, & renum passionibus, hæmorrhoides superuenientes bonum.

Præterea quòd quartana, melancholia, angina, pleuritide & aliis eiusmodi grauioribus 8 morbis hominem vindicât. 6. Epid. Salutaris quoque hæc vacuatio epilepticis, & iis, quibus tubercula & maligna vlcera oriri solent. Fluunt tamē hæmorrhoides aliquando 9 immodicè. Oportet enim ea fluxione corpus 10 leuari, non infirmari. Atque vbi de commouendis hæmorrhoidibus consilium est, peculiaris natura ægri primùm interroganda est, an ex consuetudine, & statis interuallis soleat eo modo repurgari. Sunt enim quibus periodicè fluunt. Mulieribus, 11 viduis, 12 senibus, & quibus aliter supprimuntur menses, sanguis interim diuertit à venis vteri ad sedis venas: & ita per periodos sese repurgant. Præterea interrogandus est æger, num sit opportunus grauioribus illis morbis, quos diximus. Hæc enim efficiunt consilium excitandæ huius purgationis.

Excitantur autem aliquando 13 purgationibus, quæ cacochymia cōueniant. Nonnunquam phlebotomo è malleolo, vel iis venis, quæ superiore parte pedis eminent: cucurbitulis item cruribus admotis & sedi. Leuissima via est per sanguisugas.

Ferro etiam aperiuntur, vbi turgent, quas mariscas appellant. Tum etiam medicamentis, vt oleo è

7 Aphor. 11.

lib. 6. Aphor.

8 Sect. 3 li. 6

αἱμὴν ἐπιδιδῆμι.

Et ad finem

lib. de humo-

ribus.

9 Vnderache

xiam adfe-

runt, indeq.

hydropem.

10 Quod e-

rat aliqui

onus tum hu-

moris melan-

chologici proue-

tu aut sup-

pressi sangui-

nis plethora.

11 Quæ sue-

rant olim re-

sistibilibus faci-

ditatis, hoc

est, singulis

annis parie-

bant.

12 Melācho-

licia, olim bi-

liosia: quorū

corpora bi-

liosia iā per-

spiratione ca-

rentia fiunt

melancholi-

ca.

13 Ex decocto foliorum fenæ & cassia, de luto rhei & diaphanico, maximè verò aloes usu.

nucleis persicorum, aut in quo res 14 acres & amaræ coctæ sint. Aut vnguento.

℥. pinguedinis lardi erasæ ex parte pinguißima 14 *Vt persicaria, myrion-*  
 3. 1. olei irini, ruthacei, aut similiū 3. 3. Fiat veluti *phyllum, ap-*  
 vnguentum molle, quod subigatur ex succo cæpæ *parine, &*  
 rubræ. Eadem cæpa aceto macerata, contusa, & *præsertim ru-*  
 imposita. Verum vbi dolor est, cum butyro subigi- *bia minor.*  
 mus, oui vitello, vel rosaceo. Pulpa colocynthidis  
 conuenienti oleo immergitur, ano alligatur: quin-  
 que horarum spatium aperit.

Collyria, suppositoria ex radice cyclaminis, ex  
 radice caulium induntur. Fortiora, si taurino felle  
 illinuntur. Fellis genera, maximè flaua, sed illinun-  
 tur, vel gossipio excepta induntur. Pallida verò mi-  
 tiora sunt. Forte hoc est.

℥. stercoris columbini in puluerem redacti 3. 3.  
 inspergantur vnguento molli facto ex pinguedinis  
 lardi 3. 1. olei, in quo matricaria coctarit; 3. 3. salis  
 3. 2. omnia misceantur in mortario.

Celerius agent medicamenta, si antè confrice-  
 tur sedes ex foliis ficus, parietariæ, aut aliis asperio-  
 ribus, vt linteo cannabino, vel detrito panno.

Fotus quoque ex cyclamino, centaury, abro-  
 tono, matricaria, bryonia, radice enulæ, ireos, ab-  
 synthij, & similiū. Reliqua materia cap. de com-  
 mouendis mensibus dicitur.

Sed aliquando latent 15 hæmorrhoides: qua in  
 re placuit Antiquis vt sedes euerteretur. Inusitatum  
 nec ita tutum remedium nostris temporibus. Ener- *15 Neque*  
 titur sedes, quò facilius remedia applicentur. *sub aspectum*  
*veniunt, siue*

℥. piperis, nitri ana 3. 1. læuigatis locum attrin- *sistendi, siue*  
 gito. Vti licet & sale gemmæ, & pul. seriphij, & felle, *ciendi consi-*  
*lium sit, si-*  
*ue symptoma*  
*corrigendi.*

# DE MORB. INTERNIS

16 *Nonnulli  
esula lacte  
viuntur.*

absynthij 16 succo, & matricariæ. Postea verò reponenda sedes ex iis, quæ capite proprio dicentur. At verò vbi iam immodicè fluunt, sistere oportet. Sistuntur autem, vbi odiosæ sunt. Atque vbi grauius aliquod malum non metuitur, ad eam rem vena 17 cubiti secatur, aut extremæ manus Cucurbitulæ hypochondriis, lumbis ac scapulis affiguntur. Reliqua curatio 18 potionibus, topicis remediis, Chirurgiâ perficitur. Quod autem ad Chirurgiam attinet, meminisse oportet, anum maximè ea parte, qua sphincter est, partim neruosa substantiâ, partim neruoso circulo constare.

17 *Tum ad  
reuulsionem  
humori eo  
fluente, tum  
etiâ ad pro-  
hibendâ sæ-  
culenti san-  
guinis gene-  
rationem.*

18 *Alteran-  
tibus, va-  
cuantibus &  
sistentibus.  
Præter hæc  
abstinendum  
erit vino, vt  
orgasmus in-  
hibeatur.*

Neruosa substantia neque acria & mordacia medicamenta, neque vstionem aut incisionem, sine conuulsionis periculo, perferre potest. Exterior musculus recti terminus ignobilis & carnosus, qui vocatur podex, ea remedia perferre potest. Quod autem scriptum est ab Hippocr. quòdque ad consilium sistendi hæmorrhoides pertinet, A diuturnis sanato hæmorrhoidibus, si vna non seruatur, periculum est, ne intercus, aut tabes subsequatur, ita intelligere oportet. Medico sananti hæmorrhoidas, id est, dum sanguinem mittit, affigit cucurbitulas, topica & reliqua remedia adhibet, rectam vitæ rationem instituit, vna quidem eo tempore relinquenda hæmorrhoids, vt paulatim non temerè ac præcipitanter fluxum cohibeat. Vbi verò persanauit, nulla relinquenda est.

Potiones conueniunt, quæ partim cap. de sputo sang. partim cap. de profluuiis alui & mictu sanguinis descriptæ sunt, & describentur cap. de supprimendis mensibus. Sed quia in hæmorrhoidibus

ferè cruciat dolor, his vtendum est.

℥.olei violarum ℥.3. mucag.sem. pſilij ℥.2. mi-  
ſce, vngatur ſedes. Aliud.

*Symptoma-  
tū correctio.*

℥.olei violarum ℥.3. ceruſſæ lotæ drach. 6. ce-  
ræ albæ quod ſufficit. Aliquando vitellum oui cum  
roſaceo, aut violato oleo ſubigimus. Nonnun-  
quam albumen commiſcemus, vbi maior ardor  
eſt. Similiter & 19 micam panis albiſſimī ex fu-  
pradiſtis oleis ſubactam emplaſtri modo apponi-  
mus. Conueniunt & mucag. portulacæ, lactucæ,  
ſed maximè pſilij. Fiunt quoque ſacculi ex rebus  
anodynis. Fiunt fotus ex iſdem, atque vbi dolor  
vrit grauiùs.

*19 Violaria  
in lacte cocta  
ad pulſu cō-  
ſiſtentia mi-  
cificè dolorē  
ſeda, ſi cum  
tantillo olei  
roſacei ad-  
moueatur.*

℥.olei violati ℥.2. populei ℥.2. Cum ouo inte-  
gro fiat vnguētum. Quòd ſi res vrgeat, opij ʒ. com-  
miſcere poteſt. Poſtremò videndum, ne adſtringen-  
tibus immodicè nimium reſiccatus podex non præ-  
ſtet officium. Itaque fomentis humectantibus cor-  
rigendum vitium eſt. Similiter cum nimium po-  
dex refrixit refrigerantibus medicamentis & nar-  
cotiſis, temperandus eſt.

Poteſt ſiſti hæmorrhoids ſiccantibus, cauſticis,  
voſſella præhenſis, & vinculo interceptis venis.

Laudatur farina volatilis, aranearum tela, &  
alia in fluxu ſanguinis numerata. Vrunt, & vt lo-  
quuntur, mortificant ex puluere radicis caulium  
torrefactæ, & ſtercore canino ſimiliter cremato,  
ſæce arida vini adſtringentis cremata, adiecta ter-  
tia parte vitrioli Romani.

Extremū eſt arrhenicū rubrum, cum æqua parte  
aluminis plumæ. Oportebit autem, priuſquam hæc  
admoueas, ſedem madefacere vino adſtringente.

Per anum effluit sanguis multis modis, ut per intestinorum fluxum, hæmorrhoidas, *σύνωπιν*, siue ficum, & Thymum siue Mariscam. In quibus multi sæpè falluntur, qui sine distinctione, statim fluxu aliquo in ano, aut tumore apparente, hæmorrhoidas esse putant, cum plurimum hi omnes affectus inter se differant, & natura, & curatione. Thymus à veteribus describitur tuberculum carnosum, quasi verruca eminens ad cutem, tenue, suprà latius, subrubrum, in summo perasperum, oblongum, florem thymi referens, unde nomen habet. Facile finditur & cruentatur, modòque vnus, modò plures nascuntur in pedibus, talis, palmis, mediis femoribus, glande, præputio, facie, & sæpè in ano. Alij sunt sine dolore carnosi, asperi, candidi, aut subrubri. Alij cum dolore punctorio duriores, asperiores, maiores, fœculenti, liuidi qui non facile curentur, nisi tota parte exacta, cui innascuntur. Sycoſis idem significat, nisi quòd minor est quantitate & magnitudine, ut scribit Aëtius.

*Aëtius Te-  
trah. 4. Ser.  
2. cap. 4.*

De quibus sic Iuuenal. Satyr. 2.

Cæduntur tumidæ, Medico ridente, mariscæ.

*Mariscarū  
et hæmor-  
rhoidum ge-  
neratio.*

*Fluxionum  
omniū cause  
quæ possint  
diagnosci.*

*Sanguinis  
per intestina  
reiecti signa.*

Falluntur ergò, qui mariscas cum hæmorrhoidibus confundunt. Illæ enim generantur ex præpostera venere, immodica equitatione, vel attritione qualibet in ea parte facta. Hæmorrhoids verò (nomine pro affectu sumpto, siquidem partem affectam quandoque significat) nihil aliud est, quàm profluuium sanguinis per venas ani, aut in illis tumor ab influente sanguine. Quæ affectio ut distinguatur à fluxu sanguinis antea descripto superioribus capitibus, obseruanda est hæc methodus, omnium fluxionum causis inuestigandis accommodatissima, siue naturales sint, siue præter naturam. Tria enim sunt in genere, in quibus causam inuenies. Virtus quæ mittit: instrumenta seu viæ fluxionum, unde, quæ, & quò mittuntur: postremò materia fluens. Virtus quadruplex attractrix, retentrix, concoctrix & expultrix. In materia notanda mixtio consistentia, quantitas, qualitas. Primum igitur per quam viam sanguis fluat, obseruandum,

an per intestina, an per venas ani. Hoc cùm ex causis antecedentibus & sensu, tum ex mixtione coniiciendum. Nam simul cum recrementis reiectus & cum illis mixtus ab intestinis prodit: sine recrementis, ab ano. Illic causa est vel in sanguinis multitudine aut acrimonia, vel in virtute, siue non retineat ob imbecillitatem, siue excernat ob copiam: vel in via, vt vlcere aliquo in intestinis. De quibus omnibus dictum est superius. Si à venis ani (simul cum arteriis: ab utrisque enim fiunt) hæmorrhoides erunt. Itaque videndum initio, vt fluxionis natura & origo exactè intelligatur, vnde venæ illæ oriuntur, quæ progrediantur, & vbi terminentur. Vna est insignis, quæ à ramo splenico venæ portæ per mesaræum circa cololum & intestinum rectum extensa terminatur in musculis ani & intestino interiofe, cui circa lumbos occurrit arteria. In eundem locum, sed vlterius ad cutim vsque à vena caua, tres cum suis arteriis, à duabus iliis & ramulo venæ sacræ dictæ Syluio. Si per has effluat sanguis, quia exteriores sunt, hæmorrhoides apertæ dicuntur, siue externæ, in quibus necesse est hepar, renes, & totum illud venosum genus à vena caua magis expurgari, proindeque sanguinem magis coctum esse, quàm qui fluit à venis mesaraïcis, in quibus adhuc rudis est & splendidus, licet ater sit & crassus, quem lien, & mesaræum maximè hac via expurgant. Nam hepar sanguinem coctum per venam cauam distribuit. Mesaraïcæ verò sugunt à ventriculo, & omnibus intestinis, atque ad hepar succum mittunt, plurimùmque feri continent. Lien autem sanguinem fœculentum exonerat in ramum splenicum. A quo descendit per mesaraicum ramum, vnde primus ramus, qui descendendo occurrit, hæmorrhoidalis est: paulò infrà, venæ mesaraïcæ. Si igitur per venam à mesaraico ramo, qui à splenico oriuntur, fiat ille fluor hæmorrhoides internæ erunt, quod intus lateant, nec oculis cerni possint, nisi descendente ano, aut immisso speculo. Vtræque rursus diuidantur in cæcas, & apertas. Cæcæ sunt, quæ tument cum maximo dolore, nec sanguinem reddunt. Quanquam non ignoro cæcas etiam dici illas interiores, quia non videntur. Apertæ verò, in quibus est sanguinis profusio. Rursus vel sine inflammatione sunt, vel cum inflammatione. Inflammationis signa sunt dolor, rubor, tensio, &c.

*Hæmorrhoides cæcæ.*

*Hæmorrhoides internæ.*

*Inflammatio  
na in hæmorrhoidibus nota.*



## DE MORB. INTERNIS

renixus, febris. In cæcis grauiſſimus dolor, quia partes illæ acutiore ſunt ſenſu. Sphincter enim neruoſa quædam ſubſtantia eſt quæ neque uſionem, neque ſectionem facilè ferre poteſt ſine conuulſione. Deinde hæbent è vicino oſſe ſacro ductos neruos, & extremæ partes ſunt: quales acerrimum habent ſenſum, neque ſine periculo offenduntur. Indicio eſt è pollice pedis ſubita mors apud Hippocr. 1. Epid. & læſis extremis digitis dolor grauiſſimus & oculis, & pudendis, & ſedi. Reſtitudo quoque & tenuitas neruorum plurimùm facit ad doloris ſenſum. Quæ omnia indicant, non ſine cauſa, plenioribus vaſis, & diſtenta membrana ſedis, quæ oriſiciis venarum prætenditur, à plenitudine, aut inflammatione acutiſſimum dolorem excitari, qui ſæpè ad ſe totam curationem traducit. Ex his etiam perſpicuum eſt, non ſolùm propter craſſum & ſæculentum ſanguinem, ſed etiam puriſſimum, hæmorrhoidas fieri, licet Gal. in Aphor. contrà ſentire videatur. Si igitur ſanguis, qui effluit, redundet & vitioſus ſit, magna ex hæmorrhoidibus commoda conſequuntur, quæ numentur ab Hipp. Incipientem melancholiam prohibent, ſæctam ſanant, quòd ferè iſ humor craſſior & nigrior per has venas vacuetur, quanquam & alius. Varicibus, lieni indurato, arthritidi, nephritidi remedio ſunt. Quibus (inquit Hippoc. ſect. 6. Epid. 3.) hæmorrhoides, ij neque pleuritide, neque peripneumoniâ, neque phagedænâ, neque furunculis, neque thermynthis, fortasſe neque leprâ, neque alphis corripuntur. Sed non ſolùm his, quæ dicit Hippoc. profunt, verùm etiam vteri, veſicæ & pudendi affectibus. Ex eadem enim diuiſione hæc omnia venas habent. E viduis quibuſdam loco

*Gal. cõment.  
in aph. 11. c.  
12 lib. 6. c.  
cõm. in ſent.  
37. ſect. 3. li.  
3. Epid.*

*Hæmorrhoides fluentes  
menſium loco,*

*Sanguinẽ &  
pus mingentis  
hæmorrhoidis  
aperta ſaluti  
fuit.*

menſium fluunt hæmorrhoides. In grauidis quoque notauit hæmorrhoidas vtiliter fluere in duabus mulieribus nobiliſſimis iam quatuor menſes in vtero habentibus: in quibus partus tempeſtiuſ conſequutus eſt, & ſaluberrimè adoleuit. Erat autem frequens & multus fluxus, ſanguis ferè dilutus, qui vbi ſubſiſtebat, grauiùs habebant. Ægrè excluſo leuabantur. Quibuſdam etiam familiis conſuetæ ſunt. Cuidam nobili in æde Ambroſij Paræi Chirurgi decumbenti, qui me ad cõſilium adhibuit, cùm in grauiſſimo renum dolore emingeret pus, ſanguinem & craſſam pituitam, natura remedium

ostendente, quia tumebat hæmorrhoids, & aliis remediis non cedebat dolor, eo statim tempore iussi aperiri hæmorrhoidē, vnde incredibili celeritate dolor conqueuit. Sed hæc omnia intelligenda de natura superflua exonerante, & si ægri leuiter ferant. Nam quæ ab infirmitate viscerum & intemperie, vnde sanguis vel acrior, vel serosior generatur, vel quæ à laxatione & hiatu venarum ortum habent, aut immodicè fluunt, in his celeriter tolli debet totius mali origo. Alioqui intempestiuè cohibita deteriora longè & periculosiora vitia inuehunt. Nam suppressus sanguis ad hepar, hinc aliquando ad pulmonem, cerebrum, latus, aut in corpus diffunditur, vel aliqua parte consistit, vnde morbi illi omnes superiùs relati oriuntur, & si qua adhuc grauiora dici possunt. Paucis enim grauioribus annotatis morbis alios intelligit Hippocrates, vt epilepsiam, & similes. Non immeritò igitur quæstiones illæ duæ pōnuntur, an prouocandæ sint, an sistendæ. Et si sistere consilium sit, an vna relinquenda, vt Hippocr. præcipit in Aphorismis. De quibus remota omni disputatione ab hoc loco aliena sic breuiter censemus. Assuetis & grauioribus morbis laborantibus, aut opportunis, aperiri posse. Quibusdam familiis consuetas esse, in quibus indiuidui ratio habenda. Et quia ante pubertatem non fluunt, vt est author Hippocrates, impetus quoque naturæ considerandus. Alioqui non est facienda consuetudo. Aperiendæ igitur non sunt si non tumeant, & si nunquam fluxerint. Quod ad alteram quæstionem pertinet, Curati (inquit Hippocr. 6. Epid.) importunè multi subitò his morbis correpti sint, & grauissimè. Galenus importunè curatos interpretatur, qui neque phlebotomiâ, neque medicamento subducente per interualla exhibitto, vel exercitationibus vacuantur, qui item neque vnâ ex ipsis relinquunt, sed omnes in vniuersum tollunt. Vbi Galenus videtur sentire omnes quidem tolli posse, sed non ἀσπῶς. Deinde oportere *κατὰ περιόδους* vacuare corpus, phlebotomiâ, medicamento, exercitio: alioqui vnâ relinquendam. Quare vbi hæc remedia adhibita fuerint, & per interualla, nulla relinquenda videtur, præsertim cū ea purgatio non sit naturalis, & optima victus ratione declinari queat. In recentibus quoque metu grauioris mali vna seruari potest.

*Hæmorrhoides quando prouocandæ, aut sistendæ.*

## DE MORB. INTERNIS

Multis percurantur. Sed experientia docet, nisi purgentur, & sanguis detrahatur, nescio qua melancholia & obscœnis, somniis vexari. An autem vna relinquenda sit, quæ statis periodis effluat, an obligandus æger phlebotomiæ per interualla, & medicamentis, id ferè arbitrio ægri relinquendum nisi si quis à phlebotomia, purgatione, exercitiis deterius habeat, aut hæc leuiter ferens, grauius ferat hæmorrhoidem. Relinquere autem vnam apud Hippocr. nihil aliud est, quàm non secare, non vrere, non confuere, siccare, putrefacere. Nam liber est de hæmorrhoidibus, vbi omnes vrit, secat, curat, confuit, putrefacit, siccatur. Vrit autem non adhibito venæ ferro, sed tantum admoto, vt assetur, & siccetur. Quod igitur Aëtius nullam seruandam scripsit, Paulus contra, non solum in diuturnis, sed vbi stillicidij modo effluit sanguis, cæteris occlusis, vnam relinquendam præcipit. Seruari duobus modis interpretari poteris, vel neglecta artificiosa curatione, vel adhibita. Si negligatur, vna seruanda est: si adhibeatur, nulla. Rursus sistendi consilium duplex. Alterum dum fluentes sistimus: alterum, dum fluxuras animaduertimus. In illis immoderatum fluxum adstringi debere non est dubium. Cæterum externæ faciliè deprehenduntur ex tumore. Internæ verò ex pondere circa sedem, egerendi difficultate, & clysteres aut glandes immittendi, sanguine aliis excrementis non permixto, & consueta purgatione, atque indiuidui natura.

Multi sunt igitur curationis scopi. Tumentes aperiendæ: fluentes compescendæ: dolor mitigandus, & inflammatio tollenda. Quæ omnia propriis remediis perficiuntur. In omnibus, partis affectæ habita ratione, ab omnibus acerbis & mordentibus abstinendū. Cauendum à cancro, aut fistula: quæ vehementioribus medicamentis faciliè inducuntur. Nam cuniculi quidam sæpè latent, in quibus pus. Vnde longiores sinus in fistulas abeunt. Videndum etiam, ne nimium adstringamus, aut refrigeremus podicem. Hinc sequitur ani prolapsus, vel resolutio: illinc non præstat officium, & aluus nimium resiccatur. Itaque post vsum horum corrigi vitium debet, si quod illatū sit. Vbi remediis non est locus, Chirurgia opus est ligatis, vstis, tabefactis venis. Sed reuera in hæmorrhoidibus

diuturnis, in varicibus, & reliquis influxionibus & collectionibus iam inueteratis omninò periculosa sectio, quâ vel moriuntur, vel in aliquem grauissimum dolorem incidunt, priore peiorem. Purgato corpore fots conuenit cum vino adstringente, decoctione ros. centinod. plantaginis, scorïa ferri, & similibus. Topica adhibentur & sedi, & ossi sacro.

## ANTO. VALETII EXERCIT. LV.

**H**æmorrhoides aliæ sunt internæ, externæ alię. Illæ à splenico ramo & mesenterio: hæ potiùs à venæ cauæ propaginibus ipsi sedi explantatis, fiunt. Internarum sanguis parcior & aquosior: crassior externarum. Sunt item aliæ vuis similes, rugosæ, proptereaquę dictæ vulgò morales, quòd moris similes conspiciantur. Corpus aliàs cacochymia expurgant, præsertim melancholica, aliquando plethoram deplent. Prorruptionis sanguinis ab hæmorrhoidibus cõmoditates vide apud Gal. cap. 7. lib. de venæ sectione aduersus Erasistratæos, cõm. in sent. 8. sect. 6. lib. 6. Epid. & in 37. sent. sect. 3. lib. eiusdem. Suppressarum verò incommoda comm. in sent. 39. Prorrhetic. 3. Prima curatio est, vt molestus dolor sæpè leniatur: secunda, si sistantur, & mali grauioris metum afferant, vt aperiantur: tertia si immodicè fluant, vt cohibeantur. Sola quippe vacuatio optima censetur, quæ quod graue, infensumq; est, velut onus inutile, deponit citra corporis infirmitatem, & virium iacturam. Sedabitur itaque dolor aluo molliore facta, vt minore cum expressione & conatu fæces reiiciantur, quæ alioqui duræ hæmorrhoidas exasperant, fluxionem videlicet dolorifica duritie ingeminando. Et quia in-

*Gal. cõment.  
in senten. 25.  
sect. 5. lib. 6.  
Epidem.*

*Gal. ad finem libr. de differ. sympt.*

## DE MORB. INTERNIS

flammatiō sæpè adiungitur , conuenientissimum hoc erit remedium.

℞. mucag. seminis psilij ʒ. 3. vnguenti populei ʒ. 2. misce  
pro linimento : quo pannus mollis, aut gossipium imbutum,  
in anum inditur.

Quòd si tensio sine inflammatione sit , satis erit bombacem imbuere linimento ex mucaginib. alth. lini & fœnugræc. vel oleo viol. aut simil. Dein aper-  
riuntur hæmorrhoides infinitis propè artibus ab Hollerio traditis. Vulgò tumentes venas inungunt sanguine gallinæ , aut columbi : mox hirudines præparatas affigunt : quæ si satis sanguinis non ex-  
hauriant , sanguinem fluere sinunt. Quod si per se sistatur, ægrum iubent in aqua tepida insidere. Con-  
trà verò si per apertas hæmorrhoidas fiat profu-  
sior sanguinis proruptio, à qua periculum tabis, aut cachexiæ impendeat , auertetur sanguis secta dex-  
tra basilica , largo sanguine ducto, si multus substi-  
terit, affixis dextro hypochondrio & interscapulis  
cucurbitulis, &c. Vbi tenuitas sanguinis & acrimo-  
nia in suspicionem venit, syrup. incrassantes, refrige-  
rantes & ora vasorum occludentes vsui erunt. Tu-  
tissimum etià erit, rhei electi in aqu. cichor. plantag.  
rosar. aut solani cum paucis cinam. crassiusculè con-  
quassato infusi fortem expressionem exhibere , ad-  
iecto syrup. aliquo adstringente : aut, si magna fue-  
rit cum sanguine feri copia, syrup. laxat. rosa. pallid.  
Facit & hûc maximè hic potus.

℞. sacch. ros. ʒ. 2. bol. arm. clotæ in aqu. ros. ʒ. 2. syru. myr-  
rill. ʒ. 1. aq. ros. ʒ. 2. f. potus.

Foris sedi admoventur ad sistendum fluxum ea-  
dem fermè quæ in ani procidentia.

1 De vltima  
recti, in testi-  
ni partis pro-  
lapso.

2 Ductarum  
à peritonæo,  
atque etiā à  
ligamētis lū-  
barū & ossis  
sacri.

3 Quæ vel  
ab obstruētio-  
ne, vel com-  
pressionē fit.

4 Dolore itē  
& pulso.

5 Ad reuel-  
lēndū & in-  
hibendū flu-  
xum.

6 Ad amo-  
tionem mate-  
riæ cōiunctæ.

7 Quæ parte  
ischium cum  
osse sacro cō-  
nectitur.

8 Ut ad so-  
lū, lūtu, im-  
plāstra, dro-  
gares

De his vid.  
Hippocratē  
ad finē libelli  
de fistula.

**A**Nus totum rectum intestinum est, aut extre-  
ma laxitas eius. Excidit hæc infirmis musculis  
obliquis, qui sedem sursum reuellunt, & laxitate  
2 membranarum, quibus ossi sacro & lumbis col-  
ligatur. Nerui etiam 3 resolutione, qui ab extrema  
spina ad sedem porrigitur. Itaque primum animad-  
uertendum, num quæ inflammatio adsit, quod  
tumore, rubore, calore & 4 duritie intelliges.  
Hic 5 sanguinem è brachio detrahes: deinde etiam  
è 6 malleolo. Si fuerit opus, materiam inflamma-  
tionis resoluentibus medicamentis & laxantibus  
digeres, admixta etiam parte eorum, quæ repercu-  
tiant & corroborent.

Topica remedia frustra sunt adhibita sedi, si à  
læso neruo vitium est. Tuncque applicanda extre-  
mitati spinæ, vbi 7 coxa est: redeundumque ad ge-  
nus 8 curationis, quod cap. de Paralyti dictum est.  
Si verò infirmitas est eorum obliquorum musculo-  
rum, & corpus crassis ac viscidis humoribus abun-  
dat, purgatione primum vtendū est ex hiera simpl.  
aga. hiera diacolocynt. & similibus: tum si qua for-  
des ano inhæsit, detergenda prius hydromelite, vri-  
na propria, decocto betæ, muria, marina aqua.

Postea verò fatus cōueniet sæpe repetitus ex vino  
austero, in quo acacia, hypocistis, mirthus, malico-  
rium, rosæ, scorïa ferri, & alia eiusmodi adstringen-  
tia cocta sint, adhibita ratione, quæ iubet mollio-  
ribus mitiora, durioribus fortiora remedia esse ad-  
hibenda.

A foci vnctiones, insersiones puluerum, incessio-

# DE MORB. INTERNIS

nes & balnea vsurpanda sunt. Quanquam inunctiones & olea, quæque lubrica sunt omnia, non sine ratione quidam reiciunt, alij admittunt, quia firmitus inhærent. Laudabitur oleû nardinum, costinum, laurinum, mastichinum, rosaceum, quæ ubi inuncta fuerint, pulvis ex arida pice trita, seta porcina, vsta galla, fimo canino, cornu cerui, carabe, sanguine draconis, mastiche, corallo & similibus.

Suffitus è bdellio, pice arida, pinea, Colophonia, exuuio serpentis, lapide molari candente consperso aceto, in quo porri folia coxerint, vino austero nigro, in quo aliquid adstringētium ferbuerit, infusiones in aqua sulphurea, marina, bituminosa, aluminosa, & similibus. Pulvis.

℥.sang.draco.malicorij ana ʒ.i.gallæ, bituminis ana ʒ.2. subtilissimè trita & cribrata inspergantur. Alius.

9 Stibij non  
calcinats.

℥.carabe, cornu cerui vsti, coralli, balaustiorum, thuris albi 9 antimonij, acaciæ ana ʒ.ʒ. trita inspergatur, aut incorporētur vitello oui, & modico petrolei, Vitellū oui vsurpamus, vt in eo pulueres incorporentur, quia non, vt oleum, sordes relinquit.

Emplastra fiunt ex ammoniaco, bdellio, malaxatis cum oleo nardino, & similibus conspersis puluisculis, quæ adstringant: ossi sacro, perinæo & sedi apponi debent, & ne concidant, fasciis contineri. Tempus remediorum, ubi iam ægri deiecerint, & abluta sedes reposita fuerit.

## EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Alexand.  
Aphrodis.  
lib.I. Probl.

Rectum intestinum, Græcis ἀπενθυσμένον dicitur, Hippocrati ἀρχός, Aph. 58. libr. 5. vt interpretatur Philoth. Prius nomen illi inditum est, quod cum alia intestina

flexuosa sint, recta lineâ sine gyris in anum siue podicem deducatur: posterius verò, quòd vel aliis imperet, vel aliorum sit principium. Excrementa enim excipit, & foras agit, adiutum septo transuerso, & musculis abdominis propellentibus. Opus igitur habuit musculo, à quo, tanquam crumena, constringeretur, ne ante tempus excrementa effluerent, quem Græci σφιγκτήρα vocant ἀπὸ τῆ σφίγιος, id est, constringendo. Quæ est illius propria actio, non autem excretio, vt multi voluerunt. Deinde altero (qui geminus est, vel etiam tergeminus) obliquè supra rotundum sito, quò sursum reuollitur. Adiectæ sunt membranæ, ad maiorem firmitatem, quibus alligatur ossi sacro & lumbis. In hac parte morbosus affectus plurimi oriuntur. Si excrementa nobis inuitis egrediantur, resolutio est sphincteris. Si verò extra anum prolabatur intestinum rectum, neque sursum retrahi possit, nisi manu protrudatur, necesse est causam esse in musculis, aut neruis sursum reuellentibus, vel membranis alligantibus. Id autem fit laxatis illis neruosis corporibus, vel imbecillioribus redditis, vel intumescente & inflato intestino. Si resoluantur nerui, causæ ex capite de Paralyti exquirendæ sunt, topicæque ossi sacro imponenda. Imbecilliores redduntur aliquando ob nimiam mollitiem & humiditatem, vt in pueris, vel frigus à quacunque causâ externa, vel aliquam aliam intemperiem, aut humorem madefacientem. Aliquando verò ob magnam aliquam contentionem in reddendis excrementis durioribus, aut acrioribus, vt in dysenteria, vel tenesmo. Inflatur autem à quolibet tumore, sed præcipuè inflammatione, quam sequitur dolor, febris, perpetua irritatio ad excretionem, stillicidium vrinæ.

Fieri scribit Hippocr. de fistulis à pituita ex corpore in intestinum rectum decumbente. Quanquam in contextu Græco habetur ὑπὸ τῆ φλέγματος. Certum autem est phlegma Hippocrati aliquando inflammationem dici, vt in Prognosticis. Nec dubium, quin ab aliis etiam humoribus, præsertim à sanguine, fieri possit. Mirum est, quòd nobili cuidam mulieri contigit anno 1559. Nihil excluderetur stercoris: dolor ingens in ano, qui nullis remediis cedebat. De causâ disputabatur. Nihil è speculo immisso apparuit interiore recto intestino. Tandem summa vi, & eo dolore, qui in partem



## DE MORB. INTERNIS

difficili excitatur, rotundum globum tophaceum è cæco intestino deiecit. Hernia laborabat. Erat is globus tunica inuolutus, suberis substantiâ.

Non eadem omnibus curatio. Frustra adhibentur remedia ano, si spinæ vitio resolutus sit neruus. Inflammatio curanda, vt cæteræ, indicatione sumpta à parte.

### ANTO. VALETII EXERCIT. LVI.

*Vteri procidentia cause,  
& eiusdē curationis.*

**P**rocidit anus vel ab externa causa, vt ictu, lapſu, casu, nimioque egerendi conatu, velut in teneſmo, vel ab interna, vt frigida humida intemperie, calida humida, musculos resolvente, aut ab aliquo præter naturam humore. Hic affectus vt curetur, sordes imprimis, si quæ adhæreant, hydromelite, vel decocto betonicæ detergenda: deinde sordes sic fouenda.

℞. ros. rub. myrtill. sumach. cortic. granat. balaustior. cupul. gland. gall. nucum cupressi ana ʒ. ʒ. Contusa omnia bulliant in sufficienti quantitat. vini austeri. Eo decocto foueatur. anus procidens, postea exsicceetur, & oleis sequentibus linatur. ℞. ol. myrt. rosar. & cydon. ana ʒ. ʒ. misce.

Postremò sequenti puluere aspergatur, ac demum reponatur.

℞. corti. granat. ros. rub. balaust. myrtill. cupul. gland. ana ʒ. i. f. omnium puluis, vtendus, vt dictum est.

Intestinum verò sic repositum denuò fouebitur decocto præscripto, ægro quiescente, altis & iunctis clunibus. De conuenienti deligatione ani ex Hippocrate, Gale. & Heliodoro vide Cornel. Cels. libr. 6. cap. de condylomate. Hippocrates libr. de fistulis vtitur zona, à qua deducta fascia per dorsum recta ano subinducitur, & superadductæ zonæ ad

umbilicum religatur: sed prius reponit anum, fo-  
uet decocto adstringente, regit molli spongia, vel  
lintheo in decocto insuccato. Vbi deiiciendi cupidi-  
tas vrget, angustissimis asseribus ani latera innitan-  
tur: aut, si puer est, femur pedibus insideat, utrín-  
que extentis cruribus deiiciat. Si dolor accesserit,  
sedabitur. vt in hæmorrhoidibus.

*De exitu matricis.* CAP. 57.

**R**elaxatis 1 vinculis, refrigerato 2 vtero, col-  
lecta 3 mucosa substantia vterus excidit, se-  
nibus magis, & iis, quæ ex instituto vitæ 4 nudos  
pedes in frigida continent, aut diutius in frigido  
lapide sedent, vel aërem frigidiorē excipiunt,  
maximè in puerperio, & 5 tempore menstruor-  
um. Casu, ictu, resolutione quoque decedit. In  
vehementi motu eo modo, quo vrina & stercora  
præter voluntatem effluunt, ita etiam vterus 6  
delabitur.

Totum vterum decidere posse quidam 7 è Græ-  
cis negant: contra quos 8 Arabum authoritas &  
experientia facit. Tūque desperata res est, vt cum  
inueterauit malum, quod ætate senili non facile cu-  
rari potest.

Initio animaduertendum, num retenta vrina,  
9 aut stercus. Primū enim excludere oportet. Vte-  
rus enim in medio positus, & compressus magis ex-  
pellitur, nec facile reponitur.

Aptè collocanda mulier est, sublati coxis inui-  
cem dilatatis, reflexis poplitibus. Atque eo modo,  
crasso intestino sphincteris constrictione obduru-  
erit.

1 Quibus v-  
terus coale-  
scit, adiungi-  
tur, mouetur,  
nutritur.

2 Quod fri-  
gus vtero bel-  
lum indixit.

3 Tū in cor-  
pore vteri,  
tumin acetab-  
ulis ipsis.

4 Vnde grauior  
factus, vin-  
culis suo loco  
contineri non  
potest.

5 Vt mulie-  
ribus lotrici-  
bus.

6 Quo tēpo-  
ri vteri pars  
vtrāq. hiat.

7 Ac: edit  
et coeundi  
libido, cum  
scilicet vte-  
rus defrau-  
datur, et ap-  
petitum non  
explet. Arist  
cap. 2. lib. 7.

8 Vt Actius.  
9 Vt Avi-  
cenna.

10 Vt si in

# DE MORB. INTERNIS

quo in sede diximus, detergendum, abluendum, fouendum, pessuli quoque è lana molli inuoluta linteolo fingendi sunt. In ea lana 10 pulueres misceri possunt, qui vterum confirment.

Pessulus factus pro ratione ætatis immergendus est vino, in quo 11 adstringentia coxerint, & ita insinuandus pudendo, prius reposito 12 vtero.

Pectinem quoque & lumbos lana, bombace, aut spongiis imbutis oxycrato contegemus, & ne concidant, alligabimus.

Cucurbitulæ cum multa 13 flamma vmbilico & lumini, atque etiam ilibus affigendæ sunt, sæpiusque repetendæ. Atque interuallis cucurbitularum 14 emplastrum supra vmbilicum & lumbos affigendum est.

℥. galbani ʒ. i. β. myrrhæ, thuris albi ana ʒ. 2. terebinthinæ ʒ. β. sem. lauendulæ ʒ. i. moschi ʒ. β. incorporentur, & extendantur in aluta.

Pessarium, pessulus, priapismus.

℥. assæ fœtidæ, myrrhæ, thuris albi, mastichis an. quod sufficit pro ætate, & ratione mulieris.

Fiat pessarium malaxatum cum oleo laurino, vel de liliis, addendo ʒ. i. β. lauendulæ, & baccarum lauri ʒ. β.

Naribus odora, vtero fœtida admouenda, panis lineis inuoluendæ partes pudendæ & vicinæ, perfumigatis cum myrrha & thure. Suffumigia & incessiones, vt prius.

Sed hîc peculiariter ex lauédula, bistorta, foliis & baccis lauri, adiecta portiuncula myrrhæ, thuris cum cortice, & mastichis.

10 Ex balanus  
stii, radice  
cyperi, nuce  
cupressi, rosæ  
11 Vt bacca,  
cortex & fo-  
lia rosæ cani-  
na. fol. rubi.  
hypocistii,  
balaustia.  
12 Vt reposi-  
tus suo loco  
contineatur.  
Hinc semi-  
spharam fi-  
gura ouali,  
cera obductâ,  
filoque ap-  
pessam in mu-  
liebris sinum  
(si visquequâ-  
que sit prolapsus  
vterus)  
immittere, &  
subligaculis  
retinere de-  
cuerit.  
13 Vt maiore  
vi sursum at-  
trahant vte-  
rû prolapsum  
14 Quod vim  
habeat cõfir-  
mâdi & con-  
stringendi:  
cuiusmodi est  
empla. contra  
rupturâ vng.  
Comitis. emplastr. de mastiche, rubrum desiccatum cum radice cyperi.

Si putruit vteri pars, quæ decedit, placuit Græcis & Arabibus, vt quicquid corruptū sit, amputetur.

## EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Veterus vinculis vndiquaque alligatur antè, retrò, supriùs, inferiùs : dextra, sinistra : obliquè ad collum & inguina. Ossi pubis, ilion, & sacro per tunicam à peritonæo, dextra & sinistra parte annectitur : magnis vasis per arterias & venas, præsertim spermaticas & apophysim peritonæi : spinali medullæ per nervos : recto intestino per fibras quasdam tenues : vesicæ per alias, sed plures & laxiores : ossi pubis per vincula laxa. Omnia membranæ peritonæi præter vasa. Hinc maximus vteri consensus cum vniuerso corpore. Plato tanquam animal vorax moueri putat modò deorsum ad semen excipiendum, modò sursum, fugâ malè olentium, aut alia causâ. Medici verò naturaliter quidem excipiendo semen, hiare, deinde constringi volunt, sursum autem non moueri, nisi vasis plenis reuellatur, aut infletur, vt in suffocatione : deorsum verò, cum peritonæum aut vincula à peritonæo relaxantur, vel rumpuntur, vel fundum inuertitur, vnde vteri procidentia. Contorquetur etiam interdum vt ob abscessum, vel inflammationem, vel vim aliquam illatam, vel post partum. Videre etiam licet multas, quæ cum vtero gestant, dolore coxæ affectis ligamentis laborent, sic vt edito fœtu dolor maneat, vnde claudicant, cuius meminit Galenus 6. de locis affectis. Sunt igitur tres affectus vteri præcipui ex deprauato motu, vnde infinita & admiranda symptomata consequuntur, suffocatio, contorsio & procidentia. Hic de postremo tantum agitur, in quo aliquando collum, aliquando fundum in vuluam procidit. Vbi collum excidit, videtur veluti glans viri rubens, quæ se ostendit in ore pudendi cum suo foramine. Fundum autem cum procidit, inuertitur. Quæ omnia ratione diligenter distinguenda sunt. Causæ igitur sunt, relaxatio aut ruptio aliquando vinculorum ad ossa pubis : nonnunquam peritonæi. Relaxatio fit ab humiditate, aut difficili partu, aut rupto peritonæo, aut tensis inferioribus ligamentis. Quod tamen fieri non posse existimo. Sic enim traheretur ad ossa pubis potius.

*Vteri maximus consensus cum vniuerso corpore.*

*Vterum gestantes nonnullas vnde claudicare contingat.*

## DE MORB. INTERNIS

Aristoteles 7. de natura animalium scribit quibusdam desiderio coitus, aut longiore veneris abstinence vterum excidere, quibus coitus & conceptus remedio est. Sæpius fit casu, ictu, vehemente metu, morâ in aqua frigida, vt in lotricibus, difficili partu, magno conatu in reddendis excrementis. Ob rupturam peritonæi, aut difficilem partum, vix curatur, aut nunquam.

Si fundum procidat, sublatis cruribus facilè redit: si vincula, declinet in latus, vnde dilabuntur. Puellæ cuidam (quod à nobis annotatum est) tremor sinistra parte in facie & thorace, non inferioribus partibus. Decumbenti in sinistram mouebatur: quiescebat reuolutæ in dextram. Manè & vespere mouebatur. Ardebat similiter & frigebat. Suppressi menses annis ferè tribus, facies saturato rubore, tenemus, dolor stomachi, lien inflatus. Si ab humiditate fiat relaxatio, resiccantibus & adstringentibus vtendum. Vacua in repellendo debent esse intestina & vesica. Conueniunt fots, inunctiones, pessaria, odores foetidi, fumigia, emplastra, cataplasmata, vnguenta, cucurbitulæ admotæ lumbis & vmbilico. Extremum remedium est zona Hippocratis, quæ à cingulo zonam habeat à parte posteriore per perinæum ad ductam in anteriorem partem ad idem cingulum. Iuxta pubem arctè colligatur. Alij è subere ouales formas inductas cera, & quasi pediculo alligatas, immittunt in sinum pudendi, atque alligant coxis. Inunguntur oleis & vnguentis adstringentibus.

### ANTO. VALETTI EXERCIT. LVII.

**V**Terus procidit praua fœtus extractione, violenta secundinæ depulsione, spiritus cohibitione, immensi oneris sublatione, plaga, partuum frequentia, animi affectibus, vel resolutione ligamentorum & musculorum vterum sustinentium.

*Curatio.*

Quod ex vtero propendet, ouo simile existit. Vterus antequam reponatur, & aluus clystère subducitur, & excluditur vrina, vt patentior sit ipsi vtero.

locus. Dein fouetur eodem decocto vterus, eodem item puluere aspergitur, quo prolapsa anus: tum verò obstetricis manibus oleo mastich. aut ros. vel butyro inunctis sua statione locatur. Interim cucurbitula magna vmbilico sæpè admouetur: vel singulæ cucurbitulæ singulis vmbilici lateribus affiguntur. Pecten, lumbi, os sacrum, lana, vel gossipio, aut spongiis; oxycrato madidis conteguntur, superductis fasciis. Denique emplastrum de galbano dorso, vmbilico adhibetur.

*De 1 sistendis mensibus. CAP. 58.*

**M**ensis 2 naturalis est purgatio, nisi vel quantitate excedat, vel 3 præter statas periodos effluat. Decimo 4 quarto anno excitatur, nonnullis 12: rarissimè 7. Desinit verò 40. aut paulò pòst, alioqui ad 60. producitur. Aliis singulis mensibus, nonnullis vno aut pluribus mensibus intermissis, quibusdam sæpiùs vno 5 mense redit. Iunioribus ad lunæ plenilunia, aliis ferè decresciente luna, tribus, 4. 5. 6. 7. diebus, eò plus minùsve. Maiorem copiam efficiunt, ratio vitæ plenior, otium, temperamentum 6 frigidius, tenuitas sanguinis, vel acrimonia, amplitudo vasorum, quæ plurima & maxima ad vterum perueniunt. Subsistere debent in totum grauidis, puerperiis, lactantibus.

Vt sistas, primùm animaduerte 7 causam immoderati fluxus, colorem sanguis fluentis. Si lioreolo excipias, animaduertes. Calida enim menstrua, vbi sanguis calidior est: florida atque rubenguinis copia & qualitas, vasorum laxitas, facultatis retentricis infirmitas.

1 Cum scilicet fluant immodicè, & præter modum peculiaris naturæ, ætatis, diætæ.

2 Quæ commodo nature fit, & à natura suscipitur.

3 Vt si bus n. esse repetat.

4 Cum puella ad iustam magnitudinem & modum peruenire.

5 Vt salacibus mulieribus, quæ sero abundant.

6 Vt si mulier sit habitior, corpus habeat minus perspirabile, glabrum, cutim albam, capillos nigros & relictos oculos

quoque nigros, vocem acutam, vt si sit iracunda.

7 Quæ triplex est: sanguinis.

# DE MORB. INTERNIS

tia, vbi sanguinis copia in causa est : subalbida, vbi

8 Aut etiam sanguis 8 frigidior est. Rubentibus itaque menstruis, si quidem corporis plenitudo est, 9 venam

è cubito secato. Si verò magna pars plenitudinis iam 10 depleta est, aut alioqui non redundat in reliquo corpore sanguis, cucurbitulas satis amplas cum multa flamma sub mammis affigito : vinculis

brachiorum vtitor, 11 frictionibus manuum & calfactionibus. In vsu phlebotomię & reliquorum, interrogabis primùm, qua parte vteri maior grauitas sit. Si dextra parte, basilicam dextram secabis, dextram manũ ligabis, fricabis, calfacies. Sub dextra mamma cucurbitulam affiges.

Si verò cacochymia est, biliosum sanguinem rhabarbari 3. i. s. aut hierâ picra repurgabis. Si pituita, eadem hierâ aut rhabarbaro vtêris, sed addito agarico. Sed ferè vbi nulla plenitudo, aut manifesta cacochymia, cucurbitula sub mammis, aut in humeris apposita, vincula manuum, remedia quæ

sanguinem sistunt, satis esse possunt. 12 At felicius aqua In laxitate meatuum, adstringentibus : in tenuitate, incrassantibus vtendũ est. Conuenit inter Gręcos & Arabes succũ plantaginis efficacissimè mentes sistere. Memini (inquit Gal.) cùm quatuor diebus iugiter sanguis fluxisset, nec sisti posset, cyathovno succi plantaginis constitisse. Recentiores 12 aqua plantaginis vrantur. In aqua melius fuerit aliquid dissoluere eorum, quæ sanguinẽ sistunt, vt 3. i. trochiscorum de carabe, de spodio, de terra sigillata, & eorum, quæ iam antea sæpè enumerata sunt.

Loco pessulorum (quoniam mulieres non facilè admittunt pessula) lana vel gossipium, aut mollius

lindeolum succo adstringente, vt plantaginis, infucatur, & ita inditur genitalibus. Mulieres fingunt è peruinca, quæ iniiciunt cruribus. Laudant vngulas asini, pelles anguillarum, pelliculas interiores nucis auellanae, quæ cum succo cydoniorum cõguntur in pilulas, aut diluuntur in succo conuenienti.

Pessali, si finguntur, teretes sint ac rotundi ad instar digiti è lana, bombace, aut conferto linamento, quibus medicamenta adstringentia excipiuntur. Deinde conuoluantur, vel serico raro, vel lineo lindeolo. Pendeat è filo, vt cùm opus fuerit, retrahantur. Vtuntur epithematibus lumborum 13 & crurum posteriorum, ex aqua plantaginis, sumach, vino rubro adstringente, & similibus.

℞. scorix ferri crematae, & in aceto extinctæ, deinde pulueratæ, lapidis hæmatitis triti ana ʒ. 2. syrupi myrtillorum & ros. ana ʒ. ʒ. aquæ plantaginis ʒ. 2. Fiat potus.

℞. trochiscor. ambre citrine pulueratæ ʒ. 1. datur cum vino adstringente diluto modica aqua plantaginis.

℞. sanguinis draconis, boli armenæ, ambre citrinæ, coralli rubri ana ʒ. 1. Fiat pulvis, detur ex aqua plantaginis.

℞. boli armenæ ʒ. 2. coque in vino subtili subaustero ad ʒ. 2. colatura bibatur. Opiata.

℞. 14 conferue veteris ros. ʒ. 2. sem. plantaginis ʒ. 2. sanguinis dracon. boli armenæ ana ʒ. 4. ambre citrinæ, coralli rubri ana ʒ. 1. cum syrupo de myrtillis fiat opiata. Datur castaneæ magnitudo serò & manè ante cibum.

Laudant puluerem è pectunculis, quæ è Compo-

13 Ad regionem venarum spermaticarum

quæ ad fundum vteri feruntur. Ii filis etiam partibus. emplastra

admoventur è bolo, empl. contra rupturam vnguentum

Comitissæ.

14 Huic ad des symphyti & nenupharis cõferuuntur.



## DE MORB. INTERNIS

stella & mari comportantur. Iapis, onix, id est, corallina, hæmatites, corallus ruber prodesse creduntur, siue in puluerem redacta vsurpentur, vel è collo pendeant, manui alligentur, aut supponantur mammis, distillatum è conserua consolidæ maioris & limacibus ana quod sufficit. Aliquando ad stupeficientia deueniendum est, vt.

15 Vt anno 50. 45. aliis ferius, aliis celerius.

16 Vt in nutricib<sup>9</sup>, quòd per venam epigasticam atque mam-

ariam sanguis fiat à-  
νάρρπος ad lactis generationem.

17 Quòd nulla sint in his reliquæ partium sanguinearum alimentis.

18 Vt in mulieribus bene carnosus, & propterea sine incommodo valetudinis non menstrualibus.

19 Hippoc. secl. 7. lib. 6. τῶν ἐπιδυμ.  
20 E malcolo.

24. philonij. 3. 1. boli armenæ ʒ. i. cum vino stiptico fiat potus. Ablutiones ex vino austero, in quo saluia coxerit, aut aliquid ex materia adstringente. Inunctiones ex oleo rosarum, melino, vel in quo adstringentia coxerint, vnde & alia remedia ex aliis locis.

### De prouocatione menstruum.

Resistunt menses 15 ætate, conceptu, 16 lactatione, & his prouocari nõ debent. Sunt quibus præter calidius & siccus temperamētum, præter frugaliorē vitam, exercitia maiora, vacuationes tum manifestas, tum insensiles, vt sanguinis vacuationem per nares, phlebotomias frequentes, & alia eiusmodi. Item in iis, 17 quæ à longo morbo se confirmant. Aliis propter pinguedinem, in quam totus sanguis cōuertitur. Nonnullis propter gracilitatem mensis, vt nec benè carnosus, si quidem cassatione menstruum nihil offenduntur. Vnicum tamen est, 18 quod excipi debet ratio generationis. Nam vt mulier suppressa purgatione, nihil lædatur, quia tamen sine menstruo sanguine 19 generatio esse nõ potest, oportet quiddam naturam assuefacere, vt sanguinem in vterum deriuat. Nam in multis conceptum adiuuat bis aut ter detractus 20 sanguis in

anno, sed iis maximè, quibus præ copia sanguinis menstrua resistunt. Huius rei author est 21 Hippocrates. Frequentissimum est, ut vel crassiore sanguine, vel alio, qui interceptis uteri venis resistant menses: qua in re consilium est 22 Galeni, ut vena malleoli aperiatur. Tria vascula detrahuntur aliquot post diebus, duobus, tribusve. Balneum imperetur, in quo chamæmeli flores, origanum, maiorana, arthemisia, folia lauri, coniza, bacca iuniperi & lauri, 23 aliâque eiusmodi coxerint. Satis à balneo 24 melicratum propinandum è pulegio, calamentho, & eiusmodi. Alioqui nostro more syrpus de hyssopo, prassio, calamentho, de bizantiis, de duabus radicibus, aut quinque radicibus ad 3. i. β. cum aqua cuscuthæ, decocto cinamomi, aut cassiæ liquore ad 3. 3. propinabitur. Quod si fortius volueris, castorei 3. i. aut 3. o plus adijcies. Hac arte semper expectus est Galenus moueri menses, ut nihil inde mulier læderetur. Cucurbitulæ pubi, inguini, interiori femori affigi debent. Purgationes conueniunt ex hiera picra, quæ hoc modo parari debet.

℥. 25 aloës succotrin. 3. 2. spicæ, cassiæ lignæ, cinamomi, xyloaloës, radicis gentianæ, mastichis, asari, cubebæ ana Gr. 6. Gr. 3. Omnia puluerisata incorporentur cum modico conseruæ anthos, aut borraginis, propinentur cum vino albo tenui.

Secretum est quarundam mulierum, uti conserua borraginis dissoluta in vino albo tenui. Potest & pulueri hieræ aliquid agarici commisceri. Laudantur & pilulæ elephanginæ, mastichinæ & similes. Laudatur quoque hæc purgatio.

21 Hipp. li. de carnibus.  
22 Lib. de curad. ratione per sang. miss. ou. è, & lib. II. de tremore.  
23 Vi matri-caria, nepeta, hyssopus.  
24 ℥. de coct. puleg. & calameth. 3. li.  
2. qui 2. Ad mellis 3. 3. hie me: astue 3. 4 f. met. cr.  
25 Vel ℥. ca storis 3. i. dis solue in vino albo, fiat potus. Mirificè cōfert de ciedos menses. Ceterum ad obstrueta liberanda, & materiã præparadã hie imperabit ℥. sabinae, fol. M. i. cuius decoct. adde syrup. de radicibus, aut capill. ven. 3. i. β. propinentur.

# DE MORB. INTERNIS

℞. Cassiæ fistulæ ʒ. 10. pul. liquiritiæ ʒ. 2. croci Gr. 3. mellis anthosati ʒ. 3. dissolue in decocto cicerum rubrorum. Vacuato & bene purgato corpore, aliis remediis vtendum est. Suffitus 26 aromaticum muliebria ducit. Fiunt autem cum baccis lauri, iuniperi, siccis herbis odoratis, cassia lignea, & aliis eiusmodi.

26 Aphor.  
28. lib. 5. Sūt  
autem suffi-  
tus aromatici  
cautè per in-  
fundibulum  
administran-  
di. His enim  
plerūque  
siccæ vntri-  
cui intempe-  
ries contra-  
hitur, imo  
vasa & co-  
tyledones a-  
durentur.

Inseffiones, vt prius. Vbi biliosi & pingues humores sunt, petroselino, porro, apio, alliis, tmyrnio, styrace, melanthio, fœniculo, vtrāque centaurea vtendum est, & ad suffitus & olea comparanda, & pessulos. Laudatur & oleum de ben, de nuce moschata, laurinum, de iunipero. Sunt qui gemistæ floribus ad dimidium vas impleant, oleū chamæmelinum superfundunt, fideliter obturatum vas fimo sepe liunt, aut reponunt in furno calido, sinuntque effervesce: quo oleo inguina inungunt, & pessulos madefaciunt.

Optimum est imperare decoctionem cicerum rubrorum coctorum cum radicibus petroselini, vt cum modico butyro iusculum paretur, cui, vt ferè consuetudo, pulnerem cinamomi, & tantillum croci insperges.

Laudantur aquæ absynthij, cuscutæ, pulegij, calamamenti, menthastri, rubiæ tinctorum, sabinæ. Vinum album tenue, colatum per manicam Hippocratis cum saccharo in aqua anthos dissoluto, & tantillo cinamomi.

Hermodactylos scribit Mesuæus non habere par remedium in mouendis menstruis, & fœtu mortuo.

Fortes quoque sunt trochisci de myrrha.

℞. 27 myrrhæ electæ ʒ.i. lupinorum optimè 27 *Cōserua*  
 tritorum ʒ. ʒ. foliorum rutæ, menthastri, pulegij, cu- *borraginis*  
 mini, rubiæ tinctorum, serapini, opopanacis ana ʒ. *in vino albo*  
 ʒ. Formetur trochisci pondere ʒ. 2. Detur vnus ma- *dissoluta mi-*  
 nè cum aqua, in qua iuniperi semen coxerit. Vel. *risicè men-*  
*strua & lo-*  
*chia ciet.*

℞. myrrhæ ʒ. 2. assæ fœtidæ ʒ. ʒ. cinamomi  
 Gra. 10. croci Gra. 2. cum aqua rubiæ fiant pilulæ.  
 Fœniculi radix, melanthium, quod quidem præ-  
 stantissimum est. Alij dant trypheræ sine opio ʒ. i.  
 cum decoct. cinamomi. Eodem modo mythrida-  
 tium dari potest. In summa omnia, quæ magis cal-  
 faciunt, & siccant minùs.

*Pessulus.*

℞. olei moschati, vel alterius conuenientis ʒ. 2.  
 pulueris gentianæ ʒ. 2. misce cum bombace mo-  
 schato in eo madefacto, fiat pessulus.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Mulierum purgamenta per vterum quædam sunt mul- *Mulierum*  
 tum inter se differentia, quæ tamen similitudine sæpè fallunt, *purgamenta*  
 vt species quædam hæmorrhoidum, *λόχια*, spermatis corru- *per vterum*  
 ptela, muliebris purgatio, & menstrua. Nam ex ramo illo *varia.*  
 venæ cauæ duæ sunt propagines, quarum vna Syluio epiga-  
 stria dicta, sursum ascendit per musculos rectos, ac mam-  
 mariæ occurrit. Paulò suprà altera propago ceruici vuluæ  
 & ori inseritur, sicuti & sedi hæmorrhoids, vnde fir consen-  
 sus vteri cum mammis ob viciniam, sursum ac deorsum  
 fluente sanguine ex vtero in mammas, & contrà. Ab hac  
 propagine posteriore interdum fluit crassior sanguis non ali-  
 ter, quàm per hæmorrhoidas. Aiunt Virgines & grauidas  
 hac viâ aliquando purgari. Quod certè in grauidis magis  
 necessarium videtur post aliquod tempus, ob arctam illam  
 colli vteri adstrictionem, quasi nodulis quibusdam accura-  
 tè & artificiosè à natura instructam, vt ne vi quidem spe-

## DE MORB. INTERNIS

cillum emitti possit, & ob acetabula, è quibus sanguis destinatur alendo fœtui. In virginibus non tanta adstrictio. Quæ igitur fluxio fit ex iis venis, eam ad menstruam purgationem vulgò referunt, cùm tamen & partis, & vasorum, & sanguinis fluentibus natura diligenter perspecta, hæmorrhoidum potius species quædam appellari debere videatur. Non enim nisi solo situ differunt, nisi dicas in grauidis veram esse purgationem menstruam regurgitante illuc sanguine, qui in capacitatem vteri per venas è seminariis vasis expurgari debebat. Sed cùm hoc non sit omninò secundum naturam & ex iis quæ rarò contingunt, id etiam cæteris, quæ vterum non gerunt, haudquaquam conueniat, nec ita certis & mensuris interuallis fiat, minùs id videtur consentaneum rationi.

*Menstrua  
purgatio in  
gravidis du-  
plici fit mo-  
do.*

Non ignoramus tamen veram purgationem menstruam in grauidis fieri posse, sed diuerso modo, eoque duplici. Vno, primo mense per vteri. capacitatem, quia adhuc os illius non ita constrictum est, cùm etiam fiat superfœtatio. Altero, per alterum ramum spermaticæ iuxta hederiformem, quæ ad latera vteri descendit, & hypogastriæ occurrit. Sed unicuique liberum sit vocare vt libuerit, curationem tamen eandem non habere perspicuum est. Curatur enim fluxus huiusmodi eadem ratione, qua hæmorrhoides, præsertim quod attinet ad venæ sectionem. Nam retentis mensuris vena cruris secatur, hæmorrhoidibus suppressis interdum vena cubiti. Quod hic quoque obseruandum est. Proinde hi affectus distinctione opus habent: *λόχεια* quoque distinguenda, tum quòd edito fœtui tantùm prodeant, tum quod comprehendant quicquid post fœtum & secundas exit à puerperio.

Sæpè etiam à spermatis corruptela salacibus, venere abstinentibus, viduis & similibus redditur humor quidam crassus, & veluti seminalis in vtero corruptus, vel sanguis grumosus, qui ad mēstruam purgationem nullo modo referri debet. Quarta fluxio est illa, quam vocant muliebrem purgationē, quæ quibusdam quotidie, aliis post mensem purgationem, nonnullis inter duas purgationes cōtingit, vel à toto corpore, vel affectibus vteri. In hac excernuntur quædam excrementa serosa, & veluti ichores sine dolore, & in maiore quantitate, quam

quàm pus ab vlcere . Quæ colore intelligimus modo ab hoc, modò ab illo humore vitioso separari . Nunquam enim fit absque cacoehymia . Ponamus igitur præter has quatuor affectiones , Menses propriè dici , quos Græci *καταμήνια* vocant , cum sanguis ille generationi & alendo foetui destinatus à natura ratis statisque diebus semel in mense excernitur per venulas è vasis seminariis in vteri capacitatem , non quòd ab vtero trahatur , sed quia illuc mittitur siue lunæ cursu, siue alia quapiam prouidentia moderante . Vnde non sine ratione multi contendunt neque præter naturam esse, neque excrementitium, nisi sola quantitate.

Nam si qua in eo maleficia reperiantur, quæ Plinius recenset, ea corruptioni illius, & diuturniori in vtero moræ, cum è vasis propriis excidit, accepta referri debent, aut mixtioni vitiosi alicuius succi. Quod satius est, quàm duas illius partes constituere puriorem beneficam, & sæculentam veneficam. Neque enim probabile est hominem veneno concipi, conceptum veneno conseruari in vtero: in lucem editum eodem ali, nisi iam dicere velis infantis corpus aut totum, aut magna ex parte venenum esse.

Sanæ igitur mulieri ( inquit Hippocrates l. de Morbis mul. ) sanguis menstruus exit interuallis victimæ iugulatæ sanguini similis, rubens. Effluit autem duarum heminarum Atticarum mensura. Quæ non, vt Fuchsius Aph. 30. lib. 1. olei mensura æstimanda est, sed sanguinis, vt redeat circiter ad tres semisextariolos Luterianos, natura tamen, ætate, & similibus perpèsis. Id autem absoluitur duobus aut tribus diebus. Excelsus & defectus in vitio est. Illinc tenues fiunt, foetus emarcescit, aut parum vitalis est. Hinc si videlicet, minusquàm tribus vel duobus diebus, & pauci, crassæ fiunt, nec faciliè concipiunt. Quæ plus habent sanguinis ad quinque, septem: quæ sanguinem crassum aut venas exiles, ad plures etiam purgantur. Inipio verò & sine pauciores & tenuiores : inter media purgatione plures & crassiores, præsertim vbi multi fluunt. Aristoteles cap. 2. 7. de histor. animalium moueri scribit decremento lunæ, & hæc crescente colligi, vnde cauillo sexum fœmineum lunæ tribuunt. Aliter tamen sæpe experimur.

*Menstrua  
non esse vitiosa  
rulensta.*

*Menstruorum  
excessus &  
defectus in  
vitio est.*

## DE MORB. INTERNIS

*Mulieres* Idem quoque voluit mulieres quasdam esse, quæ concipiunt, etiam si non fluant menses, quibus non plus est sanguinis, quam aliis restat à purgatione. Sed haud scio, an id ex principiis Galeni admitti queat. Constat tamen multas concepisse antequam passæ essent menstrua. Naturalis purgatio cessat 45. aut 60. ætatis anno experientia & iusta ratione. Incipit 13. 14. quo tempore cessat incrementum, & in quibusdam 20. ob pituitam, & sanguinis paucitatem.

*Menstruorum naturalis purgatio quando cesset.* Ex his intelliguntur, quot modis menses præter naturam esse possint. Vel enim omninò supprimuntur, vel immodicè fluunt, vel tempore non conuenienti. Sanguis autem peccat in qualitate, quantitate aut consistentia. In quibus omnibus peruestiganda causa, & an ob id morbosæ viuant. Nam aliis debetur curatio, aliis præcautio, aliis conseruatio ut pro ratione quadam peculiaris temperamenti, aut causa morbifica semel in mense multis, aliis sæpiùs, quibusdam vno mense intermisso, nonnullis tertio quoque mense prodeunt. Supprimuntur, quia vel sanguis absumitur, vel retinetur. Illud fit aliquando in sicciore temperamento & calidiore, iu pinguibus ob pauci sanguinis in pinguedinem conuersionem, venarum angustiam; vnde etiam non concipiunt, aut imbecillos pariunt. Id etiam fit in longo morbo consumptis, lactantibus audioxes pueros, viraginibus, exercitio multo vtentibus, sanguine in nutritionem conuerso. In quibus frustra naturæ repugnamus mouendis mensibus. Retinentur autem euerfione vteri & distortionem osculi interioris, in quibus quoque frustra mouemus menses: aut obstructione, quia sanguis crassior, aut acetabula mucosa plena, aut condensata substantia. Mœrore quoque suppressi etiam, quæ iam fluant, & præ doloribus, certum est. Tunc sanguis ferè tertio mense incipit regurgitare in hepar, caput pulmonem, totum denique corpus, vnde sequuntur iidem ferè morbi, quos de hæmorrhoidibus diximus, vteri suffocatio, difficilis spiratio, vel ob plenitudinem venarum, vel oppresso corde ab humore in pericardio. Si diutiùs, quàm par sit, suppressionem mensium ferant, vix curantur obductis & induratis meatibus. Immodicè fluentium signum certissimum est imbecillitas virium. Hoc fit, ut cæteræ

*Menstruorum retentorum causa.*

*Menstruorum immodicè fluentium signum certiss.*

fluxiones, nimia vasorum laxitate, ruptione, erosione ab acriore sanguine, imbecillitate partium, causâ externa, in abortibus fractis vasis, aut obstetricis vnguibus irritato vtero in partu, aut natura imbecilliore reddita ob violentiam, & similibus cæterarum fluxionum signis, exquirenda sunt. Sanguis qualitate peccat, si malè coloratus sit, quia, ut vult Hippocr. colore similis non est sanguini recens mactati animalis. Albi, saniosi, loturæ carniū similes, à pituita: pallidi, flauī & acres à bile: nigri, crassi, pauci à melancholia. Iam atrabilis est, cum, veluti acetum, terram effusi radunt, fermentant, & grauius exulcerant. Alij carbunculo similes, caliginosi, acres, turbati, falsi, purulenti. Quò magis à naturali constitutione recesserunt, eò periculosiores. Fluxus albus prouectis magis: rubens iunioribus: fuluus utrîsq̃. Aristoteles vult puellis albos fieri, vnde extenuantur, præsertim si victu humidiorē vtantur, sicq̃ incrementum prohibetur. Alio loco saniosas purgationes & humidiores puellis: senibus paucas, nigras, quæ faciliè concrecant, mediâ ætate medias. In quo non videtur consentire cum Hippocr. Ut autem ex sanguinis colore humor peccans internoscatur exactè, Hippocr. iubet substracta arenâ in sole superfundimenses, aut linteo excipi & siccari. Nam biliosi pallidum: pituitosi mucosum, grumosum, pelliculosum, albidum colorem relinquunt. A melancholia nigri, valde splendidi, paucissimi. Sed antea cta vita, temperamentum corporis, ætas, omnia consideranda. Tardiores crassiore materia, pauciores densatione & præclusionē acetabulorum, osculi vteri: è contrario, plures. Sed & frequenti coitu copiosiores fiunt. In omnibus colores fædi. Quod tamen vitium aliquando simplex est suppressis mensibus: aliquando affectis visceribus & corpore: nonnunquam malo naturali contracto ante tempus mensium. Quod ad curationem ab ægra sciscitari oportet.

In cachexia sanguis generandus: in obstructione medicamenta aperientia, sanguis ad vterum trahendus cucurbitulis circa emunctoria. Sanguinis missio ex talo, poplite, ligaturæ in coxis, frictiones, linimenta, suffitus, vnguenta, syrupi aperientes, incidentes, attenuantes, pessaria nuptis, omnia tempore quo fluxuri sunt. Hoc præcepto perpe-



## DE MORB. INTERNIS

tuo obseruato, in omnibus morbis, qui fiunt per consensum, partem primario affectam primo loco curandam esse, & causam sine qua non remouendam. In locum missionis sanguinis succedit catharticum: fit enim affatim & plus è corde educit, vnde virium maior deiection. Sed longè utilior. Vomitu & narium profusione leuantur à natura. An id medico imitandum? Ad redundantem sanguinem respicienti licet: ad menses mouendos, minimè. Nisi suppressis mēsisbus oriatur morbus, qui venæ sectionem requirat è superioribus. Tunc vena secatur è cubito. Vt enim natura viis interclusis per oppositas partes, aliquando per vicinas multitudinem vacuat: ita licebit aperto cubito multitudinem tollere, & morbo mederi, malleolo secto, sanguinem trahere. Neque naturæ imitator semper esse debet medicus, sed minister, in quibus ipsa nihil potest, vt cucurbitulis affigendis, ligaturis, venæ sectione. Natura verò id quod commodius est, sequi solet in iis quæ potest. Cùm itaque viæ per venas brachij apertas non pateant, alias, quas sequi potest, aperit. Contraria omnia fiunt in sistendo. Reuulsio sanguinis missione è mediana: cucurbitulæ in circuitu mammarum, ligaturæ in brachiis potius, quàm digitis, quia per plures venas fit attractio, & iter breuius.

*Medicus non  
semper natura  
imitator.*

## ANTO. VALETTI EXERCIT. LVIII.

**T**Riplex mulieres exercet fluor, mēstruus vnus, in partu alter, tertius inordinatus qui quoniā proprium nomen nondum est adeptus, muliebris fluor vulgò nuncupatur: in quo quod excernitur, aliàs albicat, pallet aliàs, nunc alium colorem, pro cacochoymia laborantis corporis, seque per vterum repurgantis, refert. Menstruus, si moderatus, naturalis est, & sinendus: at vbi exuberat, sistendus. Eodem enim morbos, quos sanguinis per hæmorrhoidas largior profusio, infert. Quanquam &

*Hippocr.  
aph. 57. lib. 5*

hæc affectio interdum sine noxa accidit, otiosis præsertim & sedentariam vitam agentibus, quæ vi-  
ctu sese inuitant copiosiore. *Menstrue purgationis debita quan-* Quantitas legitimæ  
purgationis menstruæ moderata erit cheopinæ v-  
nius, aut duarum, pro cuiusque mulieris propria *tutæ.*  
natura. Si maior est, & plurium dierum, sympto-  
ma est ex genere immodicè excretorum, non toto  
genere præter naturam, sed multitudine, vel qua-  
litate. Fluxionis verò huiusmodi tres statuun-  
tur causæ, fortis virtutis ratio, cum vterus sit à na-  
tura fabrefactus ad corpus expurgandum: humor, *Gal. lib. 5.*  
vel multitudine, vel qualitate praua, acri videlicet *Meth.*  
& stimulante, peccans; membrum propter vasorum  
nimiam imbecillitatem, vel compositionem, læ-  
sum apertis scilicet, vel reſeratis, aut erosioſis osculis  
venarum. Itaque optimè curatio ut suscipiatur san-  
guinis quantitas consideranda, excretionis modus,  
necnon qualitas ipsa, obseruatis linteis quibus ex-  
cipitur, ut intelligas an per anastomosin, an per  
diaurosin, an per diapedesin vacuetur. Fluxus im-  
modicus reuulsionis indicationem præbet. *Gal. ibid & lib. 13. meth.* Vnde  
opportune vena cubitum perreptans (partita inte-  
rim sanguinis missione) incidetur: cucurbitula ma-  
gna sub mammis defigetur, ventri deinde medio.  
Interim austera & refrigerantia edulia plurimum  
iuuabunt. Mox propinabitur hoc medicamentum.

℥. myrobal. citr. 3. 3. coquantur in aq. plantag. & ros. In  
expressa colat. dissol. rh. elect. puluerati 3. i. syr. ros sic. vel  
cydon. 3. 6. vel 3. β. f. potio.

Quia verò biliosus est, ut plurimum, sanguis,  
syrup. zulapiis, opiatis temperandus. Ut.

℥. aq. ros. & plantag. ana 3. 2. syr. myrtil. 3. 1. tro-

## DE MORB. INTERNIS

chisc. de carab. ʒ. i. f. zulap. Vel. ℥. aqu. ros. & arnogloss. ana ʒ. i. diacod. sine speciebus ʒ. i. f. potio. Detur hora somni.

Opiatæ hunc in modum concinnantur.

℥. conseru. ros. viol. & symphythi ana ʒ. β. semin. portul. planthag. corall. rub. ana ʒ. β. bol. arm. rasur. ebor. & corn ceru. vsti ana ʒ. i. cum syrup. myrtill. aut ros. siccat. f. opiatæ.

Huc quoque facient myrobalan. conditæ, grana quoque berberis condita. Vbi suspitio fuerit calidioris hepatis copiosiore & calidiorē sanguinem generatis, admovebitur epithema, ex aquis refrigerantibus, pulueribus trium santalor. ros. rub. & boli armenæ, pauca caphura addita. Iuuabit etiam emplastra adstringentia lūbis & pubi instituere. Vt.

℥. emplast. contr. ruptur. & vnguent. Comitiss. an. ʒ. 2, cum oleo myrtill. f. emplast. pro lumbis & pube.

Erunt & ex vsu iniectiones in vterum, qualis hæc esse potest.

℥. plantag. absynth. tapf. barb. ros. rub ana M. i. ba-lauitior. calic. gland. querc. ana p. i. f. decoct. In ʒ. 3. colaturæ dissolue pulu. mastich. & trochisc. de carab. vel de terra sigill. ana ʒ. i. f. clyster metrenchytes.

Vel ad eundem scopum comparantur pessuli de pulueribus corall. rub. hæmatit. sang. dracon. bōl. armen. linamento, gossipio, aut re quapiam tali, in vnguentum commodum demersa, excipiedī, deinde panno tenui integendi, vt in vterum indantur. Vulgaris puluer. quantitas est ʒ. β. Paratu facilius erit pessarium ex semimanipulo conuenientis herbæ leuiter tritæ, & (vt antè) tereti linteo inuolutæ. Interim si fractæ appareant vires, roborabūtur stillatiis instauratis. Vt.

℥. conseru. antiq. ros. ʒ. 3. conseru. symphyt. & carn. cydon. ana ʒ. 2. granor. berber. p. 2. semin. portul. acetos.

citr. card. pap. alb. ana 3. 2. specier. diamarg. diarho. Abba. & triasantal. ana 3. 3. aqu. plantag. arnoglossi. portul. & ros. ana 3. 4. decocti vnius capi cum multa oxalide alterati lb. 2. adde carn. pullor. 2. vel perdiculor. cum mica panis alb. f. distillatio lento igne in alembico, vel diplomate. ℥. prædict. distillat. lb. 5. sacchar. ros. 3. 2. cinamom. 3. 5. tranciatur per manicam Hippocratis.

Accidit etiam, vt supprimantur menses: quorum secundum naturam eruptio vt melioribus fit naturæ rebus, ita retentio præter naturam maximo est detrimento. Suppressionis illius causam triplicem assignat Galenus: priorem quidem partium expurgantium imbecillitatem: angustiam vasorum alteram: tertiam vitium sanguinis, crassi, lenti, multi, pauci. Quibus addi potest vitium corporis totius à diuturna exercitatione, morbo præcedente, tenui victu, aut per alias vias reuulsione & deriuatione facta. Imbecillitatis parens est intemperies: angustiae obstructio, vel tumor præter naturam ab humorum defluxione: obstructionis crassities, aut tenacitas humoris, aut cum aliquid, velut germen, vasi adnatum est. Cum autem tot sint *ὑποπείδων*, quot morborum idæ, cognito per suas causas morbo, non difficile fuerit indicationes curatiuas, atque medicamentorum euporiam venari. Sed imprimis aduertendū, quibus cieri menses debeāt, quibus minimè. Non enim ante tempus à natura definitum, vt ante annum 14. aut circiter, & post 45. aut circiter, citantur: non iis quæ vtero gestant, aut quæ lactant: non quibus laboriosa vitæ ratio inita, & quæ à suppressione nihil mali perferunt: non tenuiter viuentibus, præpinguib. à morbo diuturno conualescentibus: nec ante solitum tempus,

*Suppressionis  
mēstruū cau-  
sa ex Galen.  
cōment. 2. in  
libr. de Ho-  
morib.*

*Mēstrua  
quomodo ex  
quibus mo-  
uenda.*

# DE MORB. INTERNIS

*Mēstrua sup-  
pressa quā-  
grauia infe-  
rant incom-  
moda.*

quo natura ad excretionem sese componere con-  
suevit. Tum verò prouocantur potissimum, cum  
grauia inducunt incommoda, tabem, fædos colo-  
res, lipothymiam, vertiginem, deiectam appeten-  
tiam, dyspnœam, hydropem, articulorum cruciatû,  
dorsi & lumborum dolorificam grauitatem, quæ  
nephritidem, ventris tormina, & colicum ementi-  
tur affectum. Initio igitur, post aluum clystère aut  
cathartico solutam, secabitur cubiti vena in pletho-  
ra, aut obstructione vasorum, ne fluor sequatur lar-  
gior, quàm vt sisti possit, si in poplite vel talo sece-  
tur, vel vt imminuatur & reuellatur sanguis, qui  
copia sua obstructionem fouet. Ad prouocationem  
& vacuationem tum deinde in utrôque poplite, vel  
malleolo, vena aperietur. Reliqua autē materia ad  
faciliorem euocationem apparabitur zulapiis, apo-  
zematis. Vt.

℥. radic. comm. aper. in aceto temperatar. ana ʒ. i. radic.  
rub. tinct. ʒ. β. fabiæ, nepetæ, puleg. absynth. menth. hyss. ar-  
themif. ana M. β. semin. petro. fœnic. apij ana ʒ. i. femin. end.  
portul. cucurb. melon. ana ʒ. i. β. flor. cardiac. genist. & anth.  
ana p. β. f. decoct. ad lb. i. In colatura pro dosib. ʒ. dissol. syrup.  
de arthemif. capill. ven. & de quinq. radic. ana ʒ. i. f. apozema  
clarum, conditum cinam.

Ex iisdē syrupis & similibus cum aquis apij, fœni.  
aut cicer. rubrorum decocto dissolutis zulapia pa-  
rantur. Purgatio sequetur.

℥. polypod. quern. gram. petro. rub. tinct. ana ʒ. 2. cichor.  
cum toto, agrimon. ana M. i. semin. anif. fœnic. apij ana ʒ. i.  
flor. cardiac. ana p. i. f. decoctio, addendo sub finem folicul.  
sennæ mund. ʒ. 3. In colatura infunde rhei elect. ʒ. i. β. agar.  
troch. ʒ. 2. cinamom. ʒ. i. In expressione dissol. syrup. laxatiui  
ros. pallid. ʒ. 6. f. potio.

Instante iam iam mēstruorum tempore balneū

vtiliter imperabitur, ex origano, calament. arthem. matricar. parietar. florib. chamæm. melil. Vel decocto eorundem fouebitur imus venter, ilia & lumbi, adhibito deinde litu ex oleo liliaceo, aut irino. Repetenda quoque venæ sectio in maleolo, altero, aut vtróque, cucurbitulæ interiori crurum parti affigendæ. Iniectiones in vterum, aut etiam pessaria hûc reuocanda.

℥. succ. mercurial. depurati, vel decoctio. rub. tinct. ering. vel cyclam. vel radic. comm. aperitiuar. vel saluiæ, matric. nepetæ ʒ. 3. pulu. melanthij ʒ. 2. f. iniectio in vterum.

Talis tamen acrior iniectio virginibus viros non expertis instituenda non est, sed potiùs secessus, aut suffitus. Pessarium verò sit huiusmodi.

℥. radic. ireos, cyclam. ana ʒ. i. myrrh. elect. castor. ana ʒ. i. sem. rut. melanth. ana ʒ. ʒ. Ex his omnibus fit puluis, ex quo terebinthina excepto fingitur pessus.

Ex semimanipulo mercurialis parum trit. & hier. simplic. & mythrid. ana ʒ. ʒ. granis aliquot moschi additis, f. etiam pess. Non omittenda cardiaca ad vires reficiendas capienda: conseru. bugloss. melyss. borrag. cort. citr. cond. ther. vet. mythrid. aut ex his & speciebus diamarg. trochis. de myrrh. rasur. eboris & cornu cerui cum syrupo limon. fingenda cōdita. Cæterum fluor muliebris, qui ferè pituitosus & serofus, purgantibus, sudores mouentibus, aut vrinas, fanescit. Lochia verò seu purgamenta à partu, eandem, quam menstrua, poscunt curationem.

*De vteri 1 prefocatione.*

*CAP. 59.*

**M**ulta ad hanc rem ex capite 5. libr. 6. de locis affectis, & Aëtio colligenda sunt. Vocatus in paroxysmo primùm an 2 viuat mulier, cogno-

1 De suffoca-  
tione hysteri-  
ca, quam aliq  
stragulatione  
appellant.  
2 Interdum  
enim mortue  
mulie vide-  
tur, quod spi-  
ritus non au-  
cat,

# DE MORB. INTERNIS

3 *Ab im-* scendum est. Nam sæpè fit, vt grauiore 3 accessio-  
*peditis respi-* ne intercant, aut non aliter iaceant, quàm mortuæ.  
*randi instru-* Infidele est signum vitæ, quod floccis naribus ad-  
*mentis.* motis, vel vase pleno aqua imposito regioni stoma-  
4 *Vt helle-* boro Et pyre- chi, colligitur. 4 Sternutatoriis potius de vita co-  
*thro naribus* gnoscendum. Secundum est, vt causam cognosca-  
*admotis, aut* mus. Causæ sunt, menstruorum suppressio, sperma-  
*immissio pul-* tis corruptela in nubilibus, virginibus, viduis, & iis  
*mere, aut etiã* mulieribus, quæ natura sunt salaces, & præter con-  
*penna.* suetudinem non miscentur viris. Aliquando hu-  
5 *Et eius cor* ruptione hy- mor quidam crassus, & veluti seminalis, vtero 5 col-  
*ruptione hy-* lectus corrumpitur. In tali causa præfocationis vte-  
*sterica fit sus-* ri in paroxysmo extremorum vincula, 6 frictiones  
*focatio, subla* maximè crurum ex sale & aceto, vel similibus. Odo-  
*to respiratio-* rata 7 vtero : grauius olentia naribus admouen-  
*nis vsq, pro-* da sunt. Malè olentia, vt castoreum, galbanum,  
*pter oppressio-* gagates lapis, capilli hominis, assa fætida, plumæ  
*nè diaphrag-* crematæ, cornu cerui, cornua reliquorum anima-  
*matis.* tum cremata, euphorbium. Quæ omnia excipi pos-  
6 *Vt exci-* sunt pice humida, vel in puluerem redacta galba-  
*tentur spiri-* no, & rebus eiusmodi. Huius rei causam repetes ex  
*tus, & exci-* proble. 60. Aphrodisæi. lib. 2. Odorata verò, quæ  
*tetur humor* vtero admouentur, ziber, seu ciueta, bombax mos-  
*ad excretio-* chatus, aut gossipium moscho conspersum, oleum  
*nem.* moscho perfusum, gallia moschata, alipta moscha-  
7 *Vt in sinu* ta, caryophyllum, & similia.  
*pudoris im-* 7. aliptæ moschatae ʒ. 2. ligni aloës, caryophyl-  
*mittatur, &* ana ʒ. ʒ. aut ʒ. 1. moschi, ambre ana Gra. 3. excipian-  
*uteri cerui-* tur oleo de spica. Aliud.  
*cem.* 7. galliæ moschatae ʒ. 2. cinamomi, folij, macis,  
8 *Nisi mu-* caryophyl. ana ʒ. 1. ambre, moschi ana Gr. 3. labda-  
*lier sit epile-* ni, styracis ana q. s. cum aqua rosata moschata fiat  
*psie obnoxia.*

7. galliæ moschatae ʒ. 2. cinamomi, folij, macis,  
caryophyl. ana ʒ. 1. ambre, moschi ana Gr. 3. labda-  
ni, styracis ana q. s. cum aqua rosata moschata fiat

veluti suppositorium, quod indatur genitalibus. Pulveres eiusmodi aliquādo inspergimus oleo castoreo, de spica, laurino, de lilio, ut inde intinctis digitus obstetrix affricet os uteri in virginibus: in aliis etiam interiora. Et ut à paroxysmo excitentur, vellicandæ aures, nares, sed maximè pili, qui pudendis adnascuntur. Aliquando etiam piper, zinziber, sal gemmæ, & alia eiusmodi pudendis immittuntur, ut naturam irritent ad excretionem. Et quia magna ex parte plenæ sunt ventorum, glandulis, clysteribus, unctionibus, quæ flatus discutiunt, utendum erit ex capite de colico dolore.

Excitatis à paroxysmo nullum remedium melius marito. Alioqui si retenti menses in causa sint, emouere oportebit ex proximo capite. Et si humor crassus, purgationes conueniunt. Imperabis igitur hieræ diacol. ℥. 4. aut infusionem ʒ. i. β. agarici trochisc. vel ʒ. 2. pulueris hieræ picræ. Alioqui.

℥. terebinthinæ lotæ in aqua matricariæ ʒ. β. fe- Remedia cly-  
min. dauci, agni casti, cinamomi ana Gr. 8. cum mo- stericæ suffo-  
dico conservæ anthos fiat bolus. Aliud. cation, quæ  
fit à semine

℞. terebinthinæ ʒ. 3. agarici trochiscati ʒ. 2. semi-<sup>fit a semina</sup>  
nis dauci, cannabis, ligni aloës an. Gr. 8. cum eadem <sup>corruptione,</sup> dicata,  
conferua fiat bolus.

Purgationes per intervalla repetendæ sunt, sed paulatim imminuto modo. Laudatur castoreum per intervalla datum. Hoc autem variis modis videntur. Nam in paroxysmo dissolvimus in aceto acerrimo, & naribus admouemus, vel eius  $\mathfrak{D}$ . 2. aut  $\mathfrak{z}$ . i. exhibemus cum aqua distillationis radicū dauci vel arthemisiæ q. s. Acetum scylliticum, vel in quo



## DE MORB. INTERNIS

pulegium, calamentum, thymum, organum, coniza coxerint, naribus admotum, vel etiam potum adiuuat, etiam si vterum lædere videatur.

Laudatur ab antiquis succus & semen plantaginis. Cinamomum, lignum aloës, semen dauci, cannabis, rutæ, agni casti, radix nimpheæ, & quæ semen extinguunt. Vomitus, sternutatio, cucurbitulæ, primum quidē inguinibus & coxis, deinde ilibus cum multa flamma affixæ. Hypochôdria quoque fasciis deligata & constricta. Glomeres fili anethino feruenti, inculcati & calidi alternatim appressi pectini. Laudatur pulvis conchulæ, seu blattæ byzantiæ, & pectunculorum.

Post alia quoque remedia dropaces & sinapismi extremæ spinæ & ventri appositi. Balnea naturalia, frequens coitus, vinctio ex oleo dulci, in quo semen agni casti, cinamom. confracta omnia coxerint, ut eo fumen & lumbi inungantur. Adiicitur aliquando pyrethrum, piper & similia. Sed ineunda ratio habitus corporis, temporis, anni, & reliquorum. Similiter clementer agendum est cum prægnantibus.

10 Nunquā  
enim venam  
secabis in suf-  
focatione hy-  
sterica à se-  
minis corru-  
ptione.

Quod ad phlebotomiam attinet, 10 suspectum remedium est, nisi cū suppressi sint menses. Tūque eo modo, quo in mouendis mensibus. Si quidem nigella mulier est, malleoli venam phlebotomo aperies: sin alba & mollis, vel scarificatu, vel sanguisugis uteris.

## EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Υστερικὴ πνίξις, Græcis dicitur vteri suffocatio, cum vterus suusum ascendit, vel quia inflatur & intumescit, vel quia ple-

nis venis, quæ ad vterum pertinent, reuellit: in qua passione, sine motu, sine sensu quasi mortuæ iacent, frequentiusque viduis & malè purgatis ac sterilibus accidit & iuenculis ad venerem procliuioribus. Vnum commune symptoma est, defectus respirationis, non quòd strangulentur. vt inquit Galenus, quia nihil est, quod spirationem intercipiat, sed quia ita inflatus vterus primùm intestina, deinde mutuo contactu ventriculum & diaphragma comprimit adeò, vt dilatari nequeant. Atque ob id non loquuntur, quia aëris satis non attrahitur, aut extrà propellitur. Alij id referunt ad frigiditatem humidi & frigidi seminis totum corpus refrigerantis, vt sic transpiratio per poros illis sufficiat. Quanquam in nonnullis hæc constant, & ratio, pulsus languidus, exiguus, & aliquando nullus. Sed quia vterus maximum cum corde per arterias habet consensum, cum cerebro verò perspirinæ membranas & neruos, horum membrorum actiones variè læduntur, admirandæque subsequuntur symptomata, præsertim sublato tetro vapore sursum ex causa coniuncta ipsius affectus. Cum accessio imminet, torpor mentis, pigritia, crurum imbecillitas, pallor quidam faciei. Hinc sopor grauis, mentis desipientia, sensuum interceptio, ἀφώνοια, crurum contractio & similia. Quibusdam risus, aliis lachrymæ, aliis vtrunque, vt D. de Rochepot: quæ cum varicosa esset, eo affectu corripiebatur cum delirio risu, lachrymis, contractione oculorum. Alteri risus, deinde perturbatio mentis: hinc lachrymæ, à quibus etiam monitæ non cessant. Sed nihil admirabilius, quàm quod duabus filiabus Præsidis Rhotomagensis contingere solebat in motu sursum vteri, quo interuallis laborabant. Risu enim longo ad horam, & horas duas imminente paroxysmo capiebantur, quem neque metu iniecto, neque hortatu, neque aliis artibus poterant compescere. Parentibus interrogatæ & obiurgatæ respondebant se non posse continere risum. Aliis priùs lachrymæ, deinde risus mouetur in eodem affectu. Sunt quæ magnam ducunt respirationem, in quibus necesse est nullam fieri compressionem stomachi & cordis, sed materiam aliò ferri. Inclinate accessione humiditas quædam è locis muliebribus prodit, ventris strepitus, laxatio vteri. Circuitu quodam redit morbus, hyeme præ-

*Vteri affecti  
variæ sympto-  
mata, ob par-  
tium, quibus  
cum cōsentie.  
sympathet.*

## DE MORB. INTERNIS

*Suffocationis* tertio & Autumno. Causæ sunt refrigeratio vteri, spermatis corruptela, humor quidam crassus, & veluti seminalis in vtero corruptus, grumus, menses suppressi, læuigatus & nimium vacuatus vterus. Sic enim ad loca humida sese conuertit, & è capite ac reliquo corpore immodico labore siccatus trahit. Id quoque grauidis fieri potest inopiâ alimenti sicciore factò vtero, & concalfactò labore. Eodem modo è defluxione pituitæ à capite in præcordia, & impedita respiratione, vtero ad humiditatem concurrente. In remediis hæ omnes causæ distinguendæ. Alij aiunt vacuato vtero, vt per immodicam mensium fluxionem, aëre vterum repleri, & ita inflari conuiiente collo. Gratis etiam odoribus ad nares quibusdam ascendit.

*Suffocatio vteri quando cesset.* Præfocatio vteri cessatione mensium naturali 45. anno, vel 50. vel cessat, vel ingrauescens interficit. Discernitur primum à syncope, pulsu, sudore, pallore, odoribus admotis. Nam hic pulsus est aliquis, licet languidus, sudor frigidus nullus, minor pallor, & odorata nocent, nisi admoucantur inferioribus. In syncope contraria omnia. A Catalepsi verò, quia rigor nullus, aut refrigeratio, qualis in corpore gelu concreto, nec oculi aperti, & similia. Ab apoplexia, sensu. Sentiant enim, cum punguntur, licet obtusè. Ab epilepsia, quia corpus non concutitur. A flatibus fieri intelligimus, cum venter intumuit.

Remedia sunt, odores fœtidi sursum admoti, vt bituminis, castorei, galbani, picis liquidæ, pilorum combustorum, ruthæ, caparum, alliorum: grati verò deorsum, vtero, vel ad coxas, ligaturæ dolorificæ in inferioribus partibus, cucurbitulæ in inguinibus, pessaria trahentia, emplastrum ceroneum. Vbi frigiditas & inde dolor, confectio Neræ, quæ etiam conceptum iuuat, pretiosissimum suffumigium.

### ANTO. VALETII EXERCIT. LIX.

**P**Ræfocatio ab vtero vehemens est totius corporis refrigeratio, cui causa continens vapor malignus ab vtero sublatus. Materia, ex qua effertur va-

por, semen, vel menstruum, putre, suppressum, mo-  
 la, humores prauī, vteri abscessus. Pro magnitudi-  
 ne causæ, & partium vtero consentientium læsio-  
 ne varia insurgunt symptomata. Hinc ægra non-  
 nunquam sensu & motu priuatur, sine euidenti re-  
 spiratione & pulsu: aliàs illæsa ratione manente,  
 animi deliquio concidit, & respirat difficulter: aliàs  
 conuelluntur haud aliter membra, atque in epilep-  
 sia. Paroxysmus primùm tollendus: deinde, vt ne  
 recurrat, prouidendum. Et quia vapor teter mali  
 huius author sursum contendit, & vteri distensio à  
 repletis vasis compressionem diaphragmatis, à qua  
 præfocatio, molitur, vsurpanda sunt, quæ spiritum  
 vitalem, animalémque vehementer moneant, at-  
 que vterum ipsum deorsum pellant. Itaque frictio-  
 nes fiunt extremarum partium, plantarum pedum,  
 manuum, ex sale gemmæ in aceto dissoluto, coxa-  
 rum ligaturæ dolorificæ: cucurbitulæ inguini, iliis,  
 lumbis, pubi, carnosæ tibiæ parti aptantur. Fum-  
 us rerum graueolentium naribus captus, expul-  
 tricem facultatem stimulo præsentī est reme-  
 dio. Vnde & sternutatoria è castoreo puluerato,  
 aut helleboro, in nares indito, quàm citissimè opi-  
 tulantur. Alio cocto & expresso additur tantillum  
 aloës, eo imbuitur vmbilicus magno successu, quo-  
 rundam opinione. His accedent propiora reme-  
 dia, linimenta in collum vteri indita, si mulier virū  
 iam sit experta: suffitus aromatum, si virgo sit. Lini-  
 mentum erit ex olei moschati & nardini ana vnc. i.  
 nuc. mosch. styrac. calaminth. & ligni aloës ana ʒ. β.  
 cera addita pauca. Suffitus ex pulueribus aromatū,  
 benzoini, calam. arom. maioran. & simil. in trochis-

*Hippocr. li. 1.  
 de morb. mu-  
 lier. ad finem  
 lib. de loc. in  
 hom. Et Gal.  
 cap. 5. lib. 6.  
 de loc. affect.*

*Suffocationis  
 hystericae cu-  
 ratio.*

# DE MORB. INTERNIS

cos ex aqua arthemisiæ compactis. Vbi ægra paroxysmo liberata, cardiacis recreabitur: tum verò emplastrum de galbano cum pauco moscho vmbilico apponetur. Cæterùm quia dæmonij hoc genus (vt dici solet) non nisi ieiunio multo eiicitur, vitandus erit vsus ouorum, carniū, vini, & eorū quæ multum nutriunt, & semen augent.

*Ad Rhagades.*

CAP. 60.

**R** Hagades vlcera sunt 1 ani & vteri deducta in fissuras. Sed alia humida & saniosa, alia callosa, nonnulla cancrofa & feruida. Saniosa primum 2 ablues sero lactis, mulsā: deinde consolidabis tetrapharmaco in rosaceo dissoluto, medicamentis è lithargyro 3 chalcitide, & metallis. Callosa remollies æsypo humida, radice lilij, iride Illyrica, quam excipies terebinthina. Alioqui vitellum oui assum cum lacte muliebri subactum impones. Vbi feruet & cancri suspitio.

1 *Vt hæ partes dehiscant perinde accallosa Aquilonia tempestate manus.*  
 2 *Ad infringendā sanieiacrimoniam, & vlcus detergendum.*  
 3 *Vel vnguēto diapopholygos: itē ex cerussa, pompholyge, adipē suillo & aqua plantaginis.*

℥. cerussæ lotæ, tuthiæ præparatæ & pulueratæ partes æqual. misce. Aliud.

℥. succi portulacæ, lactucæ, plantaginis, psilij, horum vnus 3.3. Agitentur in plumbeo mortario pistillo plumbeo ad crassitudinem. Aliud.

Valebit etiam ceratū rosaceum Galeni cum succo solatri, vnguentum de cerussa, de plumbo, quibus tuthia lota & infriata commisceri debet.

## EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

*Ραγάδες* fissuræ, vel rimæ, quibus partes musculosæ veluti proscinduntur, vt labra quandoque & manus ex vehementi

hementi frigore. Nascuntur ex difficili partu, & violento coitu: in ano ex vi aliqua. Aliquando in causa est humoris acris affluxus, aut condylomatum inflammatio & distensio rupta cute. Hæc vlcera vel saniosa sunt, vel callosa, vel cancrofa.

Conueniunt, diaponpholigos Nicolai mollitum liquido cerato rosaceo, vbi callus est, mucagine & adipibus emollientibus: si calor est, vitellus oui, succus cancriorum, plantaginis, clymeni, vnguentum de cerussa, de plumbo, lithargyro, & similia.

## ANTO. VALETTI EXERCIT. LX.

**R** Hagades hiátia sunt vlcuscula, acrium humorum decubitus accepta ferenda. In quibus sanies cumulat, deterfusio ex hydromelite ineunda. Callum si contraxerint, cū medula cerui, oleo liliorum & cera emolliuntur. Si calor in parte adest, huic oleo rosaceo, vel vitello oui affo cū lacte muliebri subacto subuenitur. At vbi cácrofa labes inuri, cœpta est, vnguentum de plumbo, & similia vsui sunt. Cum interna sunt id genus vitia, iniectiones fiunt ex aqua hordei cum melle rosaceo. Vel ex feri lactis  $\frac{3}{4}$ . olei ros.  $\frac{3}{4}$ . 2. tuth. præparat.  $\frac{3}{4}$ .  $\beta$ . alumin.  $\frac{3}{4}$ . 2. in mortario & pistillo plumbeis ductis fit vnguentum, cuius portio in aq. hordei dissoluta iniicitur.

De mola.

CAP. 61.

**M**ola cruditas quædam est, & 1 coagulatio materiæ, quam naturalis calor conformare non potest, vixque 2 curatur. Utendum tamen est primū quidem mollentibus, ex capite de scirrho: deinde iis, quæ partum eiciunt, & fœ-

1 Rudior, in  
digest. aque  
moles in vte-  
ro ex semine  
vicio, siue ef-  
fata vi, et  
sanguinis n. e  
strui largiore  
affluxu cō-  
pta. Hippoc.  
lib. de Steri-  
libus.

2 Aristot.  
c. 7. lib. 4. de  
gener. ani-  
mal.

DE MORB. INTERNIS  
tūm mortuum excludunt, quales sunt trochisci de  
myrrha, hermodactyli, & alia eiusmodi. Deinde  
opus erit manu chirurgica: ut nonnunquam specu-  
lum matricis adhibetur.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Ea est naturæ providentia, ut calor opifex & forma-  
tor eorum quæ generantur, nunquam sit otiosus, sed quam-  
libet materiam in opus aliquod miro artificio ducat, quale-  
cunque tandem sit. Sic Aristoteles in putredine vermes ge-  
nerari scribit, cum humidum substantificum, in quo calor  
insitus est, dissolvitur, & extra, calore externo illectum,  
effluit. Tum enim calor in exitu, ne proprio subiecto de-  
ferro intereat, quicquid est benignioris materiæ colligit,  
eāque effingit in animalculum aliquod, in quo conservari  
queat, pro quantitate & qualitate illius materiæ, ex qua  
nihil maius efficere potest. Quod si eam quasi pro arbitrio  
tractare non possit, quia aut copiosior, aut minore copia,  
aut ex diversis generibus constans, minusque sequax, mon-  
strum generat, siquidem aliquid perfectius non licet. Sin  
inepta omnino sit, aut herbam, aut aliquid adhuc rudius ef-  
formabit, inducta quàm maxima fieri poterit, perfectione.  
Naturæ enim, quæ in perpetua individui successione conti-  
nuatur, longè satius est creare aliquid, quàm nihil. Hoc idem no-  
stra quidem sententia in vtero generationi à natura destinato  
fit, à spiritu illo gignitivo & calore, quem non sine ratione sui  
domicilij architectum veteres Philosophi appellarunt. Ma-  
teriam enim convenientem & tractabilem si repererit ex  
utriusque sexus semine, fœtum pulcherrimum ad utriusque  
exemplar diuinitus fabricatur, aut vni magis, quàm alteri  
similem, pro ratione materiæ & viribus imaginatricis fa-  
cultatis, tanquam optimi moderatoris. Si verò ipse im-  
becillior sit, materia autem subiecta qualitate, quantitate,  
consistentia, aut mixtione alicuius extranei, ut sangui-  
nis crassi, aut alterius succi vitiosi ineptior ad tantam per-  
fectionem, aliquid tamen, ne nihil, generat, siue ani-

matum, siue rude & expers vitæ. Vidimus mulierem, quæ cum nouem mensium spatio vterum gestâsset, omnibus, quæ in legitimo partu euenire solent, mirificè respondentibus, tandem nihil aliud præter animalia quædam ranis haud absimilia cum multis purgationibus cruentis & corruptis in lucem edidit: aliam, cui carnea moles informis exiit cum fœtu, veluti superfœtatione quadam.

F. Valeriola multas protulit & admirandas in huiusmodi partibus obseruationes, maximèque curationem de mola, cui partus quatuor mensium erat alligatus, cum ipsa iam pro vtero fœtu nouem menses in vtero latitâsset. Qui quia materiam hanc copiosissimè & doctissimè tractat, longiori demonstrationi supersedendum putamus, summam generationis tantùm complexi.

Primum carnem hanc informem, & tanquam exiguum quoddam chaos non eodem modo, quo vermes, in vtero generari à calore tantùm coquente, & humore crasso ac viscido, sed ex semine & viri, & mulieris efformari à spiritu illo gignitiuo, indicio sunt membranæ, quibus aliquando integitur, ligamenta, superfœtatio fœtu alligato, incrementum, motus quidam tremulus cum tumore vteri. Quæ omnia *Mola sine coïtu non concipitur.* concepti fœtus speciem per initia exhibent. Neque unquam quisquam sine coïtu concipi obseruauit. Causa igitur efficiens erit spiritus ille, qui opificis vices gerit: materia, semen cum multo crasso & spisso sanguine menstruo concreto & indurato: vel (vt ait Hippocr. de Sterilibus) morbosum semen viri & modicum, cum mensium copia: forma, modò perfectior & animata (nam & animalia illa speciem quandam molæ, quod eodem modo, iisdemque de causis generentur, esse putamus) modò rudior & expers vitæ, licet augeatur & increseat.

Galenus scribit fœtum ita informari in vtero, vt primum viuat tanquam planta: deinde vt brutum: postremò vt homo: non quod tot simul formæ in homine contineantur, tanquam Geryone quodam, sed quia cum quatuor sint naturæ perfectiones, esse nimirum, vt in elementis: viuere, vt in plantis, sentire vt in animalibus, & intelligere, vt in homine, posteriores prioribus continentur, vt numeri minores ma-



# DE MORB. INTERNIS

ioribus. Vt enim vnitas non est binarius, neque binarius est ternarius: binarius tamen continet vnitatem, & ternarius binarium: ita quod essentiam duntaxat habet, necesse non est vt viuat, neque quod viuit, vt sentiat, aut quod sentit, intelligat. Quod tamen intelligit & sentit vt homo, necessariò & in rerum natura cohæret, & viuit. Atque hæc vera ratio est cur veteribus homo μικρόκοσμος dicatur. Eius enim forma cæterarum omnium perfectionem complectitur, siquidem essentiam cum elementis, vitam cum plantis, sensum cum animalibus, intelligentiam cum formis diuinis habet communem. Cùm igitur natura ita progrediatur, non vt ex specie aliam speciem procreet, vt ex planta hominem, sed formam perficiat gradatim ascendendo, haud absurdum fortasse fuerit, neque à Galeni sententia alienum in hac portentosa generatione idem fieri. Primum enim rudis quædam moles gignitur, in qua si natura vitio materiæ, quasi in itinere, intercipiatur, consistit, neque aliud quicquam addit. Sin vterius nullo vitio repugnante progrediatur, paulatim perficit, vt iam videatur stipes, deinde animal. Cuius pro materiæ quantitate & temperamento variè figura immutatur, & corporis effigies. Hinc fortasse ex molis aliæ rudiores, aliæ propius ad legitimum fœtum accedentes, aliæ variis animalium imperfectorum figuris effectæ conspiciuntur. Finis autem semper est generatio humanæ naturæ, ad quam perfectionem diuina facultas corporis nostri architectatrix, vteri vitio, colliuie humorum, materiæ ineptitudine, & caloris imbecillitate præpedita, peruenire non potuit, nonnunquam etiam alterato optimo semine ab aëre externo, aut vteri intemperie, vt frigore. Locus generationis huius præter vterum nullus est. Tempus & reliqua ferè omnia, vt in legitimo partu. Hinc fit, vt in principio à vero partu distingui non possit. Menfes supprimuntur, vterus attollitur, nausea & vomitiones incurrunt, motus in vtero tremulus percipitur, siue sit à mola, siue ab vtero veluti inutile pondus excutere contendente. Quòd si animatum sit, quicquid illud est, difficilius adhuc internoscitur. Certissima signa sunt, primum si tempus legitimi partus excesserit. Nam aliquando gestatur mola decem, duodecim & plures menses: aliquando toto vitæ

*Ηomo cui  
μικρόκοσμος  
appellatus.*

*Mola conce-  
pit certissima  
signa.*

spatio sæpe foras expellitur primis mensibus. Deinde si mortus instar lapidis percipiatur à latere in latus, non qualis inest foetui, qui calcitrat circumuoluitur, neque eo tempore, ut mense 3. in maribus: 4. in fœminis. Præterea sanguis menstruus, qui in vterum delabatur, in alimentum non ita absuitur, sed corrumpitur, vnde vterum peius affici necesse est, & per consensum corpus vniuersum. Hinc ventris tumor maior & tensio, color fœdior, appetentia magis deiecta, grauitas difficilior, quàm in vera imprægnatione. Sed nihil adhuc certius, quàm si mammæ tumeant sine lacte. Si initio deprehendatur, non expectandum tempus partus. Sic enim sæpe incurabilis est, aut onere grauata natura propulsatur, sed exeundo interficit, aut dolores acerbissimos, symptomataque periculosa inuehit. Quibus Perpiniani visa est mulier nobilis interiisse, cum molam gestasset duodecim mensibus.

Curatur sanguinis missione, laxatis partibus fotu, medicamentis aperientibus, & iis omnibus, quæ abortum prouocant. Alioqui Chirurgia est opus, videndumque an insideat ori vteri, an superiore parte, vel ad latera, ut remedia adaptes. Si vel ante, vel post veram imprægnationem oriatur, foetum necat.

## ANTO. VALETII EXERCIT. LXI.

**P**AUCO semine, eoque morbofo, ad multum sanguinem menstruum concedente, progignitur mola. Calor enim in illo debilis efficit, ut formatrix facultas eam materiam effingere non possit: vnde manet rudis quædam caro, quæ per suas venas non secus alitur, ac foetus. Sed certis quibusdam signis ex Hollerio facile ediscendis internoscitur. Curationem autem recipit menstrua prouocantibus medicamentis.

1 Ut ad dia-  
gnosim, pro-  
gnosim & cu  
rationē her-  
nia.

**Q**Væ i ad hanc rem pertinent, plurima cap. 18.  
& sequentibus libri 7. Cornelij Celsi. Multa  
quoque apud Paulum & Aëtium.

Cæterum vinculum quoddam membranofum  
est, vtrinque ab inguinibus procedens, in peritonæū  
exporrectum, cuius robore peritonæum confirma-  
tur. Atque hinc omentum & intestina. Relaxatum  
herniam facit, descenditq; plus, minúsue intestinū  
& omentum, aliquando in inguina, nonnunquam  
in scrotum, vnde nomina enterocèle & epiplocèle.

2 Labore,  
actu, casu.

3 Leue, distri-  
butioni chyli  
& secretioni  
stercoris dica-  
tum, quod à  
suo mesaræo  
diuisum de-  
scēdit. Quā-  
obrem entero-  
cèle ferè fit

Aliquando 2 rupto peritonæo idem fit. Græue  
malum est, cū 3 intestinum descēdit, intestinū-  
que in scroto conuoluitur. Supprimuntur fæces, re-  
gurgitantque in ventrem. Testiculus erythroïde tu-  
nica vestitur. Post hanc verò adnata est *δαρτος*.  
In superficiem extenditur folliculus genitalis, quod  
*ὄρχον* Græci, scrotum Latini vocant.

cæci intestini  
prolapsu, quæ  
nihil aliud  
est, quàm apo-  
physis quædā  
puerulis sæpe contingit, facilèque discutitur. Vari-  
cosus ramex, sarcocèle, testiculorum inflammatio,  
tumor & similia extra rationem herniæ sunt.

Inter erythroïdem & darton, & inter testiculum  
& erythroidem, aut etiam in scroto, aquosa sanies,  
aut aqua colligitur, vnde hydrocèle. Nonnunquā  
soli flatus herniam repræsentant. Id recens natis  
puerulis sæpe contingit, facilèque discutitur. Vari-  
cosus ramex, sarcocèle, testiculorum inflammatio,  
tumor & similia extra rationem herniæ sunt.

Aquosa & ventosa hernia remediis curantur, quæ  
descripta sunt in ascite & tympanite. In aquosa  
peculiariter laudatur emplastrum factum è recenti  
stercore vaccino, & tertia parte pulueris boli arme-  
næ, vel sang. draconis. Laudatur & semuncia pulue-  
ris è cremata radice brassicæ. Pulvis is incorpore-

Comm. in  
sent. 3. sect. 4.  
lib. 6. Epid.

tur adipe suillo vetere. Ad enterocalem & epiplo-  
 celem multa remedia sunt medica, tum quæ per os  
 sumuntur, tum quæ apponuntur. Sed in primis ha-  
 benda ratio, vt quod decedit, reponatur. Quies ad  
 multos dies imperetur: molli lecto decumbant,  
 pro ratione corporis, abstineant clamoribus. Et in  
 4 egerendo manum apprimant pubi & scroto, ne  
 quid recidat. Fasciæ seu loculamenta scroti ex pan-  
 niculis comparentur, sed ita compactis, vt solida  
 sint. Optimûmque fuerit materiam eiusmodi fasci-  
 arum adstringentem materiam primûm imbibisse.  
 Possunt & ex ligno, ferro, aut alioqui solidiore  
 materia confici, sed ita vt interiori parte, qua scro-  
 tum contingant & inguina, molliori corpore indu-  
 cantur. Laudatur succus iacæ 5 vtriûsque. Datur  
 singulis diebus manè, quantum testa oui capiat,  
 cum modico vini albi. Ex eodem succo depurato  
 iulepi & syrupi comparati possunt.

4 *Imo dan-  
da opera, vt  
fæces duræ  
non sint, sed  
molles.*

5 *Præsertim  
tamen albæ.*

Laudatur pul. & succus radicis consolidæ ma-  
 ioris, rusci, omundæ regalis, sigilli Salomonis, panis  
 cuculi, radicis valerianæ. Pulueris ʒ. i. datur pueris  
 in lacte cocto, addito oui vitello, aut ex solo oui vi-  
 tello. Succis vtemur, vt succo iacæ, eodem modo,  
 sem. thlaspi, vermibus terrenis, limatura chalybis,  
 lapide, quem vulgò (diament) vocât, hepatica irita,  
 Et hæc quidem probata multis. Herbula 6 est in  
 fabulosis nascens: ramulos multos in terram spar-  
 git, foliis minimis & rotundulis, alis follicatis ex vi-  
 ridi flauescens, per ramulos sparsis, adstringen-  
 te gustu, ex qua succus expressus subinde affuso vi-  
 no albo, certissimum, & aliquoties probatû reme-  
 dium cōtra descensum intestini. Nam nouē diebus

6 *Hæc her-  
maria dicta.  
Ab aliis her-  
ba Hollerij.*

# DE MORB. INTERNIS

7 Puerorum ita percurat, vt postea non redeat malum. 7 Faci-  
pulticula ex lis inuentu Autumno.

Ex radicibus Osmundæ regalis repurgatis fiunt  
syrupi, qui huic rei conueniant. Radices eiusmodi  
in nigro vino austero coqui possunt, & inde em-  
plastra fingi. Alioqui vtédum erit emplastro Phar-  
macopolarum contra rupturam. Valet & lenticula  
aquæ trita & alligata, similiter & cicuta valet, ra-  
dix pentaphylli sicca trita ʒ. pondere ex vino data.  
Semuncia foliorum equiseti tritorum ex aqua cali-  
da. Parabile emplastrum ex ʒ. i. bdelij, manè qui-  
dem subacta cum salua hominis: vespere verò cum  
vino austero. Radix cyperi, arnoglossi, aristolochiæ  
longæ & rotundæ in emplastrum formata, & trita  
prius, deinde data potui.

## Emplastrum.

℥. mastichis, corticis thuris, nucis cupressi,  
myrrhæ, sarcocollæ, glutinis piscis (vsblach vo-  
cant, & ichthyocollam) ana ʒ. β. ichthyocolla in  
aceto dissoluatur, reliqua trita misceantur, exten-  
dantur in aluta.

E nucibus cupressi & gallis immaturis ad con-  
sumptionem coctis emplastra fiunt parabilia, quæ  
in mensem relinquantur, nisi superueniat dolor.  
Liquor autem, in quo coxerint, potui datur.

Probatissimum istud est Octauio. ℥. balaustio-  
rum ʒ. i. β. gallarum ʒ. β. radicis asphodeli, radicis  
narcissi, aut (si hæ radices desunt) radicis arnoglossi  
& betæ, loco personatæ, ana ʒ. i. β. coquantur in vi-  
no, tundantur in emplastrum, subigantur.

## Aliud.

℥. spumæ argenti vehementer combustæ ʒ. 9.

aceti lb.2. & ℥.3. olei cydoniorum lb. β. succi plantaginis ℥. 2. Spuma argenti in aceto extinguitur, etiamdum feruens: deinde teratur. Tum adiecto oleo & succo, perpetuò agitando fiat decoctio secundum artem, vt habeas emplastrum, quod quidem diebus continuis adhibetur.

*Aliud emplastrum.*

℥. thuris, mastichis, sarcocollæ, acaciæ, lapidis hæmaritis, mummiæ, tracaganthi, gummi arabici, terræ sigillatæ ana ℥.3. boli armenæ, gallæ, lithargyri, balaustiorum, nucis cupressi, malicorij, aristolochiæ longæ & rotundæ, corticis olibani, rosarum, radicis vtriûsque consolidæ, orobi, siliginis, sambuci, cyperi ana ℥.β. picis naualis ℥.2.β. Colophoniæ, resinæ pini, terebinthinæ ana ℥.i. visci querni ℥. i. β. ceræ ℥.2. pilorum leporis vstorum ℥.4. olei, in quo ficus pingues incoctæ sint, ℥. β. fiant magdaleones secundum artem, de quibus portio extendatur in aluta, applicetur. Quòd si his remediis nihil proficitur, ad Chirurgiam veniendum est, quam ex 6. Pauli, 7. Celsi, & recentioribus colliges.

EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Ad ossa pubis non perforatur peritonæum, sed productio *Hernia fit*  
quædam illius descendit in scrotum, per cuius meatum va- *producto iã.*  
sa spermatica, arteria scilicet & vena, perreptant ad testes, & *tum non ru-*  
per eundem locum eiculatoria ascendunt, vt inferantur col- *pto, perito-*  
lo pudendi. In hac productione multi tumores fiunt, quos *neo.*  
Græci κήλας vocant, modò in scroto, modò supra scrotum,  
qua parte in illud descendit. Quorum omnium causa est vel  
flatus, aut aqua ibi contenta, aut caro, aut tumor venarum

# DE MORB. INTERNIS

varicosus: vel delapsa pars aliqua ex iis, quæ intra peritonæum continentur, vt intestinum & epiploon. Idque fit vel rupto peritonæo, vel relaxato & hiantē. Ex omnibus autem intestinis solum ileon, in quo chylus semper continetur, pro-  
cidit. Nam rectum in anum, cum relaxatur, descendit. Colum-  
alligatum est renibus, & altius ascendit ad ventriculum. Ieiuna & tenuia intestina sublimiora sunt. Ileon itaque tantum  
superest, vel cæcum. Neque enim de duodeno vlla dubitatio. Duo igitur in his affectibus statim initio distinguenda sunt,  
an sit aqua, vel flatus, vel caro, vel varicosus ramex: in mulie-  
ribus, laxatio foraminis ligamenti descendētis ad internam  
partem inguinis: aut ileon delapsum, vel epiploon: nonnulli  
addunt musculos ruptos epigastrij. Deinde si quid descende-  
rit, qua parte sit, & an ruptione, an relaxatione id fiat. Si aqua  
fuerit, hydrocele: si flatus, pneumatocèle: si caro, sarcocèle: si  
varices, cirrocèle: si ileon, enterocèle: si epiploon, epiplocèle  
nominatur. A situ verò partium, bubonocèle, in inguine:  
oscheocèle in scroto dicitur. Quibusdam testiculus in inguen  
translatus imposuit, vt herniam crederent. Aliquando etiam  
hi affectus inter se complicantur. Sæpè vehementi imagina-  
tione libidinis colligitur semen inter tunicas testiculi, vt vi-  
deatur quædam esse sarcocèle, aut hydrocele. In quibus om-  
nibus cauendum, ne iudicando fallamur. Primum in hernia  
aquosa cognoscenda omnis aditus lucis intercludatur, & ob-  
iecta candelâ cerea, videatur nunquid pelluceat. Est enim ali-  
quando durities, quæ plenitudine & tensione fallit, vt videatur  
esse carnosâ, aut intestinalis, sed pelluciditas fraudem de-  
tegit. Sed quia pelluciditas conuenit etiam flatuosâ, ad leui-  
tatem respiciendum. Nam aquosa obscurior est & grauior,  
quàm flatuosa. Vbi constiterit de aqua, videndum quo loco  
contineatur. Qua in re veteres satis perplexi & confusi viden-  
tur. Galenus de tumoribus scribit in tunicis, quæ testes am-  
biunt, contineri. Paulus in corporibus scrotum implicanti-  
bus. Celsus integris membranis colligi: alij ruptis etiam &  
relaxatis. Alij modò intra tunicas, modò intra membranas.  
Si inter tunicas, vel inter summam & mediam, vel mediam  
& imam. De loco certè & ad prædictionem, & ad curatio-  
nem non est ambigendum. Nam aliquando in superficiali  
scroto continetur: aliquando profundius. Sed cum testiculus

*Ileon solum,  
vel cecū pro-  
cidit in her-  
nia.*

*Hydrocele.  
Pneumatocèle  
Sarcocèle.  
Cirrocèle.  
Enterocèle.  
Epiplocèle.  
Bubonocèle.  
Oscheocèle.  
Seminis col-  
lectio inter  
testiculi tu-  
nicas herniâ  
ementitur.*

*Aqua quo  
loco in hy-  
drocele con-  
tineatur.*

duabus tunicis insignibus inuoluatur, erythroide, quam sequitur dartos, ferè semper hydrocele fit, vel inter has duas, vel in toto scroto. Hic totum scrotum intumescit sine rugis, vesicæ inflatæ simile. Illic tumor tantum in testiculo percipitur, videturque rotundus & tensus rugato & laxiore scroto. Aliquando, ut Paulus scribit, peculiari quadam tunica humor ille comprehenditur, quæ supernascitur, veluti atheroma quoddam, aut steatoma, ut videatur esse tertius testiculus. Quinetiam videre contigit in puero Typographi filio tertium testiculum. Nec desunt, qui asserant quibusdam familiis peculiare esse, ut tertium habeant testiculum. In mulieribus Aëtius tumorem aquosum fieri scribit circa pudendi alas inflationi similem, debilem, mollem, ut humor fluctuans appareat, modò in vna parte, modò in utrâque tantum. His perspectis de humoris natura cogitandum, an tenuis, an albugineus, an sanguineus & sæculentus, ut naturæ humoris remedia adaptentur. Si ægro venter tumeat, symptoma est hydropis. In pneumatocoele similia omnia, nisi quòd, ut dixi, perspicuitas & leuitas maior adest, quia dilatio fit à flatulento spiritu. Fit aliquando vel in quatuor vasis testiculos alentibus, vel in arteriis darton intercurrentibus. Ille durior, nec compressu digitorum euanescit, recipitque curationem: hic oppresso digito intrò recurrit & euanescit, vixque curatur, periculo ab incessabili sanguinis profluuiio imminente. Fit sine hydrope, & cum hydrope. Sarcocoele, tumore, duritie & colore ubique sui simili dignoscitur. Est enim tumor rotundus, oblongus, durus, formam testiculi referens, qui longo tempore pedetentim increuit. Quibus duobus ab enterocoele distinguitur, quæ mollior est & repente oborta. Fit à carne duriore in aliqua scroti parte nata. Galenus ad scirrhum refert. Aliquando testiculi, aliquando nerui, à quibus testes dependent, indurantur, aut inter tunicas caro illa generatur. Causæ sunt, fluxio, ictus, succissio ramicis non rectè curata, & similia, quæ scirrhos procreant. Cirfocele, id est, varicosus ramex, cum venæ intumescunt testiculum nutriendes. Sentitur diuersitas tumorum & paruitas in epididymide & vasis spermaticis, quæ sunt veluti conglomerata & intorta. Paulus vasorum aut darti dilationem *κίρρως*, id est, varices simplici vocabulo appellat: eo-

*Paul. Æg.  
cap. 45. li. 6.*

*Sarcocoele ab  
enterocoele  
duobus modis  
distincta.*



## DE MORB. INTERNIS

rum verò, quæ testiculum nutriunt, *κρσοχήλην*. Celsus ex loci varietate quatuor differentias facit, omnesque vno nomine comprehendit. In enterocele signa sunt, tumor mollis, repente natus. Augetur vel minuitur pro ratione materiæ collectæ. Clamore & cibi satietate crescit, frigore contrahitur, scrotum multum distentum apparet, magis in vna, quàm altera parte. Tactu sæpè discernuntur excrementa indurata, nec excerni possunt, vt videatur iliaca passio. Cum ad inguen retruditur, murmur flatulentum percipitur. Quod fit, cum æger supinus iacet, & quiescit. In epiplocele percipitur veluti strophium molliusculum, lubricum, inæquale: tumor parvus, frequentius in osse pubis, quàm scroto. Idem semper manet, siue à cibo, siue ante cibum, & quouis modo collocetur, aut hûc & illûc moueatur corpus, nec retento spiritu adeò increscit. In his duobus videndum an ruptum sit peritonæum, an relaxatum. Ruptura fit in lateribus ossis ilium post saltum, ictum, vehementem corporis contorsionem. Initio tumor parvus, progressu temporis augetur. Paulatim enim magis disrumpitur peritonæum. Quæ tumorem faciunt, in summa cute apparent, quia extra peritonæum dilapsa sunt, atque à sola cute integuntur, magisque suprà scrotum. Dolor punctorius sequitur, & quasi lacerans. Contrà in relaxatione. Tumorem enim efficientia cum maiore renixu sentiuntur, quia intendunt meatum illum peritonæi, per quem vasa & muscoli cremasteres descendunt, videnturque esse in secundo vase, quæ vbi in ventrem recipiuntur, tumor cessat. Si vel omentum, vel ileon remaneat in illo meatu, nec perueniat ad scrotum, bubonocèle erit, in ipso nimirum inguine affectu consistente. In mulieribus fit ob fœtus magnitudinem aut multitudinem. Alioqui rarè hernia laborant, quòd peritonæum firmiter continendo fœtui habeant. Omnium periculosissima enterocèle, præsertim si reduci nequeat intestinum. Sinistra parte adhuc grauior, vbi cœcum conuolutum definit in rectum, & multa intestina tenuia incumbunt. Quibusdam inde singultuosæ febres, in quibus reposito intestino, mors acceleratur. In aliis non reposito, gangræna. Experientia etiam docuit paulò post mori quibus vi reponitur.

Carnosa insignis non curatur, sed testiculus extrahen-

*Enterocèle  
signa.*

*Peritonæi  
rupti notæ  
à signis eius-  
dem relaxati  
distinctæ.*

*Enterocèle  
omnium gra-  
uissima præ-  
sertim si sini-  
stra parte in-  
cumbat.*

dus. Neque cirsocele, sed minùs molesta est. Epiloon ob mol- *Sarcocoele in-*  
 litiem vix reducitur. Remedia adhibenda vacuato ventre à *signis nō eu-*  
 stercore & flatu, blando clystère aut medicamento. Inunctio- *ratur.*  
 nes, sacculi, ligamenta, subligaculum, decocta, emplastra. Ex-  
 tremum remedium in ferro. Alij aperiunt ventrem ad intesti-  
 na, vt dissito retrahatur intestinum. Id fit supra ilia, via ad va-  
 sa spermatica, quæ proinde separantur, & peritonæi locus  
 constringitur, non colligatur, ne impediatur generatio. Peri-  
 culosum certè remedium, & sæpè frustra tentatum: ex quo  
 gangræna oritur & mors, vt cuidam in suburbio sancti Ger-  
 mani. Alij sectionem faciunt ad ilia: vbi alligant productio-  
 nem illam peritonæi simul cum vasis spermaticis. Deinde cu-  
 rant vulnus callo illic obducto. Alij id faciunt punceto vo-  
 cato aureo in ilibus, quæ permeant vasa spermatica, acu du-  
 cta, & exceptis vinculo vasis illis & vicinis corporibus. Ex-  
 perimentum fit contrectato & deorsum tracto testiculo, vt  
 intelligas, an sit vas spermaticum. Et certè si quis vasis illis  
 non ligatis constringere posset peritonæum, neque testicu-  
 lus excidendus esset, neque impediretur generatio. In aquo-  
 so quoque ramice si nihil efficitur fomentis, cataplasmatibus,  
 emplastris, diætâ, purgationibus, ad incisionem, punctio-  
 nem, cultellum, cauterium actuale, potentiale veniendum.  
 Habita tamen ratione corporis, viscerum, partis affectæ,  
 & multis diebus preparato ægro, ad mensem aut 40. dies  
 adhibitis emplastris superiori parti, qua humor defluit. Se-  
 ctio periculosa è cultello. Multis gangræna inde mota, atque  
 inde mors.

Melius cauterium potentiale, & alia remedia. Anno *Hernia a-*  
 1555. mense Martio in suburbio sancti Germani, nobili *quosa aperta*  
 cuidam cultello aperta hernia aquosa, vnde in gangrænam, *salutaris.*  
 dolorem intolerabilem febrem & delirium incidit, vnde  
 mors ab omnibus expectabatur. Exclusa multa aqua per  
 vrethram, concisa magna parte gangrænx, conualuit præter  
 expectationem. Cauendum quoque, ne assiduo fotu exco-  
 quatur testiculus & corrumpatur, vt vidimus contigisse in  
 aquoso ramice.

DE MORB. INTERNIS  
ANTO. VALETII EXERCIT. LXII.

**H**erniarum frequentissima enterocoele non peritonæi folius, sed ipsius quoque tendinis eius musculi, cui peritonæos tunica innititur, morbus est, isque in situ, ob intestini ad alterutrum inguen, aut ad scrotum prolapsum. Hic si negligatur, testiculi corruptelam affert, ut ad curationem hic quoque sit auferendus. Purgato corpore clysteribus (qui minore quantitate, sed irritante facultate, imperari debent, ne portio in prolapsum intestinum feratur) vel catharticis, adeoque prægresso fotu intestino reposito, sumpta & admota adstringentia proderunt. Itaque ex conferu. symphyti maioris, cortic. citr. condit. cum puluere osmundæ regal. bol. arm. terr. sigill. ros. rub. mastich. & similib. condita paratur. Admouentur hæc.

℥. mastich. sarcocoll. glut. pisc. ana ʒ. β. radic. consolid. maior. osmund. reg. sigill. Salom. ana ʒ. 2. Dissoluantur gummi in aceto: radices bene purgentur, cum oleo de spica & costino f. emplastrum, quod pinsatur cum saliuâ limacum.

Vtilissimum quoque est emplastrum è limacibus tritis cum thure, mastiche, bdellio. Item.

℥. massæ emplastri contra rupturam ʒ. β. mastich. sarcocoll. glutin. pisc. ana ʒ. 2. cum oleo mastich. & costin. fi. emplastr.

Priusquam applicetur, vngatur locus pinguedine cerui. Mirabilis est Hollerianæ herbæ, herniariæ propterea appellant, ad hunc affectum profligandum efficacia. Eius aquæ stillatitiæ arte Chymica extractæ vnico haustu, cum tentata alia remedia non responderent, paucis abhinc diebus curatus est adolescens in gymnasio Haricuriano, cui citatior sal-

tus insignem herniam conciliârat. Admotum autem emplastrum huiusmodi.

℥.emplastr. contr. rupt.& de grat. dei ana ʒ. i. sang. drac. puluer. radic. ofmund. regal. oliban. puluera. ana ʒ. 2. cum modico olei myrtill. molliantur in igne, & f. emplast. super alutâ.

*De arthritide.*

*CAP. 63.*

**C**Vratio in 1 vacuando & roborando. Vacua-  
mus & repellendo, & diuertendo, & propriè  
vacuando in cautionem, & initio morbi, etiam si  
arthritidis frigida est. Si quidem nihil aliud prohi-  
bet, detrahendus sanguis est. Ischio, id est, coxa,  
vel crure laborante 2 venas brachij diuidimus. Et,  
si quidem fluxio est à capite, 3 mediam: si à reli-  
quo, corpore basilicam.

4 Hippocrates non satis manifesta ratione ve-  
nas post aures aperit, vbi coxendix afficitur. Ara-  
bes vehementer laudant phlebotomiam ex inter-  
uallo annularis & parui digiti.

Brachiis laborantibus deplendus sanguis est è  
crure, & perpetuò secundum rectitudinem. In co-  
xendice post phlebotomiam è brachio, venam po-  
plitis & malleoli incidere oportet. Multò magis, si  
sanguis in causa est.

Quòd si dextrum crus, dextrum item brachium  
laboret, è sinistris membris vena secanda est. Si  
verò in omnia membra dolor sparsus est, ex eo,  
quod minùs laborat.

*Purgatio.*

In biliosa arthritide & serosa Arabes 6 fortiori-  
bus cathartici vtuntur. Alij primùm quidem leui-  
oribus, vt cassia: deinde fortioribus. Melius fuerit

*Arthritis enim ex humo-  
ris morbi-  
fici copia &  
articuli im-  
becillitate na-*

*scitur. 2 Ad pro-  
hibendū mor-  
bificā mate-  
ria genera-  
tionem, et ad  
fluentis re-  
uulsionem.*

*3 Et hepa-  
tis & visce-  
rum ratio ha-  
beatur.*

*4 Aph. 22.  
sect. 5. lib. 6.  
τῶν ἐπιδημ.*

*6 Vt diacar-  
tham, electa-  
rio de succo  
rosarum.*

# DE MORB. INTERNIS

7 *Ut castia, catholico, syrnp. ros. pallidarum laxatio.* partem materiæ leui 7 pharmaco repurgare. Quod est reliquum, partim 8 vrinis, partim sudoribus excludendum.

In pituitosa aluus magis ducenda, vt cum 9 melancholia in vitio est. Solo 10 potu lactis asinini, & decocto radicis graminis dulcorato cum modico saccharo, calidæ arthritides internæ curantur. Purgationes ex superioribus repetendæ sunt, & maxime ex morbis capitis. Peculiariter laudatur purgatio, quæ fit ex hermodactylis. Græcis & Arabibus pilulæ sunt de hermodactylis paratæ in officinis: maiores, in causa frigida: minores, in causa calida. Minoribus rhabarbarum: maioribus agaricum adiicies, vt massæ pilularum 3.1. sit, reliquorum 3.1. Græci hoc modo.

II *Vel. 4. aloës, hermodactyl. myrobala. turbit. colocynthid. sagapeni ana 3.6. castorei, sarcocollæ, opopanax, euphorbii, rutæ agrest. ana 3.3. cum succo brassicæ f. massa.* 4. II hermodactyl. 3. 3. anisi, cumini, piperis communis & longi, croci, medull. semn. Cartharmini ana 3.1. moschi Gra. 2. cum aqua saluiæ fiat massa. Dosis 3.4. ex hydromelite. Arabes hoc 4. hermodactylorum 3.3. 3. cumini, zinziberis ana 3.1. trita incorporentur cum melle. Datur cum aqua tepida. Hæc in pituita magis cōueniunt. In biliosa singulis dosibus grana duo aut tria dacrydij adiici possunt. In biliosa hoc modo componunt.

4. aloës 3.1. dacrydij Gra. 15. rosarum rubrarum, sem. apij & fœniculi ana 3. 3. hermodactyl. 3.3. mastichis 3.2. rhabarbari 3.1. sacchari 3.3. Fiat puluis, detur ex aqua calida.

Vtuntur electario de succo rosarum & diacydonio cathartico in biliosa. In pituitosa 3. 3. turbit gummosi in lacte cocti, vt expressio bibatur. Neq; reformidant 3.1. dacrydij cum saccharo rosato.

Compar-

Comparant & pilulas ex 3.3. sarcocollæ, serapini vel opopanacis. Sed videndū in vſu fortium pharmacorum, ne æger macilentō ſit corpore, virtute non ita firma, maximè ventriculi & inteſtinorum. Periculum enim inde ſit, ne citetur dyſenteria. Et hermodactylus natura ſua ſtomachum lædit. Propterea quidam è veteribus non radice, ſed herba eius utebantur: nihilominus adiectis, quæ ſtomachum roborant.

Alexāder loco hermodactyli corronopodio herba utebatur.

Plurimū laudantur hæ pilulæ, nec ſtomachum lædunt.

℞. agar. 3. i. nucis moſchatae, zinziberis ana ʒ. ſ. infundātur in aqua menthæ. Fiat levis feruor ſuper calidos cineres. Materiæ expreſſæ adde rhabarbari ʒ. 4. pul. hieræ diacoloc. 3. i. ʒ. dacrydij ʒ. ſ. cū infuſione, ex aqua menthæ ſiāt pilulę. Doſis 3. i. vel ʒ. 4.

Quinque topicorum ſcopi. Topica ſunt, vt 12 dolo-rem leniant, 13 repellant, 14 coquant, 15 diſcutiant, 16 roborent. Celebre iam olim, nunc etiam frequentatum remedium.

℞. 17 medullæ panis P. i. diſſoluatur in lacte calido muliebri, bubulo, vel ouillo, cui adde croci 3. ſ. Et ſi vehemens dolor fuerit & calor, adde opij ʒ. 3. i. ad 3. 2. plus minusve.

℞. tria 18 albumina ouorum benè agitata & deſpumata cū 3. i. oleioſati, miſce. Linteola in medicamento madefacta applica. Aliud.

erato parti admoueantur. Deinde parari poterit cataplaſma ex foliis hyoſcyami in lacte bubulo coctis. quod miſcificè proderit. 18 Ouorum albumina non æque proſunt. Nam exitu prohibent humorem.

12 *Tempéra-  
tiōe humoru;  
& habitus  
reſtitutione.*  
13 *ſucroſſan-  
do, acrimo-  
niam inſtrin-  
gendo.*  
14 *Pep. ſm̃  
mitificando  
inducant.*  
15 *Inaſpe-  
ctabilem pur-  
gationem &  
diaphoreſim  
faciendo.*  
16 *Partē ni-  
mirū inſir-  
mam.*  
17 *At ineūte  
morbo ſumes  
micam panis  
ſiliginei q. ſ.  
maceretur in  
aquaroſacea;  
deinde coqui-  
tur in lacte  
vaccino ſ. ca-  
taplaſma. Ac  
ſi pars ſit ru-  
bore ſuffuſa.  
℞. aquę ʒ. ʒ.  
tig. ʒ. i. ſolani  
ʒ. ſ. aceti ʒ. 3.  
i. ʒ. but. ʒ. ſpic-  
niæ eo oxy-*

## DE MORB. INTERNIS

$\mathcal{L}$ . cetussæ  $\mathfrak{z}$ . 2. dissolue in aqua endiuixæ & modico aceti, fiat liquidum vnguentū. Quòd si ad narcotica per doloris vehementiam deueniendum est.

$\mathcal{L}$ . ol. ros.  $\mathfrak{z}$ . 4. opij  $\mathfrak{z}$ . 2. concorporentur. Aliud.

$\mathcal{L}$ . butyri recens.  $\mathfrak{z}$ . 2. mandragoræ subtilissimæ tritæ  $\mathfrak{z}$ . 1. misce.

$\mathcal{L}$ . lactis muliebris  $\mathfrak{z}$ . 2. opij  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . Alia sunt etiam aliis locis descripta. Sola aquæ frigidissimè perfusio, vel niuis, aliquando satis esse potest.

Verbasci flores & folia, lenticula palustris, psilium nymphaea, violaria, portulaca & similia trita per se, vel cum rosaceo, apponuntur calida. A quibus leuiter digerentibus vtendum est, vt cerato ex oleo chamæmelino, anethino, de liliis, & similibus.

In frigida conuenit oleum, in quo enula, aristolochia, gentiana, nepitha, rosmar. iua, id est, chamæpithys, saluia, maiorana, coxerint. Leuius, in quo radix althææ, vulpes, vermes terreni incocti sint. Laudatur & oleum raphaninū, aut in quo 19 galbanum liquefactum sit. Oleum de terebinthina, oleum expressum è granis tritici, vel nuce moschata in lamina ferrea candente, quibus aliquando axungie commiscentur. Arthritidem frigidam & ventosam fots ex decocto origani, meliloti, chamæmeli, & spongia eodem decocto imbuta, patientiq; loco applicita, percurat.

Laudatur plurimū 20 humana & vrsina. Oleū, in quo folia ebuli coxerint, vel succus radicis eius.

Sunt qui dolentem locum primū quidem frigidissima perfundunt, idque diutiùs: deinde è petroleo fouent.

Quædam occulta proprietate profunt, qualia

19 Imò Ca-  
storeū ipsum  
fi dissoluatur  
in oleo lum-  
bricorum mi-  
rifice confert  
ad frigidam  
arthritidem.  
20 Vt.  $\mathcal{L}$ .  
axungia hu-  
manæ lb. i.  
fol. lauri, cha-  
mæpytheos,  
saluia, maio-  
rana an. M.  
 $\beta$ . Coquatur  
i balneo ma-  
rie. Deinde  
illatur lo-  
cus affectus.

sunt ossa comminuta potui data. Deplume caput miluij crematum & tritum, corium canis marini admotum loco, corium torpedinis, stercus, vt cum adipe vsino fiat vnguentum.

Pulli ciconiæ, pulli cigui in oleo cocti, vt oleo medulla ceruina misceatur. Historia est Sexti Pompei, qui pedibus immisissis acervo tritici persanatus est: 21 quod remediū postea Medici sequuti sunt.

21 Minime  
tamen pro-  
bandum est  
id remedium,  
si frigida sit  
arthritis.

In tophis casens inueteratus, acris, maceratus in decocto cruris suilli salsi, vt inde fiat emplastrum.

Stercus caprinum in oxycrato dissolutum cum farina hordeacea. Sed hæc durioribus corporibus. In mollioribus axungia, radices althææ commiscendæ sunt. Aliud.

℥. collæ, id est, visci, terebinthinæ, ceræ ana 3. i. galbani 3. 3. liquefactis vtor.

Vsus mythridatij & theriacæ post bene purgatum corpus.

Laudantur Græcis & Arabibus balnea, si nulum viscus infirmum est, si vacuatum corpus, remissionis tempore munita prius ægra parte ex puluere boli armenæ. Incorporato in oui albumine, vel hoc medicamento.

℥. corticis granatorum, sumach. ana P. 2. Coquantur ad mollitiem. Incorporentur cum P. 3. farinæ hordei & succi semperuiui, applicentur loco. Hæc autem, ne balneo liquefactus humor in partem infirmam defluat. Quibus remediis & in repellendo vtilicet in fine morbi, & ad cautionem. Origanum, menthastrum, nepitha in aqua salsa diu coquantur. Inde fit fotsus, vel vna parte salis, tribus aquæ & olei mixtis, locus affricatur.



## DE MORB. INTERNIS

Abſtinentia vini multos ſanauit. Balnea quoque naturalia ad cautionem conueniunt.

Vere & Autumno podagræ excitantur, Aprili ſerè & Septembri. Itaque priùs cauendum eſt. Humor ſerè calidior chiragræ: frigidior podagræ.

22 *Iſchiadicos vt cures, primùm quidem ( ſi nibil te auocet ) in vomitum im-* In 22 Iſchiadicis venæ ſectio, vt priùs, ita & purgatio.

*ferabis, neq; medicamētū purgās præſcribes. Deinde ad clyſteres lenientes, hīc acres, veniendū eſt. Poſtea vrò cum materia pugnādū eſt. Admouendū cataplaſmatum materiam vide libro 10. κατὰ τὸ πρῶτον.* Clyſteres acres, cucurbitulæ loco affixæ. Repellentibus abſtinendum. Fortioribus remediis vtendum, phœnigmis, hiberide, naſturtio, dracuntio, batrachio, & ſimilibus. Cauterio, incifione cum ferro, vt in Eupolemo Hippocr. fieri oportuit initio lib. 5. Epid. Hæc eadem reliquis arthriticis, vbi contumacius malum eſt. Inuentum quoque hoc remedium eſt, vt ſuperiori parte, qua humor influit in articulum, caro nudaretur, venæ hamulo exciperentur, vinculis interceptæ ſecarentur, atque ita via fluxioni præciditur. Plurima remedia ſcripta inuenies apud Aëtium.

### EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Oſſa inter ſe connectuntur tribus modis in vniuerſum: vel enim inuicem coaleſcunt, modò ſine alicuius materiæ interuentu, vt in mollioribus & fungoſis: modò intercedente aliqua materiâ, vt in duris & ſiccis, per ſymphyſin: vel ita committuntur inter ſe, vt obſcurum habeant & difficilem motum per ſynarthroſim: vel manifeſtum & euidentem, per diarthroſim. In prima connexionione articulorum dolores non fiunt. In ſecunda rarò, niſi tophi & œdematoſi tumores, vt in articulationibus carpi, aut metacarpij. Tertia arthritidis ſedes eſt, inter membranas, tendones & ligamenta, quæ oriuntur à periſtio, & proinde ſenſum habent, ex quibus omnibus firmatur articulus. Vnde dolor vehemētiffimus excitatur, ſi qua materia illuc intercipiatur, ſiue acrimoniâ, vt bilis: ſiue frigidityte, vt pituita: ſiue aſperitate, vt gypſea: ſiue diſtentione membranarū

& ligamentorū, aut inflammatione, quod ab omnibus humoribus fieri potest, sanguine, pituita, & utrāque bile cum propriis symptomatis cuiusque humoris. Oportet autem intra ipsum articulum contineri, antequam verè dicatur arthritis. Si enim vel sola intemperies adsit, vel humor diffusus per carnem partēque circumiacentes, diuersa est affectio. Nam quòd Hipp. scripsit articulorum dolores fieri in siccitatibus, id non est intelligendum de arthritide, vt scribit Galenus, sed dolore, & difficili motu, qui fit absumpta humiditate, nisi quis, omnes articulorum dolores hoc nomine complecti velit, aut eum locum interpretari de biliosa arthritide, quæ fit immodicè calida temporis constitutione, aut sicca, quibus infirmis redditis articulis talis humor defluit. Imò Galenus podagræ materiam contineri tantum vult in articulis & ligamentis, quæ tenduntur, non neruis & tendonibus, quæ duntaxat ad tensionem aliorum contenduntur: argumento quòd inde non fuit visa conuulsio. Fluxionem enim humoris suscipiunt, primum quidem loca articulationum, deinceps omnia ad cutem vsque circumstantia. Verisimile tamen non est materiam ad articulum confluentem imbibi, & durissimis ligamentis, non mollioribus neruis, & tendinibus. Proinde Aërius non solum distendi, sed permalescere scribit. Materia hæc aliquando tenuis est, aliquando crassa vel tenax, nonnunquam simul & crassa & tenax, aut etiam gypsea, resoluta tenuiore parte. Colligitur enim duobus modis per affluxionem ab aliis partibus, & per congestionem malè concoquente parte. Hæc naturam partium retinet, nisi quòd mora & dolore incalescit, & aliundè nouam materiam recipit. Per congestionem magis fit in morbo Gallico sine tumore, cum dolore totius perioestij. Quæ fit per defluxionem, ferè materiam mixtam habet, & distentione, ac calore concepto potius dolorem parit, nomēque accipit à parte affecta. In pedibus, podagra: in manibus, chiragra: in coxis, ischias: in multis simul articulis verè & propriè arthritis nuncupatur. Tria igitur hîc consideranda: pars, quæ recipit: origo fluxionis, & via, per quam fit. In parte necesse est imbecillitatem esse, alioqui nunquam admittere fluxionem. Et contrahitur contagione seminaria à

*Arthritis non fit, nisi humore cum articulū obfidente.*

*Aëtius ca. 7. Tetrabibi. 3. Serm. 4.*

*Tria in arthritide consideranda.*

## DE MORB. INTERNIS

parentibus podagricis, in quibus semen erat vitiatum: deinde venere: postremò consuetudine fluxionis, & qualibet intemperie, aut laxitate. Non tamen necesse est, si adsit hæc imbecillitas, articulare morbum generari, si in vita æger nihil deliquerit, vt ait Gale nus. Nam humor non influet, si corpus liberum sit cruditatibus. Vnde etiam Poëtæ

*Podagra Bacchi & Veneris filia.* Græci podagram Bacchi & Veneris filiam esse sinxerunt. Hippocrates quoque ob eandem causam eunuchos, mulieres, pueros ante usum venereorum podagra non laborare dixit. Quod intelligendum est, modò temperanter viuant. Nouimus tamen eunuchum Podagricum, cumque vehementer. Seneca quoque epistola quadam ineligitur in mulieres, quæ per luxum Hippocratem mendacem fecerint. Sed reuera mulieres multò rariùs eo morbo corripiuntur, quàm viri, ob menstruam purgationem. Et si laborent sæpiùs menstrua defecerunt, vel pauciora sunt quàm prohibendis vitiis conueniant. Alioqui vitam maximè immoderatam esse oportet. In pueris autem, cum ad pubertatem peruenerunt, naturalis est motus feminis, vnde rarefcit corpus & relaxatur. Accedente venere, concussio, motus, concalfactio articulorum, ex quo celerius eò materia decumbit. Atque etiam inde fit vt podagrici magna ex parte sint salaces, tum ob assuetudinem, tum ob frequentiore neruorum rigorem

*Arthritidis futura duo præcipua remedia.* atque intensiorem. Adde quòd crebro in dorsum decubitu humores ad partes genitales confluunt, Ob idque duo præcipua remedia podagræ futuræ esse putamus, abstinentiam à venere & vitam frugalem. Seminaria autem quatuor, imbecillitatem hæreditariam: Veneriem: vinum præsertim forte: & cruditatem ex intemperata vita. Origo defluxionis est à

*Arthritidis quatuor semina.* capite, vel hepate. Illiè intra tunicas tendonum per foramen nuçæ pituita exudat, quæ per palatum, aut nares expurgari debebat. Hic veidò cum venæ magnæ & hepar copia grauantur, quam continere non possunt, aut irritantur qualitate aliqua vitiosa. Sic vel à plénitudine & redundantia venarum fiunt defluxiones in articulos, vel à recrementis aliarum partium, vt cerebri. A capite autem defluxionem fieri intelligimus, si grauitas capitis & ceruicis præcesserit, sæpèque frigus vel horror paruus sentitur

A venis magnis internis, si citra hæc dolor præhendat partem aliquam, sed cum febricula, vel aliqua inæqualitate fiat, pars citò intumescat, rubeat, doleat, ab vna parte in aliam moueatur. Quibus autem viis fiat huiusmodi fluxio, non eadem est omnium sententia. Alij à capite sub cute materiam per summa corporis in extimas partes influere aiunt. Alij negant, quòd cum sit fluxionis species, partibus robustis ad imbecilliores sua excrementa transmittentibus, probabilius sit non solum secundum membranas neruósque, sed etiam per vasa, id est, venas & arterias eam fieri. Sed hoc vt verissimum est fluxione orta ab hepate, ita minùs consentaneum, cum pituita è cerebri ventriculis per spinalem medullam delabitur. Sic enim oporteret materiam è venis egressam rursus venas subire. Fluxionis modus est, quasi inundatio aluei & elu-  
 uies quædam in cavitatem articulorum, & partes vicinas. Sed cum per musculos sit transitus, dolor non percipitur ob laxitatem. Raròque defluxio sincera est à venis, cum in his humores omnes contineantur. Sæpiùs si vel à recrementis cerebri oriatur, vel per congestionem fiat, humor syncerus est. Podagra fit modò in articulo maioris digiti pedis, modò calcanei extremo, aut cauo pedis. A pedibus paulatim ad genua progreditur: hinc ad coxam & fœmorum iuncturas, postremò ad manus, vertebrae humerorum & maxillarum. Coxendicus tamen dolor sæpè fit multis, qui podagra nunquam laborârunt, fortasse à recrementis illius partis illi congestis, vel in eam tantum partem defluxis. Dolor profundus est, & cum mouetur crus sentitur. Causa quandoque est eluxatio, aut dissectio ligamenti, quod à periostio nascitur. In mulieribus à partu, aut cum vterum gerunt, dolor in parte interna inguinis, & magis ad interiorem partem, quàm exteriorè, continuus quoque, siue crus moueatur, siue quiescat, non est coxendicus, sed à ligamenti vteri ob flatû, retractiõnem, refrigerationem, contortionem vteri, & similia. Humor vitiosus deprehèditur tribus potissimum modis, doloris proprietate: antecedètib. v. victu, anni cõstitutione, ætate, regione tẽperamẽto: postremò cuiusq; humoris effectû. Multus enim humor distèdit: acris erodit, calidus calefacit, & frigidus refrigerat. Qualis quoq; aër est, tales in corpore generat humores

*Fluxionis  
modus in ar-  
thritide q. a-  
lis.*

*Humoris vi-  
tiosi in ar-  
thritide di-  
gnoscaas tres  
modi.*

## DE MORB. INTERNIS

ut & cibus, & temperamentum, & ætas. A sanguine color rubens, dolor pulsatorius, vehemens, tumor non solum venarum, sed totius particulæ. Neque refrigerantia admodum, neque calfacientia tolerant. Accessiones quotidianæ minùs diuturnæ, quàm à pituita. A bilioso sanguine multi caloris sensus, irritatio à calidis, à mitigantibus remissio: color subpallidus, subrubeus, quandoque flauo permixtus, nullus euidens tumor. Si locus tangatur, facilè sanguis subterfugit, citiùs ab vna parte mutatur in aliam. Exacerbationes ut plurimum tertio quoque die. A pituita, color subalbidus, aquæ inter cutem similis, tumor tactui cedens, dolor mediocris, sæpè nullus, exacerbationes quotidianæ diuturniores. A melancholia rarissimè fit. Color partis niger, frigoris sensus, dolor profundior instar scalpelli perforantis, exacerbationes quarto quoque die. Vere & Autumno magna ex parte mouentur dolores arthritici, ut scribit Hippocrates in Aphorismis. Signa præcedentia sunt, quod non tantum mingunt, aut sudant, quam solebant, & quò humor crassior est, copiosior, densiore membrana inclusus, aut imbecillitas maior, eò diutiùs durant huiusmodi dolores.

Cura in præcautionem & curationem distribuitur. Remedia varia, & ex aliis petenda. Admouebimus tantum dupliciter hic peccari in topicis admouendis. Primum, cum nulla de toto corpore habetur prouidentia: deinde cum digerentibus resoluta tenuiore parte, calli, artuum durities, articulorum curuitas inducuntur, aut pars affecta immodicè calefit, refrigeratur, siccatur, humectatur, aut fortiter attrahentibus materia copiosior è venis extrahitur.

### ANTO. VALETII EXERCIT. LXIII.

*Gal. comment.  
ad apho. 49.  
lib. 6. Apho.*

**A** Rthriticus dolor tactus deprauati symptoma est: quanquam improprie inflammatio dici possit, tunc fluxionis ratione, tum quòd inflammatio huius sit affectus inseparabilis comes. Huius causæ sunt quæ, fluxio, & articulorum imbecillitas. Fluxio qui-

dem humorum est, non modò articuli cavitatem subeuntium, & eiusdem imbuentium vinculum, sed præterea superiectas membranas, nervos & tendones, quæ partes propter sensum eximium vel calida intemperie, vel frigida, & solutione continui per distentionem à repletionem facta, maximè infestantur, occupatium. Ut est humoris species arthritidis causa continens, ita arthritidis frigida est, vel calida. Fernelius cap. 18. lib. 6. Patholog. aliquot rationum momentis, sed sanè leuioribus, quàm quæ debeant à meliore veterum dogmate nos abducere, omnis arthritidis materiam pituitosam esse omnino ac serosam contra Galenum arctissimè contendit. Addit & tenuem illum humorem, non è cerebro & interioribus eius ventriculis, sed à pericranio, parte capitis externa, extrâque caluam posita, non per spinalem medullam, per summa corporis sub cute deorsum decurrere. At, quæso, an calorem, ruborem, febrem, quæ arthritidem ferè comitantur, pituitoso potius, quàm feruenti humori, ut calido & bilioso, adscripseris? Fiunt dices, non à natura humoris, sed à distensione. Cur igitur idem œdematum generi non vsuuenit? Deinde aliquis (gratia exempli) ætate iuuenili, ætate media, antegresso victus genere bili generandæ accommodato, consentientibus etiam symptomatis humoris biliosi propriis, arthritideprehendatur, an eam potius à bile, quàm à pituita, quæ isto in corpore nullo modo peccat, fieri dixeris? Quinetiam ad arcendam arthritidē non perpetuo idonea esse eadem remedia cōmunis docet experientia: siquidē dolori alicuius sedādo, ut biliosæ, competit oleū rosaceum, quod pituitosæ noxium,

*Fluxionis  
modus in ar-  
thritide.*

*Fernelij de  
arthritide op-  
inio non se-  
renda.*

## DE MORB. INTERNIS

Sic humorem biliosum mitia digerentia satis resolvunt : pituitosum verò minimè, sed vehementiora longè requiruntur. Quod autem pericranium pars non sit transmittens, à qua omnis fluxio fiat, hinc colligitur, quòd reperiantur multi arthriticis doloribus grauitè afflicti, qui priùs nec capitis grauitatem vllam, nec vllum perceperint dolorem : cùm tamen ex Hippocr. libr. de Natura humana omnis pars transmittens, excipiènsque laboret in omni humorum decubitu, suisque symptomatis se prodar. Præterea à pericranio in spinalem medullà qui potest esse aditus? Probabilius enim est fluxiones in spinalem medullam fieri à cerebro, ex quo oritur. Et quid vetat, quo minùs sanguis, qualiscunque sit in membranarum & cerebri venis, huiusque sinibus, per venas & arterias deuolui, deorsumque relabi possit, omnèque fluxionis genus parere? Adhæc sententia est Hippocratis. *Cui intestinum à dextra parte, articularum morbo laborauit, erat quietior : postquam verò id curatum fuit, erat dolentior.* Galenus in commentar. id fieri scripsit conuerso humorum impetu à colo intestino in articulos. At humorem eiusmodi semper à pericranio decidere quis dixerit? Accedit hûc, quod plerique obseruarunt, à diarrhæa intempestiuè cohibita arthritidem nonnunquam subsequi. Qui Fernelij partes mordicus tenent, validas huic sententiæ machinas admotas putant, si soli capiti adhibitis remediis tentatis frustrà aliis, se fortè arthritidem curâsse profiteantur. Sed hoc minùs verisimile. Reliquum ergo statuamus humorem morbosum magna ex parte ex capite, toto corpore, hepate, liene, manare.

*Hippo. sent.  
3 sect. 4 lib.  
6. Epid.*

*Diarrhæa  
intempestiuè  
suppressa ar-  
thritidē at-  
tulit.*

*Arthritidē à  
causa calida  
curatio.*

Morbus hic vt liberatu, sanatuque difficilis fit, non tamen lethalis est. Consuetudo enim fluxionis in habitum cum concesserit, non finit magnam, ingentemque copiam colligi, verum ex facilitate perpetiendi in consuetos articulos excrementa illabuntur. Statim itaque si à calida sit materia, vena partis oppositæ incidatur: aut, si venæ sectioni non sit locus, clementior purgatio è cassia, cathol. rheo, syrup. laxat. ros. pallid. imperetur. Atque etiam ipsis in initiis oleum rosaceum, vel omphacinum pauco aceto perfusum parti affectæ admoueat, quod repellendo & roborando sit. Deinde verò temperantur atque incrassantur humores syrupis accommodatis, de quibus in aliis affectibus biliosis diximus: postremò cholagogis vacuantur. Pilulæ de hermodactylis, Arabibus alioqui tantopere commendatæ, suspectæ sunt, nisi in robustis corporibus, quòd hermodactyli ventriculo plurimum noceant. Adde quod veris caremus hermodactylis. Topica anodyna sunt infinita. In ardore magno vtilissimum vnguentum ex æquis populei & vnguenti nutriti partibus. Vel.

℞. cerat. ros. ʒ. i. mucag. semin. psilij ʒ. β. opij ʒ. β. croc. gra. 4. hæc postrema lacte vniantur, deinde cum aliis misceantur addito rosaceo, pro vnguento.

Cum autem inclinat morbus, ex coquentibus oleis, & discutientibus, vt chamæm. sesamin. liliac. anethino, additis eius generis farinis, pulueribus & adipibus cataplasmata fingentur. Vel.

℞. mucag. semin. lini & scænogr. extract. in aq. chamæm. ana ʒ. 6. adipis anatis & gallinæ ana ʒ. 2. cum cera pauca & oleo f. vnguent. Inunctæ ex eo parti succida lana superponatur.



## DE MORB. INTERNIS

Cum de præcautione tantum agitur, sufficiet incunte Vere & Autumno venam secare, & purgationem, cæteris non repugnantibus, instituisse, nec non ad deficationem humorum, & laxitatem articulorum corrigendam, formenta ex adstringentibus, balauſtiis, malicorio, vino nigro & austero incoctis vsurpasse, vini vsu penitus subtracto.

*Arthritidis  
a causa frigida  
curatio.*

Arthritis autem cum à causa est frigida, purgantia primum requirit blandiora, vt ex rheo & agarico in aqua salu. beton. aut cephatico decocto infusis: deinde valida, sed præparatis antè humoribus, apozematis, & iis, quæ neruosum genus roborant, simplicibus. Materiam valenter purgant pilulæ aureæ, coccia, mollitæ cum aq. aut syrup. cephal. infusionis pauci turpethi benè gummosi. Hûc etiam pertinebunt anodyna statim principio adhibenda: vt ol. chamæm. vulpin. lumbr. tantillo addito rosaceo, donec fluxio desierit. Diaphoretica sint valentiora. In tophos aut nodos si abierit affectio, ferè semper insanabilis. Iuxta illud.

*Tollere nodosam nescit medicina podagram.*

Vulgò tamen ad ea emplastra parantur ex gummi ammoniac. opopan. bdellio, cum mucaginibus alth. lini, fœnugr. extract. in aq. vitæ, in qua etiam gummi dissoluuntur, adiectis medullis, adipibus, pulueribus salu. cyper. ircos, hermodactylorum cera & oleo sufficienti.

*Ischiadis  
curatio.*

Ischias grauissima est, quæ nullum certè præsentius habet remedium clysteribus sæpè ac sæpè repetitis. Etenim præterquam quod humorem in affectam partem ruentem reuellunt, oleorum etiam calore digerunt. Clysterum forma hæc erit.

℥. malū. bismal. violar. centau. minor. chamædr. chamæp. orig. puleg. calamenth. ana M. i. semin. anis. fœnic. ruth. ana ʒ. flor. rosmar. & chamæm. an. p. i. f. decoct. ad t̄b. i. In colatur. dissol. hieræ simpl. & diaphœn. ana ʒ. 2. mell. anth. ʒ. i. ol. lil. & chamæm. ana ʒ. i. β. f. clyster.

Paulatim augebis olea magis digerentia Sectio venæ in cubito lateris eiusdem reuellendo plurimum confert, præsertim si phethoricus sit æger. Interim quia acerbissimus est dolor, exterius anodyna applicentur.

℥. olei chamæm. & aneth. ana ʒ. i. puluer. chamæm. ʒ. 2. misce pro fotu partis.

Repellentia hîc nunquam vsurpanda: nam intrò humorem regerendo dolorem augerent. Lini-menta verò magis digerentia sensim imperatur. Vt.

℥. mucag. femin. lini, fœnugr. extract. in aqua. stillati-  
tia chamæmel. ana ʒ. i. puluer. chamæm. ʒ. 2. olei lilior. &  
aneth. ana ʒ. i. axung. anser. ʒ. 6. cum cera fiat linimentum pro  
parte affecta.

Efficacius erit hoc vnguentum.

℥. vnguent. dialth. vng. resump. ana ʒ. i. mucag. sem. lini.  
& fœnugræ. extract. in aq. chamæm. ana ʒ. i. β. puluer. ireos  
Florent. iuxæ arthrit. ana ʒ. i. β. emplastr. de meliloto ʒ. i. β.  
malaxentur omnia in oleo lilior. vel oleo de terebinthin. &  
modic. aq. vitæ f. vnguent.

Si his linimentis & similibus, quæ quisque suo-  
pte ingenio effinxerit, non remittitur dolor, cly-  
steres iterabuntur: à quibus parti fomenta insti-  
tuentur. Vt.

℥. malū. bismal. parietar. violariæ ana M. i. origani, ca-  
lament. puluer. chamæp. chamædr. agrim. ana M. β. ros. rub.  
p. i. f. decoct. in aq. comm. cum paucō vino albo, pro fotu  
partis cum spongiis.

Ex magmate eius decocti parari potest cata-  
plasma additis olei lilior. & chamæm. ana ʒ. 2. pul-

# DE MORB. INTERNIS

1 *Decanero* uer. chamæm. ʒ. 3. puluer. ireos Florentiæ ʒ. 2. axungia anseris, vel cati, vel teporis ʒ. 1. ʒ. cum cera sufficienti. Syluius probabat fotum ex vrina pueri biliosi. In cataplasmatibus vitanda nimium digerentia, ne tenuiore materia vacuata reliqua occalescat. Ad materiam ab alto ischio euocandam hoc emplastro utebatur Fernelius.

2 *Signis* significata pro priu, ex quibus non generatio, verum perfectio significatur. ʒ. gummi pini, resinæ nigr. ana ʒ. 1. hermodactyl. puluer. sulphuris vini ana ʒ. 6. aristoloch. vtriusque ʒ. 3. ireos Florent. ʒ. 1. ʒ. cum oleo lumbr. & cera f. emplastrum. Addes, si velis, adipēs digerentes.

Neque vero interim omittendæ sunt cucurbitulæ, quæ in hoc morbo tantam vim habent, ut primam partem respiciant. Affiguntur sæpè ac sæpè partibus superioribus, à quibus in coxendicem defluit humor. Si ex calore febris corripuerit, ut ferè fit, electariis vires recreentur. Medicamenta purgantia alternatim sumantur. Viscidis alimentis & siccis, itémque syrup. myrtill. cydon. cum aqua multa chalybeata, vino etiam crassiore, nisi febris inhibeat, sanguis ad omnem motum ineptus reddatur.

3 *Quod in habitu corporis omnino deprauata sit assimilatio, in visceribus corrupti sanguinis omniumque humorum perennis generatio* Si spes sit contractæ à lue venerea ischiados, decoctum guaiacini ligni, Cynaræ, falsæ Parillæ eri, ex vflu. Si præ dolore somnum inire non potis sit, frontalia & hypnotici syrupi imperabuntur.

*De 1 Elephantiasi vera. CAP. 64.*

Confirmata 2 Elephantiasi non 3 curatur. Recens 4 curari potest & prohiberi. Recentem autem volunt, quæ annum non superat.

Sæpiusque Medicus, ut de morbo iudicet, quàm ut eundem curet, appellatur. Signis itaque de mor-

bo 5 pronuntiandum est. Temperamentum ho-  
 minis spectandum est. Qui 6 sanguine sunt cras-  
 siore, huic vitio magis opportuni sunt, & aliquan-  
 do hæreditarium malum est. Locis calidioribus a-  
 dustus sanguis aut à frigore congelatus hoc malum  
 inuehit. A febribus continuis male curatis, ab usu  
 alimentorum & medicamentorum, quæ melâcho-  
 liam gignant, aut pituitam crassam, quæ nimium in-  
 cidunt & attenuant, aut aliter calfaciunt, nonnun-  
 quam huius mali initium est. His piger sensus &  
 motus, 7 spiratio retardatur. Durescit 8 aluus, vri-  
 næ 9 crassescunt instar iumentorum, aliquâdo te-  
 nues 10 minguntur, spiritus 11 olet grauius, 12 fre-  
 quens ructus & 13 sternutatio incitatur, 14 libido  
 incenditur, 15 concidit appetentia, crassescunt ma-  
 læ, mentum, superciliiorum locus, crura & manus,  
 16 labia crassescunt, tabescunt muscoli, & is pluri-  
 mum, qui medius est inter indicem & pollicem. Fit  
 corpus grandinosum. Sub lingua varicosæ venæ  
 nigricant. facies rubet ad luorem. Pili 17 è capite &  
 superciliis, decidunt, habitus corporis commutatur.  
 18 Fiunt pterygodes, quasi alati. 19 Satyros repre-  
 sentant. Somnia 20 molestissima, 21 incubi, mæror  
 & anxietas. Pulsus exiguus, imbecillus, creber, tar-  
 dus, rubent oculi, & in rotunditatem coguntur, rau-  
 cessit vox, nauium pinnae dilatantur inferiore par-  
 te.

*5 Ne conta-  
 gione morbus  
 ad alios ser-  
 pat.  
 6 Ob gene-  
 rationem hu-  
 moru melan-  
 cholicæ peren-  
 nium, quia a-  
 bundant fac-  
 ce. & facile  
 sanguis assa-  
 tur.  
 7 Oppressio-  
 ne cerebri, mu-  
 sculorum cõ-  
 tumacia.  
 8 Viscerum  
 incendio, &  
 humorum a-  
 vaρρονη.  
 9 Ex-pur-  
 batione in ve-  
 nis à fluitien-  
 to spiritu cũ  
 calore contra  
 naturam.  
 10 Viarum  
 obstructione.  
 11 Ab aluo,  
 pulmonibus  
 & cerebro.  
 12 Ab hu-  
 more melan-  
 cholico in aluum fluente, & cœctionis infirmitate.  
 13 Aucto symptomati pletho-  
 rica cerebro.  
 14 A suis humoribus & fluitento spiritu.  
 15 Alui impurita-  
 te.  
 16 Continuitate interiori tunica quæ aluo & labiis communis est.  
 17 Nam  
 neque aluntur, neque gignuntur.  
 18 Consumptione partis inferiori muscoli tra-  
 peziæ.  
 19 Mutato faciei colore, charactere, mole, auribus resortis.  
 20 Materiæ  
 somni feræ corruptione.  
 21 Oppressi lienis tumore.*

## DE MORB. INTERNIS

te, nares constringuntur, dyspnœa, mollis auricula contrahitur.

Excrementa olida, interstitium nasi corrumpitur, fixus intuitus. Quibusdā detractus sanguis totus corruptus non cogitur. Sal iniectum calenti & recens extracto sanguini non dissoluitur. Acetum iniectum sanguini non dissoluitur. Si ad spondylia colli transfiguntur, non sentiunt. Perit tandē extremitatū sensus. Oportet igitur vocatū Medicum, ut de re magni momenti pronunciet, hæc signa omnia percurrere. Quæ ut aucta sunt, ita aucti virij indicium est. Consilium est 22 Galeni, ubi eius mali suspitio est, ut Vere sanguis detrahatur, deinde resectis viribus exhibeatur medicamentum, quod atram bilem purget. Ratio vitæ instituat, quæ sanguinem crassiores attenuet, ac depuret.

22. Galen.  
lib. 2. Ad  
Glaucōn.

Vitato tamen immodico usu attenuantium rationem vitæ ex Aëtio & aliis colliges. Consensus est Græcorum & Arabum initio detrahendum eum sanguinem. Sed quia magna ex parte corruptus is est, particulatim ex utroque brachio detrahes, eligesque maiores venas, siquidem vires patiuntur, multò magis cum spiratio difficilior est. Alioqui venas extremæ manus, vel malleoli aperies. Nonnunquam etiā contentus eris sanguine, aut cucurbitulis cum scarificatione apposis partim tibiis, partim scapulis. Auicennas venas etiam capitis incidit & iugulares, si suffocatio imminet.

A sanguinis missione purgatio ex hiera diacolocynthidos, deinde etiam adiecto dacrydio: postremò etiam helleboro, sed interuallis hæc fieri oportet. Quo tempore cessamus à pharmacis, sero lactis,

lactis, lacte etiam & iis quæ humores 21 præparât, *23 Vt succo fumarie, & venonæ, scolo-*  
& depurant. Materia ex capite de melancholia. *pendrie, ce-*

Postea verò frequens vomitus. Primum qui- *therac.*  
dè è leuioribus: deinde raphano: postremò helle- *24 Ad vi-*  
borismo. Cucurbitulæ 24 inanes stomacho & vi- *scerum colla-*  
sceribus admouentur. Caputpurgia, gagarismata, *psorum resti-*  
vnctiones primum, vt è butyro: deinde vbi pruri- *tutionem.*  
tus est, ex iis, quæ detergent: postremò, cum vlcera- *25 Aquæ ege-*  
tæ partes, conueniunt quæ leuiter adstringunt. *lide scilicet*  
*ex decocto*

Balnea 25 primum dulcia. Persuasum 26 vulgò *fumarie, a-*  
est balnea comparata sanguine humano morbum *grimonia, be-*  
hunc perfanare. Deinde si pruritus est, naturalia *ta, mercuria-*  
conueniunt. In multis remediis brassicæ & absyn- *lis.*  
thij decoctum, stœchados, ligni 27 sancti, commē- *26 Hoc co-*  
datur. *mentum ri-*  
*det Gal lib.*

Optimumque fuerit cum his passulas, ficus, vio- *10. de sim-*  
larū flores, buglossi & borraginis incoquere. Mul- *plic. med. fa-*  
tò magis, si feruidior sanguis est. 28 Castratio, vt *cul.*  
singulare remedium, ab antiquis probata est. Sco- *27 Modò*  
bes eboris, cornu cerui, succus Cyrenaicus, aselli a- *marasmus*  
quarij, scyllæ semen, & hæc duo maximè contra *περισπύας*  
dyspnœam. Smaragdus trita, & ex aqua data, vel *viscerum te*  
cum aqua & gummi illita. Eriñacei caput lauda- *non auocet.*  
tur à Galeno, nepitha, qua eo modo vtendum erit, *Tū enim tu-*  
quo ligno sancto, id est, cum passulis & cæteris. *tus decoctum*  
Laudatur theriaca, quæ in calidiore conditione *radicis iun-*  
temperari potest, adiecta parte conseruæ violarum *cata imper-*  
aut borraginis. Laudatur vinum, in quo 19 vipera *bis.*  
viua extincta sit. *28 Sic enim*  
*retenta ma-*  
*teria sperma-*  
*tica abūlat,*

Viperarum carnes abscisso capite & caudâ ad *qua partes*  
tur & tumescunt: vnde aß. mularionis deprauatio tollitur. 29 Iege *solida frunn-*  
1. li. 11. de simplic. medicamentorum facultatibus. *Galenum c.*

## DE MORB. INTERNIS

putrilaginem coctæ cum iure albo veterum, vel iis quæ huic morbo conueniunt, vt & carnes edantur, & iusculum sorbeatur.

Alioqui non tam suspectum remedium, si pabulis caporum & gallinarum iusculum illud & carnes misceantur. Senties penetrasse virus, cum plumæ decidunt auibus, tùmque aues ad cibum elixabis. Sed theriacæ & remediorum vsus magis tempestiuus à thermis comparatis è fumaris, borragine, endiuia, nepitha, rosmarino, origano, meliloto, & aliis eiusmodi.

Vstio frequens circa caput satis fuit aliquando, alioqui in tibiis ac genu, aut musculosa parte brachiorum cauteria imprimuntur.

### EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

Αλφος, id est, vitiligo, κνησμός, sicut pruritus aut prurigo, λεχὴν id est, impetigo, ψώρα, λέπρα, ἐλέφας, nomina sunt affectionum, in quibus omnibus malè afficitur cutis à vitioso aliquo succo, qui nequit assimilari, cum aliqua contagione aliàs maiore, aliàs minore. Differunt autem magnitudine & propriis differentiis. Nam vitiligo & pruritus ad lichenem: hic ad psoram: psora ad lepram: lepra ad elephantiasim veluti via quædam est. Vitiligo vitiosa macula est & fœda ex malo corporis habitu excitata, non in tota carne, sed in cute, sine manifesta cutis asperitate, squamis, exulceratione. Cuius tres sunt species: alphas nomen generis retinens ex pituitoso sanguine: color albus ferè subasper, similis quibusdam guttis dispersis: leuce paulò albidior, ad carnem vsque descendens, à pituita lenta & viscosa, vnde pili albescunt: & μέλας ab atro humore cum colore nigro, & umbræ simili. Leuce dicitur etiam quibusdā lepra alba, in qua nō iam caro, sed alba caro, media inter sanguineā & exanguē, ac pituitosa generatur. Non facilè sanescit, si locus pilosus

*Vitiliginis  
tres species*

*Leuce seu le-  
pra alba  
quæ sit sana-  
bilis.*

glabrescat. Cutim incidi iubent, aut acu pungi ad intelligendum, an sanari queat. Nam si sanguis exit, curationi locus est: si pro sanguine humor albidus, sanari non potest. Aliæ duæ species facilius curantur. Pruritus sine asperitate etiam est & exulceratione cutis, sed excrementi acris sub cute sensum excitat & dolorem. Excrementum acrenitrosum, salsum & amarum, paucius, tenuiusque, quam in lepra, aut psora. Nascenturque malum ex sorditie, cruditate, cibis vitiosis. Lichen deterior est, habetque duo symptomata perpetua, summæ cutis asperitatem, & leuem pruritum. Gignitur (authore Galeno) ex serosis, tenuibus, & acris succis cum crassis permixtis. Si augeatur & cutem in furfures resoluat, in psoram degenerat: si in squamulas fit lepra suecis illis tenuibus discussis & crassioribus adustis. Initio à ieiunio salua si quotidie fricetur, curationem recipit. Hoc nomine comprehendunt mentagram Romanorum & nouum illum morbum ignotum ante Tiberij principatum, de quo multa sunt apud Plinium. In psora asperitas cutis est, furfures, pruritus & colliquatio corporis. Sed non tanta profunditate in carnem descendit, quanta lepra. Distinguitur ergo tum squamulis, tum profunditate à lepra. Paulus addit figuram, quæ varia est in psora, circularis in lepra. Materiam habet melancholicum humorem & sanguinem biliosum, sæpèque in squamas resoluitur, exulceratur, serpit: pustulas & saniem emittit, vocaturque *ἀγρία* Græcis, Cornelio Celso fera scabies. Lepræ propria sunt asperitas cutis profundior, pruritus maior, squamulæ. Scabendo æger non iuuatur; sed vlcera & phlegmonas inducit. Subiecta caro colliquatur, & corpus vniuersum à calore præter naturam. Materia est melancholicus humor, multus, viscosus crassus, acris, terrestris, siccus. In quatuor differentias distribuitur, sola intensiōe & remissione malignitatis humoris distinctas. Primæ symptomata sunt rubor, exulceratio maior quam in scabie pustulæ, squamulæ. Secundæ, quæ deterior est papulæ, asperitas rubor maior, figuræ variæ, squamulæ, rostitio maior, & celerius, latiusque procedens. Teritiæ, crassities, tumor, fistulæ, rostitio, omnia quam in prioribus, maiora. Quarta subalbida, recenti cicatrici similis, incurabilis. Elephantiasis ab omnibus differt magnitudine. Est enim veluti cancer totius

*Lichenis duo  
perpetua sym-  
ptomata.*

*Mentagra  
Romanorum*

*Lepræ pro-  
pria sympto-  
mata.*

*Lepræ differe-  
ntiæ qua-  
tuor.*



## DE MORB. INTERNIS

corporis. Cuius descriptio copiosa est apud Aretæum. Ex deformitate figuræ & magnitudine affectus varia nomina habuit à Græcis. Elephas enim dicitur, quia corij crassitie tenebricoso colore, facie fœda & informi, magnitudine Elephantem refert: *λέον καὶ λεόντιον*, propter extremarum rugarum frontis similitudinem cum leonibus: *σατυρίασις*, tum ob faciem satyris similem, tum ob libidinem: *ἡράκλειον*, quia nullus morbus eo maior est. A liene & iecore initio sumpto ad extremam cutim continuatur, ibique perficitur. Morbus contagiosus est ob materiam venenosam & malignam, quæ aërem, & proxima quæque inficit, sed imprimis saluâ, quæ cyathis adhærescit propter lentorem & venenatum limum dentium. Et quia humor melancholicus triplex est, sanguis crassior, fæx sanguinis, & atra bilis, idcirco tres illius differentias constituunt, à sanguine crasso *ὑπερυθρούς*, subrubicundas, mitiores & minùs malignas: à melancholico humore cum pituita mixto, crassa, falsa, nitrosa & acri, *ἐκλύκαιε*, albas: ab atrabile omnibus deteriores, in quibus vniuersum corpus scatet viceribus, & extrema etiam decidunt. Causæ ferè sunt, semen parentum elephanticum, victus ratio talem humorem procreans, suppressi menses, hæmorrhoides, varices cohibitæ, & quandoque lues venerea. Quia igitur morbus hic contagiosus est admodum & abominandus, atque aliquando cognitu difficilis, optimè cōstitutum est à veteribus, vt & extra vrbis pomeria ablegentur elephantici, & Medici doctissimi, tanquam Critici ac Censores constituentur, qui hos explorent, vt apud Belgas, & Arelatæ. Qua de re doctissimè scripsit F. Valeriola in suis enarrationibus. Initium est de annua elephantiorum apud Arelatam probatione vetere senatusconsulto instituta. Signa quædam vniuoca faciunt, alia æquiuioca. Vniuoca quidem, vt ab elephantice prognatos esse, etiam auis, aut atavis repetita origine, cum elephantice consuetudo, excretionum consuetarum retentio, ciborum crassorum, salforum, acutorum, nidororum assiduus vsus, vini multi & crassi potus, vita ærumnosa in metu & mœrore, extuberationes in plerisque corporis partibus, sed in facie magis, & secundum frontem, aures acuminatæ nasus simus, labra crassa, horrèdus aspectus, color faciei ex rubeo luens, vocis-raucitas, oculorum rotunditas. Signa æquiuioca sunt

*Elephantia-  
seos varia  
appellatio-  
es  
unde petita.*

*Elephantia-  
seos causa.*

*Elephantia  
signa dupli-  
cia, vniuoca,  
& æquiuioca.*

extuberationes extremorum & crurum, color morpheæ similis & tenebrosus, capillorum defluuium, & tenuium regenerationis, musculorum, præcipuè pollicis, consumptio, stupor, aut sensus amissio in extremis partibus induratis & exiccatis, scabies, impetigines, gutta rosacea, extuberationes rotundæ & duræ sub lingua, palpebris, auribus, ulcero sa lassitudo, cutis crispitudo instar implumis anseris, vinctuosa cutis, & tãquam resperfa aqua, sanguis trumbosus, niger, liuens, obscurus. Ex his omnibus notis vel multis simul cõcurrentibus, vel paucis, sed essentialib⁹ & pathognomonicis, explorantur elephãtici.

# ANTO. VALETII EXERCIT. LXIIII.

**E**lephantiasis canerosus est corporis totius tumor ab humoris affatione melancholici venenatæ qualitatis participis genitus. Ac citra tetram illam qualitatem id affectus non accidere hinc perspicitur, quòd qui toto sunt corpore melancholici, eos non necesse sit elephantiasi prehendi. Alia Arabum elephantia, alia Græcorum & Romanorum. Illa pedum est cum varicibus tumor: hæc lepra vulgò appellata, dira, truculenta, crudelis, membra ad ossa usque erodens. In hoc affectu triplex morbi genus inest: intemperies calida, sicca, quæ tandem deferuescente humore, imminutâque exustione frigida euadit: morbus organicus, qui figuram totius corporis immutat: continui solutio, suis signis satis manifesta. Morbificus humor impurus & malignus quanquam promiscuè summa & intima corporis inuadit, præcipuè tamen in iecore ac liene residet, à quibus visceribus in corpus spargitur vniuersum. Et vt in cute sese prima prodiderint labis indicia, eam tamen prius oportuit diu ipsis in visceribus delituisse. Contrahitur vel ab ortu, vt à semi-

*Elephantia  
Arabum &  
Græcorum  
distincta.*

*Gal cap. 7.  
lib. 2. de caus.  
morb.*

*Elephantiasis  
unde sit ge-  
neratio.*

## DE MORB. INTERNIS

ne parentum elephantico: vel contagione, vt contactu, fomite, & ad distans, vt per aërem: vel proprio corporis vitio, à bile atra plurimum exuperante, & sensim, per adustionem, venenatam qualitatem asciscente. Incipientis elephantiasis signa sunt, decoloratio cutis, nigricans, flavescentes, aut albicans, pro humoris, qui in peculiari cuiusque natura redundare consuevit, exustione. Eadem cutis densior, durior, asperior, in facie, manibus pedibus protuberantibus. Torpet sensus, & extrema frigescent, maximèque pedes, ob humorum crassitiem spirituum continuitatem intercipientem. Hinc segnities, spiratio tarda, motus difficilis, alui constictio assidua, respiratio grauis & foetida, ructus continui vehemens ad coitum alacritas: & vt malum increfcit, sordida ab humorum acrimonia & malignitate plerisque locis excauantur vlcera.

Miserrimum id mali genus postquam penitus radices infixerit, nunquam curationem admittit. Si enim cancer, veluti elephantiasis quædam, vni obortus particulæ inter morbos insanabiles vel ab ipso Hippocrate relatus est, quantò magis elephantia, ceu totius corporis cancer aliquis, ab omni remedio abhorrebit? Attamen si recens adhuc est malum, & manum quis ei rectè adhibeat, eoque quo debet modo præsidia applicet, ne saltem inualefcat, augeaturque, prohibebit. Itaque remedia erunt, missio sanguinis frequens, pharmaca melancholiam vacuantia annis singulis reuocanda, balnea, cornicula, vini abstinentia, aquæ potus, vsus lactis asinini, pullastrorum decocta, hordeata. In qua elephantiasi rota corporis moles putrescit, creber-

*Elephantiasis signa.*

*Paul. Æg. cap. I. lib. 4.*

*Curabilis est elephantia incipiens.*

*Gal. comm. ad aph. 47. lib. 6.*

rimo theriacæ vsu fluxio & corruptela prohibean-  
tur. Quod si scabie, papulis, & id genus similibus  
eruptionibus à vitioso succo abortis fœdetur cutis,  
valebit hoc vnguentum sæpiùs expertum.

*℞.* axung. veter. lotæ in succo limon. *℥.* 4. sulphur. viui in  
aceto triti *℥.* 1. salis torrefact. & in succo fumar. modico extin-  
cti *℥.* 3. *℞.* f. vnguentum. Vel. *℞.* vng. enulati, nutriti, butyr. torref-  
fact. ana *℥.* 1. addito plantag. succo f. vng.

Cæterùm præter elephantiaſes ſuperiùs comme-  
moratas habetur vna in ſacris literis lepra appella-  
ta, quæ cauſam agnoſcit longè ſuperiorem, Dei, ni-  
mirùm, iuſti vindicis iram. Nam pro peccati ratione  
lepra hæc antiquitus ſequibat: vt ſi peccatum paruũ  
eſſet, in parietibus domus maculæ pullularent: ſi  
maius, in veſtibus perciperentur: ſi maximum, pec-  
cantium corpora eiſdem deturparentur: qua lepra  
infecti quatuordecim in diebus à Sacerdote ſummo  
iudicabantur, an extra conſortium hominum ef-  
ſent relegandi. Non enim ad eam proſtigandam hu-  
mana manus ſufficiebat, ſed diuina potiùs opus  
erat, cùm nulla remedia illi adhibita conferrent, ſed  
ſola Dei optimi maximi voluntas.

*De cutis excoriatione, vlceratione, puſtulis &  
rubore faciei. C A P. 65.*

**E**Xcoriationi cutis, qualis eſt ex attritu, longio-  
re decubitu, ceratum ex tribus partibus olei  
myrthini, vel roſacei, & vna ceræ, conuenit. Quòd ſi  
calor eſt, ex ſucco plantaginis, decocto ſumach, aut  
rei frigide adſtringentis ſubigatur. Eidem rei con-  
uenit vnguentum de ceruſſa. Vbi verò rubor faciei  
& puſtulæ, ſanguis è media vena brachij detrahen-

dus est, imperanda purgatio, quæ partim flauam bil-  
 lem, partim melancholiam purget. Cucurbitulæ &  
 ceruici, & scapulis affigendæ cū scarificatione. San-  
 guisugæ malis, extremo naso, extremis labiis, lateri-  
 bus menti affigendæ. Abluenda facies primùm ex re-  
 mollientium decocto, vt ficuum, passularum, ab  
 hisque fumus excipiendus. Tum vel aqua plantagi-  
 nis, vel terebinthinæ, in qua mellis portiuncula dis-  
 soluta sit, faciem lauabis. Inunges autem axungia  
 ursina, vel vulpina: alioqui tauina, vel porcina, in  
 qua farina ciceris incorporata sit. Caseus recēs ex a-  
 ceto subactus Æstate conuenit. Vnguentū mixtū ex  
 sapone gallico, & vnguento albo. Ex vnguenti albi  
 parte 1. & 3. olei rosarum subactus cum aqua plan-  
 taginis, nenupharis, semperuiui. Sanguis leporis  
 calidus & reliquorum animalium vtilis est. Conue-  
 nit aqua distillationis florum salicis, succus limonū,  
 sulphur viuum, cerussa, caphura. Vbi pustulæ emi-  
 nent, vnguento enulato, siue hydrargyro concidūt.  
 Argentum viuum ex salina hominis ieiuni extin-  
 ctum, & cerato, vel adipi incorporatum, efficacissi-  
 mum est. Hyeme theriaca vti licet, vel vnguento ci-  
 trino, vel pomulato, vel lythargyro auri, modo Ser-  
 uitoris præparato. Sed interim dum hæc fiunt, vitæ  
 ratio instituenda est, quæ calorem hepatis attempe-  
 ret. Deinde etiam quæ fumos prohibeat à cibo.  
 Qualis est dragea communis, puluis communitatis,  
 adiecto coralli modico.

ANTO. VALETII EXERCIT. LXV.

**C**Vis in facie à carne inseparabilis existit. Et  
 quia assiduè detecta patet, densior fit, illicque

propterea facilius pustulæ insistant, rubor, &c.  
 Hûc quoque faciunt intemperies & imbecillitas.  
 Vacuato prius corpore curabuntur pustulæ, vlcera-  
 rationes & maculæ litu ex radice lapathi acuti ad  
 putrilaginem in aceto cocta. Rubor aquâ sola-  
 tri, morellæ, succo limonum. Vnicè commendabat  
 Honoratus Castellanus Medicus Regius hoc re-  
 medium.

℥. succor. plantag. portul. vuæ immatur. ana ʒ. 6. album.  
 ouor. numer. 10. farin. hord. tb. ss. semin. papauer. album. ʒ. ss.  
 Concludantur omnia vase vitreo, & distillantur in balneo  
 mariæ. Referuetur aqua vsui, de qua abluat faciem manè &  
 vespèri

Noui celebrem quendam Medicum, cui nasi &  
 faciei totius rubor disparuit his duobus auxiliorum  
 generibus. Horis matutinis ante pastum fructu ro-  
 sæ caninæ cydoniati more cum saccharo præparato  
 utebatur. Totis verò quinque mensibus ab initio  
 Martij continuò diluebat vinum cichorij decocto.

*De dolore.*

*CAP. 66.*

**D**E dolore iam multis locis dictum est, ac postea  
 dicetur. Fit autem vel intemperie, vel solu-  
 tione continui. Remedia vel paregorica, vel con-  
 traria qualitate pugnancia, vel narcotica. De nar-  
 coticis multis locis. Paregorica sunt, oleum simplex,  
 anethinum, chamæmelinum, lini, oleum ouorum,  
 oleum in quo althææ radix cocta sit, axungia suis,  
 gallinæ, anatis, vituli, ouum crudum, alia sæpè enu-  
 merata.

Contraria qualitate & hæc paregorica, caryinum,  
 laurinum, oleum de galbano, de sulphure, & simi-

## DE MORB. INTERNIS

lia calida olea ex refrigeratione nato dolori subueniunt. A calore verò excitato repugnât, oleum violatum, oleum rosaceum, de nenuphare, papauerinum, & similia. Dolorem à siccitate corrigunt, aqua tepida, hydrelæon, lac, butyrum, oleum, axungia, œsypus. Dolorem à sanguinis copia tollit phlebotomia. A flatu, oxycratum tepidum, decoctum ruthæ, anethi, serpilli, & alia, quæ capitibus de morbis intestinorum descripta sunt.

A crassis humoribus cum flatu oxycratum, in quo hyssopus, thymum, pulegium, calamentum, & similia coxerint.

A contusione caseus recens, aloë, aut mastix in oleo myrthino liquata. Vbi locus intumuit, spongiæ foveæ ex sero lactis, si quidem inflammatio non est. Sic enim ex aqua tepida fouebimus. Oleum ricininum, caryinum, & in his inculcatus pannus, & parti impositus.

### EIVSDEM HOLLERII SCHOLIA.

*Dolores faciente quæ sunt obseruanda ex Gal.*

Galenus in aphorismis, & plerisque aliis locis, in doloribus hæc obseruanda esse vult, qualitatem, vehementiam, diuturnitatem, remissionem, intermissionem, comparisonem in diuersis ægris, & in genere dolorum, sensum peculiarem hominis, quod alij aliis vegetiore sint sensu, ut hinc cognoscas, præfagias, remedia distinguas. Qualitas est, ut grauis, pungens, tendens, stimulans, feriens, torpidus. Vehementia ex natura partium & materiæ, vel eiusdem qualitate & multitudine, vel loco affecto pendet. Diuturnitatem facit materia pigra, multitudo, naturæ imbecillitas, via intercepta. Ex iisdem & remissio, & intermissio. In duobus aut tribus ægris ita differunt, aut sunt similes. Ex his omnibus periculum, aut contrà, faciliè intelligitur. Sed de his omnibus alio loco accuratius.

## ANTO. VALETH EXERCIT. LXVI.

**V**T sunt causæ dolorum multæ, ita anodyna numero penè infinita. Communis docet experientia hæc præsertim iuuare.

℞. furfur. ʒ. 6. semin. lini recent. ʒ. 2. f. sacculus. Bulliat in tribus partib. aquæ decoctionis chamæmel. & vna vini.

Sic ex mucagineis seminibus cum furfure licebit alia dolorem sedantia instituere. Vel.

℞. furfur. lb. ʒ. frigatur cum sapa, & fiat caplasma.

Plura passim descripta reperias in dolorificorum affectuum curatione.

Hæc sunt, studiose Lector, quæ desultoriè, & nimium sanè festinanter, in priorem Hollerij Librum, dum sub prælo gemeret, exaravi. Tibi, quæliacunque sunt, si probentur, & me meæ præcoci operæ non pœnitebit, & ad maturiora, palatòque tuo gratiora futura, edenda, quæ certior cognitio, iudicium acrius, & peritior exercitatio parturierint maiore accedam alacritate.





SINGVLARES ALIQVOT  
AVTHORIS OBSERVATIO-  
NES, QVÆ AD CONSILIA  
curandi pertinent.

I.

**I**N intolerabili cruciatu capitis, qui & assiduus sit, nec aliis cedat remediis, ferro & igne vtédum est. Frustrà enim pharmaça, cucurbitulæ, topica, &c. comperta sunt, quia hectica quædam capitis intemperies atque infirmitas adest. Et constat quidem permultos meliùs habuisse in eiusmodi malis, & epilepsia, mania, melancholia, hemicrania, terebellis vel cycliscis aperto capite, vel inusto. Sed ignis toto capite periculosus. Inuenta ergo melior ratio. Locus in brachio medius inter axillarem ferro aperitur. Vulnus continetur, ne coëat, vt hâc perpetuò excurrat materia, atque hîc meliùs, quàm exteriore brachio: quia minùs opportunus locus est occurrentibus externis, minùsque visui patet. Sed interim capiti priùs & vniuerso corpori consulendum, vt pura sint, vt paulatim reducantur ad naturam. Odiosum enim fuerit, si perpetuò locus defluat. Eodem modo in coxariis, & aliis contumacibus malis, ferro & igne vtendum est.

## I I.

In oculis affectis remedia inspiratu hominis anhelantur. Declinatur frictio capitis, & pectendum in partem posteriorem. Quod si abluendum caput, reclinatum abluatur, atque oculi muniantur. Ca- uendum ab errhinis & sternutamentis: his enim fa- cilè decurrit materia in oculos. In naso multò ma- gis, si ad radicem constrictus est, videndum ne acris materia capitis illâc deducatur. Nam inde contin- git, vt exeso nasi initio è naso loquantur, & vox ve- hementer vitietur.

## I I I.

In dolore capitis sæpe sanies sub est inter craniũ & pericranium. Molliter digito contingendus lo- cus, vt si quid illîc sit puris, intelligatur: multò ma- gis si fixus illîc dolor est, aperiendus locus. Nam sæpe sanies aperto loco defluit, & liberantur: atque inde metus est, ne os corrumpatur. Si qua illîc vena est, aperiri, vel ferro rescindi debet, nisi admodum sit insignis.

## I I I I.

Cuidam è fluxione acri palati pars mollior ad ra- dicem linguæ perforata est. Purgatum corpus, de- tractus sanguis, imperatum gargarisma è decocto guaiaci, & lacte, contactus locus aqua alchymista- rum cocta cum galla, malicorio, & rosis. Acus im- perata benè longa, postrema parte incurua, & sub mucronem perforata, quâ filum suendo loco tra- duceretur è filo sericio cerato: prætereà vt primum coagmentum vulneris rescinderetur, ac rursus re- fueretur. Ex quibus cum consequuta non fuisset in- tegra sanitas, locus cera, vel spongia occlusus man-

OBSERVAT. AD CONSILIA  
fit, & postea benè habuit æger.

V.

Alteri è luis veneræ reliquiis capitis, dolor, aurium tinnitus, & veluti articulorum contractio, dolor, pustulæ parvæ celeriter inarescentes contigerunt. His conualuit remediis.

℞. radic. ireos, acor. fœnic. ana. ʒ. β. radic. gram. & acetos. ana ʒ. 6. summit. lupul fumar. absynt. beton. an. M. β. salu. p. 2. semi. anif. fœnie. nreton. limon. cucumer. ana ʒ. 2. passul. hord. glycyrrh. ana p. 1. fol. fennæ mund. ʒ. 3. agar. trochis. ʒ. 1. β. f. decoct. ad quart. 3. In colatura dissolue sacchar. alb. quart. 3. f. syrup. mediocriter coctus secundum artem.

℞. supradicti syrup. ʒ. 1. β. hydromelit. ʒ. 3. f. potus. Utatur interuallis.

℞. pulueris specier. hieræ diacolocynth. ʒ. 2. puluer. hieræ picr. agar. troch. ana ʒ. 1. mac. ros. & mastich. an. ʒ. 1. semin. citr. limon. an. ʒ. β. croc. gran. 6. cum syrup. de stæchade f. pilulæ. Utatur interuallis.

℞. rasur. ligni sancti ℥. β. maceretur per tres dies in tribus pintis aquæ, deinde coquatur ad dimid. Utatur mane initio pastus, & sub somnum.

Ab his tempestiuus fuit illitus scapularum, spinæ & articulorum.

V I.

Quidam curatus est tophis & doloribus hac potione.

℞. lign. Indic. ras. ℥. j. aqu. ℥. 12. folior. card. bened. p. 2. semin. card. ben. p. 1. iuæ arthrit. marrub. salu. radic. enul. ana ʒ. β. summitat. attractylid. ʒ. 2. Maceretur diem vnum in olla vitrea: deinde bulliant leui igne, & sine fumo, ad medietatis consumptionem. In colatura refrigerata decoquantur ʒ. 4. palm. sanct. puluerat. ad dimid. In alio vase macerentur per diem ʒ. 2. cortic. palma. sanct. cum vini alb. odoriferi cheopinis tribus: deinde misceantur cum priore decoctione, & coquantur omnia vnica ebullitione, colatura bibatur mane in lecto, initio pastus, & ad somnum.

Rurfus magna fupradictorum coquatur in lb. 8. aq. ad dimid. & fub finem decoct. adde vini alb. libr. i. Vtatur tempore fitis interdium.

## VII.

Claudicans ex ifchiade veteri, fine luxatione, fed relaxatis & mollitis articulis, fequentibus auxiliis liberatus.

℥. agar. rh. elect. ana ℥. i. puluer. hieræ diacolocynth. ʒ. β. cum fyr. de ftœchad. formentur pilul. Poterit addi aliquid pilul. de hermodactyl. Vtatur his pilul. per interualla, aut etiam fyr. obferuatione ꝑ. præfcripto.

℥. falu. maioran. calamenth. ebul. iuæ arthrit. ruth. rofmar. beton. ana M. β. radic. acor. ʒ. i. fol. laur. p. 2. f. decoct. in aq. & vini quantitate fufficienti. Impleatur vafculum hoc decocto, benè claufum plantæ pedū admoueatur, dum calor ad cruris fuperioris articulos perueniat. Eodem decocto pars foueatur. Materia cū oleo laurino fubactâ articulo apponatur.

℥. euphorb. caftorei, ftyrac. calamith. ana ʒ. 2. liquefiant in vafe duplici cum olei chamæm. & laurin. ana ʒ. 3. Cum eo oleo calido ꝑ. fofus. Vel. ℥. olei fupradicti ʒ. 4. ceræ ʒ. i. β. terebinthinæ vnc. i. mifce pro vnguento.

Pòft verò vbi materia fuerit refoluta, vtatur balneis naturalibus, vel factitiis è fuphure, fale & alumine, cum dupla aqua. Emplaſtrum etiam valet ex ebulo in vino cocto. Potus hydromeli, & ratio vitæ conueniens.

## VIII.

Mulier honeſta, mollis & rara, annorum 30. febre, diſtillatione veteri in pulmones laborabat, fœtum geſtans oétimeſtrem. Imperatæ ſunt aliquot purgationes. Phlebotomia iterata. Ratio vitæ ex expreſſis carniū ſuccis, iure crur. ariet. colatit. diſtillatis. Cōtra exulceratum guttur ſic pugnatū eſt.

℥. hord. münd. benè medulloſi ʒ. 3. decoquantur in aquæ

# OBSERVAT. AD CONSILIA

lib. 3. Colatura traiciatur per manicam Hippoc. cum sacchar. cand. vel rosacei quarta parte, & modico cinamom.

Extrahatur succus ex amygdal. dulcib. velut lac, sine igne, & affusa aqua illa hordei modica, deinde edulcetur cum saccharo Cando, rosaceo. Teneat alternatim ore saccharum Candum, rosaceum. In difficultate anhelitus cucurbitula alternatim scapulæ affixa. In difficultate partus decoctum veteris galli cum modico cassiæ lignæ & croci, & tantillo vini odoriferi.

Vnctio pubis & sub vmbilico cum ol. liliac. mucag. sem. alth. ana  $\mathfrak{z}$ . i.  $\beta$ . medullæ cerui  $\mathfrak{z}$ . i.

Appensus laspis, Aëtites, radix aristolochiæ, cyclam. & similia, coxæ. Vel admota trita radix cyclamini & similiū pudendi orificio.

$\mathcal{V}$ . rad. gram. & petros. ana  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . arthemif. nepith. ana p.  $\beta$ . femin. anif. & fœnic. ana  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . f. decoct. ad vnc. 3. Transfundatur colatura per manicam Hippoc. cum cinam. elect.  $\mathfrak{d}$ . i. cass. lignæ  $\mathfrak{d}$ . 2. sacchar. vnc. i. Detur in labore partus. Item.  $\mathcal{V}$ . arthemif. nepith. ana p. 2. f. decoct. in vna aquæ parte & tribus vini pro fotu.

Obstetrix intingat digitos in oleo nardino, vel costino, & molliter contingat sinum pudoris.

Si vomitus moueatur, iuuetur oxymelite & aliis præfidiis. Peperit die 7. leuata febris, & omnia imperata, quæ instaurant: consumptum è crure veruecino, capo, & thorace vitulino, dum omnia propè ad tres lances consumpta sint, colatitia, expressa, vinum album tenue. Amygdalata ad leniendum, hord. decoctum vt priùs, & lac expressum ex amygd. lis. Contra tormina decoctum seminis fœnugr. benè lori in aqua calida, colatum per manicā Hippocr. cum sacchar. & modic. cinam. Syrup. capill.

ven:

ven. cum succo amygdal. Inunctio ex oleis, & litus  
 ut prius. Sacculi è milio. Prohibitus somnus in ho-  
 ram vnam, aut duas, propter multas vacuationes.  
 Stomachus illitus mastichino.

Contra animi deliquia mica panis intincta vino.  
 Mortua est decima hora à partu. Apertæ vterus  
 grumis plenus inuētus est, totus venter flatibus tu-  
 mens, ren dexter purulentus, hepar quantitate pec-  
 cans, lobo vno nothis costis hærens, colore totum  
 vitiatum, aridum ac veluti frixum, aliis partibus  
 quasi putredine mucosum. Similiter & pulmones,  
 in quorum summo ad arteriam vomica pure ple-  
 na erupit.

## IX.

Mulieri cuidam natæ ann. 28. tibia posterior ve-  
 hementer intumuit, ut inde dolor grauis, præcipuè  
 noctu, excitaretur, & tendines crurum extensi ni-  
 miùm membrum incuruarēt. Initium morbi qua-  
 tuor antè annis. In vteri gestatione puerperio mi-  
 nuebatur. Mansit tamen reliquum quid, & tertio  
 conceptu plurimùm intumuit. Minuebatur resol-  
 uentibus malacticis: suppurantibus non concessit.  
 Ingrauescit malum: parit. Apertus tumor cauterio  
 frigido. Nihil exiit, præterquam cruenta sanies. Ca-  
 ro emortua, inania quædã loca, nullus ea parte sen-  
 sus. Cataplasma è farina hordeacea & oxymelite,  
 quæq; putredinem arcent, admota. Expuit sangui-  
 nem: commota alius multa deiecit mala. Biduo  
 priusquam moreretur, pulsus vehemens fuit & fre-  
 quens, neque tamen respondebat febrilis calor. De-  
 cimo die postquam aperta vomica est, expirauit.  
 Præfagio iam antè factò liberati calumnia Medici

OBSERVAT. AD CONSILIA  
& Chirurgi.

X.

Alteri post 15. annos à connubio parere contigit. Laboravit multum à partu. Secundæ substiterunt: euulsæ frustulatim. Obstetrix assererat superesse aliquid. Febris nata. Hinc nigra lingua, dentium interualla scabritie nigricantia, facies <sup>et ad caput</sup> ~~ver~~ <sup>et ad</sup> ~~pro~~ <sup>et ad</sup> ~~dis~~. Septimo die mortua. Secta inuēta caro oblonga adnata vtero, & membranarum pars, quæ computruerat.

XI.

Homini hirsuto, nigro, & habitu melancholico solennis erat singulis mensibus diarrhæa quædam torminosa, declinante Luna. Defluxione in testiculos facta, & sarcocoele, exectus est. Nimis laboriosa vita, & itinere per æstus & frigora, incōmoda cœpit valetudine viuere, interuallis leuiter febricitare. Cessabat tardiùs diarrhæa. Correptus est febre lenta, quæ noctu exacerbabatur, & tumore duro, dolentēque in dextris ilibus. Dolor à rene dextro incepit, tum in dextrum ilium & sinistrum progressus. Ad sinistrum renem rugitus erat, & velut borborygmus exaudiebatur. Vomitus vna hora à cibo. Quæsitum vnde ea materia, num ab intemperie earum partium, aut alia parte. Alij ab hepate, quia solennis erat diarrhæa, os amarum, vomitus amarus aliquādo. Mihi hoc placuit, partes exectas, in quibus obduruerat callus, natura frigidas, equitatione & venere fessas & infirmas fuisse, resistentem diarrhææ materiam, & aliam eò confluisse, intercepta via refluxisse partim ad peritonæi partes, partim ad obliquos epigastrij musculos, atque ita tumorem succreuisse. Si verò ab hepate id esset,

vel per venas, atque ita potiùs ad intestina, vel per superficiem, quia in membrana cingente hepar vesicæ quædam ὀδαιώδες excitatæ exudarent in epigastrij medium inter peritonæum & omentum. Os verò amaricare non à bile, quæ ab hepate refunderetur, sed potiùs à putri humore, & fumis, hydropicis id accidere, & aliis vomitiones in colica frigida, & sitim, & amarorem, & cætera apparere. Materiam tumoris non esse bilem, sed frigidam, crassamque pituitam. Itaque videndum fuit, ut reuelleretur materia, quæ influeret, non per vrinas, quia partes genitales infirmæ exciperent, sed per aluum. Æger enim clysteribus plurimùm leuabatur, tum medicamentis, quæ agaricum & alia phlegmagoga reciperent. Quod ad tumorem videndum esse, ut remolliretur & discuteretur: sed metum esse ne suppuraret, quia à ventris dolore diuturno (ait Hippocr. aphor. 22. lib. 7.) suppuratio expectanda est, nisi peccetur ab ægro, aut medico, aut æger præripiatur. Id etiam Aurelianus annotauit in Chronic. Et veteres cataplasmatibus vfi sunt & potionibus, quibus acceleraretur suppuratio, sperantes ut ea materia tenuata in intestina transfunderetur. Id quod sæpè probârunt, ut aliquando per vrinas, aliquando per aluum purgaretur. Et Aniceti est medicamentum apud Galenum, quod hoc polliceatur efficere.

Hoc tamen metui propter virium imbecillitatem.

Crus oppositum deinde tumuit, & loco vno ventris persistebat dolor. Tensio aliquando ad testiculos. Vtróque crure intumescente, & sursum



## OBSERVAT. AD CONSILIA

refluente materia, ad diem ferè quadragesimum mortuus est. Facto vlcere in crure, quàm materia extra flueret, seruari fortasse potuit.

## XII.

Cuidam podagrico malum ad stomachum conuersum est. Vnde dolor tendens & grauis. Imperatum est primùm hoc oxymel, & quæ sequuntur remedia: à quibus præter spem multorum integrè curatus est.

℞. oxymelij. simplic. Galen. ℔. β. In fine decoctionis eius infunde fol. menth. siccor. p. β. Deinde traiciatur per manicam Hippocr. cum cinamom. drach. β. galang. & calam. aromatic. ana ℥. i. Vtatur primùm frigido, deinde tepido ad vomitum.

℞. aloës succotr. optim. ℥. 2. rh. elect. 3. β. mastich. ros. cinam. galang. ana gran. 8. Incorporentur omnia cum syr. de menth. dentur ex cochleari.

Purgato corpore cucurbitula super vmbilicum applicetur, quæ priùs immersa sit in vino decoctionis ruth. menth. absynthij.

℞. mellis anthosat. mell. ros. ana vnc. 2. aqu. vitæ 3. i. Bulliant in balneo mariæ, vel cineribus calid. ad consumptionem aquæ. Deinde insperge cinamom. calam. aromatic. galang. mastich. ana ℥. i. Misce. Vtatur ante pastum vno cochleari.

Manè vtatur zinzibere viridi, & nuce moschata viridi, conditis. Auiculis, alauda, perdicibus &c. cōfixis caryophyllis. Fiant fomenta ex oleis de ruth. spic. mentha, absynthio. Vel.

℞. horum oleor. 3. i. β. mythridatij 3. β. misce, & affrica ventriculi orificium.

Vtatur vino albo, veteri, pane albo bene cocto, & aniso condito. Item.

℥. puluer. menth. siccæ drach. 2. puluer. absynth. 3. i. caryophyl. ligni aloës, xylobalsami ana ʒ. i. cinamom. mac. ana ʒ. ʒ. f. puluis. Vtatur mane cum ouo forbili, aut in consumpto.

Mollis frictio circumducta in ventrem, etiam in articul. deinde longè à cibo, vt facta iam coctione.

℥. oleorum de spica & menth. ana vnc. i. ol. rut. ʒ. ʒ. ol. de castoreo 3. 2. mythridar. 3. i. zibetti gr. 8. misce pro litu stomachi.

Fiet fofus hepatis cum oleo de absynthio & chamæmelino, vt Hyeme. Vel.

℥. ceræ albæ nouæ vnc. ʒ. ol. rofac. chamæm. & absynt. ana ʒ. ʒ. f. cerotum molle: malaxetur cum vino albo leuiter adstringente. Intendatur in linteo molli, & tepidum apponatur.

℥. fol. rut ment. absynth. rofar. ana p. i. cumini conquassati, carui, dauc. anif. ana 3. i. galangæ, piperis longi ana drach. ʒ. Conquassata omnia distemperentur in aquæ vitæ vnc. 4. Deinde cum vnc. 4. olei de spica leuiter coquantur in balneo Mariæ ad aquæ consumptionem. Expressum oleum seruetur. Cui adde zibetti gran. 6. mythridatij vnc. ʒ.

℥. olei de spica, absynth. & menth. ana ʒ. ʒ. caryophill. mac. cinamo. cardamom. rofar. corall. galliæ moschatæ ana ʒ. i. cum cer. mastich, aloës ana drach. ʒ. f. linimentum. Loco rofar. & corall. addes galang. granor. paradif. ana ʒ. ʒ. vbi non ita magnus est calor.

## XIII.

Quadragenarius febre ardentissima correptus, doluit etiam à latere. Detractus mediocriter sanguis ad vascula duo. Perseuerant omnia, neque cedit dolor remedijs. Sexto die detractus iterum sanguis ad duo vascula, putris & corruptus. Sudor septimo leuis, tenuis, & tantum in capite & thorace. Nihilo melius habet. Deliria nocturna, æstus & inquietudo magna, vrinæ turbidæ, sudauit, nono

## OBSERVAT. AD CONSILIA

& vndecimo, nihilo leuata febre. Decimo leuius habere visus, nocte eadem patitur. Vndecimo vrinae subsident, sed diuulso & nigro sedimento. Sudat vt prius. Pulsus perpetuò frequens & magnus cum pauca inaequalitate. Iam tendines manuum sine manifesto membri motu reuelli sentiuntur. Vrinae benè coloratae & corporatae cum sedimento nigro. Decimotertio floccos colligit, manibus reuelluntur digiti, delirium ferè perpetuum. Decimoquarto media nocte mortuus est. Pulmonibus corruptis, nigricantibus, inuentus est.

## XIIII.

Puero annos nato 12. repentinè syncopè correpto & muto, in lecto reposito, temere, quasi gesticulando, mouebatur corpus, crura & manus. Subinde garrulus vocatus non respondebat. Diem integrum ita habuit. Clysteres non retinebat. Balano acuta cum hiera diacolocynthide, & cucurbitulis in ceruice rediit, & sanatus est.

## XV.

Principi Lotaringo, magno priori ordinis Rhodiorum Equestris, ancyle in dextro cubito sequentibus remediis curata. Post habitam totius corporis rationem, victus & domicilij, hæc ordine sunt instituta. Frictio partis è molli manu: ex quo vapor è decocto molliente: immersio in idem decoctum partis ægræ: siccatio loci: inunctio ex axungia humana benè purgata, colata, lota in aqu. mistura, Ceratum ex cera molli, pingui mollita ad ignē, manibus intinctis butyro, deinde liquata cū butyr. recent. & axung. humanę supradictæ æqua quâtitate,

Ab vnctione superdatum molle gossipium.

Decoctum institutum guaiaci ex vnguinosâ, odorâ, & media parte ligni, initio.

Interuallis acetum album, aqua vitæ decocto vaporationis intermixta. Ex quo ceratum æsypi descriptione Philagrij.

Capiti tunso gossipium conspersum puluere caryophyllorum. Errhina, masticatoria.

Saluia in sartagine concalfacta, & conspersa aqua fœniculi, vel saluiæ, frictio capitis & spinæ.

Immersio totius brachij in animal recens matatum. Exercitium molle partis. Effectum fotu & axung. vt octo diebus dissoluto tumore, liberatis neruis omninò, sanus euaserit, liberis omnibus motionibus totius membri.

## XVI.

Quinquagenarius longo corpore & collo, satis oportunus tabi, tussicula, flatibus, pituita tres annos laborauit. Audiebatur quasi aqua fluctuans ad diaphragma & vētrem. Alij vitium lienis causabantur. Purgationibus, decocto guaiaci, & aliis vexatus nihilo meliùs habuit. Subtabidus, malè coloratus. Tandem decretum est, desperantibus Medicis & ægro, vt aperiretur thorax primùm cauteriò potentiali, deinde cultello. Nam propriùs admota aure intelleximus materiam diaphragmati insidere, non esse in ventre. Itaque inter quartam & quintam vertebram aperta via est, monitis ægri amicis, quantum periculi immineret, ægro quoque monito, & id postulante. Effluxit pus multum crudum. Quinque pòst diebus mortuus est. Dissecto ægro inuentus pulmo aridus, scirrhis plenus, syderata pars

## OBSERVAT. AD CONSILIA

membranæ succingentis & costarum. Venter inferior integer. Nunquam pus expuerat, neque sanguinem. Laborauerat longo antè tempore, vt ferè triennio, pleuritide.

## XVII.

Cuidam perforatus venter acuto ense, intestina tenuia vulnerata, & pars crassorum. Exierunt intestina per vulnus & stercus. Desperatus erat à Medicis, sed longa cura conualuit.

## XVIII.

Alteri ad scapulas inflictum pugione vulnus, deorsum inclinans. Apertum latus ad quartam & quintam vertebam, vt pus, quod in diaphragma decumbebat, hâc efflueret. Vixit annum apèrta plaga. Expuebat sanguinem & pus.

## XIX.

Nobilis adolescens annor. 15. Baro Dessaulx, Pro-uincialis, molliter educatus, deinde ad aulam transfatus, febre ardente correptus est, deinde lenta. Ortis exanthematibus tumuit ab vtróque hypochondrio: & velut materiam purulentam seorsim ab excrementis alui, & aliquando ante alui excrementa reddidit. Erat autè, qualis est materia atheromatis. Quæsitum vnde prodiret. Nam ab abscessu credebatur. Alij pituitam esse à cerebro, alij ab intestinis autumabant. Sed quia nihil mordebat, nec iniecto clystère sensus vllus doloris erat, & pituita tantùm detergebatur, verisimilior sententia putauit abscessum esse in inferiore mesenterio. Data visceribus quæ molliant, & leuiter discutiant. Atque cùm clysteribus non iuuaretur abscessus, vsus fuit conuenientissimus apozematum solutiuiorum, terebin-

thinæ, pilul. ex hiera picra & aloë, datæque hæ ad 3. ß. iusto effectu. Imperatum decoctum ligni sancti. Consultum viribus. Desiit pus excerni: mansit tensio in dextro hypochondrio, & febricula post retentum pus, non à medicamento, sed à reliquis obstructionibus. Imperatum est catharticum è syrup. de cichor. compos. cum rhabarbaro, & decocto radic. oxalidis & gram. Conualuit.

## X X.

Quinquagenarius, aut ad circiter, è febre tertiana æstiva Autumno in quartanam simplicem, hinc in quartanam triplicem degeneravit, atque ad Nouembrem in hydropem. Desperatus est à Medicis, quia Præctici confirmatum hydropem dicunt post secundum mensem. Relata causa ad hepar refrigeratum partim morbo, partim usu aquarum distillatarum acetos. & cichor. quibus plurimum fuerat usus. Itaque læsa sanguifica virtute visum est primum hepati roborando consulere oportere his tabulis.

℞. diarhod. 3. ß. lign. aloës & rasur. ebor. ana. 3. i. cinam. 3. ß. sacchar. in aq. agrimonie solut. q. s. f. tabell. quæ pendeant. 3. 2.

Deinde etiam syrupo de cichor. simplic. ad obstructions liberandas, &c. Frequens fuit fœtus sacculis ex iis, quæ descutiunt & roborant. Datæ sunt pilulæ Rauedsen. auctæ rh. & agar. troch. infuso in succo ireos. Syrup. laxatius præscriptus, qui reciperet aperientia, semen cartham. polypod. sennam, agaric. &c. cum 3. i. ß. succ. ireos. Deinde thermæ siccæ, illitus primum ex ol. aneth. & chamæm. deinde ex fermento, emplastro de baccis lauri, sterco-

## OBSERVAT. AD CONSILIA

re caprillo, postremò cauter. in tibiis. Instituta diu-  
retica. Atque omninò in roborantibus hepar &  
ventriculum, in purgationibus per interualla, re-  
liqua curatio posita. Mortuo Februarij initio in-  
uenta sunt syderata intestina, similia aquatilibus  
Colubris, omentum corruptum, hepar multis oc-  
cupatum scirrhis,

## X X I.

Quidam Germanus adolescens 18. annorum,  
vsus antea Beria, in Galliam venit: vbi crapulæ  
indulgens cœpit vertigine laborare, reuomere quæ  
fumebat, dolere ad ventriculum. Adhibito reme-  
dio cessauit vomitus & vertigo. Meliùs habuit. Sed  
post quartum aut quintum diem rediit malum.  
Languit leui febricula. Inuasit leue delirium, vnde  
facile redibat ad se. Pulsus languidus. Decimoquar-  
to sudor multus, perturbatio, pulsus cōcidens. De-  
cimoquinto in eo sudore mortuus. Aperto inuen-  
tum epiloon putrefactum, hepar, siccior ventri-  
culus interior ad finem quasi contusus, nigro succo  
ex dimidio plenus.

## X X I I.

Hispanus nobilis, qui seruiebat Duci Albano,  
quo tempore Carolus Quintus cogitabat bellum  
contra Germanos Anno 1545. Lutetiam venit, frū-  
strà petitis auxiliis in Italia, Hispania Germania,  
remediis sequētibus curatus est. Ad venerē ineptus  
erat, quòd flaccido esset pene, quique erigi non  
posset. In quam rem cū ad me venisset, vocatis  
è senioribus & celebrioribus Medicis Parisiensibus  
ad consilium, visum imprimis malum ab vlcere  
esse, & læsis nervis atque arteriis, quæ impletæ flatu

penem erigunt, partes ita lædi, vt spirituosum sanguinem non exciperent. Curandum fuit vlcus, instituenta omnia quæ calidos flatus gignerent, & partes genitales corroborarent. Atque habita primum ratione corporis totius per medicamenta, leuem phlebotomiam & decoctũ guaiaci, hæc compositio singularis & diuina erigendo peni, & excitandæ veneri instituta, quæ cum, remediis aliis frustra tentatis, conualuit.

℥. vitellor. ouor. ʒ. i. β. butyr. recent. pudend. tauri, cice. galang. satyrion. zedoariæ, zinziberis conditi, menth. testiculor. galli, testiculor. vulpis ana ʒ. i. cerebellor. collumbar. & passer. benè coctor. & assor. ana ℥. i. medull. auellanæ Indicæ, pineolor. mundator. fisticor. iuiubar. amygdal. dulc. mund. semin. malux, sem. mercurialis, auellan. excorticatarum, dactylorum ana ʒ. i. semin. dauc. caryophyll. piperis, trium generum linguæ auis, semin. cæpæ, porri & scariol. cinam. an. ʒ. i. Coquantur simul omnia in lacte ouino: postea fortiter terantur. Omnia conficiantur cum melle rosaceo, & saccharo albissimo: coquantur lento igne, benè misceantur.

Poterunt aromata post coctionem aliorum inspergi, quo modo fit in conseruis, conditis.

℥. diasatyrionis ex 2. descriptione Mesuæi ʒ. 2. vtriusque diamargariti, aromatic. rosar. ana ʒ. i. cinamom. ʒ. β. pudend. ceru. ʒ. i. cum melle anthosato & radic. vna zinziberis viridis misce omnia. Detur manè & hora somni ad modum maioris auellanæ cum vino albo. Item. ℥. ol. de spica, lilior. & mastichini ana ʒ. i. adip. cunicul. & anat. ana ʒ. β. adip. passer. culor. farctorum radice satyrion. & modico zedoariæ, adipis columb. ana ʒ. 6. semin. eruc. raphan. cæpæ puluerat zedoariæ ana ʒ. β. croc. gran. 6. f. linimentum pro lumbis, pectine & perinæo.

His sanatus remediis abiit.

### XXIII.

Nobilis Pictò, cui paulatim ganglium excreuerat



## OBSERVAT. AD CONSILIA

in inguine dextro tam magnam, quàm pueri caput, cum adnato crassiore tuberculo, in consilium adhibuit medicos, Fernelium, Syluium, Hollerium, Chirurgos, Thierryum, Riuiarium, Ambrosium Paræum. Medicis cum Ambrosio periculum declarantibus, si excinderetur (nam hoc vnum erat remedium) alij contrà senserunt sine periculo incidi posse. Vicit consilium plurimum, quia metuerent hæmorrhag. gangrenam ab incisione, claudicationem. Post aliquot dies reuocatus æger cum Chirurgis de incidendo agentibus, altero voluit die rem longa disputatione agitari. Tandem conuentum, ægro impellente, & profitente se mori malle, quàm diutiùs malum perferre, quia & armis ineptus esset, & cōiugio atque cōitui, oportere in circulum molem incidi, circulo longiùs ab inguine & scroto circumscripto, deinde ad membranam tumorem paulatim exsecari, paulatim quoque pellem separari, quæ esset versus radicem: venas & arterias, vt deregabantur, contra hæmorrhagiam ligari. Quod post aliquot dies Fernelio & Hollerio præsentibus à Theodorico Thyerrio & Riuiario, tribus aliis Chirurgis assistentibus, effectum fuit. Euulsa moles cum tunica, glandulosa, albicans, intus sine sanguine & carne, multis constans glandulis, à sua pellicula seu pediculo facilè separabilis. Glándulam pinguem representabat. Iam sanescente vulnere, febricula, oris amaror, fastidia incurabilia, virulenta sanies, fœtida, dolor in altero inguine, pube, ventre. At tandem soluta aluo, liberatur amarore, & aëri commissus, vt ad suos rediret, perbellè habuit.

## XXIIII.

Cuidam deuorata piscis arista difficilis labor in gutture, abscessus, raucedo, difficultas spirandi. Iussus ut ex longo traheret spiritum, facile trahebat: ut semel & confertim audiebatur strepitus in gutture, aperto ore, nihil vitij apparebat. Collum anterius erat subtumidum. Visum itaque vitium esse imbibitum musculis laryngis, & vicinis partibus. Institutum pharmacum quod vniuersum purgaret corpus: er rhina, quæ caput: frictiones quæ diuerterent: decoctum ficuum, in quo oxymel simplex, scyllitic. & similia dissoluta. Foris, quæ leuiter discuterent, cum lana sordida. Iussus æger non bibere frigidum, tenuiter viuere, lacte amygdal. & simili victu detergente, incidente & tenuante vti. Mox curatur.

## XXV.

Brito quidam nobilis correptus febre tertiana in prima accessione summa virium imbecillitate laborauit, ut videretur mori. Tertio die in secunda accessione eodem modo habuit. Somnolentus in vtrâque, ut vix somno posset prohiberi. Aliis accessionibus vigil, neq; ad somnum verti potuit. Sexta mortuus est. Adhibita etiam ab initio fuerant remedia, quæ vim vitalem sustinerent.

## XXVI.

Cuidam mulieri Aurelianæ excreuit caro à gingiuis parte interna durior, externa mollior, insignis vtrâq; magnitudinis. Mulier erat sterilis, malè purgabatur, habitu melancholico. Adhibitum consilium, monitumque iam ab annis tribus initium esse mali, crescere in dies cum dolore, sed sine putredine, odore graui, sine dentiū vicinorū corruptione.

## OBSERVAT. AD CONSILIA

Vnicum in incisione remedium. Sed ab incisione metus hæmorrhagiæ, convulsionis, irritationis partis, unde cancer. Tandem visum fuit exteriorem debere vel ferro incidi, vel filo præligatum tabefieri. Ut videretur num quid ossis, quod erat ad pediculum, corruptum esset, ut inureretur radix, & si quid esset corrupti ossis, signe corrueretur. Quod ut succederet, ad interiorem simili ratione veniendū esse, à qua periculum maius, quia durior, quia interior pars propter tunicam & nervos magis periculosa: ac cauterium, quod inderetur, decisa carne immitendum per canaliculum. Hæc omnia post purgationes frequentes, phlebotomiam, cucurbitulas, deriuationes, integram sanitatem attulêre.

## X XVII.

Cuidam adolescenti annor. 15. tumor, velut inflammatio, ad malleolum dextrum. Adhibita iusta remedia. Quarto die cœpit balbutire, causari stomachum, deliravit. Cùm autem videretur qualitas venenosa efferri à pede, putavi adhibendum loco cauterium potentiale, aut locum eum scarificandū esse. Quod minimè factum est, reclamante pertinaci & imperito barbitonfore. Clyster injectus, à quo conveniēter deiecit. Auctum delirium. Phreniticus eodem die quarto mortuus April. mense, Anno 1548. in collegio Barbarano. Febris erat latens & obscura, sitis ingens, lingua fuliginosa.

## X XVIII.

Stephanus Hacqué cœpit leuiter è catarrho laborare. Rubor quidam apparet in facie: multa loquitur, prudens futuri delirij coniectura. Quarto die, quo statim detractus sanguis, meliùs habere

visus. Sexto deliravit nocte. Matutino melius habuit. Sequenti nocte phreniticum auctum malum, conuulsio totius corporis & maxillarum. Adhibitis remediis cessat phrenitis & conuulsio, nisi quod levis quidam tremor subapparebat. Decimo apparuit vrina melior cum leui sedimento diuulso, acuto. Sub meridē sudor frigidus. Eodem die, ritē omnibus alioqui institutis, & nullo peccato ab ægro, neque à ministris, morbi malignitate mortuus est.

## X X I X.

Quidam apoplexia correptus frictione, motione, phlebotomia excitatus est. Sequenta febris continua satis mitis, sed cum delirio. Negligentiùs curatus, neque expuens, quæ in pulmones defluebant nono die à febre, decimo ab apoplexia suffocatus est.

## X X X.

Qua parte recti musculi ad sternum pertinent, puero cum abscessu in ventre tumor manifestus, digito cedens, obtigit. Vocati ferē omnes iudicârūt abscessum in rectis musculis: alij in ventre, qui attenuato vehementer puero, & consumptis musculis facilē emineret tumor. Paucissimi in hepate, quod quibusdam hepar totum ventrem ad partes sinistras pertendat. Aperto loco exiit pus virosum & grauiter fœtens, corrupto peritonæo. Abscessus sedes in parte hepatis, quæ illūc perueniebat. Quod magis apparuit mortuo & dissecto puero.

## X X X I.

Quidam Lutetiæ dum dentem euellit, simul & partē maxillæ, & vicinos dentes detrahit. Hæmorrhagia sequitur periculosa. Vocat<sup>9</sup> in ius Chirurgus

OBSERVAT. AD CONSILIA  
liberatur, quia inuenti dentes non inferi, sed omni-  
nò maxillæ continuari.

R A R A Q V Æ D A M.

- 1 Quidam Lutetiæ vomicam membrana tectam, ouo similem, è pulmonibus expurgauit, cùm antè fuisset asthmaticus: & ita paulò pòst extinctus est.
- 2 Aluis eminxit multa quidem similia liquidis margaritis, admodum pellucida, alia crassiora, mediocriter cocto oui albumini similia.
- 3 Nouimus quendam, cui è regione hepatis vena per interualla dehiscebat, quæ sanguinem funderet. Restitante sanguine vestigium non apparebat.
- 4 Rigida Hyeme anno 1543. ad fines Ianuarij & initia Februarij salutare pleuritides grassatæ sunt: quarum quidem aliquot per vrinas nigras, crassas, in quibus supernatabat multa spuma crocea, crassa, glutinosa, iudicatæ sunt.
- 5 Aperta mulier à nobis in Scholis Medicorum Lutetiæ lapidem habens in vtero, in cranio anteriore, & quæ sine liene inuenta sit.
- 6 Visa mulier à nobis, quæ in altera mamma duplicem papillam lac reddentem haberet.
- 7 Cuidam mulieri Lutetiæ totum corpus molle, flexile, & sine solidis ossibus fuit.
- 8 Lutetiæ cuidam mulieri grauidæ fœtus exerta manus est per vmbilicum, & quindecim diès ad partum sic stetit, saluæque matre euasit viuus, & vitalis.

FINIS.



I A C O B I  
**HOLLERII STEMPANI,**  
 MEDICI PARISIENSIS CE-  
 LEBERRIMI, DE MORBIS IN-  
 tern. Liber 11. febrium Historiam  
 & curationem continens.

A N T O N I I V A L E T I I O P E R A I A M-  
 nunc multò quàm antèa auctior ac inte-  
 grior factus, & scholiis non pœ-  
 nitendis illustratus.

*Quid sit febris.*

**F** E B R I S, 1 calor est præter naturam,  
 2 accensus in corde. Substantia 3 er-  
 go febris, est calor præter naturam,  
 qui omnino in corde accenditur. Aliàs  
 verò 4 toto corpore sparsus, aut sal-  
 tem in quamplurimis partibus, vel certè principi-  
 bus inest. Pessimum genus febrium, cùm vruntur in-  
 teriora, exteriora frigent, 5 vt in lipyriis, & cùm  
 viscera interiora inflammantur.

1 Hinc est, quod febris ad intemperiem calidam, tanquàm  
 ad summum genus, Galeno referatur, cap. 5. libel. de differēt,  
 morb;

## DE MORB. INTERNIS.

2 Cor cùm sit fons innati caloris , principium quoque sit febrilis est necesse : si quidem non alius ab illo calor sit, qui in igneum conuertatur. Gal. com. ad aph. 14. lib. 1. & ad sent. 18. lib. 1. de vict. ratione in morb. acut.

3 Galen. comm. 3. in lib. de fractur. sent. 8. & in aphor. 5. libr. 6.

4 Satis tamen est ad febris constitutionem, si calor ille plurimas, aut nobiliores occupet partes. Gal. comm. ad sent. 29. sect. 1. lib. 6. Epid.

5 Neque enim in causo , neque in tertiana , quæ febres omnium calidissimæ perhibentur , internæ partes vsque ad eò aduruntur perfrigerata cute, atque in lipyriis : quas propterea Gal. maximè malignas appellauit comm. ad aph. 48. lib. 4.

Malignum quoque, 6 quod *ασώδης* vocatur: in quo exteriora quidè moderatè calida sunt, intus ardor est, sitis infatiabilis, perpetua corporis iactatio, vigilia, deliriū: quod ferè fit crasso atque contumaci humore in primis venis putrefacto. Aliquando in corde vehemens æstus est, quod vehemèti palpitatione (cordis motu præter naturā) intelligitur, moderatus tamen ad manū calor est. Pereunthij celeriter, & sub mortem tenuis quidam & frigidus sudor effluit. Itaque febrilis calor 7 nō perpetuò toti corpori equalis est. 8 Optima ratio diuidendæ febris ex Galeno lib. 1. de differentiis febrium, est, vt è substantia, hoc est, iis, quæ definitio eius continet, differentia sumatur: è calore videlicet, iis in quib. calor est.

6 *Ασώδης* id genus febres seu fastidiosæ comitem habent anxietatem ingentis malignitatis indicem, ex Gal. comm. 2. in lib. 3. Epid.

7 Imò multis in partibus sæpè non apparet , vt in lipyria febre.

8 Variæ febrium diuisiones, de quibus Hippocr. sub finem sect. 1. lib. 6. Epid. & fusiùs Gal. in commentar.

Calor itaque alius 9 siccus, 10 alius humidus, alius 11 vaporosus: ex quo febris alia sicca, alia humida, quædam vaporosa, Maligna sicca est. In hac squalescit cutis, arida lingua est, vehemens sitis & vigilia, calor acris, nihil vaporum, nihil sudorum excluditur. Talis est exquisitè ardens, Hæc autem aut 12 breuiter occidit, aut in hecticam vix curabilem cōuertitur. In humida perpetuo sudore ac madore corpus resoluitur: quales sunt 13 typhodes & elodes. Quanquam typhodes ab Aëtio & quibusdam aliis dicitur, quam erisypelas hepatis, lienis, renis, aut cuiusvis partis, incendit. Salubris ferè, in qua madidus & mollis calor est, cutis quoque eiusmodi, & sudores in tempore erumpunt.

9 Vt in hectica, causo, & reliquis febribus biliosis.

10 Vt in febre sanguinea, pituitosa.

11 Vt in diaria.

12 Exquisitè ardēs vt plurimū funesta, causæ magnitudine, symptomatū vehemētia, & excrementorū suppressione.

13 Gal. ex veterum placitis febres typhodeas sine vllarum inflammatione partium fieri asserit, ealdēque humiditas in summo Lib. contra Lycum descripsit.

Rursus calor quantitate & qualitate distinguitur. Nam alias 14 copiosus, 15 aliàs paucus, 16 nonnunquam in medio est. Similiter hic acerrimus, hic (vt febris est, & quantum natura febris patitur) suavis, & mitis, ille medius: magna vis est febris, cū & plurimū, & mordacissimū.

14 Vt in synocho vtrāque, maximè verò plethoricis in corporibus.

15 Qui scilicet in pauca materia accensus, vt in tertiana exquisita.

16 Vt q̄ copia moderatus, & in sanguine, aut pituita, accēsus, vt in synochis febribus & pituitosis: & tum est essentialis.



## DE MORB. INTERNIS

Febris alia morbus, v ardor : alia symptoma , vt in pleuritide : alia simplex, alia cum grauib. symptomatibus, & iis, quæ ὀπρῖνόμενα Græci vocant: vt quæ febris cum frequenti syncope, cum singultu, cum synceris deiectionibus. Rudis illa & nimis antiqua 17 Hippocratis distinctio, laudanda tamen, vt fuit ætas. Febres aliæ manu mordaces, aliæ mansuetæ : quædam vehementer rubræ, nonnullæ admodum flauæ, aliæ crocæ, aliæ crudæ, &c. quæ pluribus 6. Epid. ab Hippocrate & Galeno, tum initio librorum de differ. feb. explicata sunt, nondum tamen satis intellecta : quod 18 vox Pemphigodes satis ostendit, non satis intellecta interpretibus. Alij enim ad pestilenciales, nonnulli ad vaporosas & humidas transferunt. In qua sententia fuisse visus est Galenus in exegeſi vocum Hippocratis.

17 Hæc ex sent. 29. sect. 1. lib. 6. Epid.

18 De hac vide Gal. comm. in citatum Hippoc. locum.

Alia verò diuisio febrium, quia hæ acutæ ac celeres, vt ardens & tertiana : aliæ longæ, vt typhodes & quartana : nonnullæ mediæ, vt quotidiana & semitertiana. Acutæ sunt, quia propria tempora ad finem vsque celeriter percurrunt. Acutum enim & celer idem est.

Sunt è Græcis, qui ex ratione prægressæ causæ ita diuidunt. Aliæ febres derepentè atque ex causa manifesta ortæ sunt. Hæ minùs periculosæ, minùsq; fallax præſagium ostendunt. Aliarum causa ignorata, quod latenter atque longo tempore cōtracto in humoribus vitio ortæ sint, de quibus hoc verbum Hipp. maximè pronuntiatur, cōmune quidem reli-

19 Hippo.

aph. 19. li. 2.

quis morbis acutis, 19 Acutorum morborum non

omninò certè sunt pronúciationes salutis aut mortis. Atque hæ ferè periculosiores.

Longas item ex causarū varietate diuidunt. Longæ enim sunt vel quia materia frigida, crassa & cōtumax est, vt quartanæ: vel multa, vt typhodes: vel quia pars affecta frigidior est, vnde primū calor succensus est, vt quartana à liene longior, ab hepate breuior: vel imbecillitas ratione, ex quo 20 in senibus longior, in iuvene breuior: vel denique exteriorū vitio, quæ τὰ ἐξωτέρω vocat Hipp. ægri, Medici, ministrorum, loci, æëris, temporis anni, & simil.

20 Facultas enim naturalis senibus infirma: iuuenibus robusta. Vnde illi tardius: hi celerius febre defunguntur.

Aliæ item febres 21 peruigiles, aliæ 22 soporosæ nonnullæ mediæ. Somnus atque vigilia, utrâque si modū excesserint, malum. ex lib. 2. Aph. Praxagoras quasdā febres soporosas annotauit, ab anno 12 ad 16. & 17. driuata quadā pernicio. In soporosis, 23 grauius periculum est, si præter soporem & silentium, saltus partium, ac veluti cōuulsio, faciei rubor, oculorum fixus intuitus, à somno manuum neglecta abiectio, mœror, anxietas, deliria conuulsifica, motio articulorum, frigus.

21 Quod acres profundant vapores, sua caliditate & sicci-  
tate cerebrum continuò percellentes.

22 Ab oppressione cerebri nimia humiditate perfusi, nimiumque perfrigerati.

23 Hæc enim cerebrum grauioribus auctum symptomatis ostendunt.

Sed, quod ad institutum maximè pertinet, alia febris in solidis partibus, hæctica: quædam in spiritibus, diaria: tertium genus in humoribus, putrida-

## DE MORB. INTERNIS

De hæc tica differentiis & diariæ suo loco dicetur. Putrida fiet vel à bile, quæ tertiana: vel pituita, quæ quotidiana: vel atra bile, quæ quartana. An 24 verò à sanguineo, postea differetur.

24 Agitur hæc quæstio paulò pòst, capite de febre continua putrida.

Putrida rursus vel intermitit, vel continua est. Quæ intermitit, Hippocrati quidem aph. 43. lib. 4. sine periculo est: Diocli minus periculosa, quàm continua, ac ferè salutaris: sed quæ tamen aliquândo interficit, & maximè ubi talis est, qualis soporosa quæ proximè descripta est. Continua magis periculosa, quæ tertio quoque die exacerbatur, auth. Hipp. & Archigene. Accedit ad periculum, si quarta die vel tam grauis est, vel etiam asperior, quàm fuit tertia.

Cæterùm quandoquidè hîc de curatione febriû agitur, primum est, vt febris species cognoscatur, ex propriis signis, communibus, & externis cõiecturis. Cognita febris specie, causæ magna ex parte innotescunt. Secundû est, vt febris cõstitutio intelligatur. Quod fiet, si obseruemus qualia sint, & quanta fuerint & futura sint vniuersalia febris tẽpora, principiû, incrementû, status & declinatio. Deinde 25 quod in toto morbo, idè in particularib<sup>9</sup> accessionib<sup>9</sup> obseruemus, & has rursus inter se cõparemus. Postremò adiûgemus externa, anni tẽpus, etatẽ, locum, regionẽ, peculiarẽ ægri naturã, &c. eiusmodi: videbimûsq; ne quid ministri peccent, & vt æger imperata faciat. Ita fiet, vt & morbi natura cognoscatur, & remedia medica fideliter adhibeantur. Certû denique ac minimè fallax præfagiû de febre instituat.

25 Vt si ex longo morbi principio morbum eundem fore longum dignoscamus.

*De Tertianâ.*

**T**ertianam facit 1 putrefacta bilis, 2 non quidem in venis, sed toto corpore dispersa. Tercio quoque die accessiones habet ( unde tertiana appellatur ) quôdque putrefactum accessionibus singulis excernitur ; ferè per sudores & insensibilem transpirationem, aliàs etiam 3 vomitu, 4 & deiectione alui repurgatur. Duodecim 5 horas exquisita tertiana non superat accessione particulari, nec pluribus quam septem accessionibus sollicitat. Sic enim scriptum ab Hipp. aph. 59. lib. 4. Quamquam in Coacis præfagiis 5. 7. aut 9. circuitu ad summum iudicari scribit. Statû ferè habet quarta accessione, hoc est, die septimo. 9. 11. Decimotercio, qui septimæ accessionis dies est, declinat: atque ita soluitur. Initium ferè prima accessione, incrementû secunda ac

1 Quæ libet, pallida, rubra, vitellina, porracea, æruginosa: cuius certus locus est fomes, propria cystis, hepar, mesenterium, aut quæ circum præcordia, cauâque viscerum sunt loca.

2 Alioqui enim ardens esset, cõtinuâve febris, à qua tamen sola intermissione differt. Gal. cap. 3. lib. 2. de crisi- bus.

3 Effusa scilicet in ventriculum bile, sed non primis diebus. Præproperea nânque isthæc esset excretio, nec melioribus naturæ rebus instituta, quæ ante concoctam materiam veniret.

4 Prout bilis viam affectat.

5 Accessio longior aut breuior pro bilis copia maiore aut minore, eiusdémque tenuitate aut crassitie, ægriorum viribus raritate aut densitate corporum. Adde quod miscella pituitæ cum bile efficit, vt his in regionibus vel paucas exquisitas tertianas, vel propè nullas agnoscamus. Vnde nihil mirum, si paroxysmi vltra horas 12. 20. 30. etiam, itémque circuitus vltra septem producantur : siquidem pituita bili admixta à natura non facîle superetur.

## DE MORB. INTERNIS

tertia:accessionis tempus, à quatuor horis ad duodecim:inuadit cum rigore,in quo veluti pungentes aculeos sentiunt ægri:iniò quidem vehementior, paulatim mitescit, ex quo increfcit calor. Intima vrùtur, 6 iactatur corpus, vexat fitis & vigiliæ, solitudo quæritur. Hæc verò vt progreditur accessio in statum, calor admodum acris & mordax est. Pulsus 7 iniò tardus, paruus, rarus, debilis: postea magnus, celer, frequens, velox, & vt declinat accessio, paulatim redeunt omnia ad naturam. Post vigorem vomitus, sudores aut excretiones: & vbi iam concoquitur ad salutem febris, vt principio tertix & quartæ accessionû, vomitus, in fine sudores fiunt. Vrina 8 subrufa, subflaua, rufa, mediocri substantia, aut, vt Arabes, rubra, tenui, substantia ignea. Parte quidem inferiore subtilior: superiore vmbrosa atque nebulosa. In qua si 9 nebula alba, aut eiusmodi sublimamentû iniò appareat, nō trāscendet quartum circuitum. Si verò primo die vel secûdo 10 sedimentum album est, læue & æquale tertio circuitu terminabitur febris. Quod si talia non apparent primis diebus, id est, prima vel secunda accessione.

6 A bile per ipsum delata, quæ maius ac maius cundo acquirit incendium.

7 Primis enim febris inuasionib<sup>9</sup> calor ab inuiecta adhuc materia oppressus, non potis est citatiore pulsu emicare. Huc accedit, quod tum temporis nondum accensa bile habitus corporis refrigescit.

8 Ab ardore & biliosi humoris permixtione. Ex commentar. ad sent. 26. lib. 2. Prognost.

9 Nebulæ enim albæ in vrina concoctionum sunt notæ. Côm. 3. in Prorrhet. & in sent. 43. li. 4. de vict. rat. in acut.

10 Nam certius coctionis signum ab hypostasi, quàm ab aliis contentis, sumitur.

septimus circuitus expectandus est: tūmq̃ue rufæ magis sunt vrinæ. Et si contingit longiores esse accessiones, id efficit materiæ copia, aut crassior consistencia. Alioqui ad densitatem cutis, aut ad imbecilitatē naturæ causa referenda est. Describunt autem Græci & Arabes tertianā, quæ sit veluti 11 idea quædam & exemplar tertianarū omnium, quæ vt proprius ad ideā illā accedunt, ita & manifestiora signa proferunt, vel minùs manifesta. Excitātur hæ febres ferè æstate, tēperie calida & sicca, cœlo, ætate, ratione vitæ & aliis, quæ corpus reddūt calidius & siccāt.

11 In naturis enim quantumvis biliosis, victus ratio, aut vitæ institutum, aut quippiam simile generandæ pituitæ accommodatum concurrit semper, quod tertianam à sola fieri bile prohibeat. Ex cap. 3. lib. 2. de differ. febrium.

Curatio ad duos scopos relata est veteribus Medicis, alterationē & vacuationem. Alteratio, refrigerantibus & humectantibus: vacuatio per sudores & vrinas, perficitur. 12 Paulus rectè quidē infirma hæc remedia credidit, propterea quòd non tertiana illa, quæ idea & exemplum quoddā est reliquarum, nobis curanda est: sed quæ iam aliquid pituitæ cōmixtum bili habet. Oportebit ergo intendere in scopos illos veterum, sed ita temperare, vt quantum declinet curāda febris ab idea illa, tātūm curatio euariet. Initio ergo, si resistit aluus, 13 clystere leni, vel debili.

12 De hac re ampliùs nihil apud Paul. Æginetam cap. 20. lib. 2. scriptum, quàm apud Galen. lib. 2. ad Glauc.

13 Clyster eiusmodi parabitur ex decocti remollientium & refrigerantium, & lactucæ, portul. violariæ, florum nymphææ libr. 1. vel ex decoctionis eorundem refrigerantium & feri lactis ana lb. β. cassiæ, aut cathol. dissolut. ʒ. 1. vel cathol. & diapruni solutiui ana ʒ. 1. saccha. alb. mell.

## DE MORB. INTERNIS

viol. ana  $\mathfrak{z}$ . i. olei violacei  $\mathfrak{z}$ . 3. Verùm hic non nisi ante paroxysmum, vel post immittitur.

14 quodam pharmaco mouenda est. Medicamenta sunt, vt Cassia fistula ex decoct. violarum, prunorum, tamarindorum, & similibus.

14 Vt si bolum è cassia præscripseris, addito, si velis, rheo, atque etiam, si nihil vetet, diaphœnico pauco. Vel hanc potionem imperabis.  $\mathcal{L}$ . cathol.  $\mathfrak{z}$ . 6. diaphœnici  $\mathfrak{z}$ . 2. syrup. capill. vener. aut simil.  $\mathfrak{z}$ . i. cum aqua cichor. aut decocto conuenienti f. potio. Nunquam tamen adducere, vt paroxysmi die purges, ne geminum naturæ negotium facessas.

Vehementer cõmendant hanc potionem.  $\mathcal{L}$ . succi granati acidi & dulcis ana  $\mathfrak{z}$ . i.  $\beta$ . per noctem salubri loco resideat, postridie in eo suc. dissolue sacchari optimi  $\mathfrak{z}$ . i. Et si vehemens calor est, sacch. violaceum sit, & addatur porioni aquæ ros.  $\mathfrak{z}$ . i. Si verò pituitę aliquid mixtum est, loco aquæ ros. misce  
15 vini tenuis  $\mathfrak{z}$ . i. Lenies aluum, reuocabis appetitum, partes naturales roborabis. Quod si 16 obstructionis suspitio est, aquam end. aut hordei, vnus  $\mathfrak{z}$ . i. cõmiscabis. Alij  $\mathfrak{z}$ . 2. 17 oxyfacch. simplicis, succi end. depurati  $\mathfrak{z}$ . i. vtuntur eadẽ vtilitate. Vbi verò plus pituitæ mixtum est, pro succo end. succus rad. fœni. pro oxyfacch. oxymel simplex miscendũ est. Atque vtilius oxymel volũt, in quo ferbuerint fron-

15 Ad pituitam incidendam, & ventriculum roborandum, quod cetera omnia refrigerent.

16 Obstructionis notæ erunt, tensio, durities, dolor hypochondrij dextri.

17 Loco huius licebit zulapia concinnare è syrup. de cichor. simplic. capill. ven. acetosi simplic. granator. & aquis conuenientibus, cichor. end. bugloss. borrag. Vel

hoc apozema. ℞. radi. polypod. quern. cicho. oxylapath. ana  
 ℥. i. rad. petros. asparag. fœnic. in aceto per noctem vnam (si  
 magnus æstus) maceratarum ana ℥. i. folior. agrimon. cicho.  
 end. non lotæ, scariol. ana M. i. capill. omnium ana. M. ℞.  
 femin. frigid. minor. (si æstus sit) vel maiorum (si hyems) ana  
 ℥. i. femin. anis. & fœnic. ana ℥. 2. flor. cardiacorum ana p. i. f.  
 decoct. In colatura pro dosib. iij. dissolue syr. de cichor.  
 simpl. & capill. vent. ana ℥. i. ℞. f. apoz. clar. conditum pauc.  
 cinam. & fantalo citrino. Ab eo, si videbitur, purgato.

des nucis, vel tenues asparagi & hyssopi summita-  
 tes. Alij 18 contenti sunt ℥. 4. decocti prunorum  
 cum saccha. viol. ℥. ℞. Eodem modo & tamarind.  
 uti licet. tam remollita aluo de phlebotomia sta-  
 tuendum. Saluberrimum, 19 inquit Gale. febrib.  
 omnib. non modò continuis, sed iis quæ ex putre-  
 dine natæ sunt, secare venam, si ætas, vires, &c.  
 permittant. Omissum tamen hoc remedium à Græ-  
 cis, & omittendum quidem, si exquisita tertia-  
 na est. Alioqui admodum salutare: quod tamen  
 temperare oportet, 20 ut tertiana, quam curamus,  
 vel ad exquisitam accedit, vel ab ea recedit. Ara-  
 bes ex vrina rubra consilium sumunt phleboto-  
 miæ, fallaci quidem coniectura: quòd eam domi-  
 nantis sanguinis, vel grauioris incendij, indicium  
 esse putent. Talis enim vrina, aliquando infirmo

18 Hoc remedium aluum tantum mollit, non purgat.

19 Id scriptum passim reperias lib. 11. Meth. med.

20 Ut videlicet sanguinis minor sit detractio, si tertiana  
 propius ad exquisitam accedat: amplior, si minus propè.  
 Cæterum auocare nos à venæ sectione minimè debet, quod  
 iam pridem est ab Arabibus proclamatum, sanguinem nem-  
 pè bilis frænum esse & refrigerium: nam & phlebotome to-  
 tius corporis refrigerationem inducit, in qua magnum est ad  
 curationem momentum.



## De MORB. INTERNIS

ex hepate, vel rene plus æquo attrahēte, aut aliis de causis, non ex natura febris, procedit. Addunt præterea non esse detrahendum sanguinem ante tertium paroxysmum, obtruduntque experientiam, quòd quibus aliter sanguis detractus est, iis ferè exasperatum malum: secant ferè sexto die: aut prædici iubent fore, vt proxima accessio, quæ quarta est & die septimo, grauissima, ne id ex phlebotomia & peccato Medici contigisse videatur. Conueniunt cum Græcis in vsu eorum quæ vrinas mouent & sudores. Vtuntur plurimum oxyfach. simpl. syrup. acetofo. Græci, si materia sursum ascendit, & æger nauseat, vomitiones adiuuāt: si mordentur intestina 21 lenib. clyst. excludunt, alioqui lotia & sudores mouent. Vomitus cient ptisanæ tepidæ ℥. 4. sac. ℥. β. Aliud. ℥. decoct. lact. atripl. portul. an. ℥. β. olei communis ℥. ij. 22 tepido vtatur. Sed abstinēdum vomitionib. in iis maximè, qui ex consuetudine nō vomunt. In clyst. cass. ℥. β. aut catholici, plus etiam, vt res exigit, dissol. debet oleo viol. In iisdem vtendum est sacch. potius, quàm melle. Apio & anetho mixtis in potu, aliisque leuiorib. diuret. utebantur. Sudores mouendi sunt, si quidem resistunt, sub finem accessionum. ℥. ptisanæ vulgaris calidæ ℥. 4. aut ℥. 3. cum ℥. i. decoct. flor. cham. vel diluto oxymel. in quo nepethæ modicum ferbuerit.

21 Iuxta aph. 21. lib. I. Quæ ducere oportet, quò maximè vrgunt per loca conferentia, eò ducere oportet.

22 Vbi plus pituitæ adest, oxymellitis ℥. iiij. v. vel vj. ex tepida propinātur. Interdum ptisanæ ℥. iiij. cum ℥. j. syrup. acetosi simplic. Cietur autem vomitus initiis accessionum, si per se natura satis non moueat.

Idque magis, si crassior humor fuerit. Viratus est ptisanæ vulgaris potus calidus cum subduplo syrupi acetosi, ut sint ptisanæ ℥.3. syrupi acetosi ℥.1.℞. Vinum 23 quoque album, tenue, oligophorum, & urinas & sudores mouet. Verum neque urinae mouendæ sunt, neque exprimendus sudor, nisi cum apparuerint manifesta signa coctionis: multò maximè, cum iam perfecta signa coctionis apparuerint, & quæ vomitiones mouent, 24 tepida: quæ sudores 25 calida exhiberi debent. Quod si superioribus remediis non concedit febris 26 rhabarbaro utendum est ad ℥.1.℞. vel 3 2. Si verò neque his concedit, & 27 vires sustinent, phlebotomia de eadem vena axillari interna dextra repetenda est. Alioqui catharticis paulatim deducenda materia est, quale hoc est. ℥. syrup. de cichorio simpl. ℥.6. rhabarbari puluerati, & nodulo raro inclusi 3.2. suspendatur nodulus, & syrupo immergatur, capiat diebus intermissionis ℥.1.℞. syrupi, cum aquæ hordei in calidiore conditione, hydromelitis in frigidiorē ℥.2. Atque iam declinante morbo, & longius progressu medicamentis catharticis 28 aliquid eorum, quæ melancholiam purgant, miscendum est. Pars enim materiæ ardore febris in melancholiam versa est. In accessionibus, ubi vehementer sitiunt, sed maximè in statu, aqua hordei, 29 iulep violatū, syrup. violatus cum aqua frigida, vinum etiam album oligophorum, si quidem iam tempus est sudoris promouendi & urinae, exhiberi debent. Nec hoc quidem exigua quantitate, 30 sed semel quantum appetunt. Ratio victus, quæ refrigeret & humectet, non tam tenuis, quàm ab antiquis præscri-

## DE MORB. INTERNIS

pta est, propter consuetudinem victus. Licet enim  
vtri iusculis plurimum alteratis cum lactuca, acetosa,  
portulaca, hordeato cum seminibus frigidis alterato.  
Postea verò apparentibus signis coctionis, lacte amygd.  
pedibus ouillis, piscibus saxatilibus, caneris, percis & similibus, vitellis ouis: de quibus quia  
controuersia est, postea dicetur. Tùmque iusculis  
cōmisceri debent, quæ aperiunt, & vrinas mouent.  
Vsitatæ sunt radices acetosæ, petroselini hortensis &  
cichorij. Sed per omnia meminisse oportet, maiora  
remedia, vt venæ sectionem & cathartica, conuenire  
diebus quietis. Excrementa verò promouenda,  
cùm iam manifesta coctio apparuerit in vrinis. Vigilant,  
æstuant, sitiunt, & alia patiuntur, contra quæ  
remedia suo loco dicentur ad finem libri huius.

23 Nam omnem in partem celerrimè distribuitur, cùm  
tenuium sit partium. Sed vinum antequam tutò imperetur,  
febre facta remissiore concoctionis signa apparere est necessesse.  
Poterunt etiam sudores excitari frictionib. inunctionib.  
& sudorificis potionibus: vrinæ quoque cieri, decocto aperi-  
entium cum syrup. capill. ven. aut simil.

24 Talia siquidem ventriculum relaxant.

25 Vt celerius distribuantur, & ad habitum corporis per-  
uadant.

26 Vel hæc potio præscribetur. ℞. rhei electi ʒ. 2. infun-  
dantur in decocto refrigerante: vel in decocto è passul. mun-  
datur. & tamarindor. ping. ana ʒ. 3. additis semin. anis. melon.  
3. 1. flor. cardiac. p. 1. In express. dissolue cathol. ʒ. 6. syrup.  
capill. ven. aut de cichor. simpl. aut viol. ʒ. 1. f. pot. vel ex syrup.  
de cicho. compos. cum rheo ʒ. 1. aut ʒ. 1. β. cum decocto con-  
uen. aut lactis sero purgatio instituetur. Pauperioribus im-  
perantur diaprunum simplex & solutium, electar. de succo  
ros. diaph. diacarth. Sed hæc calidiore cœli tempestate nō ca-  
rent periculo.

27 Atque tum si vires effœtæ langueant, eas imprimis

confirmare oportebit, maximè verò hepatis & ventriculi robori consulere. Vt. ℥. conferuæ borrag. & bugloss. ana ʒ. i. electar. triaantal. & diarhod. Abbatis, vel aromatici rosat. an. ʒ. 2. rasur. ebor. & cornu ceru. an. ʒ. ʒ. cum syr. de limonibus aut de bugloss. f. opiata, vel cum saccharo rosaceo conditum. Et quoniam non rarò humor aut flatus in præcordiis colligitur, tumorem, duritiem, aut tensionem faciens, optimum erit, si prætumida, vel tensa sint hypochondria, fotum & litum imperiare. Fotus erit huiusmodi. ℥. malū. bism. cichor. agrim. scœnuanth. absynth. an. M. i. flor. chamæmelin. violar. anet. ros. an. p. i. f. decoct. in aqua & vinum album tum aceto pauco in fine addito pro fotu hypochondrij dextr. cum spongia. Post fotum efficcatus locus illinetur ex olei liliac. olei amygdal. dulc. & absynth. ana ʒ. ʒ. cum cera pauca comparato linamento. Si ardor vrgeat, epithemata refrigerantia, itémque ceratum santalinum, vitata nimio perfrigerio expirationem cohibente.

28 Vt folia fennæ, diaphœnic. diacatholicum.

29 Aut syr. nenupharinus, acetosus simpl. oxy sacch. syr. de limonib. cum tripl. aqua, aut quadrupla.

30 Vt calor febrilis extinguatur, & partes contemperentur.

Remedia quædam sunt vulgaria, quibus quidem uti licet, non nèglēctis aliis, quale hoc est. Sonchus tritus, sambuchus, plantago, ex aceto subiguntur, & carpis alligantur. Sunt, qui & 32 semperuium, & alia eiusmodi refrigerantia trita hepatis regioni applicent. Suspectum quidem hoc remedium, quāquam aliquando febrem extinguit. Sed nunquam hoc vtendum est, vbi obstructionis suspitio. Alij pul. fuliginis è furno, & saluiam contusam vnā miscēt cum oui albumine, & ita imponunt carpis. Nonnulli eandem fuliginem cum aliis, cæpis, albumine oui & germine, miscēt, acētum affundunt, admouētque carpis. Temeraria verò remedia cau-

## DE MORB. INTERNIS

stica, quæ vesicas excitant: quale est, quo vulgus utitur, radice ranunculi trita, alligata carpo. Eadem quoque 33 exteriori gutturi admouent. Itaque prudenter utendum est vulgi remediis.

31 Ex his vulgi remediis alia refrigerando, & febrilem calorem extinguendo prodesse creduntur: alia calida foras humorem mortificum trahendo. Sed temerè his non fidendum. Eorum enim usu sæpè fit, ut feruor quidem & intemperies reprimatur, materia adhuc resistente, quæ recidiuæ sit soboles.

32 Satiùs fuerit oleo rosaceo hypochondrion, irrigare, pauco aceto addito.

33 Hac enim arte scabritiem à fuligine oriri solitam prohiberi putant.

### *De Tertianâ nothâ.*

**T**ERTIANA 1 nothâ cum rigore quidem incipit, sed 2 languidiore. Materiam habet pituitam commixtam bili. Inuadit, ut plurimum, febris hæc otiosos iuuenes & intemperatos, sub Autumnum frequens. Signa eadem quæ tertiana, nisi quod habet commutata ex proportionē pituitæ ad bilem, media quodammodo inter signa quotidianæ & tertianæ. Alternis diebus inuadit: aliquando tamen, ut etiam tertiana duplex, 3 singulis diebus. Neque enim singulis inuadere diebus, neque alternis tertianam facit: oportetque non tantum ex periodis, sed propriis signis & symptomatis, cuiusque febris speciem constituere. Accessio ultra duodecim horas producit: aliquando ad triginta & eò plures. Non terminatur septem periodis, ut tertiana vera, vixque duodecima periodo, aut 14. terminatur. Sæpè etiam in mensem, quadragesimum

gesimum etiam diem extenditur. Nonnunquam sex menses integros perseuerat, feréque desinit in 4 vitia lienis. Hic plurima grauitas corporis, dolor vertebrarum, inflatio ventriculi, fastidia, sitis, magna oris amaritudo, vrina citiua & crassior, quàm in vera, ob crassitiem humoris à pituita permista. Clysteribus primum; non ita mollibus vtendum est deinde leui pharmaco: vnde primæ venæ repurgentur. Postea consentientibus numeris, phlebotomia, è basilica dextra. Auicennas post tertium vel quartum paroxysmum venam aperit, dextram æstate, hyeme sinistram.

1 Hæc vel ex vitellina bile (quam parit adustio) in ventriculo putrente ac tenaciùs in hærente, vel ex permixtione bilis & pituitæ, vt antè dictum est, gigni cõsuevit.

2 Languidior & diuturnior est rigor, quia pituita bilis acrimoniam, velocémque motum impedit. Hinc fit vt mitior sit rigor, sed alioqui longior.

3 Id accidit propter humoris copiam, & pituitosæ accessionem materiæ: quæ ambæ quotidianis accessionibus efficiendis sunt satis.

4 Nam in tanta febris longitudine melancholicus accumulatur succus à quo lienis tumores, obstructions.

5 Vt. ℞. malu. beton. mercurial. organ. calamenth. ana M. i. femin. anis. fœnic. ana ℥. i. hord. integ. p. 2. flor. chamæm. melil. ana. p. i. f. decoct. ad lb. i. In colatura dissol. cathol. & diaphœnic. an. ℥. i. vel catholic. 3. 6. diaphœnic. 3. β. aut diaphœnic. loco tantundem hieræ. mellis ros. aut anthos. sacchar. rub. an. ℥. i. olei chamæmel. & aneth. ana 3. i. β. f. clyster.

Victus aliàs parcior, aliàs plenior, vt breuitas, vel longitudo febri expectatur. 6 Nam in longis plenius nutrimus: in celebribus, parcius. 7 Victus sic incidens & abstergens, coctu facilis. Vrinæ & sudores paulò calidioribus, quàm in tertiana moueā-

tur. Iam apparētibus signis coctionis, Gal. hordeatis aliquid piperis adiecit. Amigdalino lacti aliquot amygdala amara commiscere licet, alioqui amygdala dissoluemus ex decocto rei, quæ incîdat & detergeat. Græci mulsa utebātur, in qua hyssopus ferbuisset, aut aliquid tale, quod videlicet sine insigni calfactione & exsiccatione vrinas ducat. Qualia sunt, spica Celtica, cinamomum, radices apij hortēsis, semina anethi, fœnicul. comē absynthij, sed quæ, cūm adstringant, non tam ad mouendas vrinas & sudores, quàm ad ventriculi robur, & biliosi humoris euacuationem faciunt. Oxymel quoque conuenit conditum aliquo aromate, vt spica vel cinamomo, puluere hyssopi, méthæ, calamenthi, stœchade.

6 Ex aphor. 7. libr. 4.

7 Qui bilis crassitiem, quam permista efficit pituita, tenuet. Idem verò victus sit *διαιτῆς*, id est concoctu facilis, vt qui partium naturalium imbecillitati prospiciat.

Potiones autem dilues magis aut minùs, 8 pro ratione febris, materiæ, quæ febrem facit, temperamenti, ætatis, temporis & similium. Iam ferè paratur hydrosachar. ex lb. .i. aquæ coctæ col. per manicam Hippocratis cum ꝑ. 3. sacch. & ꝑ. 3. β. cinamomi, vel ꝑ. 1. Veteres loco hydrosacch. mulsa utebantur. Nunc verò in frigidiore conditione, loco sacchari, melle albo vti licet, vel partim saccharo, partim melle albo.

8 Vt si plus affuerit bilis, vinum sit dilutius: si vberior pituita, meracius. Idem esto de melle iudicium in hydromelitis, aut oxymelitis vsu.

Vbi iam apparuerint signa coctionis, molliter

subducenda alius est ex iis, quæ postea dicentur. Non omittendum, quod Hippoc. primùm, deinde Gal. & Auicennas annotârunt, 9 vomitum à cibo tam efficacem esse in hac febre, antecedentem morbi causam vacuando, vt hoc vno remedio permulti conualuerint.

9 Vomitus à pastu potiùs excitatur, quia morbificus humor cibo mistus faciliùs expellitur. Adde quod transuersæ ventriculi fibræ, cibo & potu humectatæ, ruptioni minùs sunt opportunæ.

Historia est apud Hipp. de vxore Theotimi, quâ mulso succo granatorum percurauit, inde vomitu citato. Licebit itaque vti oxyfacchara tepida, vel oxymelite simplici cum aqua tepida, in qua sex rotulæ raphani coxerint, statim à cæna. Alioqui.

℥. hydromelitis ℥. 2. decocti hyssopi ℥. 2. β. detur tepidum à cæna.

Nostra ætas non feret tenuem victum, quem veteres, tertio tantùm quoque die ægrum nutrientes, præscripserunt. Nutriemus itaque, 10 vt semel in die comedant, remissionis vel intermissionis tempore. Vino tenui vti licet extra accessiones. Pullus iam satis adultus in aqua coctus 11 cum borragine, cerephyllo, oxalide, petroselino, hyssopi modico: coques autem ad putrilaginem, & si vis, iusculo sacchari aliquid iniicies, vt oui vitellum omphacio dissolutum.

10 Cibandi ansam suadebunt longiores accessiones, vires debiliores, ægrorû naturæ biliosa, & pleniori victui assuetæ.

11 Hæc comparantur cum ad compescendum incendium, tum ad obstructa liberanda.

Hordeato & lacte amygdalino vteris, sed benè cōditis 12 saccharo, vel melle albo. Ptisana vulgari, in

12 Vt pituita lètor magis detur.



qua anethi coma, aut aliquid feminis eius, apij, fœniculi, spicæ, cinam. piperis maduerit, vti oportet: aut in ea octauam partem sacchari, vel mellis albi liquefacies. Poteris imperare hanc ptisanā. ℥. hordei mundati pr. j. hyssopi, glycyrrhizæ mūdātæ ana ℥. β. iuiubarum, passul. mundatarum, cicerū rubrorum ana ℥. i. fiat decoctio in aqua purissima ad lb. 2. Colatura transfundatur per manicā Hippocratis cū ℥. 4. sacchari. Fiat 13 ptisana clarificata & aromatizata cum ℥. ij. 14 cinamomi, vel mulsæ, vel hydro-sacch. parabitur ex aqua, in qua pugillus spicæ Celticæ, aut stœchados efferbuerit. Materia clysterum, quibus interuallis vtendum est, furfures, hordeum, chamæmel. melilot. absynth. anethi coma, beta, scariola, ficus pingues, addita etiam lactuca, portulaca, acetosa, si refrigerandi consilium est. Quod si alius sit durior, addenda sunt remollientia. In decocto ad lb. i. olei communis aut chamæm. ℥. 3. mellis cōmunis ℥. 2. dissolues. Nonnunquam etiam vel cathol. ℥. vj. 15 vel diaphœni. aut benedictæ ℥. β. Supposito-ria acuantur cum ℥. 2. hier, picræ & ℥. i. salis gemmæ.

13 Refrigerat, deterget, incidit, tenuat, sitim sedat.

14 In vehementiore febre, & capitis dolore, aut cinamomum nullum, aut paucum exhibendum, quod suo calore febris afferat incrementū, & vaporosa sua substantia caput tētet.

15 Plerunque duorum ex his ana ℥. β. vel tantundem hieræ picræ dissoluitur.

Purgationes 16 conueniunt ex rhab. mixta parte agar. trochiscati, vt vtriúsque ℥. 2. cathol. ℥. 6. incorporentur. Alioqui pauperibus imperabis ℥. 6. catho. ℥. 2. diaphœnici cum hydromelite.

16 Iis præsertim diebus quibus minimè febris exacerbatur, 2. morbi die, 4. 6. 8.

Vel diaphenici ʒ. 2. agari ʒ. 1. cum hydromel. Quòd si ab infirmitate ventriculi metuatur, ℥. pul. hieræ picræ recentis, rhab. electi torrefacti & subtiliter puluerati an. ʒ. 2. incorporentur ʒ. 3. terebinthinæ, fiant bol. cooperti auro, vel nebulis, vt faciliùs trās-glutiantur. Laudantur pilulæ de rhab. maximè Autunno, de eupatorio. ℥. 17 aloës, rhabarbari, myrobala. citrincrum, succi agrimonix ana ʒ. ʒ. vniantur cum succo endiuix, aut fœniculi. Laudatur trifera Sarracenica sine scammonio. Syrupi imperandi, 18 oxymel simplex, oxysaccharum, syrupus acetosus, de scolopend. capillorum veneris, dilutum cuscute, cichorij, absynthij, cicerum rubrorum, sed diluta saccharo & tantillo cinamomi cōdienda sunt. Maximè probatur syrup. de cychorio compositus, qui etiam catholicus est, & ad omnes humores valens. Datur ad ʒ. 2.

Nonnunquam quia metuitur, ne degeneret in quartanam, imperamus dissecandis humoribus & aperiendo, quale hoc est.

17 Harum pilularum ʒ. 2.umat æger per horam ante cibum semel in hebdomade, maximè si ventriculus malè sit affectus, vt ferè est semper in hac febre. Aut integra drachma semel capietur à somno noctu, & intermissionis tempore.

18 Hæc continuis quinque, aut sex diebus mane atque etiam vesperi duabus ante cœnam horis exhibita humores præparant, obstructions explicant & reserant. Licebit etiam vrgente in ipsa accessione siti eadem imperare, si refrigerantibus, vt syrupo acetos. simpl. oxysaccharæ, & similibus, oxymellitis pars aliqua adiiciatur.

℥. summitatum lupuli, cich. an. M. ʒ. rad. apij. petroselinij, gramin. an. ʒ. ʒ. sem. melonum, cuscute,

## DE MORB. INTERNIS

anisi an. ʒ. i. ʒ. glycyrrhizæ rasæ ʒ. i. fiat decoctio ad lb. ʒ. pro dosib. 2. In col. dissolue syrup. de bisantiis & capill. vene. an. ʒ. i. ʒ. fiat apozema clarificatum & aromatizatum cum tantillo cinamomi, vel pulvere diarhodi Abbatis, vel triasantali. Aliud.

℥. rad. petroselini, acetosæ, graminis an. ʒ. ʒ. feminis anisi & fœniculi torrefacti, liquiritiæ an. ʒ. ʒ. summitatum lupuli, fumarizæ, cichorij cum toto an. P. i. trium florum cardiacorum ana P. ʒ. fiat decoctum ad lb. ʒ. In colatura dissolue syrup. capillorum veneris ʒ. 2. oxymelitis simpl. ʒ. i. fiat apozema, ut prius, pro duabus dosibus: 19 tempestius vsus erit tempore remissionis febris. Ab his verò cathartica imperanda sunt, quale hoc est.

℥. passularum mundatarum, hordei integri ana ʒ. ʒ. cinam. santali citrini an. ʒ. i. violarum P. i. fiat decoctio pro vna dosi: in qua infunde rhabar. elect. ʒ. 2. expressioni colatæ adde syrup. de cichorio simpl. ʒ. i. 20 fiat dosis. Aliud.

19 Tale apozema in febris declinatione si propinetur, vias mouebit, aut sudores.

20 Dosis hæc molliora tantum corpora mouerit, non robustiora, & duriorum aluum habentia, præsertim tempestate Aquilonia. Verum valentior fiet si addideris cathol. ʒ. ʒ. vel diaphœnici ʒ. 2. vel si ʒ. 2. fol. fennæ in decocto infundantur.

℥. hordei integri P. i. summitatum lupuli & absynthij, cichorij, eupatorii ana P. ʒ. feminis melonum, & cucumeris ana ʒ. ʒ. stœchados arabic. ʒ. i. folliculorum fennæ mundatorum ʒ. 3. fiat decoctio ad ʒ. iiii. In colat. infunde rhabarbari electi ʒ. iiii.

agar. trochiscati 3.ß. Expressioni adde sacchari albiß. 3.ß. vel, vt purget efficacius, syr. laxat. ros. pallid. 3. i. fantali citrini & cinamomi an. 3. i. Probatur inunctio hypochôdriorû ex oleo de cydoniis, de absynthio, chamemelino, anethino, & aliis quę stomachû corroborant. Balneum quoque probatum antiquis post signa coctionis. Sed iam vsus exoleuit, & perit industria parandi, quę suspectû auxilium reddunt.

*De 1 Semitertiana.*

**D**E hac febre 2 parum cõstat inter veteres Medicos, dubitatûrque, vtrum continua an intermittens: qua in re etiam Gal. dubius est. Ex tertiana interim semitertiana fit, inquit Gal. cap. 3. lib. de typis, & contrà: eadêmque ferè habet accidentia, sed hæc periculosa. Stomachum & neruosa lædit, lethargicas attonitâsque passiones infert, colliquat corpus, animi deliquia excitat, profunda vehementer commouet, typo fero 3 & periculi plenissimo, ætati virili familiaris, 4 Autumno peculiariter commouetur, tûmque periculosior, frequens Romæ, in Æthiopia & toto littore tractûque terræ, vbi cælû calidius cum aduentitia humiditate. Non semper cõtina, sed aliquâdo intermittens, 5 acutis non solûm, sed diuturnis cõnumeranda ex Hippocrate. Auicennas author est ad septimû mensem aliquando protrahi. Mitissima accessiones habet 24 horarû: mediocris, 36 fortis 48 aut iam cõtina est. Primo epidem. & 2. de diff. feb. multis disputat Gal. contra Agathinum & Archigenem cõtinaam esse, nec posse ex 6 duabus intermittentibus componi, aut 7 ex duabus continuis. Pessimum verò hoc genus febriû, quæ in crudis & biliosis humoribus in-

## DE MORB. INTERNIS

cenduntur. Cæterum duplex est semitertiana : altera simpliciter, id est, exquisita, quæ ex quotidiana continua, biliosa, tertiana, æqualiter mixtis bile & pituita, constans, primo die 8 horrificas habet accessiones, & ingeminantes : horrificas quidem ex natura intermittentium. Tertiana enim rigorem, quotidiana frigus facit. Itaque mixtis causis frigoris & rigoris initio accessionis fit horror, qui horum medius est. Ingeminatio verò propter naturam humorum : commota bilis putrefacit de integro pituitam. Pituita putrefacta calorem accendit, & bilem acuit, ita fit ingeminatio, horroreque inæqualis. Hæc stomachi labor est, totiusque nervosi generis. Secundo die, quo quotidiana continua sola regnat, nullus horror est : tertio die idem horror qui fuit primo. Est & altera semitertiana non exquisita, in qua alter humor superat. Vter verò superet, ex signis coniicies. Nam si biliosæ febris indicia superant, bilis pituitam vincit : utriusque autem symptomata concurrunt, seseque proferunt. Quo enim tempore biliosa inuadit, 9 rigor : quo desinit, vomitus, sudor, deiectio. Cum verò pituitosa, frigus, ceteraque quotidianæ propria sese ostendunt. Quo verò tempore uterque humor confusus incenditur, symptomata confusa medium quid efficiunt. Sed interim 10 semitertianæ tertiana complicatur, qualis est historia mulierculæ 2. de Crisibus, variè quidem scripta in Græcis codicibus, nec satis fideliter versa à Latino interprete. Ergò semitertiana cum horrore inuadit, diebus imparibus : paribus verò tantum frigus est, inæqualis pulsus, 11 calor quoque inæqualis. Modò enim increscit, quasi procedat accessio in

statum, aut in medio sit augmento: modo derepente horror inuadit, extrema frigent, calor in medium corpus contrahitur, soporosi fiunt, è stomacho laborant, conuelluntur, vrina ferè crassior, ac turbulenta. Animaduertendúmque in hac febre, num aliquando proferant se signa propria tertianæ. Sic enim tertiana complicata semitertianæ. Rursus videndú est, num semitertiana sit, cum tertianæ quotidiana complicata est. Neque idem est apud Medicos ὁππλοκή, id est, complicatio febrium & semitertiana. In semitertiana, bilis & pituita omninò confusa sunt, & æquali proportionem mixta. In semitertiana quotidiana, ferè cōtinua est, tertiana intermittens. In semitertiana, neque quotidianæ, neque tertianæ propria signa apparent: sed veluti ex duplici horum genere vnum quoddam confusum & mixtum genus coalescit. In complicatione verò manent integra signa tertianæ, integra signa quotidianæ, quæ suis interuallis proferuntur. Huius febris semitertianæ & proximorum generum Cornelius Celsus lib. 3. ex Asclepiade, ex eodémq; autore Aurelianus meminerunt. Est & alia de nomine controuersia. Ridet Gal. primo Epid. qui nomen tale semitertianæ indiderunt, propterea quòd potius dupla tertiana appellanda sit. Duplicat enim accidentia omnia tertianæ, eadémque duplo peiora habet, non dimidio minora, vel clementiora, quod sonare nomen semitertianæ videtur. Secúdo de differentiis febrium institutionem nominis approbat, quòd dimidio sui semitertiana cōstet tertiana. Nec id reprobatur ex Agathino lib. de typis. Ratio nominis ad curationem nihil pertinet. Recentiores Me-

## DE MORB. INTERNIS

dici eadem ferè dicunt. Alij tria genera instituunt. Minus, in quo pituita in vasis putrescit: extra vasa, bilis. Medium, in quo bilis putrescit in vasis, & extra vasa pituita. Pessimú verò tertium genus, quod continuum est, ac ferè interficit. Vrinæ rufæ, spissæ, superiore matulæ parte ex liuido flavescent, pulsus durus, inæqualis, frequens, dolor est capitis, grauitas, sopor, sed à quo vocati statim excitantur, cui si succedit acuta febris, admodum lethalis est. Curationes temperant mixta curatione tertianæ & quotidianæ. Eadem ferè curatio, quæ tertianæ nothæ, nisi quòd in semitertiana <sup>1</sup> maior pituitæ ratio habenda est. Itaque descripta curatione quotidiana, & repetita, quæ in tertiana dicta est, semitertianæ curatio fiet manifesta.

<sup>1</sup> Semitertiana febris dicta est, quòd ex quotidiana continua & intermittente tertiana sit temperata, vt scribit Gal. cap. 8. lib. 2. de differ. febr. Istam tamen appellationem idem reprehendit comm. ad sent. 5. sect. 3. lib. 1. Epid. quòd tantum absit, vt semitertiana quicquam tertianæ concedat, cum continuitatis causa longè grauior existat, tum verò duarum accessionum, quæ tertio quòque dieprehendunt, atque etiam longitudinis ratione.

<sup>2</sup> Etenim Hippocrati citato loco lib. 1. Epid. continua est: nec non Galeno cap. 8. 9. & 10. lib. 2. de diff. febr. Ac. cap. 4. li. de typis intermittentem aliquando vidisse Gal. proficitur.

<sup>3</sup> Sic Gal. eodem cap. de typis hanc febrem ait esse perniciosissimam, quam sæuissima comitantur symptomata. Vnde eam Hippoc. *φρικώδη*, id est, horrificam, appellauit.

<sup>4</sup> Propter retorridam ab æstate prægressa bilem. Febrem verò eiusmodi periculosiorem faciunt maligna qualitas bilis, & morbi longitudo.

<sup>5</sup> Habet enim à cōtinua quotidiana vt chronica sit, seu longa: à tertiana, vt acuta, propter symptomatū magnitudinem.

<sup>6</sup> Quæ alioqui non esset continua.

7 Nam tum horrida non esset: siquidem rigor & horror periodicus solarum sit intermittentium, non continuarum.

8 Maximè verò cum contingit vtriusque febris reduplicationem in idem tempus incidere, horrida istæ accessiones ingeminatur. Horror verò potius excitatur, quia bilis pituitæ permistione refracta verum rigorem facere nequit.

9 A delata per partes extimas bile: quanquam & ab ea, quæ mouetur per partes internas circa viscera, materia, rigor etiam suscitari possit, vt recentiores Medici obseruauerunt.

10 Vt si quæ bilis semitertianam parit, in alia parte corporis putreat, & alius biliosus humor in alia quoque parte succendatur, & hic moueatur alio die ab illo, qui semitertianam facit.

11 Quia bilis faciliùs, pituita difficiliùs inflammatur.

12 Maior enim est pituitæ prouentus in semitertiana. Vnde alterantia magis incidere, attenuare & detergere debent, cum medicamenta, tum alimenta.

### *De febribus horridis.*

Φ<sup>Π</sup> Græcis, horror est, vnde febris 1 Φ<sup>Π</sup>ω<sup>Δ</sup>μας, horrida. Horror remissus est rigor, media quædam affectio inter rigorem & frigus. Is autem fit calore flauæ bilis 2 humorem crudum commouente, & putrefaciente. Itaque febres omnes horridæ, succensa bile in crudis humoribus enascuntur, atque vtróque humore æqualiter mixto, si quidem cruditas putrefit in venis, bilis extra vasa, exquisita fit semitertiana.

1 Febris horrida est, non cui inuasionis, atque etiam accessionum ipsarum initio comes est horror, sed in qua per plurimam totius accessionis partem horroris Symptoma extenditur. Gal. comm. ad sent. 24. sect. I. libr. I. Epid. Cæterum non hinc noua febris species, sed eius quæ horrorem, vt symptoma perpetuum, habet, mos & natura explicatur.



## DE MORB. INTERNIS

2 Alta enim & profunda bilis est putredo propter eius incendium ingens.

Aliæ febres horrificæ, in quibus horror reperit, breuibus interuallis & eadem accessione, éstq; eiusmodi motus horrificus inæqualis, cùm videlicet natura conatur excludere materiam. Sed hæc propter crassitiem, aut quia densior cutis est, vel denique quòd natura non ita robusta est, resistit, nec potest discuti. In hoc genere tardissimè incalescunt, longæque sunt & principium accessionis & incrementum. Aliis simul atque motus bilis remissus est, nouus reddit insultus, quia dum calor affligit corpus, frigidi humores putrescunt, nouamque accessionem commouent, & inde frequens reduplicatio, quam *ἀντιδιπλωσις* vocant: sitque vt succedens accessio longè sit deterior præcedente, 3 quia iam lassata virtus est priore accessione. Sudores in his febribus mali. Etenim vi exprimuntur, non victoria naturæ effluunt: idque vel propter crudorum humorum copiam, vel virium imbecillitate m. Frigent extrema vrùtur intima, soporosi fiunt, vètres cruda deiiciùt, vrinæ crudæ, decolores, tenues, aliàs turbulentæ, & crassitudine præditæ, nullo sedimento, aut malo, inæquali, diuulso. Fastidia, animi deliquia, syncopæ, conuulsiones, mala omnia. Pessimæ enim febres, vt antè diximus, in quibus crudorum copia bili confusa est.

3 Horrore etenim affecti multùm insuper exudantes, difficili, funestóque malo implicantur. Hippocr. in Coacis animaduersionibus.

Curatio, vt antè, mixta, nisi quòd summa ratio adhibenda est, vt intelligamus vtra materia superet, cruda, an biliosa.

*De pituitosis febribus, & primum de quotidiana.*

**O**Mnem humorem frigidum & humidum in corpore pituitam appellari scribit Gal. 2. de diff. feb. Generatio pituitæ ab infirmo calore est, cibis phlegmaticis, intemperantia vitæ, otio, intempestiuis exercitiis, atate puerili & senili, hyeme, constitutione cœli humida. Tria eius genera à Gal. ferè statuuntur. A forti frigidityte, acida: à calore præter naturam, salsa. Vbi verò leuiter affectus calor, & pauca est frigiditas, dulcis & fatua. Salsa sitibundos: acida famelicos: dulcis somnolentos facit. Acida concoqui debet: salsa repurgari: dulcis & fatua naturæ relinquendæ sunt, quia facilè in sanguinem conuertuntur. Fit aliquando, vt phlegmaticus cibus non coquatur in ventriculo: quod inde generatur, cruditas est, non pituita, aut pituita cruda dicitur, quæ appetentiam tollit, inducit fastidia, & pallorem. Qui humor à cerebro per nares emungitur, aut distillat in corpus, pituita non est: quemadmodum nec humor ille vitiosus & crudus, vnde pruritus, vlcerosus affectus, lepra, scabies, & alia eiusmodi.

Saliua ore contenta potius pituita est, ad pituitâ naturalē propiùs accedens. Vniuersali nomine hæc omnia pituita sunt. Frigidissima & humidissima pituitæ species, quæ vitrea appellatur, ouorum albumini persimilis, vel vitro fuso, vehementes dolores infert, & quasi palo fixo impetentes, vbi loco calido, aut laxiore intestino impingitur, frigus infert, si immota est. Si verò mouetur per sensilia, rigorem, vt acida, commouet: nam & acoris est particeps. Vnde sub acidarum genere sunt, qui compre-

## DE MORB. INTERNIS

hendant. Leuiter hæ putrefactæ, aut ex parte epialam inferunt. Vbi verò putrescunt magis, præcedit rigor, febris. Alia dulcis rigorē non infert. Oportet ergo cum de pituitosa febre agitur, diligenter animaduertere in quo genere pituitæ febris incenditur. Nam ex eo & curandi ratio euariet, & præfagium certius instituitur. Græci ferè in genere de febre quotidiana scripserunt: Arabum familiæ plenius distinxerunt. Febris 1 autem quotidiana rarò aduenit sine 2 offensione stomachi & hepatis, 3 pulsu minimo, raritate medio inter pulsum tertianæ & quartanæ, tarditate simili tarditati pulsus quartanæ. Accessionum initia habet circa vespérâ: & noctu magis, quàm interdiu, vexare consuevit, quòd pituita eo tempore moueatur. Vnde Hippocrates lib. 3. Epidem. nocturnas febres quas appellat, intelligit quotidianas. Non inuadit cum rigore, sed frigus vehemens est partium extremarum: aliquando & 4 horror quidam est.

1 Hæc febris omnium est rarissima, si exquisita intelligatur, quòd ægrè pituita putreat. Seruatur enim à natura tanquam sibi familiaris, vt quæ deficiente sanguine cedat in idoneum naturæ alimentum. Gal. comment. 2. in lib. de rat. vi&ct. in morb. acut. sent. 44.

2 Nam superuacua potissimùm multa pituita in intestinis, mesenterio, circum ventriculum, viscera iamque caua sæpè coërcita putrescit, febrilem qualitatem nanciscens, quæ plurimum partibus illis negotium facessit.

3 A calore natiuo crudorum copia humorum obruto, impeditis instrumentis, & minore necessitate instimulante. Gal. lib. priore ad Glauc.

4 Cum pituita putruit, vel salsa est.

Difficulter eius materia accenditur, vixque in calorem commutatur frigus, vnde longum habet incrementum : materia est crassa & frigida, pigra ad motum, calor non ita magnus, 5 pori angustiores ac ferè constricti: ex quo fit, vt materia non possit tam celeriter discuti. Atque inde accessiones producuntur, aliquando ad horas octodecim : atq; vbi desit accessio, vestigia quædam febris reliqua sunt. Vnde nonnullis non tam intermittens, quàm continua credita est. In declinatione 6 sudores nulli, aut si qui sunt, à multitudine materiæ, non victoriâ naturæ excitantur. Postea iam progresso morbo, 7 paulatim sudor effluit. Primùm quidem certis partibus, deinde verò toto corpore emanat : calor ferè similis ei, qui fumoso igni comparetur, humidus, vaporosus, non deurens, 8 sed tantùm leuiter acris est.

5 Pituitosa enim corpora minùs sunt perspirabilia, quia frigidioris temperamenti dominatu tenentur.

6 Primis præsertim diebus, in quibus humoris crassities, lentor, caloris infirmitas, & cutis densitas sudores erumpere vetant.

7 Cum scilicet cocta aliqua ex parte est materia, & obstructions liberatæ.

8 Qualem dixit Hippocrates initio quidam ad manum mitem esse, sed paulatim incrementem esse, sub finem sect. i. lib. 6. Epid. Hic enim calor tardè augetur, quia materia ligni viridis more tardè inflammabilis existit.

Ægri non 9 vruntur, non iactant corpus vehementius, non nudant pedes, aut pallia deiiciunt. Neque vehementer spirant, aut efflant igneum. Non appetunt frigidam, 10 & leuiter sitiunt.

9 In his enim calor minimè est acris, sed vaporosus.

10 Id fit quia ventriculus multa madidus est pituita quæ calorem & siccitatem sitis effectrices causas reprimat.

## DE MORB. INTERNIS

Vrinæ albæ, tenues, aquææ, crudæ initio ab infirmitate caloris, progressu temporis, vt facta concoctione & obstructionibus solutis, crassescunt, multumque deponunt sedimētum. Frequentior febris hæc constitutione phlegmatica, quam proximè descripsimus. 11 Longa quidē ex ratione materiæ, sed non ita periculosa. Addunt Auicennas & Arabum sectatores, grauitatem capitis, totiúsque corporis, sopores initio accessionis, inæqualitatem frigoris partium extremarum, animi deliquia, 12 syncopas. Atque ex ratione generum pituitæ ita distinguunt. Primùm quidem ex eo quod gustus indicat falsus, dulcis aut acidus. In falsa horrificus motus est, vrina rufa, mediocri substantia. Pulsus fortior, velocior, densior quàm in cæteris pituitæ generibus, incertis nec statis temporibus cōmouetur, sitis maior est, nausea à frigore, calor sequitur, à calore sudor.

11 Ex Gal. lib. priore ad Glauc. Quo loco quotidianam periculi non expertem esse scribit, cū breue tempus naturæ relinquatur: quo suas vires colligat.

12 Quales dixeris stomachicas, vitio ventriculi orificij à crudis humoribus perfrigerati obortas.

In phlegmate naturali fatuo, saluatio, vrina citrina vel alba & spissa, pulsus tardus, rarus, nullus saluæ gustus, grauitas capitis. In phlegmate dulci vrina rubra vel subrubra, per totum spissa, pulsus velox, densus, paruus, inuadit media nocte. In declinatione sudor, oris 13 amaritudo, sitis, capitis grauitas, excrementa fœtida. De vitreo in epiala & alijs. Excrementa omnibus quotidianis deiectiones & vomitus periculosa.

13 Quæ putredinem materiæ morbificæ insequitur.

Curatio.

*Curatio.*

14 Primis diebus cùm tenues sunt vrinæ, sepe etiam albæ, vtendū est incidentibus & aperiētibus: materia enim crassa, quam incidi oportet, & iisdem medicamentis liberantur obstructions. Verū in falsa & dulci, iis quidem 15 leuioribus & paucioribus diebus vtēdū est. In vitrea & acida, fortioribus, idque pluribus diebus Græci & Arabes ad septim. diem vtuntur. Iustus terminus definiri non potest.

14 Curandi ratio euariat secundum morbi tempora, & materiæ naturam. Initio itaque antequam ad ista incidentia & aperiētia veniatur, opportunum fuerit clystère aluum subducere, aut blandiore cathartico: à quibus interdum de venæ sectione cogitatur, vt cum aucta febris, & quæ generis eiusdem coeunt indicationes, id præcipiunt faciendum.

15 Pituita enim dulcis, itēque ea quæ falsa, minus est contumax, leuioribúsque cedit incidentib. & aperiētib. cum alioquī à vehēmētoribus metuendum sit, ne in vtraque febrile incendium magis inualescat.

Conueniunt itaque oximel simplex, & hoc leuior, syrup. acetosus, aqua sacchari cōdita cinamomo. Fortiora 16 sunt oxymel diureticum, scylliticum, syrup. de duabus & quinque radicibus, & aliā descripta capitibus morborum phlegmaticorum.

17 Laudatur plurimū melicratum, hyssopi, thymi, pulegij, stæchados, rerūque similium.

16 Hi syrupi crassos humores potenter incidunt, extenuant separant.

17 Huius autillorum loco hoc poterit apozema sufficere. ℞. rad. polypod. quern. petros. asparag. cichor. totius feminis cartham. & passul. mundatar. ana ʒ. i. agrimon. cuscut. fumarie ana M. i. thym. aspleni, adianth. ana M. ʒ. glycyrrhiz. ras. ʒ. ʒ. sem. anisi. fœniculi, melonum & cucumeris ana ʒ. 2. flor. cardiacor. & anth. ana p. i. f. decoct. ad lb. i. In colatura dissol. oxymeli. simpl. & syrup. capill.

## DE MORB. INTERNIS

ven. ana ʒ.ß. vel (si valentiùs incidendum, attenuandum & detergendum) eiusdem oxymelitis & syrup. de duabus aut quinque radicibus tantundem, f. apoz. clarum, conditum cinamomo, pro dosib. iij.

Verùm habenda est ratio, vt iusta sit proportio mellis ad aquam. Nam ybi natura ægri frigida est, materia febris contumax, frigidum anni tempus, & cætera eiusmodi, 18 sexta pars mellis misceri potest, alioqui vel octaua vel nona. Hócque perpetuò meminisse oportet, in vsu syruporum oportere aliàs plus, aliàs minùs dilui. Neque consuetudo recipiēda, quæ tantùm duplum aquæ aut similis liquoris imperat, vt syrupos diluat.

18 Contra verò in naturis ægrorum calidis, calida tempestate, morbifica quoque materia calida, dilutius melicratum esse debet: promptè enim alioqui bilesceret, & morbum adaugeret.

Iam præparata materiâ, si quidem vrinæ crassæ & rubentes appareant, videndum est, an phlebotomia conueniat. Nam & antè, si tales vrinæ fuerint, conueniet multo magis, vbi vel pituita dulcis, vel salsa est. Arabes calida constitutione cæli, dextram basilicâ: frigida, sinistrâ pertundunt. Oportet autem parùm detrahère, quia affectus est frigidior.

Quod autè ad purgantia pharmaca attinet, neque cassiam, neque tamarindos, aliâque eiusmodi leuiora recipiunt: quia stomachum offendunt, & tantùm quod est subtile, euacuant. Itaq; & 19 aloë, turpetho, carthamo, & aliis, quæ dicētur, vti malūt.

19 Vt si in dosi vna superioris apozematis infundas agaric. recens trochiscati ʒ. 2. zinziberis gran. 6. & in expressione dissoluas diacartham. & diaphœnic. an. ʒ. i. ß. & syrup. de absynth. ʒ. ß. f. potio accommodata. Catapotia quoque clementiore ac humidiorè cœlo poterūt imperari.

Et quia semel non potest repurgari tota materia febris, 20 epicrasi vtendum est. Primum enim, vt antè dictum est, materiam incidimus, & obstructions liberamus, tum pharmaco vtimur, eoque leuiori, sed quod stomacho non noceat. Quinetiam omnibus medicamentis commiscere oportet ea, quæ stomachum roborant. Etenim in quotidiana stomachus ferè laborat: idque meminisse oportet, salsam & dulcem pituitam leuioribus educi posse, vitream & acidam non posse. Propterea in dulci & salsa poterit conuenire hæc potio.

20 Vt sensim quod noxium est, vacues. De epicrasi vide Galen. cap. 10. lib. 9. Methodi.

℞. summitatum absynthij P. 2. passularum P. 1. glycyrrhizæ. sem. anisi, & fœniculi ana ʒ. i. Fiat decoctio: in qua dissolue catholici ʒ. i. mellis rosari colati ʒ. β. Fiat 21 potus.

21 Hæc potio vt sit efficacior, addetur ʒ. i. aut ʒ. i. β. diaphœnic. Pauperioribus ʒ. β. diaphœnici, vel ʒ. ʒ. diacarthami, vel electarij Indi (quod Parisiis præparari minimè consuevit) totidem drachmæ in aqua absynthij, menthæ, buglossi vel cichorij dissolutæ satis erunt.

*Catharticum Auicennæ.*

℞. mastichis, zinziberis, turpethi benè gummosi ana ʒ. i. sacchari albiss. ʒ. i. cum decocto passularum fiat potus. Licet vti pil. elephanginis, de hiera, assaieret, vt sint harum alicuius ʒ. 2. agarici ʒ. i. & incorporentur syrupo ros. pallid. laxatiuo. Laudantur quoque hæc pilulæ.

*Pilulæ compositæ.*

℞. aloës lotæ in succo maioranæ, qui ventriculū roborat, ʒ. i. agar. ʒ. i. mastichis, cinamomi, piperis ana Gra. 8. cum succo absynthij formentur pilulæ.



Alioqui.

℞. massæ interioris pilul. hieræ picræ Galen. ℥. 4. agarici trochis. ℥. 1. sem. carthami, sem. vrticæ ana ʒ. ʒ. turpethi bene gummosi ℥. 1. mastichis, rosarum, cinamomi, galangæ ana Gr. 6. sacchari in vino albo tenui dissoluti q. s. cum oxymelite fiant duæ lozengæ pro duabus dosibus, sumendis tertio, aut quarto quoque die. Aliud.

℞. 22 pul. hieræ diacol. ℥. 2. agarici trochis. ℥. 1. nucis moschatae & cinamomi ana Gr. 8. cum syrup. de absynthio fiant pilulæ.

22 Hæ pilulæ potentiores sunt, & extirpandæ materiæ dicatæ: quibus cautè vtendum.

*Pilulæ probatæ.*

Auicennas agarici ʒ. 1. aut ℥. 4. corporat melli, aut eandẽ dosim 23. sem. vrticæ præcipit, datq; breuibus interuallis. Quæ sequuntur pilulæ, multis probantur.

23 Vrticæ semen soluit aluum, non trahendo, sed pun-gendo & instimulando, ac veluti titillando, ex cap. 13. lib. 6. de simpl. med. fac.

℞. pul. hieræ picræ ʒ. 1. agar. troch. ʒ. ʒ. pulpæ colocynth. ℥. 1. mastichis ℥. ʒ. nucis moschatae & cinamomi ana Gra. 6. cum succo absynthij, formentur pilulæ pro duabus dosibus. Aliæ.

℞. agar. albi, turpethi benè gūmosi ana ʒ. 2. aloës, rhab. corticū myrobalanorum citrinorum, & chebulorū ana ʒ. 1. sem. cuscutæ & absynthij, eupatorij ana ʒ. ʒ. mastichis, laccæ, anisi, sacchari albi, spicæ nardi, glycyrrh. ana Gra. 18. 24 esulæ pulueratæ ʒ. 1. cum oxymelite scyllitico 25 formentur pilulæ.

24 Quæ ad purgandas aquas est valentissima.

25 Idem præstabunt pilulæ de agarico solæ, vel cum iis, quæ vulgò sine quibus vocitantur. Aggregatiuæ quo-

que & aureæ, adiectis, vt videbitur, gran. 3. aut 4. trochiscorum alhandal. Pilulas si æger abhorreat, ad potionem ex agarico & rheo infusis in decocto conuenienti recurrendum.

Conueniunt tempore frigido ad 3. 1. nec his tamen recentibus vendum est, 26 sed post mensem. Quæ sequuntur, caput & stomachum visceraque purgant, sensus acuunt, colorem reddunt, & diuturnam quotidianam sanant.

26 Tum enim singula medicamenta cum singulis melius permixta, fermentataque sunt.

℞. aloës optimæ 3. 3. mastichis 3. 4. rosarum, epithymi, caryoph. absynthij ana 3. 1. laccæ, cuscutæ ana 3. 1. croci, esulæ ana Gra. 8. cum succo absynthij fiant pilulæ Dosis 3. 1. ad 2. Dantur breuibus interuallis. Simul atque apparebunt vrinæ crassiores, & magis coloratæ, stomacho consulendum est per ea, quæ postea dicentur. Conueniunt 27 fots ex oleo cham. anethino, iasmino: quibus totus venter fouendus, spina inungenda est, idque cum frictione. Laudata est veteribus frictio ex tela aranæ, quæ imbuenda est prius oleis supradictis.

27 Fomentis istiusmodi locus nullus erit in viribus minime constantibus, & febre plurimum intensa. Fomentaria autem talis erit formula. ℞. origan. calamēthi. salu. maioran. absynth. ana M. 1. feminum anis. & fœnic. ana 3. 1. cyper. & calam. aromatici an. 3. 2. flor. chamæmel. melilot. & ros. rubr. ana p. 1. f. sacculi: qui bulliant in aqua & vino albo pro stomachi fotu, vel etiam alterutrius hypochondrij. Licebit litum comparare, qui fotum proximè sequatur, ex olei absynth. & mastich. ana 3. 1. olei nard. 3. 1. addito caryophyl. nuc. moscha & ros. rub. ana 3. 1. cum pauca cera. Oleum moschatæ nucis chymica arte extractum horum omnium instar esse poterit.

Laudantur quoque diuretica. Balnea quoque  
Cc iij

## DE MORB. INTERNIS

in declinatione.

Sed neq; frictionibus, neq; diureticis, neq; pharmacis, multò minùs balneis vtendù est initiis febris.

Quod ad clysteria & suppositoria attinet, vbi resistit aluus, imperari possunt. Cõparantur autem ex eorù decocto, 28 quæ incidunt, attenuant, & flatus discutiunt. Inflatur enim magna ex parte præcordia iis, qui quotidiana laborant. Vomitus quoq; maximè, vbi nausea est, & iis qui facilè vomunt, utilis est.

28 Vt ex decocto parietar. mercurial. origan. calamenth. hord. femin. anis. fœnic. & similia.

Post initia iam vacuato corpore dantur horâ antè accessionem quæ sequuntur.

℥. 29 theriacæ vel mithradatij ʒ. i. propinetur ex vino tenui, Probatur quoque decoctum apij, vel quod sequitur.

29 Theriaca præterquam quod in domitorum humorum contumaciam discutit, & viribus ipsis confert, ad refrigerationem etiam ineuntis paroxysmi inhibendam conducit.

℥. zinziberis, origani, ameos ana ʒ. 3. coriandri præparati ʒ. 4. rosarum, calamenthi ana ʒ. 3. passillarum ʒ. i. coquantur in lb. 6. aquæ ad consumptionem medietatis. Dantur ʒ. 3. horâ antè accessionem. Vitæ 30 ratio institui debet ex iis, quæ coquant, attenuant, incidunt: & vt progreditur morbus, horum vis augenda est. Vinum sit album, tenue, aut vermiculum, vel hydromeli vinosum.

30 Eadem fermè vitæ ratio ineunda, quæ in tertiana notha, sed quæ humida sit minùs. Et quia quotidiana est longior, paulò pleniorẽ victum requirit, parciorẽ, cum tendit ad vigorem.

Abstinendù est multis iusculis, quia nec decoctione ita iuuant, & replèt caput, nec stomacho amica sunt.

Quibus si utimur, alterare oportet iis, quæ has noxas prohibeant. Adultis auibus utédum est potiùs, quàm iunioribus, quæ sunt humidiores, & excrementosiores.

*De febre epiala.*

**H**Πίαλον Græci vocant algorem, & febris genus, in quo sensus totius corporis inæqualis est. Nam 1 partes simul algent & calēt: ac alior quidem vehemens est, & calor mitis. Hinc epialon appellatum volunt: ἥπιον Græcis blandum & mite est. Febris huius materia est pituita vitrea, omnium humorum, qui in corpore sunt, frigidissima. Illa, siquidem integra est, neque putrefacta, 2 inexpugnabile frigus infert corpori, & ea, quæ superiore capite pituitam inuehere diximus, symptomata. Vix multa colligitur in corpore: eiùsque causa, vel ciborum materia, vel languidus calor, vel utrùmq. Si tota putrescit, quotidiana febris est: si tantùm ex parte, epiala. Quæ ergo pars non putruit, algorem: quæ putruit, vapores calidos demittit in corpus, unde febrilis sensus. Initio oscitatio, pulsus minimus, tardus, rarus, urinae crudæ & aquosæ, quotidie ferè inuadit. Accessio à quatuor horis ad viginiquatuor sed ferè breuior. Aliquando tertio quoque die, aut quarto commouetur, fortassè etiam maioribus interuallis. Neque falli oportet, ut tertianam existimemus, vel quartanam: quia tertianæ vel quartanæ periodis moueatur. Ad cognitionem huius febris antecedens vita, cælum, ætas, temperamentum, & cætera adhibenda sunt.

Hic abstinendum 4 phlebotomia. Medicamentis 5 incidentibus & calfacientibus utendum est: ut

## DE MORB. INTERNIS

hyssopi, calamenthi, origani, thymi, stæchados, melicratis, quibus quarta pars vini poterit commisceri. Alioqui syrupis vtimur in curatione quotidianæ descriptis, initio factò à leuioribus, vt syrupo acetofo, oxymelite, ad fortiores, vt oxymel compositum, scylliticum, & similes.

Iam incisa & concalsa ex parte materiâ, vtendum erit medicamento ex 6 puluer. hieræ picræ Gal. pul. hieræ diacol. ana ʒ. ʒ. videndumque erit, vt recentes sint, & electæ species, ex quibus pulueres componuntur. Post purgationem redeundum est ad incidentia medicamenta & alimenta. Atque interuallis glandibus & 7 clysteribus acrioribus vtendum, in quibus pulueres proximè dicti dissoluuntur ad ʒ. ʒ. Probant thermas siccas, vbi iam se produnt signa coctionis. Meliores thermæ, si ex rebus incidentibus & calfacientibus comparentur. Itaque calamentum, mentham, origanum, rosmarinum, thymû, satureiam, stæchada, & alia eiusmodi, quatuor partibus aquæ, & vna vini (albi, in fine decoctionis positi) incoquemus, atque inde pro ratione virium, 8 thermas comparabimus. Valent statim à thermis diatriumpipereon, diacalamynthes, aurea alexandrina, dianthos, & similia data ex vino tenui. Dosis ʒ. i. Poterit quoque his vti tēpore matutino. Sed optimum fuerit statim à thermis fricari corpus, sed spinâ maximè: deinde inungi oleis suprâ numeratis cap. de quotidiana, aut iis, quæ capite de paralyfi scripta sunt. Post hæc reponatur in molli lecto, & sumpto diatrio pipereo, vel simili, conquiescat.

Vitæ ratio eadem, quæ in quotidiana, sed attenuet magis, & incîdat.

1 Ex libr. 2. de different. februm, & libr. de inæquali intemperie.

2 Vt pote sauiſſimum rigorem: quemadmodum de colico Galeni dolore ab eiufmodi pituita vitrea oborto ſcribitur libr. 2. de loc. malè affect.

3 Non enim, vita ſuperſtite, tanta vis vnquam frigoris corpori ineſt, quæ multam congerere poſſit.

4 Ex quo febrilis caloris, non intenſi, certa fit ſignificatio.

5 A miſſo námque ſanguine tenacior pituita magis recrudſceret, vnde febris diuturnitatis metus impenderet.

6 Qualia erunt, ſyrup. de hyſſop. oxymel ſcylliticum, ſyr. de duabus & quinque radicibus de bizantiis, cum aquis abſynth. bugloſſ. borrag. Vel apozemata è radicibus aperientibus, itémque enulæ campanæ, ireos, & quæ capite ſuperiore ſcripta.

7 Raro in potu datur ob amarorem inſignem, quo plurimum ingrata eſt.

8 Tales ex origano, calamenth. centaurio minore, ſeminibus calidis, decoquendis, diaphœnico, electar. diacarthamo, hiera, melle anthoſato, & oleis calidis, diſſoluendis, inſtituentur.

9 In eorum ſimplicium decoctum igniti lapides iniiciuntur, & æger papillione vndiquaque tectus toto corpore vapores excipit.

10 Hæc antidota emendandis affectibus frigore conceptis inferuiunt. Idem præſtabit mythridatij, & theriacæ vſus. Vel talis opiata præſcribetur. ℞. conſeruæ anthos, acor. conditi ana 3. 2. mythrid. 3. 1. puluer. aromatic. roſ. deſcript. Gabriel. 3. 1. cum ſyrupo conſervationis citri fiat opiata, detur ad 3. ſ.

### *De Quartana.*

**Q**uartanæ materia ſuccus melancholicus, vel atrabilarius: quorum generatio apud Græcos ſuperaffatus ſanguis, vel flaua bilis.

Arabes torrefacta pituitâ 1 etiam melancholiam

## DE MORB. INTERNIS

gigni existimant. Quartana alia primùm inuadit, alia febres alias sequitur, 2 maximè erraticas, quam *ἡ μετέπλωσις* appellant, de specie in speciem facta febris mutatione. Arabes verò quartanam notham hanc faciunt, de qua sent. 29. lib. 3. Prognost.

1 Imò Græci pituitam sua consistentia crassam, ob idque melancholici humoris naturam referentem, quartanarios circuitus efficere profitentur. Qua in sententia est Galenus lib. 2. de crisi- bus.

2 Harum enim humor non integrè vacuatus, exurit, crassior fit, melancholiæ naturam induit, tandèmq; putrescens subiecta quartanæ materia subsistit.

In quartanam verò firmatur febris, quoties inter- mittit,prehenditque modū erraticum. Autumno 3 propè est, & cùm tricesimus, aut tricesimusquintus agitur annus. Febrium enim præcedentium materia non solùm putrescit magis cum tempore, sed torrefit, ac velut cinis quidā relinquitur. Quæ materia torrefacta, si aliis quidem partibus putrescit, feruet & commouetur: aliis verò non putrescit, neq; commouetur, quibus febris erronea fit. Contrà verò, si æqualiter hæc fiunt in corpore, quartana fit. Hoc genus quartanæ nothæ ætati consistenti magis familiare. Quæ verò quartana vera est, 4 declinanti ætati, hoc est, post trigessimumquintum annum.

3 Vnde aphorismus Hippocratis 25. lib. 2. *Æstiuæ quartanæ magna ex parte breues, autumnales, longæ, & maximè quæ hyemem attingunt.*

4 Hinc ille Hippocratis aphorismus lib. 5. *Apoplexia fiunt ab anno quadragésimo ad sexagesimum.* Quod intelligèdum scribit Galen. de melancholicis apoplexiis, quòd ea ætas melancholico succo coaceruando opportuna sit.

Qua ætate languescit calor, sanguis melancholicus colligitur, densatur cutis, & putrefacto sanguine melancholico quartanæ excitantur. Æstate breviores magna ex parte, quia humor tenuior est, cutis laxior, & materia faciliè discutitur. Autumnales longiores, maximè quæ hyemem attingunt. Harum materia crassior, cutis durior, externum frigus est, quod excretionem prohibet, & materiam febris intrò repellit. Nec perpetuò æstate breves, sed cùm materia tenuior, sanguis tempestivè detrahitur, & iusta vitæ ratio observatur.

Aliæ febres, vitio 5 hepatis: aliæ, vitio 6 lienis: nonnullæ, vitio ventriculi. Ab hepate color albidus, subhumidus corporis habitus, urinae subrufæ sandarachæ colore: dextrum hypochondrium intumescit, 7 maior spirandi labor & tussis, quàm à liene. Atque hinc 8 inevitabilis ferè hydrops. Aliquando vitio ventriculi crudus humor verè potissimùm colligitur, tam crassus & contumax, quàm atra bilis.

5 Hepar feruidius atram generat bilem, febris quartanæ suscitabulum. Idem esto iudicium de cæteris melancholicis affectibus, quorum materia sæpè vitio hepatis non minùs, quàm lienis, congeritur.

6 Qui infirmus si fuerit, impotens est sanguinis fecem secernere: à qua retenta obstructio, putredo, febris.

7 Obstructum enim & repletum iecur magis diaphragma suo pondere premit.

8 Siquidem hepatis istius materiæ multitudine gravatius calor sanguinis author obruitur, atque adeò extinguatur: vnde *σέφθαι τῆς αἱματώσεως*, sanguificationis privatio.



## DE MORB. INTERNIS

Hinc quartanam gigni posse scribit 9 Aristoteles, id est, febrem, quæ quarto quoque die repetit. Nec id quidem repugnat Græcis, aut Arabibus Medicis. Etenim pituita quantitate pauca, sed consistentiâ multum crassa & viscida quartanarios, aut etiam rariores, circuitus facit. Sed quæ quartana hæc est, ad epialam referri potest. In vera ac simplici quartana, quæ sæpissimè contingit, 10 initio quidè frigus est, quod in altum penetrat, ut etiâ ossa pertundere videatur, calor sequitur non ita magnus. Non desinit in vomitus biliosos, sed ferè pituitosos. Tenuis 11 sunt urinæ & aqueæ, pulsus parvus, rarus, debilis, tardus, occultus, quarto ferè die repetit. Aliquândo tardius Autumno, & ætati declinâti familiaris, melancholicis naturis, magis etiâ, si constitutio anni frigida & sicca est, vita refrigerans & siccans.

9 Scribit enim Aristoteles problemat. 19. sect. 1. pueros quartanæ obnoxios esse, forsan quia in his melancholici humoris (cuius nomine pituitosum & crassum subintellegerit cum Hippocrate, & aliis antiquis Medicis) sit exuperantia.

10 Quartana vera, quæ est ab humore melancholico, his, quæ nunc colligit, circumscribitur signis.

11 Octo primis diebus: quia tum materie crassæ nimium in venas intrat, ingentis obstructionis necessariam consecutionem afferens. Quo fit ut crassior portio nequeat in principio excolari. At longius progresso morbo, coloratiores & crassiores prodeunt urinæ, natura concoquente, & obstructa liberante.

Post initia rigor fit, in declinatione sudores fluunt,

Quod si etiam lien intumuit, 12 diuturnius malum est, quàm si ab hepate ortum sit. Resistit aluus, facilius in sinistrum latus decubitus, metuitur hydrops.

Soluuntur quartanæ vrinis crassis, aliàs albis, aliàs nigris, euntibus mēstruis, aut hæmorroidibus fluentibus, profluuio sanguinis è naribus, abscessu in crura. Accessionem 13 ferè habet viginti quatuor horarum, aliàs breuiorē. Quartana 14 salubris est, neminēque iugulat. Quòd tamen intelligi debet non simpliciter. Senes 15 enim magna ex parte interficit. Aliquando quoque viscerum tumor est, defluxio in viscera, aut aliquid tale, vnde mortis periculum est. Producitur ferè in tertiū vel sextum mēsem, aliquando in annum, Auicennas in duodecimum annum produci scripsit. Nec id mirum. Nam Mæcenas 16 tota vita perpetua febre laborauit, supremo triennio nunquam dormiuit.

12 Et ad hydropem ferè semper ducit. Est enim lien sanguinis depurandi officina. Vnde suo sit supersedeat officio, aqua in omentum affluens hydropem accersit. Hippocr. lib. 2. de morbis mulieb. Cæterum difficilius curatur lien, ob eius calorem imbecilliorē.

13 Quinetiam quartanarum accessiones ita interdum inualescunt, vt duplicem & triplicem quartanam repræsentent, atque etiam ad continuitatē progredi videantur. Quod crassiori & copiosiori materiæ acceptum ferendum est. Gal. lib. de typis.

14 Hippocr. sent. 4. sect. 3. lib. 1. Epid. & Gal. commentar. in sent. 71. sect. 3. lib. 3. Epidem.

15 Omnes enim febres in senibus periculo non vacant. Funestæ verò his sunt maximè quartanæ, quia, vt vincantur, multo calore egent, cū facultas cōcoctrix in senibus elanguet, & expultrix quoque sit infirma.

16 Vide Plinium cap. 51. lib. 7. Sic Antipater Sidonius poeta omnibus annis vno die tantum natali corripiebatur febris: & eo consumptus est longa satis iam senectæ. Ex eodem Plinio.

Ad genus quartanarum longiores periodi referri

## DE MORB. INTERNIS

possunt. Hippocrates sect. tert. lib. primi Epid. quasdam 17 quintanas, hasque pessimas, facit : quæ aliàs ante tabem fiunt, aliàs tabidis superueniunt, & interficiunt. Idem septimanas longas, verum non lethales. Præterea nonanas cæteris longiores, sed non lethales.

17 De his quid Galenus senserit, videre est comment. ad sent. 7. sect. 3. libr. I. Epid. Vbi febris accessiones quinto quoque die, atque etiam septimo, recurrere quidem posse fatetur, sed novas febrium species constituere negat : quod illarum causa non alia agnoscenda sit, præter materiæ humoralis portionem, & prauam victus rationem. Vnde vel ad quotidianam, vel ad tertianam, vel ad quartanam, circuitum referantur.

Verum Gal. in commentario hæc non Hippocratis, sed alterius esse putat : scribitque nullas se vidisse periodos ultra quartanariam. Agnoscit tamen aliquando fieri posse, ut à præcedente febre semen aliquod relinquatur, neque iusta vitæ ratio obseruetur, atque inde fieri, ut vel 7. vel 9.5. vel 6. 18 die repetat febris. Verum non protinus quintana, sextana febris est. Quod si in ratione vitæ nihil peccatum est, & fiant eiusmodi periodi, quintana fit febris, sextana, &c.

18 Pro maiore, aut minore humoris synatrismo, celere vel tardiore putredine & motu.

Paulus lib. secundo quartanæ periodos interim producit ultra quartum Epialæ circuitus rariores aliquando, quàm quartanarij.

Rhazes & Auicennas, aliorum quoq; experientia, eiusmodi circuitus cognoscunt. Rariores etiam,

vr qui repetant decimoquinto quoque die, semel in mense, semel in anno. Existimantque hæc fieri à materia melancholica, pauca & crassissima, quam exusta crassior pituita generauit. Nec, si vltra quartanarium, circuitus quintani, septuimani, & alij admittentur, propterea nouæ humorum species fingendæ sunt.

*Curatio.*

Cum quartana 19 clementer agendum est initio: neque medicamentis catharticis natura irritanda: medicamenta quoque incidentia, & (vt vocant) digerentia media sint. Nam quicumque initio non solum catharticis, sed etiam fortius incidentibus, & digerentibus vtuntur, ex simplici 20 quartana duplicem omnino maiorem & difficiliorem, ex duplici triplicem, vel omnino ambas maiores, difficiliorsque reddiderunt. Nonnunquam in tempestiuo vsu remediorum continua fit, quæ ægros occidit. Tempora igitur huius febris diligenter animaduertenda sunt. Neque vrina sola, sed omnia accidētia consideranda sunt. Paroxyismi inter se comparandi, videndumque an grauiora, an minora accidentia superueniant. Verum quod ad pharmaca attinet, 21 non perpetuo expectanda sunt manifesta signa coctionis. Aliquando enim multa materia est corporibus neruosis impacta, sequiturque paralyssis: cuius si qua ostenduntur signa, etiam si manifesta coctio non apparet, maioribus remediis vtendum est. Neq; leuioribus pharmacis & clysteribus interdictum est. Verum, vt primæ venæ leuiter repurgentur, exhibebitur cassiæ fist. ʒ. β. æstate in sero caprino dissolutæ: hyeme verò in hoc decocto.

## DE MORB. INTERNIS.

19 Non defunt, qui vehementioribus vtendum medicamentis præcipiant, quòd à leuioribus humores tantum commoueri, non educi, putēt. At melius fuerit ad Galeni mentem totam curationem conuertere, blandiora vniuersali morbi principio exhibere, ne naturæ perperam irritatæ vlla inferatur noxa, instante verò coctione valentiora. Lib. 1. de art. cur ac Glau.

20 Validiora enim incidentia & digerentia febrilem calorem accedendo maiorem putredinem accerfunt.

21 Vulgò lene catharticum, minoratiuum appellant, propinatur: cuius vsu subducta parte aliqua materiæ, reliquam natura iam leuata euincat, ex Galen. comm. ad aph. 29. libr. 2. Quale erit. ℞. cass. 3. 6. rhei elect. puluerati ℥. 4. vel rhei loco (si purgare valentiùs est consilium) confect. hamech. 3. 2. cum sacch. f. bol. Sed vtilius fuerit potionem imperare. ℞. cath. dupl. fenn. & rh. 3. 1. cum decocto conuenient, vel sero lact. vel aqu. lupul. scolop. cichor. f. potio.

℞. passul. P. 1. foliorum 22 fennæ 3. 1. cinamomi & seminis anisi an. ℥. β. Fiat decoctio pro vna dosi: in qua dissolue vel cassæ, vel catholici 3. β. Alioqui ex iusculo galli vel capi alterato cum multa borragine, buglossò, apio hortensì, lactuca, scariola, infundimus, & cum nodulo incoquimus 3. 2. foliorum fennæ, & iusculum colatum sorbendum exhibemus: vel eadem folia liquidiore iure pisorum, aut cicerum rubrorum incoquimus, butyrum & modicum salis adiicimus, cinamomi etiam puluisculum, & ita damus. Eadem folia in puluerem redacta 23 pondere 3. 2. inspergimus decocti absynthij 3. 3. Frequens vsus veteribus fuit epithymi. Nunc folia fennæ plurimùm vsurpantur. Iam apparentibus signis coctionis vtimur agarico, 24 pul. hieræ picræ, hieræ diacol. quibus folia fennæ trita cōmiscemus. Veteres etiam elleboro, quidam lapide armeno & lazuli,

lazuli, fortioribúsq; catharticiis, quæ ex cap. de melancholia repetenda sunt. Quod ad digerentia attinet, conueniunt syrapi 25 capill. ven. de lupulis, scolopendrio, adiantho, violatus, de pomis, de fumoterræ, oxymel simplex.

22 Parua nimiùm hæc fennæ dosiſ. Itaque poteris ad 3 2. vel 3.3. imperare.

23 Doſiſ hæc ſatiſ efficax, plúſque facit, quàm ſemuncia foliorum eorundem infuſorum. Sunt qui eundem puluerem pari doſi cum vino albo aſſumunt, ſed nimis torminoſum illud eſt medicamen.

25 Vt ſint puluer. hier. diacolocynth. ʒ. 4. puluer. epithy. & fol. fennæ ana ʒ. 2. quæ modico melle excepta in ſerō caprino diſſoluantur, ſed huius remedij tutus non eſt uſus in calidiore tempeſtate.

25 Ex hiſ ſyrupis parabuntur zulapia aquis conuenientibus additiſ, ſcolopendr. fœnic. cichor. fumar. borrag. bugloſſ. vel apozema inſtitueſ hac forma. ℥. polypod. q. 3. radic. cappar. tamarifc. petroſ. & fœnic. an. ʒ. 1. agrimon. ſcolopendriæ, aſpleni (ceterach vocant ſeplarij) adianth. bugloſſ. lupul. humanæ ana. ʒ. 1. ſemin. frigid. maior. & aniſ. ana ʒ. 1. flor. cadiacorum & geniſtæ ana p. 1. f. decoct. ad t̄b. 1. In colatura diſſol. ſyr. de ſcolopend. & de bizantiis. vel oximeliſ ſimpl. & ſyr. de lupuliſ ana ʒ. 1. f. apozema, ut decet.

Deinde etiã apparentib; ſignis coctioniſ, 26 oxymel diureticum, ſyrupus de bizantiis, ſyr. de epithymo, Saboriſ, oxymel ſcylliticum. Alioqui melicrata ex abſynthio, eupatorio, chamædri, ſcolopendrio, radice cappariſ, fœniculi, petroſelini, ruſci. geniſtæ, fraxini, polypodij, tormentillæ, tamarifci, glycyrrhiſ, & ſimilium. Aut ex hiſ ſyrupos, apozemata, comparamus, ſeréque paſſul. borrag. 27 cuſcutam, ſcariolam, cichorium, quatuor ſemina frigida ma-

## DE MORB. INTERNIS

iora, se. anisi, fœniculi, carui, sem. portulacæ, coriandri commiscemus. Mel item passularum priùs descriptum, aliquid aceti, decoctum limacum, 28 ranarum viridium, succum pomorum odoriferorum, ex quo etiam syrupus concinnatur.

26 Hic, si vitium aliquod iecur obsederit, miscentur syrupide cichorio, de endiu. acetosus.

27 Hæc præsertim adduntur, si atra bilis sit vsta.

28 Remedia id genus empirica minimè vsurpanda sunt. Ranae autem virides si cui quartanae sunt vsui, cum à venenata sua qualitate, qua virus quartanae oppugnant, depromunt.

Sed in his omnibus diiudicandum: initio enim leuiores conueniunt, vbi neque fortiter calfaciendum, neque refrigerandum est. Eligendæque sunt, quæ vel temperata, vel proxima temperatis sunt. Vfus calidorum, cum iam viget morbus, & apparent signa coctionis manifesta, vt sudores & vrinas moueant.

Quod ad 29 phlebotomiam attinet, si quidem corpus crasso sanguine abundat & redundat, si gracile corpus est, si 30 venæ turgide, si suppressa aliqua solennis purgatio, vena secanda est, satis amplo foramine facto.

29 Satiùs fuerit post purgationem initio institutam venam pertundere, quam febris incrementum expectare, maximè verò si affulserit plethora, aut solennis aliqua vacuatio fuerit suppressa. De temporis missionis sanguinis delectu non inter omnes conuenit. Aliis placet hora paroxysmi, qua commotus humor se sequaciorem præbeat: aliis improbat. Sed tutiùs die paroxysmum præcedente vena secatur.

30 Videne flatu tantùm turgeant.

Atque ubi niger & crassus sanguis effluit, pro ratione virium & multitudine sanguinis deplendum est. Si tenuis & flavus, statim claudenda vena est, ferèque aperitur basilica sinistri brachij, vel saluarella, siue splenica vena inter annularem & auricularem sita, si quidem 31 viribus metuimus. Atque aliquando periculi gratiâ, ut qualis sit sanguis, cognoscamus, vena inciditur.

31 Interna enim axillari pertusa maior sit præ vasis capacitate spirituum effluxio. Attamen splenicæ illius & paruarum eiusmodi venarum sectionem Gal. irridet lib. de curatione per sang. missionem.

Suppressa purgatio suo modo incitanda est. Est & in quartana thermarum & balnei usus. A balneis (inquit Galen. lib. 1. ad Glauc.) penitus arcendi non sunt: à quibus si omnino abstineant, solis contenti frictionibus plurimum iuvare possunt. Galenus videtur omnino reiicere, nisi consuetudini 32 aliquid concederet. Hippocrates & Arabes, recentioresque practici hoc modo utuntur. Ante signa coctionis 33 dulcia quidem balnea, leuiter calfacientes thermas, ut brevis mora sit, permittunt, idque ante cibum, obstructionis metu, 34 extrâque paroxysmum, ut die accessionem præcedente. Apparentibus verò manifestis signis coctionis, fortiora balnea & stuphas permittunt, eadèmq; frequentiora. Quorum iusta ratio esto. Nam in quartana, per initia quidem, 35 omnis motus corporis & animi, qui quidem vehemens sit, vitandus est. Postea verò is conuenit, siue fiat 36 per pharmaca, siue 37 per potiones, & alia quævis remedia. Debent autem & thermæ, & balnea ex dicta materia comparari: gra-



## DE MORB. INTERNIS

ria exempli. Chamæmelum, melilotum, anethum, herba fœniculi, postea etiam calamentum, melissophyllum, pulegium, stœchas, origanum: coquatur aqua, unde lauacra fiant, & vapor thermarum excitetur. Iam apparentibus signis coctionis, à thermis & balneo tempestivus usus est theriacæ. Quartanarios (38 inquit Gal.) multos sæpè hoc ordine curavi: eo die, qui accessionem præcedit, vomitum à cœna commoui: postridie mane cremorem absynthij exhibui, tum duabus horis ante accessionem, theriacam dedi, idque tam fœliciter cessit, ut postea non redierit accessio. Hoc modo igitur ex Gal. Arabibus, & recentioribus Medicis in quartana te habebis. Vbi iam apparent signa coctionis manifesta, pridie accessionis, ex decocto sem. atriplicis vel raphani ad 3.5. vel 6. dato, aqua, vel ptisana tepida digito immisso in gulam, penna illita oleo, 39 vomitum à cœna commovebis. Stomachum oleo absynthij inunges, somnum in noctem procurabis manè.

32 Cui tamen perpetuò parendum non est. Non enim semper inhærere iis, quibus assuevimus, sed & contraria tentare nonnunquam nos oportet. Gal. comment. ad aphor. 50. lib. 2.

33 Qualia, quæ ex aqua potabili comparata calore temperata sunt, & leuiter digerunt.

34 Quam cibi nondum cocti, & humores crudi caloris impetu ad cutim protrusi ingenerarent.

35 Quamuis enim tum temporis mitis sit febris, & intermissionis diebus ad consueta munia æger redire possit, concitatore tamen corporis motu, aut animi contentione, verendum ne melancholia efferetur, & proinde concepto incendio febris ingrauescat.

36 Ut si in expressione 3. 2. aut 3. 3. folicul. sennæ in quantitate suff. apozematis superior, cum 3. 1. seminis

anif. infusorum diffolueris cathol. & fyr. de scolopend. aut capill. ven. vel lupulor. ana ʒ. i. confectionis hamech ʒ. 2. vel huius loco, diacarthami, aut electarij de succo rofarum tantundem. Pridie accessionis, quo tempore se admotum natura componit, commodius sumetur.

37 Preparantes, roborantes, vt per electaria, condita, &c.

38 Ex Gal. lib. de Theriaca ad Pison. cap. 26. Theriaca (inquit) exugens atram è venis & liene bilem, veluti virus quoddam, quartanis & melancholicis affectibus plurimum confert.

39 Impuritas enim ventriculi cibo permista facilius vacuatur, iuxta aph. 13. lib. 4.

℥. summitatum absynthij M. β. fiat decoctio in aqua ad ʒ. 3. colatura detur, quæ modico cinamomi cōdiri potest. Ex quo duabus horis antè accessionē, ℥. 40 theriacæ bonæ & antiq. ʒ. i. vel ʒ. 2. dissol. in vino albo tenui ad ʒ. 3. in quo calido chamædreos pugillus maduerit. Alij etiam initio paroxysmi eundem potum imperant: hocque meminisse oportet, cum diem, qui præcedit paroxysmum commodissimum esse & pharmacis, & aliis remediis.

40 Videndum diligenter, ne theriaces vsu intempestiuo, vt pote antè coctionē, febrem ingemines, & ex euentu ferè incurabilem reddas.

Alia quoque 41 antidota interuallis sunt danda, multò magis vbi manifesta signa coctionis apparent. Plurimus vsus theriacæ, mythridatij, aureæ alexandrinæ, Dosis à ʒ. i. ad ʒ. 2. ex vino, decoctione chamædreos, aqua ligustici (quæ ad stomachi inflationes præcipuè valet) cuscute, scolopédrij, fumaris, lupulorum, capill. ven. valerianæ, calamenthi & rerum similium. Probatum quoque & hoc.

## DE MORB. INTERNIS

41 Cuiusmodi erunt, quæ incidunt, obstructa soluant, cruditates tollant, flatus discutiant, vt diatria fantalum, diatrium pipereon diaspolitic. & similia.

℥. 42 cinamomi ʒ. 2. piperis ʒ. 1. croci, myrrhæ, sty-  
racis, sagapeni, ana ʒ. ʒ. benzoini ʒ. 3. rad. gentianæ  
ʒ. 2. excipiantur melle. Dosis ʒ. ʒ. aut ʒ. 2. ex aqua  
calida. Eadem dosis castorei, vel bituminis iudaici.  
Dentur autem duabus horis ante paroxysmum.  
Fotus & 43 illitiones non solum stomachi, sed & vi-  
scerum, lienis præsertim, primum quidem ex iis, quæ  
remolliunt & relaxant: deinde additis, quæ flatus  
discutiunt & apperunt. Conuenit oleum chamæ-  
melinum, aneth. absynthij. Adduntur & semina ap-  
ij, rutæ, cumini. Solenne fuit veteribus Medicis,  
obseruatum quoque recentioribus, vt præter supra  
dicta remedia, quæ antè paroxysmum descripta sunt,  
44 spinam, scapulas, brachia quoque inungerent,  
imminente febre. Cui rei conueniunt oleum cha-  
mæmelinum, de cucumere agresti, oleum, in quo  
rosmarinus coxerit, & ea quæ in paralyti dicta sunt.  
Sic enim præciditur causa paralyseos, quæ aliquan-  
do quartanariis accidit, ob crassos humores neruis  
impactos. Deinde rigor anteuertitur. Probatum  
hoc linimentum.

42 Hæc usurpari non solent: quæ si in usum reuocentur,  
summa cum cautione præscribentur. Facit autem hæc mistio  
ad ventriculi cruditates, flatus, obstructiones, & coctionem  
mirificè iuuat.

43 Sæpius enim hic inflatur ventriculus, intumescit  
, ac induratur lien: quibus partibus malè affectis litubus,  
fomentis, emplastris, & aliis eius generis remediis succur-  
ritur.

44 Ad leniēda symptomata, atque imprimis horro-  
 rē vehementiam. Illitæ siquidem oleis calidioribus hæ partes  
 præterquam quod frigori fortiter resistunt, sudoribus sæpè  
 sensim diffluunt: unde subtracta materiæ, quæ factura erat  
 paroxysmus, parte, vel nullus sequitur paroxysmus, vel cer-  
 te multò minor.

℞. succi rutæ ℥. 2. olei scorpionum ℥. 4. vini mal-  
 uatici ℥. 3. ferueſcant ad succi consumptionem, &  
 addito ceræ momento fiat linimentum. Aliud.

℞. cinamomi, piperis ana ℥. 2. terantur tenuissi-  
 mè & misceantur: & postquam spinam oleo cha-  
 mæ. inunxeris, puluerem inspergito: sequentibus  
 paroxysmis idem & in scapulis & brachiis facito.

Post hæc autem, quæ fieri debent imminente  
 paroxysmo, molli lecto ægrum reponito, bene  
 contegito, lateres calidos perfusos vino tenui odo-  
 rifero, & linteolis conuolutos, 45 plantis pedum,  
 & volis manuum admoueto, vel aliter contra fri-  
 gus munito.

45 Sed cum succensus fuerit calor, lateres submoueto, ne  
 pro quartana continuam inducas.

Iam vigente morbo, urinæ & sudores mouean-  
 tur. Cui rei melicratum è calamentho, mulſa, in qua  
 anethum, ruta & similia coxerint: 46 gaiaci de-  
 coctum conuenit.

46 Dummodo quartana mitior sit à succo melanco-  
 lio, non atrabilario. Decoctum dilutius erit propter febrem:  
 ut si maceres in libris aquæ 10. vel 12. ℞. gaiaci, & singula  
 coquantur ad tertias, addit. cichorio, vel oxalido & liquiri-  
 tia ad finem decoctionis. Interim diligenter consider, an tu-  
 midum sit dextrum hypochondrium: tunc enim gaiaci vsus  
 non admittendus.

De vomitu sic habeto. Qui isagogem seu Medi-  
 cum scripsit, initio paroxysmi extrema calfacit, in

## DE MORB. INTERNIS

remissione 47 vomitum prouocat. Græci à cœna vomitum ferè imperant.

47 Melancholici potiùs per inferiora purgandi, ex Hippocrate aphor. 9. lib. 4. Sed cum in quartana vomitus imperatur, id fit non ad coniunctam febris materiam, quæ rarò per vas venosum appellatum in ventriculum recipitur, sed ad antecedentem exigendam.

Auicennas ante cibum, post cibum, hora ante paroxysmum, initio paroxysmi. Practicis recentiores initio vomitum prouocant, & ante paroxysmum. Commodissima hora est commota materiâ, & facile sequenti. Id fit initio & remissione paroxysmi: fit etiam iam cœnatis.

In clysteribus eadem ratio seruari debet, quæ in pharmacis. Primùm enim ex remollitiuis vocatis, adiecto furfurum cremore, prunorum & passul. decocto. Postea verò vbi materia cœpit cōcoqui, paulò acriores clysteres conficimus. Dissoluimus autem initio quidem cassiam fistulam. Denique etiam cum materia decoctionis epithymum, folia sennæ incoquimus, ad 3. 2. vel 3. hieram picram 48 dissoluim. ad 3. 3. vel Galeni, quæ leuior: vel Oribasilij, quæ acrior, Cuius hæc est descriptio.

48 Sepiùs melle incorporata datur bolo, vel pilulis deglutienda: rariùs propter insignem amarorem dissoluitur, vt antè dictum est.

℞. aloës 3. 2. & Gran. 6. spicæ nardi, asari, mastichis, croci, xylobalsami ana Gra. 9. corticis rad. ellebori nigri ʒ. ʒ. terantur omnia, incorporentur ex decocto pulegij, vel succo absynthij, alioqui melle, vt gratiora sint. Dissol. autè huius picrę melle incorporatæ 3. 2. 3. vel 3. 3. qua & vti licet iam progressio morbo ad 3. 1. vel ʒ. 4. si inde formentur pilulæ.

Alioqui imperabis pul. hieræ picræ 3.1. pul. fennæ 3.ß. incorporabis ex succo absynthij, in quo semiscriptulum corticis rad. ellebori nigri madefeceris.

Quòd ad victum attinet, conuenit initio è materia media, interuallis quoque ab initio ad vigorem rebus acribus, vt sinapi & pipere, & falsamentis vti licet: quanquam & post vigorem tempestius vsus est. Similiter 49 diatriupereon, diaspoliticon ad 3.2. ex 3.3. vini vel maluatici, vel tenuis & odoriferi, idque ante paroxysmum. Id autem fiet commodè, vel tertio, vel quarto quoque die. Salsamentis veterum ferè caremus, neque, vt salsamenta Græcis & Arabibus permittantur, quibûsuis rebus sale conditis vtendum est. Non enim bubula aut suilla, non icthiocola seu molluta, 50 in summa iis, quæ crassum sanguinem gignunt, quæ nimium siccant, quæ viscidam materiam relinquunt, vti oportet. Nam ideo salsamenta imperantur, quia sal incidit, attenuat, discutit excrementa, siccant, virtutem colligit & roborat.

49 Regione & tempestate frigida, necnon declinante ætate. Impensius enim æquo electarium istud calfacit.

50 Tale aliquid scribitur à Galeno lib. 3. de loc. mal. affect. cap. de melancholia.

Vitanda sunt, 51 quæ refrigerât & siccant, nisi temperetur aliquo, quod humectet. Siccât capillares & refrigerât, scolopendriû, & alia, quibus hîc vtimur. Sed aliis, vt saccharo & aqua, corrigâtur. Refrigerantia verò & humectantia prohibet ex Græcis Aërius.

51 Vt enim ratione febris conducant, nocent tamen, humorem melancholicum altius impingendo. Quartana tamè ab atrabilario si fuerit, non æquè obsunt.

## DE MORB. INTERNIS

Auicennas permittit iusto modo, vt scilicet, facilis sint coctionis, boni chymi, quantitate modica, & si quidem nihil metuimus, ne inde vis concoctrix ventriculi offendatur, tùmque corrigēda sunt. Numerat lactucas, endiuia, melones, persica. Melius fuerit vti persicis conditis, cerasis & eiusmodi fructibus æstiuis, 52 qui saccharo conditi solent, & ita seruari. Alioqui persica coquuntur, si recentia sunt, nec condita. Cerasa duobus vasis conclusa cum modico vino macerantur. Saccharum inspergitur: ita prodesse possunt, nec nocent. 53 Vino quoque contra errorem multorum persica infundi possunt. Nam hoc à vino accipiunt, quod & inde frigiditate temperantur, nec faciliè corrumpuntur.

52 Alioqui enim si conditi non sint hi fugaces fructus, humores faciliè generant obstructionis & putredinis auctores.

53 Vinum sit album & oligophorum, capillo. vent. aut vnius decocto aspleni dilutum.

Lactuca & endiuia leniter feruefiant ad acetariam parandam. Saccharum inspergatur. Proban-  
tur conseruæ violarum, rosarum & borraginis. Sed perpetuò distinctio adhibenda est, vt in vsu horum omnium remediorum rationem ineamus naturæ, materiæ, ægri, cœli, regionis & reliquorum eiusmodi.

### *De 1 febre ardente.*

**C**ausas habet procatacéticas quidem, res non naturales, quæ siccāt & calfaciunt immodicè.

1 Quæ hoc nomine donatur κατ' ἐξοχήν, & passim ab Hippocrate ignis, ob insignem, quo cæteras antecit febres, ardorem, appellatur. Quanquam tamen non tantùm de vero causo, sed etiam febre qualibet vehementissima, vt

synocho vtrâque, interdum febris ardens dicatur. Fit à bile flaua in latoribus vasis vnà cum sanguine efferuescente. Gal. comment. in sent. 73. sect. 2. libr. 1. Epidem. Quòd si, vt plerùmque fit, pituita salsa bili commisceatur, ardens non exquisita erit. Ex commentar. ad sent. 13. libr. 4. de vict. rat. in morb. acutis.

Qualis est vehemens ardor solis, liberalior potus vini fortis, longa sitis, alimenta quæ calfaciunt & siccant. Plurimus labor, venus, vigilia, cæterâque eiusmodi: ex quo venæ exhauriuntur, exsiccantur, efferuescit sanguis, affectio sequitur, quæ febris ardens appellatur. Huius indicia 2 pathognomonica eadem, quæ in tertiana: sed vehementius aucta, nisi quòd neque præcedit rigor particulares accessiones, neque sequitur excretio: nam hæc fieri solent in ardore, cum 3 omnino morbus iudicatur.

2 Pathognomonica causi signa duo sunt præcipua, sitis inexpugnabilis, & exurens calor. Gal. comment. in sent. 34. sect. 3. libr. 3. Epid.

3 Tum enim iudicatio fit & morbi solutio, quum febre ardente laboranti superuenit rigor. Ex Hippocr. aphor. 58. libr. 4.

Sitis est vehemens, fastidiû, 4 iactatio corporis, 5 lingua arida, scabra, nigra, deliriû, 6 ventris erosio, effusio alui perpallida, 7 vigiliæ interim perpetuæ,

4 A tenuium humorum acrimonia corpus vndique lacerante.

5 Ab immodico calore, & tota corporis affectione sicca,

6 Si contigerit humores acres hîc confluere.

7 Non enim hîc vlla *ἀναθυμίασις*, seu blanda sanguinis euaporatio exurgit, quæ somni conciliandi sit potens: imò continua fit acrium vaporum cerebrum exsiccantium ad caput metastasis,



## DE MORB. INTERNIS

interim 8 profundi somni, eleuatis vaporib. crassis, qui cerebri meatus obfarciant. Nonnunquam fatigata virtute, vigilandi impotentia, & falsus somnus, interim nimium reficcato gutture, vox clangorosa & propterea mala, part. 13. lib. 1. Porrhetic. ac veluti 9 rauca, pessimum signum & lethale. Celerrimè interficit hic morbus, 10 quarto aut sexto ferè die, cùm à merabile natus est. Nam & ardor est, in quo flauæ bili crudus humor aut pituita falsa commiscetur. In hoc genere magna corporis perturbatio, capitis grauitas & dolor, conuulsio, à quibus mors. Vrinæ crassæ sunt & turbulentæ.

De ea re historiæ scriptæ sunt ab Hippocr. libris Epidem. de Polyphanto, Philini vxore, & Sileno in Epidemiis. Actuarius cap. decimoquarto libr. 1. de vrinis adolescentis meminit: qui post densum & conturbatum lotium conuulsus expirauit.

Causa huius vrinæ crudus humor & crassus, putrefactæ bilis ardore agitated, multo præditus spiritu: vnde turbatio: à qua in caput sublatus vapor crassus & mordax, qui dolorem, grauitatem, cōuulsionem, mortem denique inferre solet. Celerrimus hic morbus, atq; periculosissimus. Initio ergo præsagium instituendum est, vt calumniam declines.

8 Non morbi ratione, sed temporis, vt austrini. Comment. ad sent. 34. sect. 3. lib. 3. Epidem.

9 Ab arteriæ inæqualitate ex siccitate contracta.

10 Quia tantum ardorem perferre natura nequit. Itaque vel breui molestam causam excutit, vel ab eadem euincitur, & triumphata fatiscit.

Si itaque omnia supradicta accidentia statim initio magna sunt, si anxietas, timor modicus, rigor

subinde motus, sudor lenis in fronte & clauiculis, multa deliria sunt, squalescit cutis, carpuntur flocci, conuelluntur vestes, stragula colliguntur, frequens motus est digitorum, difficilius spiratur, et vehemens cordis motus est, extrema non ita calent, aut etiam frigescunt, nec facile ad calorem reuocantur, si diebus paribus exacerbatur, si tertius & quartus difficiles sunt, si urinae tenues, nigrae, crudae, paucae, alius quoque adstricta est, aut densit, quae colliquatione indicat, vel ea excrementa, quae ab Hippocrate, lib. 2. Prognost. 12. lethalia describuntur, si guttae 13 sanguinis naribus extillent, si non sitit pro ratione, curatio tentanda non est, sed praedicenda mors. 14 Hyeme ferè periculosior ardor est. Eorum verò si nihil est, aut lenia omnia, vel pauca quidem, & ea quidem minùs lethalia, desperandum non est: què admodum & spes est salutis, si omnino adfuerint contraria.

11 Propter conceptum incendium. Extremae verò partes vel frigent, vel minùs calent, à reuocato è circumferentia corporis in eiusdem centrum & meditullium calore.

12 Qualia aquosa, candida, crocea, spumantia, pingua, glutinosa, nigra, liuida, æruginosa, foetida. Ista sanguinis stillicidia Philisci, Epaminonis & Sileni exemplo improbantur Hippocrati constitutione temporis tertia lib. 1. Epidem.

13 Indicio enim est vel virtutis extinctionem in propinquo esse, vel resolutam fore facultatem appetitricem, aut mentem labefactatam collabi.

14 Non enim est tempori congener. Itaque oportuit causam concurrissè maximam, quae contrarietatem temporis superaret. Ex comm. ad apho. 34. lib. 2.

Differt à Synocho putrida. Synochus enim pu-

## DE MORB. INTERNIS

trefacto fit sanguine: ardor à bile. In synocho 15 vna est, sibi que similis ab initio ad finem exacerbatio. Ardor alternis diebus exasperatur. Iudicatur ferè hæmorrhagiâ, vomitu, sudore, alui deiectione, vrinis, in summa, excretionem. Genus autem excretionis his signis iudicabis. Sanguinem è naribus ostendunt aures & ceruix rubentes, cætera pallida, spontaneæ lachrymæ, caligo oculorû. Interim cum splendore grauitas capitis, colli, frontis & temporum, pulsatio venarum, quæ illic sunt, pruritus narium, contentio hypochondrij sine dolore, pulsatio spinalis arteriæ, faciei rubor, vrinæ, & alui excrementa sine causâ manifesta candicantia, pulsus magnus, manus tremulæ.

Est autem salutaris fluxus sanguinis, si die fiat decretorio, quod & reliquis excretionibus criticis commune est. Si è directo fluit, si fluit affatim, non stillat guttatim. Stillare enim pessimum, præsertim quarto, ex sect. 3. lib. 3. Epid. Verna constitutione, aut calida, temperatis corporibus, & biliosis iis, qui nondum triginta annos superant, vel etiam agentibus annum 35 magis accidit. Vomitus autem signa sunt horror inferiorum partium, frigus, pulsus durus & inæqualis, mordax capitis dolor, tenebræ obiectæ oculis, ventriculi dolor, 16 inconstantia labri inferioris, tenuis sputatio. Fit post annum trigessimum. Pueris etiam & in febribus admodum biliosis. Sudorè prænuntiant 17 pulsus vndosus & præmollis, rigor proprius ferè ardoribus, cum imminet crisis, suppressa alu<sup>9</sup> simul & 18 vrina, suppressa vrina & modicè mota aluus. Deliria incrementi, partes calidiores & rubidiores, vapor calidus, humida

anni cōstitutione fiūt magis. Sudores calidi esse debent, & toto corpore dispergi. Aliarum excretionum nulla propria signa sunt. Sed cum superiorum signa non apparent, & crisis imminet, inferiorem excretionem prædicimus per aluum, & vrinas. Interim etiam lumbis prægrauatis, tensis & dolentibus in mulieribus, mēstruorum fit eruptio salutaris.

15 Increscens, decrescens, aut æqualis. Quo fit vt his in synochis locum non habeat ille Hippocratis aphorismus. Circa finem & initium morborum omnia sunt remissiora, in statu vehementia.

16 Is libri inferioris tremor fit à bile interiorem ventriculi tunicam, quæ oris partibus communis est, mordicante.

17 Significat enim multam subesse materiam, quam solui in sudores oporteat.

18. Siquidem transfertur ad cutem materia vrinis cum sudoribus communis.

*Curatio.*

Bilis repurganda & extinguenda. Primūque animaduertendum, vtro remedio potius vtendum sit, phlebotomia, an cathartico. In idea & omninò exquisita, 19 phlebotomia omittenda est. Suspecta quoque in ea, quæ ad ideam proximè accedit. In aliis si numeri phlebotomiæ consentiunt, etiam ad animi deliquium, 20 auctore Galeno, sanguis detrahi potest. Nunc verò animi deliquium expectandum non est. Veteres etiam 21 purgationibus utebantur aliis quidē fortioribus, aliis leuioribus: præferendæ 22 leuiore. Hippocrates quarto de vict. ratione in morbis acutis 23 asinino lacte cocto, Gal. etiam sero utebatur. Mollibus clysteribus ex iis, quæ feruorem febris extinguunt, vti licet: vt paratis

## DE MORB. INTERNIS

è fero lactis, è decocto violarum, maluæ, roſti porcini, & ſimilium. Saccharum potiùs, quàm mel, in his diſſolue, oleum violatum potiùs, quàm commune. Catharticum conueniens 24 caſſia eſt in ſero lactis diſſoluta, aliquando etiam infuſum 25 rhabbarum, quæque cap. de febre tertiana dicta ſunt. Maxima pars curationis in 26 extinguenta bile conſiſtit. Extinguitur commodiſſimè victus ratione. Decumbat igitur loco ſuaui auræ expoſito. Quòd ſi locus ſine ventulo eſt, flabello vtendum eſt.

19 Quia in ea ſola bilis putret citra ſanguinis copiam.

20 Galen. cap. 4. & 5. libr. 9. Method. & commentar. ad aph. 23. lib. 1. Aphoriſm.

21 Exoletæ ſunt fortiores iſtiusmodi veterum purgationes, & ſcammoniacæ & acriores.

22 Sequax enim humor eſt bilis, qui cartharticis cedit clementioribus. Humores tamen turgere ſi contigerit, paulò fortioribus præſtabit vti.

23 Hoc lac ſelegit Hippocrates, quod nullius ſit acrimoniæ particeps, & coctione longa ſtatus ſuos demiferit, quia humidiffimum eſt, & promptiùs aluum ſubit.

24 Præſtiterit caſſiam bolo dare ad ʒ. i. vel ʒ. io. cum rheo puluerato, aut alio cathartico: diſſoluta enim implacida eſt.

25 In decocto ſcilicet conuenienti, vt pectorali vulgò dicto: vel tamarindor. endiuia, lactuc. ſcariol. & ſimil. refrigerantium, vitatis tamen adſtringentibus.

26 Plus enim qualitate, quàm quantitate, peccat.

Mollis ſit culcitra, ſtragula & linteamina tenuiſſima, minimè aſpera, & ſordida. Ideoque contra errorem vulgi 27 ſubinde commutanda ſunt.

27 Niſi tempus inſtiterit criſis, quo nihil mouendum.

Lectus

Lectus amplior sit, vt subinde locum commutet æger atque vt aër, qui imbibitur, frigidus sit: corpus reliquum 28 non ita perflatur ac refrigeretur, præfertim accessionis initio, & incremento. Obscurum aërem commendat Hippocrates. Alij 29 neque obscurum, neque lucidum. De ea re iam disceptatum est cap. de phrenitide. Æstate etiam aër cubiculi flabellis excitari ac refrigerari potest: aqua putealis alioqui frigidissima è vase in vas sæpiùs transfundatur, vt etiam strepitus ad aures ægri perueniat. Solum insternatur rosas, capreolis vitiù, lactucis, nymphaea, portulaca & similibus, aquâ rosarum & aceto, aqua frigida: rami quoque è salicibus toto cubiculo componendi sunt, ac subinde commutandi. Siccati enim iam lædunt. Quòd si aër non admodum calidus est, sed temperatus, eo contentus esse poteris. 30 Victus potus sit magis, quàm cib⁹ 31 mulsa cocta, sed diluta, nostro more, aqua cocta modico saccharo cõdita. Quæ ex hordeo potiones, forbitiones, alimenta comparantur, detracto cortice hordei (ad tollendâ siccitatem, cortex enim siccat) cõparentur: hordeata diluta sint. Aqua frigida ante vigorem vsui esse non potest. Aëtius permittit, si quintam partem aquæ temperatæ ad aquam frigidam adiicias. Verùm potius vtêris aqua, vt priùs, cocta, & modico saccharo violato cõdita, vt sit octupla aqua, sub octuplum saccharum.

28 Perflatum namque corpus minùs liberè perspirat: vnde augetur putredo & febris.

29 Sæpiùs aër deligitur ad ægri arbitrium.

30 Vt iusculum pulli gallinacei cum herbis refrigerantibus, oxalide, portul. lact. omphacio & similibus alterati & cocti: gelatina sine cinamomo, expressa, destillata,

## DE MORB. INTERNIS

Atque hæc quidem humida instituuntur, quia liquidus victus magis humectat, celerius & facilius coquitur.

31 Mulsæ vsus, quamvis dilutæ, non probatur. Satius erit saccharo edulcatam aquam coctam ( Hippocraticam appellant ) vsurpare, cui tantillum limonum, aut granatorum succi sit immixtum.

Alioqui pane prius eloto, abiectaq; priore aqua, aquam conficies, quam panatam vocant, eamque frigidissimam propinabis, sed maximè in vigore, & declinatione particularis accessionis, multò liberius. Iam apparëtibus signis coctionis, pruna multa aqua cocta cibo esse possunt. Præter hæc ceratum album refrigerans Galen. ilinendum est partibus, in quibus maior feruor est, vt hypochondriis & thoraci. Dictum autem prius ex vna parte ceræ, quatuor partibus rosacei simul liquatis, vase duplici comparari. Atque vbi refrixerit, in aquâ frigidissimam demergi debet, subigiq; vel succo lactucæ, vel semperuiui, vel eorum, quæ refrigerant simul & humectant. Si in thorace feruor est, loco rosacei, violaceum eligendum est, meliusque fuerit olea prius elui. Rosaceum ex aqua rosarum, violaceum ex aqua violarum quæ quia statim incallescunt, subinde commutanda sunt. Fiunt & 32 cataplasmata ex farina hordeacea, subacta succo lactucarum, cucurbitæ, cucumeris, nenupharis, polygoni, plantaginis, capreolorum vitis & similium. Folia lactucæ, ramenta cucurbitæ, aut cucumeris, manibus contrectentur, & 33 admoueantur plantis pedum.

32 Talia cataplasmata viscida non sint: alioqui incendium penitus intrudendo suspecta.

33 Columbos alij per medium sectos: alij Tincan piscem admouent.

Extrema 34 quoque aqua frigidissima immergatur, cui, si vis, tantillum vini commixtum sit ad penetrationem, vel ad refringendam frigidæ vim. Contineat in ore & lingua, folia portulacæ, lactucæ, aut acetosæ. 35 Genitalia inuoluantur linteo subinde inculcato in miscella ex aqua rosarum, vino tenui & aceto. Etenim mirabiliter contra æstum facit. Poteris os colluere aqua frigida, vel simplici, vel refracta quinta parte temperatæ. Veteres etiam cohleare succi rosarum, 36 contra æstum stomachi propinabant. Verum in usu horum omnium frigidorum obseruandum tempus est. Nam 37 initio & augmento febris non conueniunt. In 38 vigore & declinatione cum iam in superficie calor diffusus est, æstum extinguunt. Alij pulmones recens mactatorum animalium, columbos, pullos, catellos, diuisos medios, & vt dicunt, exenteratos, raso capiti, pectori, plantis, hypochondriis admovent, vt tepido calore, calorem igneum foras attrahant, laxatis viis fuliginem ducant, & per accidens refrigerent.

34 Si tamen crisis proximè imminet, id minimè ferendum.

35 Confert ista pudendorum refrigeratio propter eum, qui sibi partibus cum principibus intercedit, consensum.

36 Valent in hunc usum mala aurantia, citria, limones: orbiculatim secantur, & ex aqua rosacea & saccharo sumuntur.

37 Tum enim calor internas partes grauiter exercens frigidorum appulsu fieret intensior.

38 Summa summo in vigore febris urgente necessitate detondetur capillitium, & rosaceo oleo caput totum inungitur. Huc faciunt & irrigationes ex decoctis frigidis instituentæ, & futuræ præsertim coronariæ affundendæ.



## DE MORB. INTERNIS

Veteres thoraci, & pectori linteolum hydrelæo calente madefactum applicabant. Alioqui lanam, quantum manu capitur, in aqua & oleo rosaceo, vel violaceo calefactis madefactam, exprimebant è sublimi in pectus, modicum quoque salis & aceti adiungi potest: sic enim sudorem excitant.

Ad refrigerium quoque lactucarum tenella 39 germina, calente posca immergantur: deinde vel saccharo violato conspergantur, alioqui ex oleo & aceto comedantur. Melius oleum rosaceum, sed priùs abluatur. Practici recetiores miscella ex oleo chamæmelino, aceto albo, & aqua rosarum, hypochondria, pectus & latera, qua maximè parte feruent, inungunt, & ita dolores mitigant. Galen. 40 lini semine in hydrelæo cocto, & tepido admoto hypochondriis, æstum dolorémque mitigabat, oxymelite quoque diluto utebatur, multo maximè, vbi obstructionis suspitio. Quietos 41 esse oportet, quantum febris patitur.

De syrupis & eorum vsu iam antè dictum est. Familiaris est iulepus rosatus, 42 syrupus de limonibus, violarum, oxysacchara simplex, syrupus acetosus. Verùm syrupos multa aquâ cocta, vel aquâ hordei excorticati, aquis scabiosæ, buglossi & similibus dilui debent.

Aëtius 43 diacodio vtitur: nunc syrupo de papa. de nenuph. vti licet. Aquæ conueniunt distillatæ è cucurbita, cucumere, melone, portulaca, rosis, violis, oxalide & similibus. Sed oportet vel quarta vel sexta parte sacchari condiri, vt fiant iulepi. Iusculis quoque è carnibus vitulinis, iuniorum pullorum gallinaceorum, alteratis cum herbis refrigerantibus

æstum temperamus. Multa verò incidunt, vt deliria, vigiliæ, sitis, linguæ scabries, animi deliquia, dolores, singultus, tusses, colliquationes, aliæque eiusmodi, contra quæ remedia propriis capitibus dicentur.

39 Hæc conueniunt tantum robusto ventriculo, & iisdem affueto.

40 Ex cap. 9. lib. 3. Simplic. Eodem lini semine vtitur Hippocr. sent. 49. lib. 4. de rat. vict. in morb. acutis, quia molliat sine manifesto calore: quod in omni sedanda phlegmone est maximum.

41 Nam quietis commoda sunt multa: morbi coctio, virium custodia. Ex comment. Gal. in aphor. 6. lib. 6. & ad sent. 48. lib. 4. de ratione vict. in morb. acutis.

42 Ex his syrupis cum aquis stillatitiis dissolutis, vel decocto herbarum refrigerantium & humectantium, fiunt zupia, apozemata, liberandis infarctibus, bili extinguendæ, humori ad euacuationem præparando dicata, bis quotidie sumenda, vel etiam quavis sitis hora.

43 Sine speciebus appellato. Exhibetur autem dormituris duorum cochlearium mensura.

*De febre I putrida continua.*

**O**bstuuntur pori corporis & constringuntur, quia vel cutis densatur frigore, vel contrahitur immodico calore, vel rerum adstringentium contactu, vel balneorum naturalium, vel duritie obfarciantur, & impinguntur humorum lentore, crassitie copia. Præclusis itaque spiramentis corporis, fumosi effluxus quotidiani excrementi retinentur: nec iam perflatur calor & spiritus, quos necesse est libera transpiratione refrigerari, vt & excrementa diffluant, & externus aer excipiat. Commutatur ergo natiuus calor à fuligine retenta acrior fa-

## DE MORB. INTERNIS

Etus, & alteratur in qualitatem præter naturam. Præterea humores corporis, qui 2 motum caloris & spiritus consequi solent, iam non perflantur, neque liberè agitantur. Itaque & peculiarem quandam calorem præter naturam cōtrahunt, & ab alteratis calore & spiritu commutantur. Tria ergo iam concurrunt, quæ putredinem faciunt: impeditur transpiratio, calor nativus in igneum commutatur, 3 hinc putrescit humor.

1 Quæ fit à concepta in humoribus putredine, quæ continenter & assidue cor contingit, nec prius desinit, quàm exhausta fuerit putredo, & quæ est à putredine vindicata humoris massa, ad pristinam redierit naturæ gratiam. De febris huius causis vide Gal. lib. 9. 10. & 11. Method. medend.

2 Calor enim, spiritus & sanguis vnum sunt subiecto.

3 Iuxta vulgatum illud theorema. Corpora calida humida loco calido conclusa, nisi difflentur, statim putredinem acquirunt. Ex Galeno cap. 7. lib. 8. Meth. cap. 5. lib. 4. de temperam. & lib. 5. de Sanit. tuend.

Quòd si hæc modica sunt, diaria fit, tantùm alteratis calore & spiritu, non etiam putrefacta materia. Si verò maiora sunt, putrescit humor. Et si hoc quidem in venis, continua est: si extra vasa, 4 intermittens. Nascuntur continuæ ex inflammatione partium: intermittentes non ita. In continuis maligna putredo est & periculosa: in intermittentibus non ita.

4 Citiùs enim & expeditius tota discutitur materia, quàm cum in vasis est immerfa.

Putrefit autem aliquando 5 sanguis, nonnunquam pituita, aliàs etiam vel flaua, vel atra bilis. Et continuæ quidem materiã ferè habent putrefactam 6 in venis primis, quæ circa hepar sunt, 7 suisq; intermit- tentibus materia quidem & nonnullis accidenti- bus, 8 non omnibus tamen, respondent. Hinc febris continua pituitosa, biliosa, melancholica: verùm an sanguinea aliqua sit, non sine re dubitatum ab anti- quis: de quo certant Arabes cum Græcis. Galenus id pernegat. Idem etiam Alex. Aphrodiseus in Pro- blematis. Quòd si sanguis putrescit, parte quidem 9 tenuiore in bilem, crassiore in melancholiam commutatur.

5 Et cùm maximo humores teneantur commercio, om- nes putredinis participes fiunt. At ei potissimùm putredo at- tribuitur, qui copia maiore & cacochymiam inuexerit, & promptiùs computruerit.

6 Quæ per se continuæ sunt febres, materiam habent pu- trefactam non in venis quidem omnibus, sed præcipuè in ma- ximis, vt iecoris, pulmonis, inter alas & inguina.

7 Nominibus secum conuenientibus.

8 Vt rigore & horrore intermittentes, & continuæ con- generes non sunt.

9 Et ista sanguinis tenuioris in bilem commutatio huic controuersiæ attulit occasionem. Sed vt constet Ga- leni sententia de sanguine in synocho putrente libro septi- mo Methodi proposita, dicunt candidiores interpretes sanguinem tenuiorem in bilem non demutari, cum pu- tret, sed bilis veluti naturam referre, vt acrimoniam & mo- tum.

Contrà Galenum Auicennas multis disputat. Hippocrates 6. Epid. febres quasdam ἐξερύσους, id est, valde rubentes facit. Galenus in Commenta- rio valde rubentes intelligit à sanguine, materia in

## DE MORB. INTERNIS.

qua calor insensus est, vnde diffunditur & calor, & rubor in corpus.

Et quo tempore, ei qui continua febre laborat, pulsus magnus, velox, æqualis, urinæ sanis proximæ, horror nullus aut rigor, calor mitis ac vaporosus, succulentum corpus est, ætas ad iuuentam inclinans, vernum tempus, regio & cætera temperata sunt, verisimile admodum febrem esse sanguineam continuam. Verùm Galenus negat esse putridam: alij contrà Galenum certant his argumentis. Putredo (Galeno definitore) cōmutatio est putrescentis substantiæ: exempli causa, sanguinis ad corruptelam. Commutatio ergo motus est. Huius motus terminus à quo (vt loquuntur) sanguis est incorruptus: terminus ad quem, bilis flaua, aut atra, in quam, igneo calore, sanguis degenerat. In eo igitur motu substantiæ, quæ putrescit, hoc est, sanguinis forma deletur, & 10 noua inducitur, vt iam sanguis non sit, qui sanguis fuit, sed flaua vel atra bilis. Si ergo putredo est motus, suis terminis concluditur. At verò motum esse hæc verba indicant inclusa definitione, putredinis commutatio, & putrescentis iam acquisita noua forma. Cum iam è sanguine bilis est, motus ille desinit, ergo & putredo illa desinit. Iam verò constituamus synochon illam Galeni sine putredine, & ex ea commutationem in febrē biliosam. In eo tempore cōmutationis febris est, & putredo est. Commutatio enim putrescentis, &c. Febris ergo putrida est. Quòd si dicas non consequi, quæritur cùm in eo motu febris sit, ea aut putrida, aut non putrida est. Nemo enim dicat non putridam. Neque enim est talis, qualis

fuit quæ sanguinea non putrida dicebatur, & iam putredo cœpta est. Reliquum fit, vt semiputridam appelles mediam inter febrem sanguineam non putridam, & febrem, quæ fit iam mutato sanguine in flauam bilem, vel atram. Quæritur ergo cur non voces putridam, cùm portio humorû iam putruerit. Nec enim necesse est II vniuersam materiam putruisse, vt febris putrida sit. Nec in omni febre putredo per vniuersum corpus sparsa est: sed aliquando sola parte aliqua, vel partibus resedit. Et in intermittētibz putridis exiguum est, quod putruit: plurima materia integra est.

10 Noua enim est generatio, in qua ortus vnus alterius interitus existit.

II Non enim potis esset vitam consistere, putredine corpus vniuersum obsidente.

Neque satis constitutum est, cur putridam biliosam appelles iam corrupto sanguine in flauam bilem. Nam bilis illa ex 12 sanguine facta vel putrida est, vel non putrida. Si non putrida, non erit febris biliosa putrida. Alioqui estate, ætatis flore, cùm sanguinis bona pars bilis sit, putredo esset, corruptio videlicet sanguinis à calore præter naturam in flauam bilem. Si putrida bilis illa est, vnde putruit? Nam ea ætate & æstate, cùm sanguis in bilem commutatus est, bilis putrida non est. Rursus si putrida est, quæritur an bilis putrida bilis sit, an nō bilis? Bilem non esse putredinis definitio & natura motus secundum substantiam, quæ 13 mutatio appellatur, satis ostendunt. Nam in putredine corruptio est, eius commutationis finis. Si corruptio, ergo ab esse ad non

## DE MORB. INTERNIS

esse motus. Bilis ergo putrefacta, bilis non est. Iam sic collige. 14 Bilis putrida bilis non est, & tamen biliosa febre putridam denominat : ergo eodem modo sanguis corruptus in bilem, etiam si sanguis non est, febre sanguineam putridam denominabit. Quod si in tēpore motus febris illa putrida est, dicetur putrida sanguinea potiùs, quàm biliosa. Nā lignum, dum corrumpitur, etiam dum lignum, nec dum cinis est. Eadem ratione in aliis.

12 Bilis per affationem sanguinis facta aliquando impuris est, ut cum per inedias, labores longos, vigilias, æstatem, bilefcit sanguis : aliàs putrida, ut in febribus acris calore sanguinis corruptelam inducentibus.

13 Insistit in tempore mutationis, quo nondum bilem generatam ait.

14 Consecutio non est necessaria: quia tres reliqui humores, dum corrumpuntur, speciem non mutant, quamvis aliqua qualitate à sese differant.

Deinde queritur an 15 necesse sit sanguinem, qui etiam vehementer incaluit, conuerti in bilem? Quod si necesse dicas, cur igitur in reliquis generibus febrium, quas vel pituita vel bilis commouit, sanguis non corrumpitur? Cur in inflammationibus in bilem non degenerat? At in his etiam, ubi multos dies febris exarsit, sanguis 16 plurimus, isque integer, per nares effluit? Idem è venis integer aliquando detrahitur, & in phlegmone apostema sanguineum facit, non biliosum? Ergo corruptus in venis febre sanguineam faciet, non biliosam. Et cum scribit Galenus in febre sanguinea sanguinem putruisse in omnibus venis, vel ergo totus putruit, vel tantum pars. Si 17 totus putruit, non constabit vita, toto scilicet sanguine partim in bi-

lem flauā, partim in atram conuerso. Oporteret enim, vt consistat vita, sanguinem reliquos humores superare: qui si non superat, sed iam nullus est, nulla quoque vita est.

15 Hoc eget distinctione. Nam vel sanguis syncerus intelligitur, vel quatuor humores complexus: ille necessario per febrem bilefcit: hic non necessario, quod haud ita sit facilis pituitæ & melancholiæ in bilem commutatio.

16 Sanguis enim vbique vniufmodi non est: & potest in vna tantum parte corrumpi, & in altera esse integer.

17 Ex cap. 3. lib. 9. Meth. sanguis totus omnibus sui partibus in syncho putret, neque tamen sanguis putridus est totus, quia recipere pristinam naturæ gratiam potest, haud aliter ac vinum, cum accessit.

Si tantum pars putruit, cur 18 non & totus putruit, cum toti sanguini præsens sit calor, & reliqua, quæ putredinem faciunt? Deinde si pars crassior, vt vult Gal. quæ natura sua & siccior & frigidior est, magis resistere debuit putredini, putrefacta est, & in atram bilem versa, & multo magis reliquæ celerius putruerunt, & in aliam substantiam conuersæ sunt, vt iam nullus sit sanguis. Sunt & alia permulta, quæ Arabum sententiam confirmant. Sed in eo laborandum magis, vt fideliter curemus, quàm vt subtiliter differamus.

18 Non enim, vt dictum est, omnibus sui partibus est ad putrendum æquè aptus.

#### *Curatio.*

In febribus putridis & continuis quædam intermittentibus respondent, nisi quod neque rigor, neque frigus præcedit.



## DE MORB. INTERNIS

Non sequitur vomitus, aut sudor, intermissio nulla est, sed tantum remissio, quarum curatio eadem in genere, quæ intermittentium est, 19 seruata ea ratione, quæ in exquisita tertiana & ardente dicta est. Sunt & 20 synochi peculiariter appellatæ febres. Aliæ quidem homotoni, quia ab initio ad finem vna eademque exacerbatio est, ac veluti tenor vnus accessionis: aliæ ab initio ad finem perpetuò crescunt, & epacmasticos appellat Hippocrates: vt paracmasticos, quæ initio efferantur, paulatim decrescunt, quibus materia est sanguis: qui in maximis venis conclusus, inguinibus & clauiculis interceptus efferuescit. Is autem aliquando superat quantitate, aliquando crassior est, nonnunquam etiam putredinem contrahit: ex quorū distinctione consiliū vniuersale curationis transferri debet. Fingamus ergo Dionē iuuenem, aut ea ætate, qua desinit adolescentia, continua febre laborare: pulsus magnus sit, velox & æqualis, vrinæ sanis proximæ: horror nullus aut rigor, calor mitis ac vaporosus, corpore bene carnosum, tumentibus venis, sensu distentionis, rubente facie: adsint quoque cætera, quæ sanguinis generationem ostendant: statim colliges febricitare ex obstructione, quam efficit sanguinis plenitudo. Itaque 21 facile consilium est. Detracto enim sanguine tollitur plenitudo, & depleta copiâ sanguinis liberatur obstructio. Nihil verò reliquū est, quàm vt corpus, quod per febrem alteratū est, suæ naturæ restituamus. Quod quia nimium incaluit, refrigerandū est, vt hæc duo remedia sanguinis missio, & 22 tempestiuus frigidæ vsus, vel eorū quæ refrigerant & humectant, exactè percurēt synochon.

19 Curatio synochi imputris hîc potius describitur, quàm putris.

20 Hæ synochorum differentiæ à Galeno explicantur lib. 9. Methodi & lib. I. de differ. febr. Ex his illæ *ὁμότροπος* appellantur, in quibus materia ei, quæ transpirat, par relinquitur: *ἐπακμαστική*, in quibus vberior, quàm, quæ dissipatur, restitat: vnde & incrementales Latinis dictæ: *παρακμαστική* his contrariæ, vbi plus resolvitur, quàm subinde succenditur.

21 Facile est enim indicationem a morbifica causa, veluti plethora, petere, ex aph. 22. lib. 2. Aph. Debet autem sanguis quam primùm mitti ex lib. 9. Method. metu suffocationis & syncopes, nisi sudor multus hæmorrhagiæve è naribus eius vacuationis vice fungatur.

22 Vt in vigore febris, apparentibus coctionis signis, nulla inflammatione in visceribus existente, nulla in ventriculo imbecillitate, nulla item obstructione. Frigidæ loco syrupos imperamus, acetosum, de limonib. de acetositate citri, qui conuenientibus aquis, vt rosar. acetosæ, cich. end. borrag. bugloss. abundè diluuntur.

Phlebotomia authoribus Græcis Medicis ex interna dextri brachij etiam 23 ad animi deliquium esse debet. Quod si vires, aut 24 alia repugnant, quò minus tantùm materiæ semel auferatur, vacuationem partiri oportet. Et in mulieribus 25 propter menstrua, in aliis etiam propter suppressam aliquam vacuationem, ea seruanda ratio, quam sæpe diximus. Repetendum quoque, vt si quid vel cruditis in ventriculo & primis venis, vel si quid veteris stercoreis in intestinis, hoc quidem clystere molli: cruditas verò molli pharmaco ante phlebotomiam excludatur. Aut si res patitur & tempus, cruditas illa frictionibus, vnctionibus, & aliis remediis concoquatur. Post phlebotomiam duabus aut tribus horis mulsam Græci propinabant, ex hinc horâ ptisanæ cremorem. Nunc verò mulsæ

## DE MORB. INTERNIS

loco, quæ quidem suspecta est in magno calore, aqua cocta, cui octaua pars sacchari commixta sit, vtendum est : deinde hordeato, loco cremoris ptisanæ.

23 Præsertim si plethora, aut visceris inflammatio alicuius subest. Nam per largiorem illam sanguinis missionem statim totius corporis habitus refrigeratur, extinguitur febris, plurimis subducitur aluus, aliis sudores erumpunt, denique sanitas restituitur. Gal. comment. ad aph. 23. lib. 1.

24 Ætas, tempus, stomachi affectus, gestatio vteri, & similia.

25 Quæ si suppressa sint, primùm plenitudo, si adsit, minuitur secta basilica : tum verò saphena pertunditur ad menses prouocandos. Attamen scribit Gal. lib. de curandi ratione per sanguinis missionem sectam basilicam menstruorum fluxum præpedire ac reuocare. Sed hoc fortasse intelligendum de missione sanguinis haud exigua, quæ nihil vacuandum naturæ relinquat.

Victus in reliquum tempus instituendus est, qui refrigeret & humectet. Is autem 26 tenuis sit, & magna ex parte in sorbitionibus. Itaque nostro more iuscula conueniunt è iunioribus pullis gallinarum, vel vitulina carne molliuscula. Alteranda verò ex acetosa, lactuca, & portulaca. Potus, aqua hordei, syrupus violatus, multa aquâ cocta dilutus, iulepus violatus, oxysacchara simplex, syrupus acetosus, iulepus Alexandrinus, oxymel simplex, dilutum, vel hæc 27 oxysacchara.

26 Nam venæ sectione imminutus calor pleniori cibo conficiendo non est. Itaque Hippocr. 4. de vict. rat. in acutis inediam suadet.

27 Oxysacchar vulgò paratur ex sacchar. lb. 1. succ. grana. acidor. 3. 8. aceti 3. 4. & sufficienti aquæ quantitate.

℥. aquæ coctæ. lb. 4. sacchari lb. 2. aceti lb. 3. Fiat potus clarificatus pro pastu, & hora sitis. Verùm in

aceti & facchari modo id obseruandum est. In mulieribus, in gracilibus corporibus, in iis quibus intestina faciliè mordentur & raduntur, acetì vsus suspectus est, aut certè minuendus modus. Quantò maior calor est, tantò minor modus debet esse facchari. Apparentibus signis coctionis, nullus potus melior est aqua frigida. Postea etiam vino albo tenui, aquoso, vti licet, ex quo & sudores & vrinæ prouocantur.

In morbo, si resistit aluus, clysteribus mollibus incitanda est. Si verò etiam crassities humoribus accedit, incidenda & attenuanda est, diluto oxymelite & aliis sæpè enumeratis. Quòd si materia incisa, vrinis aut sudoribus vacuata non est, leui pharmaco vti licet, manna, cassia, rhabarbaro. Præterea videndum est, ne densata cutis, obstructa vel occlusa obstructionem faciat, à qua & putredo, & febris. Et, si quidem frigore densata est, calidis laxantibus vtendum erit, vt chamæmelino. Si densata, adstringentibus: & siccata, ad ea quæ humectant, refugiendum est, vt hydrelæum. Et iam apparentibus signis coctionis, ad balneum aquæ dulcis. Si verò occluditur cutis humorum copiâ, vacuatione opus est: si humorum crassitie, attenuantibus vtendum est.

Si lentore, detergendum. Practici maximam partem curationis in refrigerantibus collocant, quæ faciunt ex hordeato mundato, prunis damasce-nis, glycyrrhiza, quatuor feminibus frigidis, endi-ua, scariola, cichorio, lactuca, rostro porcino, acetosa, floribus violarum, nenupharis, buglossi, borraginis, & aliquando aliquid acetì adiiciunt. Nonnunquam syrup. capillorum veneris, portulacæ,

## DE MORB. INTERNIS

acetosæ, & aliis supradictis vtuntur: syrupósque diluunt aquis vel decoctis endiuix, capillorum verneris, portulacæ, acetosæ & similiū.

*De febribus 1 colliquantibus.*

**F**Ebres 2 hæ pessimæ, in quibus substantia corporis multis modis diffluit: idque aliquando paulatim, vt in marasmo & febribus hecticis: nonnunquam verò statim initio morbi substantia corporis dissoluitur, carnosum genus, pingue & solidum. Sed aliquando quidem fit effluxus substantiæ per insensibilem transpirationem.

1 Quæ sunt de genere continuarum, quas oleagineas appellauit Galen. comment. in sent. 28. sect. 1. lib. 6. Epid.

2 Talium febrium *κακοήθειαν* satis indicat colliquatio febris pestilentis symptoma inseparabile, ex commentar. in sent. 57. sect. 3. lib. 3. Epid. In his igitur feruentior calor aliàs humores tantum venis contentos liquat, nonnunquam corpus vniuersum: carnes primum, mox solida membra: quibus liquatis squamulæ cum vrinis excernuntur ex libr. 2. Prognosticῶν.

Atque hoc quidem dupliciter: nam aliquando fit paulatim, vt in febribus, quæ marasmodēs & hecticæ nominantur: aliàs verò breuissimo tempore.

Huius signa sunt, 3 nares acutæ, oculi concaui, collapsa tempora, & cætera in eo prognostico enumerata. Sed longè periculum maius est, si id drepentè fit, ardore febris & igneo calore, qui quidem substantiã corporis resoluunt in fumos, frugi quoque spiritum & naturalem per poros excludunt. Minus periculũ est, quum ex vigilia, insigni purgatione, inedia, rebúsque eiusmodi colliquatio facta est, eaque breui tempore reparari potest. Ex mæstitiã & grauioribus animi curis idem contingit, sed ea colliquatio non ita celeriter instaurari potest.

3 Hæc

3 Hæc facies Hippocratica vulgò dicta, quæ fit ex colli-  
quatione substantiæ in his partibus. Describitur ab Hippo-  
crate sent. 3. lib. 1. Prognost.

Propriè tum colliquans febris appellatur, in qua  
feruidus, malignusque calor est, qui non solum per  
insensibilem transpirationem, sed per 4 manifestam  
excretionē exoluit corpus. In hac deiectiones alui  
rufæ, 5 crassiusculæ, fœtidæ, aliquando pingues &  
viscosæ, biliosis quoque spuma insidet, quæ feruo-  
rem indicat: vrinæ similes. Aliquando etiam appe-  
tente morte tenuis sudor, syncope, & mors, à revo-  
lutione corporis totius.

4 Id scilicet quod liquatum est non modò per hali-  
tum & insensibilem transpirationem, sed per deiectiones &  
vrias vacuando.

5 In omni colliquante febre deiectiones & vrias tales si-  
mul perpetuò apparere minimè existimandum est. Sufficit  
enim colliquationem vno excretionis genere manifestari.

Si itaque in febre acutissima statim initio ex facie  
illa mortifera colliquationem intelligas, maioribus  
remediis omninò abstinendum est: tantùmq; pro-  
curandum est, vt effluxum illum prohibeas, & causas  
synopes anteuertas. In his febribus virtus ferè  
languida est, quæ maiora remedia non ad-  
mittit.

Atque vbi videris alui excrementa rufa, graui-  
ter olentia, spumosa, & vires languidas, non solum  
maioribus remediis abstinendum, sed etiam syru-  
pis, mellitisq; rebus, nisi eiusmodi syrapi plurimùm  
diluantur. Hippocrates 6 interdicit mulla, quæ  
tantùm octauam partem mellis recipit. Duo reme-  
dia annotat, ptisanæ cremorem & aquam frigi-  
dam. Utendum erit hordeato, lactuca, in summa,

## DE MORB. INTERNIS

rebus, quæ refrigerant & humectant. Aquæ frigidaë tempus est, cum res meliùs habere cœpit, & excrementa magis cocta sunt: quanquam & ante hoc tempus licebit vti frigida, si quidem æger vehementer appetit, vehementer sitit, & assuetus & potui frigidaë.

6 Itaque dicebat Galenus comm. 3. in lib. de vict. ratione in morbis acut. febribus colliquantibus aduersissimam omnium esse mulsam, vt iuuantissimam potionem aquæ.

Quòd si ab ea metus est, refringi potest decima parte vel octaua sacchari communis, vel violati, vel conseruæ rosarum veteris, alioqui eadem mensura syrupi violati, de papaue. de nenuphar. de acetosa, de agresta, de limonibus & aliis eiusmodi. Præterea 7 epithemata, illitiones, & hypochôdriis & thoraci conueniunt, quæ refrigerât, humectant, leuiter adstringunt, ex aqua rosacea, aceti momento, oleo rosaceo, santalis. Constitui debêt loco aura frigida perflato. Atque aliquando etiam flabello ventulum facere oportet. Et quia aliquando acrimonia excrementorum intestina exulcerari solent, clysteribus vtendum erit, qui refrigerent, humectent, leniant, quorum compositio ex cap. de dysenteria.

7 Cordi, iecori, ventriculo admouenda. Litus autem toti plerùmque spinæ instituuntur. Epithema erit eiusmodi. ℞. aquæ rosacæ ʒ. 6. aceti ʒ. 1. aut circiter: santalor. pulueratorũ. ʒ. 1. f. epith. Linimentum ex oleis refrigerantibus cerato refrigerante Galen. vnguento Comitissæ parabitur.

Cibus optimus hordeatum est, quod vt magis refrigeret, ex decocto lactucarum, vel seminum frigidorum, confici potest. Accidentia hîc multa sunt, de quibus postea.

**H**Anc febrem cognosces ex eo, quòd perpetuò iactantur ægri, 2 nec ullam seruant figuram decubitus. Omnia fastidiunt, hypochondria contenduntur, sitiunt, vigilant, aut in leui somno delirant. Materia crassus est humor, alioqui acris & biliosus, tunicis stomachi & ventriculi imbibitus.

Quanquam & ex ardore febris aliquando etiam difficili natura ægri, vel dolore interiori, alioqui grauiore, quædam accidentia eius febris esse possunt. Hippocrates 3 diluto oxymelite vitur: nunc & syrupo acetoso, & oxysacchara uti licet, multò magis cum & biliosus humor est, & calor acrior. Cicerum quoque decocto, 4 diluto absynthij hordeato facto ex hordeo integro. 5 Purgatio leuis esse debet ex rhabarbaro. Victus incêdat & refrigeret. Tenuissimè nutriendum esse præcipit Hippocrates, si quidem permittunt vires. Neque 6 enim sorbitiones admittit, antequam vrinæ maturentur, & malum remittatur.

1 *Ασώδης*, seu fastidiosa febris, velut superior, & quæ adhuc aliæ sequuntur, ad ardentem febrem veniunt referendæ. Hæc autem eo donata est nomine, quòd irrequieta grauius ægrum exerceat. Vide Galen. commentar. ad sent. 47. lib. 4. de victus ratione in acutis. Idem Galen. commentar. 2. in Prorrh. sent. 43. dupliciter fieri monet: vno quidem modo, quum virtus à corpore opprimitur, nullamque figuram facile sustinet: altero quum os ventriculi à prauis mordetur humoribus.

2 Ob naturæ infirmitatem.

3 Ad crassos humores incidendos & attenuandos, bilémque refrigerandam.

4 Dilutum absynthij saccharo edulcari debet: quia ingratum alioqui futurum.



## DE MORB. INTERNIS

5 Vt.  $\mathcal{U}$ . expressionem  $\mathfrak{z}$ . 2. rhei elect. in decocto tamarind. ping. femin. frigid. & flor. cardiacor. infusi cum  $\mathfrak{D}$ . 1. cinam. in colatura dissol. syru. viol. multar. infusionum  $\mathfrak{z}$ . 1. f. potio. Vel cathol. & syrup. de cichor. compositi cum rh. ana  $\mathfrak{z}$ . 1. dissolues in sero lactis ad dosin.

6 Ne auocetur natura per accessionem alimenti à concoctione morbigicæ causæ. At ex aph. 9. lib. 1. Aph. videndum quid æger ferat.

Obscuro 7 loco iaceat æger, & molli lecto. Contineat corpus, & vt minimùm fieri possit, disiciat. Hypochondria hydrelæo foueantur, in quo semen lini, althææ, & similia coxerint.

7 Propter ægri impatientiam. Nam splendore spiritus excitati maiorem trahunt anxietatem.

Farina hordeacea ex eodem hydrelæo subigatur, & cataplasma fiat, quod hypochondriis applicetur. Pessimum hoc genus febris est, in quo celeriter 8 pulsus concidunt, & occasio præripitur maiorum remediorum.

8 Delato humore, aut vapore tetro ad ipsum cor.

### *De Cardiaca.*

**N**ON minùs grauis est & periculosa 1 febris cardiaca. In hac vehemens æstus est, facies rubet, magnus est cordis saltus, exigua, frequensque spiratio. Residere volunt similiter pulmonariis. Dolitant in regione cordis. Inclinate morbo, 2 sudor tenuis fit, frigidus aliquando, instantis mortis nuntius, ab extincta facultate vitali, ex quo syncope, & mors. Alioqui vapor calidus per cutem exit, quod Medicum fallit, nisi & manum adhibeat ori & naso. Hinc enim spiritus frigidus, ex his mors.

1 Quæ fit æstuante ventriculi ore cor in sympathiam trahente. Funesta est, & breui interimit. Vnde Hippocr.

aph. 65. lib. 4. In febribus circa ventriculum fortis æstus, & cordis morsus, malum.

2 A copia humorum, quos sudor attenuârit.

Initiò detrahendus sanguis est inflammationis subtrahendæ ergô, aër frigidus imbibēdus, flabello quoque æger ventilandus. Victus refrigerās & humectans. Epithemata ex aqua 3 violarum, nenupharis, buglossi & borraginis, additis fantalis & momento croci, syrupo de limonibus, de acetosa, de nuphare, acetosus, violatus, de papauere ex quibus syrupis & aquis cordialibus iulepj confici debent. Loco lucido stare debent, suaui aura perflato. Altior sit decubitus.

3 Vt si sumantur earum aquarum 3. 6. santalorum pulueratorum 3. 1. croci 3. 1. acetum modico addito. Pannus his intingitur, & thoraci è regione cordis applicatur. Aut paratur vnguentum ex fantali citrini 3. 2. flor. violar. & nymphæanæ 3. 1. ceræ albæ & olei rosacei q. s. vngatur anterior thorax.

*De febre lypyria.*

**Q**Uæ sit hæc, non satis conuenit. Galenus libel. de inæquali intemperie cap. 11. in eo genere reponit, in quo propter magnitudinem internæ inflammationis & malignum humorem interna ardent, externa refrigerantur. Id quod in medijs corporis inflammationibus contingit. Nam internus calor instar cucurbitulæ calorem externarum partium intrò attrahit. Aëtius lypyriam putat, quæ sequitur erisypelas ventriculi.

1 Lypyria febris epiale absimilis non est. In ea enim perfrigerantur extrema, caleſcentibus internis. Comm. in sent. 4. lib. 2. Prognost. Ac quidem tanto feruore acerbatur, vt calor ad interitum perducere videatur. Vnde ex Actuuario lib. 2 sue methodi *Λγπυρία* appellatur, quia in ea *πῦρ λείπεται*, calor deficit.

## DE MORB. INTERNIS

Arabes pituitam crassam & viscidam, aut eiusmodi bilem collectam in primis venis, & calorem vnà cum vaporibus suffocantem, ne videlicet, calor dispergatur in corpus, causam faciunt huius febris. Alia quoque parùm verisimilia de hac febre prodiderunt. Lipyria Græcorum primùm quidem 2 phlebotomia, deinde refrigerantium vsu, vt lactucæ ex aceto diluto, aciam vrgente morbo largo haustu frigida aquæ curari debet.

2 Ad reuellendam fluxionem à parte affecta, à maiore sanguinis copia imminentem. Conueniunt & cætera, quæ reuellendi vim habent, frictiones extremarum partium, ligaturæ, cucurbitulæ. Intereà abstinendum omni medicamento purgante, præcipuè si ventriculus infestetur, ne à cathartico in affectam partem attractio fiat. Gale. libr. 13. Method.

Cataplasmata ex hordeacea farina subacta cum succo semperuiui & similium hypochondriis applicantur: subinde commutentur.

Arabes syrupo acetoso, oxymelite materiam crassam incidunt, postea etiam oxymelite diuretico, sed perpetuò incidentibus aliquid admiscent, quod stomachum roboret, vt syrupum rosatum, de agresta. Quod perpetuum est in febribus phlegmaticis, vt cum incidimus, stomacho etiam consulamus. Deinde purgant.

Purgatio 3. ex aloë, hiera, rhabarbaro. Interim incidunt, vomitum cient, clysteres acres imperant, vtuntur attenuante victu, eo modo stuphis & sudoribus vtuntur, deinde etiam antidotis, quomodo in epiala dictum est.

3 Nusquam catapotia præscripseris, si lipyria comitem solam habeat inflammationem.

**H**æctica febris ex eo appellata, quia sic 1 radices egit calor febrilis, ut iam aut nullo modo, aut ægerrimè extingui possit. Difficultas sæpè nascitur, quod vel nimis confirmata est, vel coniuncta est hæcticæ febris putrida, tumor aliquis præter naturam, ut 2 inflammatio, erysipelas, vlcus etiam pulmonum.

Tenuia corpora & pauci sanguinis ferè corripit, & celeriter consumit. Febres diarias, ardentes, & biliosas sequitur, rarò per se incipit, huiusque origo aliquando primùm 3 nascitur à thoracis partibus: sed ferè priusquàm vigeat inde nata hæctica, mors est.

Vita longior, & curatio faciliior, si à 4 vètriculo, hepate, renibus, vtero, ieiuno & colo intestinis. 5 Consumit calor hic hæcticus humores corporis, deinde rorem illum, qui veluti commeatus quidam, & futurum alimentum, spatiis inanibus corporis concipitur, postea etiam substantiæ pinguis carniū, fibrarū & solidarū partium humiditatē depascitur.

Hic tabes, marasmus, & summa ariditas corporis, ubi consummata hæctica est & incurabilis.

1 Solidum enim occupat corporis habitum, & solutus perdifficilis existit. Gal. lib. I. de different. febr.

2 Ut quotidiana, vel quartana: sed tamen ita, ut hæctica & putrida diuersis sint locis.

3 Interdum etiam sequitur diarrhæam, leienteriam & dysenteriam, ex lib. I. de differ. febr.

4 Siquidem ab earum partium affectibus cor minùs afficitur, quàm à partium thoracicarum morbis.

5 Haud aliter ac lucernæ flamma, quæ absumit primùm oleum: dein humidum proprium ellichnij: postremò ellichnium ipsum. Hinc tres nascuntur hæcticæ differentiæ.

## DE MORB. INTERNIS

Pulsum habet durum à siccitate arteriæ, debilem ab infirmitate facultatis vitalis, paruum & frequentem ab intemperie cordis, nisi aliquando urgente necessitate ad frequentiam & velocitatem commutetur. Quod idem contingit à cibo, quo tempore calor hecticus nō aliter efferuescit, quàm calx viva, si aquam aut aliquid tale superinfundas. Calor toto corpore æqualis est, ex quo 6 non dolent, nec se febricitare intelligunt. Quāquam si manum admoveas, senties paulò post accerrimum, mordacemque calorem. Quòd si in hectica febre calor inæqualis est, sentitur dolor, febrisque ab ægro intelligitur, iudicabis, aut erysipelas, aut phlegmonem, aut febrem denique putridam complicari. Desperatio est, cum hæc hecticæ coniuncta sunt, præsertim si phlegmone, aut aliquid tale in parte principe incenditur, tūmq̃ue difficillima curatio est, 7 indicationibus inter se pugnantibus. Hecticis aliquando oculi cavantur, nasus acuitur, collabuntur tempora, nudantur ungues, & acuti fiunt, pedes etiam aliquando intumescunt, squalescit cutis, à cibo augeatur calor. 8 Calor maior in volis & plantis pedum, non reuera quidem, sed quia 9 manifestior illuc est, aut fortasse, quia illuc extremæ venæ sunt, & magis nudæ, eò proclivior motus caloris illuc est.

6 Hæc duo sunt signa febris huius propria. Cæterum non dolent, quia iam facta est alteratio.

7 Quando nimirum consummata est hectica. Alia enim hectica, alia complicatorum cum ea affectuum remedia.

8 Quāquam tamen calor per totum corpus sit æqualis, servata interim partium analogia. Nam ex Gal. lib. de inæq. intemp. tota febris hecticæ essentia ad intemperiei æqualitatem est referenda.

9 Vel quia temperatiores sunt manuum volæ, & propterea ad omnem mutationis sensum percipiendum propensiores.

Incipientem hecticam non facilè cognoscimus: cognitam 10 faciliùs curamus. Reliqua genera non facilè curantur, facilè cognoscuntur.

In curatione hæc maximè obseruanda sunt, an simplex sit febris hectica, an coniuncta sit febris putrida, erysipelas, inflammatio, an syncope frequens incidat. Hæc enim remedia hecticæ interpellant. Simplex nullo 11 maiori remedio irritari debet. Maiora remedia sunt, 12 phlebotomia & purgatio.

Deinde vehemens tum animi, tum corporis motus ex cap. 7. & sequentib. lib. 9. Method. vitadus est. Vnicus scopus est, vt refrigeres & humectes: idque partim balneis, partim alimentis, tum etiam epithematibus, rebûsq; non naturalibus. Quod ab balnea attinet, exoleuit iam 13 curiosus ille apparatus veterum balnearû, nec nisi cum periculo tentari potest. Exoleuit etiâ cõsuetudo: & si quid in apparatu peccatum est, grauius esse solet: itaq; hoc tẽpore proximè lectum ægri labrum aqua plenû disponi potest.

10 Nihil enim adhuc, aut parum ipsius humidi primigenij exhaustum est.

11 Partes exsiccatæ cùm sint, exsiccati amplius per venæ sectionem & purgationem minimè desiderant: imò quod absumptum est, id refarciri volunt. Itaque satis fuerit simplici in hectica febris qualitatem alterare, & corpus reficere.

12 Quando vsurpanda sit phlebotome, docet Hippocra. sent. 29. sect. 3. lib. 6. Epid. & Gal. in commentario.

13 Tria etenim parabantur balnea: primo ex aqua moderatè calida corporis meatus & spiracula aperiebantur & laxabantur: altero è tepida humectabatur corpus: tertio ex frigida constringebantur pori. Ad hæc tria comparabant labra: nos vnò contenti sumus,

## DE MORB. INTERNIS

Quòd si 14 vapor balnei ægri corpore excipitur, priusquam immergatur, salubre est. Itaque linteo conuolui potest, vt duobus pluribúsvē hominibus teneatur, ita vt frigidū aërem inspiret, reliquo corpore per raritatem lintei vaporem balnei excipiat. Iam rarefactis poris corporis, ac posteaquam æger vires receperit, satísque quieuerit, aliquoties aqua tepida & temperata immergi potest. Mora sit pro ratione virium. A balneo quoq; corpus oleo inungi potest, vel communi, vel nenupharino, vel violato, de cucurbita. Cēterū quod aliquando monuimus, & hīc quoque summopere obseruandum est, nec oleum, vel rancidum sit, vel falsum, quod vix reperiās multis in locis. Vbi itaque commodum oleum defuerit, butyrum recens vel per se, 15 vel prius ex aqua violarum lotum vsui esse potest. Subiiciebant veteres balneum è frigida: quod suspectū esse potest, nisi & vires constant, ætas sit, consuetudo frigidi balnei, temperamentum calidum & siccum, nulla cruditas, nullus tumor, nulla plenitudo. Alimenta imperari debent, lac asinæ, 16 vel mulieris, bubulum etiam vsui esse potest. Sed eligendum lac est, probandūque 17 notis suis. Sugatur è mātina, vel recens mulctū bibatur. Periculum fit mensuræ lactis datis primū 3. 2. deinde 3. vel etiam 4. Quòd si in ventriculo non corrumpitur, paulatim augeatur modus ad lb. ss. Corrupti intelliges partim è ructu, maximè nidoroso, partim ex pulsu, qui debilior, tardior, rarior, languidior factus est. Quòd si ructus nidorosus est, poterit aliquid aquæ incoqui cum lacte. Si acidus, momentum mellis aut sacchari misceatur. Hordeatum quoque maximè con-

uenit, vel prifana ex tritico cōparata & colata, iufculum itē pulli gallinacei, in quo hordeū mundatū & excorticatū coxerit, alteratū cū lactuca & portulaca.

14 Sic cutis aperitur, vt vis aquæ penitiùs fubeat. Cæterum pridie lotionis optimum erit clyfterem blandum iniicere nullo cathartico, præter cassiam adhibito. Et quia sæpè fit, vt ob coëctricis imbecillitatem cruda multa excrementa congerantur, licebit toto morbi cursu clysteres iterare. Parabuntur ex refrigerantibus humectantibus, herbis, feminibus, floribus, dissolutis cassia, sacchar. ol. violaceo, nenuph. & simil. Si nutriendes præterea esse oportuerit, ex decocto capitis arietini, vel aliarum carniū iufculo, instituentur.

15 Huius loco valebit vnguentum resumptium.

16 Lac muliebre præstantissimum est propter naturæ familiaritatem, quâ magis nutrit: quamuis Auicennæ magis refrigeret & humectet. Caprillum autem medium est. Sed de his vide cap. 6. lib. 7. Meth.

17 Lactis laudabilis hæ sunt notæ: spissitudo moderata, color albus, odor gratus, sapor dulcis, & cum instillatum in vnguem neque tardiùs, neque citiùs diffluit.

Et quia in hecticis vis attractrix infirmior est, 18 liquidiora sunt alimenta: alioqui aceti modicum, etiam si videri possit nocere, quia desiccet, misceatur. Lactuca, portulaca ex aceto diluto, aqua etiam aliquando frigida: quanquam modus esse debet, nec adeo gelida, nec multa exhiberi debet, 19 vbi nimis extenuatum corpus est.

18 Ad faciliorem distributionem. Partes enim ob siccitatē attrahendi facultate minùs valent: vnde atrophia. Probantur aliis alimenta solidiora, quòd diutiùs nutrant, & liquidiora celeriùs expirent. Sed vt illa concedantur, vires sæpiùs effætæ his concoquendis non sunt.

19 Nam ex lib. 10. Meth. in iis qui parum sanguinis & carnis habent, ad partes solidas aqua celeriter peruadit, nulli, quod eius vim frangat, occurrens.



## DE MORB. INTERNIS

Potiones frigidiusculæ, solidiora alimenta non ita frigida, sed subtepida imperentur. Epithemata ex farina hordeacea, quam subiges è succo lactucæ, oxalidis, semperuiui & similibus.

Portulaca per se contusa stomacho, & hypochondriis vtiliter apponitur. Alioqui.

℞. ceræ elotæ  $\mathfrak{z}$ . 3. olei rosati similiter loti ℔. 1. Liquefiant in vase duplici. Liquefacta refrigerescant. Vbi refrixerint, ex aqua frigidissima, lactucæ succo, vel portulacæ subigantur. Fiat cerotum. Inungatur venter, hypochondria & partes, vnde primùm hætica nata est.

Alioqui linteolum subinde inculcatum, omphacio, lactucæ, intybi, semperuiui, atque eiusmodi refrigerantium succo, hypochondriis & thoraci apponemus.

Verum in horum omnium vsu animaduertendū est, alia quidē refrigerare & humectare, alia siccare.

Humectantibus utemur, si alui profluuium non est: tum enim siccantibus utendum est simul, 20 & refrigerantibus.

20 Ea præcipuè, quæ adstringunt, declinanda sunt, quia respirationi obsunt. Et ut tutior sit refrigerantium vsus, oleum amygdal. dulc. vel etiam liliaceum commiscetur.

Denique quia breui tempore admota remedia incalescunt, subinde commutare oportet. Præterea partes spirales non sine noxa diutius perferunt refrigerantia, sed inde dyspnœa nascitur: omnia itaque temperare oportet. Olea conueniunt 21 de nenuphare, de falicibus, cucurbita, papauere, violis, rosis, cydoniis, eadem seruata distinctione in vsu siccantium & humectantium. Supra omnia aër com-

ponendus est: qui si repperatus, alterari non debet: si calidior, ut æstate, refrigerandus eo modo, quo capite de æstu dicemus. Hyeme iam frigidior, quo tempore leuiter alterari debet, non tam igne, maxime è prunis, quàm leui flamma, aut vapore aquæ calidæ.

21 His oleis thorax antrorsum & retrorsum illinendus. Spina quoque cerato antè præscripto inungenda.

In ratione alimentorum consideranda est virtus. Nutriemus enim pro ratione virium, lacte vaccino, à quo recens butyrum extractum sit, 22 lacte asinæ: aut si nutriendum, quàm alterandum magis, lacte muliebri. Bubulum plurimum nutrit, sed ratione butyri nocere potest.

22 Asininum lac omni lacte humidius, & nulla acrimonia infectum. Hipp. 4. acutor.

Caprillum quoque vsui esse potest. Sugi debet, ut antè diximus, vel recentissimè mulctum bili. Plurimum nutrit panis sæpiùs lotus in aqua, deinde ex lacte recens mulcto comeditur. Plurimum laudatur aqua hordei, in qua cancerorum caro detractis testaceis coxerit.

℥. hordei mundati ℥. i. cancerorum excorticatorum ℥. 2. bulliât in lb. 2. aquæ, dum dissiliat hordeû. Oportet ante excorticatos cancros priùs diligenter ablui, ut omnem fæditatem odoris deponant, deinde coqui. Potionum eiusmodi cancerorum mundatorum singulæ vnciæ singulis libr. aquæ hordei incoqui debent. 23 Similia ex cap. de phthisi repeti possunt. In instaurando hordeata, in quibus etiam

## DE MORB. INTERNIS.

vitellus oui dissoluatur. Aliquando quoque, vt refrigeres, semen portulacæ, lactucæ & similia concoquantur.

23 Vel hoc paretur destillatum. ℥. decoct. caponis iuuenis, armi vitul. alterator. cum lact. oxalid. bugloss. borrag. portul. scariol. seminib. frigid. maiorib. florib. violar. bugloss. nymph. ℥. 6. micam panis vnus albiss. in lacte infus. limac. præparat. & in lacte infus. ℥. 8. coxarum ranar. 3. 3. Ponantur omnia in alembico: destillentur in diplomate, seu balneo Mariæ. Hoc destillato vtatur sæpè cum saccharo pauco. Nutriet plenius, si testudo adijciatur.

Si à syncope metus est, aliquid etiam vini granatorum, margaritarû. semen acetosæ, & alia, 42 quæ cordialia appellantur. Iuscula carniû permittuntur, sed alterari oportet hordeo mundato, concocto oleribus, quæ refrigerant & humectant, lactuca, portulaca, scariola, &c. Permittitur in potu aqua, in qua aliquid sacchari dissolutum sit. 25 Vinum granatorum similiter dulcoratum. In viribus infirmis, expressionibus, colatitiis, distillatis, instaurantibus vtendû erit. Si à profluuiò alui metus est, aqua hordei paretur ex hordeo torrefacto, similiter & hordeatum. Quibus addi possunt gummi arabicû, milium torrefactum, & alia eiusmodi, quæ sine calore aluum supprimunt. Auenatum loco hordeati ad tempus commodum est. Etenim fluxiones alui supprimit. Sed dum symptomatibus consulimus, febris habenda ratio, & ad huius remedia tempestiuè redeundum est. Caseus recens sine sale paulò firmioribus conuenit, vt vocata gelatina minùs firmis. Vinum dilutum bene contrà syncopem facit & lapsum virium. 26 Cibus duabus horis ante balneum

imperari debet, aut paulo post balneum. In balneo non est exprimendus sudor. Madidus enim vapor fatis. Summatim in usu balnei, ad vires diligenter animadvertere oportet. Multa, quæ ad hanc febrem pertinent, ex commentariis de sanitate tuenda, Methodo medendi, Libello de marcore colliges.

24 Ut rosæ, nymphaea, aurum (quod quam vim cordi conferat, peritiores viderint) vnicornis cornu, saphyr, hyacinth. smaragd. vniones, fantala, terra sigillata: quæ vel in zulapiis, vel conditis, vel opiatīs exhibentur.

25 Vinum item album, tenue, oligophorum, optimè dilutum: quo tamen, nisi vires reclamant, abstinendum.

26 Salubre est statim ante cibum aquam hordei sumere ad partium humectationem, ut ipsum alimentum faciliùs agglutinetur. Exemplo id fit cementariorum, qui parietes prius aqua aspergunt, quàm aut calce, aut cemento, aut gypso incrustent.

*De febre ex cruditate.*

**F**Ebris 1 hæc ferè debilis, sed periculo non caret. Desperatio est, cum vel ventriculi, vel hepatis inflammatio accesserit, in qua quantus, qualis, quo loco intus crudus humor est, considerandum. Aliquando enim, cum sanguis utilis plurimus sit, cruditas exigua est. Contrà rursus, nonnunquam plurima cruditas est, exiguus verò sanguis reliquus. Humor crudus aliquando frigidior est, aliquando ad coctum succum accedit propiùs. Cruditas aliquando in primis venis, nonnunquam toto corpore aceruata est. Cruditatis in ventre & primis venis signa sunt, nausea, ructus, vellicatio, ac tormenta ventris, frequens borborysmus, hypochondrij tumor atque 2 inflatio.

## DE MORB. INTERNIS

1 De hac Gale. lib. 4. Sanitatis tuendæ, & comment. in sent. 31. sect. 5. lib. 6. Epid.

2 Cruditatis enim plurima & flatulentus spiritus in venis mēfaraicis continentur.

Alimenta ferè in flatus commutantur, ob caloris ventriculi imbecillitatem. Cruditatis totius corporis signa sunt urinae tenues, aquosæ, leuiter tinctæ, diuulsæ, conturbatæ, nonnunquam cum 3 sedimenti asperitate, calor faciei pallidus, aut alius quàm rubens, vt liuidus & plumbeus, totius corporis moles 4 subtumida, pulsus inæqualis, obscurus, paruus. Adiicienda sunt, quæ ad coniecturam adhibentur ex antea acta vita, otium, crapula, intempestiua exercitia, immoderata venis, & alia eiusmodi, quæ cruditatis coniecturam augment. Vocatus itaque ad eum, qui cum cruditate febricitat, ad hæc omnia animaduerte: & si quidem ad hæc omnia, vt malum faciei colorem, urinarum cruditatem, pulsum inæqualitatem & paruitatem, accesserit etiam totius corporis grauitas, tarditas, motus mentis & sensuum hebetudo, de remediis cogitandum non est, & de morte prænunciandum: multò magis, si qua subsit inflammatio ventriculi, vel hepatis. Illic enim & crudorum succorum plenitudo est, & vires admodum infirmæ, 5 à quibus & syncope, & mors expectanda est. Si verò omnia leuia sunt, de remediis ita statuendum.

3 Debilis enim calor & materiæ contumacia læuem esse vetant, æqualémque hypostasim.

4 A flatu, & imperfecta assimilatione.

5 Ex cap. 5. libr. de curand. ratione per sanguinis missionem.

Phlebotomia in hac febre 6 nunquam imperanda, nisi color faciei leuiter rubeat, pulsus sit mediocriter magnus & vehemens, nec ita inæqualis, vrinq; quoque melius colorentur. Hîc enim coniicimus frugi sanguinem superiorem esse cruditate. Itaque aperiatur basilica angusto foramine, ac 7 modica quantitate sanguis detrahatur. Exhibit primum sanguis tenuis, subalbidus: at simulatq; cœperit fluere magis rubens, vena claudatur. Neque 8 tamen perpetuò expectanda est sanguinis mutatio. Sed interim dum exit sanguis, vires è pulsu & aliis recognoscendæ sunt. A phlebotomia imperanda mulla, in qua aliquid origani, hyssopi & similium coxerit: &, si quidē humor crassior est, oxymelite vti oportebit. Decumbant molli lecto, aëre temperato, dormiant & vigilent vtrūque mediocriter, victus incîdat & attenuet. Sed aduertendum in vsu mulsæ & mellitorum. Aliquando enim acrimonia 9 mollis aluus irritatur: diarrhæa sequitur: quæ si perseuerat, hominem præcipitat. Itaque si inde metus est, vel bene cocta mulla, ptisanæ cremore vtendum est. In vsu attenuantium & incidētium tum alimenterum, tum medicamentorum, denique omnium, quæ vel intrò sumuntur, vel foris adiuuentur, vitanda sunt omnia, quæ nimis calfaciunt. Etenim febrem augent, humores crudos cōmouent, deiciunt vires, syncopen accelerât & mortem. Hæc igitur omnia non longè à medio recedant. Frictionibus & inunctionibus opus est. Atq; hæc quidem omnia, 10 vt cruditas cōcoquatur. Aspero itaq; linteo crura, brachia, spina deinceps ordine perfricētur deorsum versus, 11 dum incalescant. Postea verò oleo

## DE MORB. INTERNIS

dulci, non falso, non rancido, alioqui butyro recēti  
 cædem partes inungantur. Hyeme etiā chamæme-  
 lino, anethino & similibus, quę leniter quidem cal-  
 faciunt & digerunt. Sed perpetuò ad pulsū ani-  
 maduertendū est: qui si minor, obscurior, magis in-  
 æqualis fieri videatur, omninò viribus consulendū.  
 Vinum dilutum propinandum, mica panis ex vino,  
 hordeatum, lac amygdalarū, omnia quidem exigua  
 quantitate, sed non ita magnis interuallis repetita.  
 Alioqui si constant vires, tenuis victus conuenit, &  
 per interualla. Leue catharticū phlegmagogum, vbi  
 iam apparet aliquod signum coctionis. Maioribus  
 pharmacis abstinēdum. Intempestiuus enim maio-  
 ribus remediis vel necantur ægri, vel in periculum  
 coniiciūtur, vnde vix possint reuocari. Animaduer-  
 te ergò ad vires 12 ex pulsu, ad coctionem ex vrinis.  
 Vrinarū hic ferè ordo est. Vbi expectatur salus, ex-  
 eunt initio crudę & aquosę, postea sedimentum  
 ponunt crassum, diuulsum & asperū. Conturbātur,  
 sed cōturbatę sedimentū ponunt, celerius quidem,  
 si quidē melius habet coctio: tardiùs, si non ita be-  
 ne sedimentum. Deinde melius fit, propiùs acce-  
 dens ad album, læue & æquale. 13 Melius procedē-  
 te morbo, iam non sedimentum, sed sublimamen-  
 tum, vel nebula in media vrina ostēditur. Cum iam  
 appetit perfecta coctio, neque sedimentū, neque su-  
 blimamētum, sed tantū nebula in summo vrinę  
 attollitur: atque ita vrinę ad naturā redeunt, simūl-  
 que æger ad pristinā valetudinem. Videndum quo-  
 que, ne te fallat vrinę conturbatio. Perturbatur v-  
 rina, vel quia calor natiuus iam cruda concoquit:  
 vel quia extinguitur. Vtrūque distingues ex pulsu,

Etenim si pulsus, quàm ante, melior, coëctio cœpta est. Si verò minor, obscurior, magisque inæqualis, mors in propinquo est. Suffocatur calor multitudine materiæ: deinde quia humor crassus vias intercipit, multæque obstructions fiunt. Clysteres, ubi resistit aluus, acriusculi infundantur. Alioqui, si à viribus metus est, remittenda sunt cætera remedia ad tempus, & tantùm viribus consulendum est. Vbi omnia mediocria sunt, mediocriter temperanda omnia, ac toto decursu morbi faciei color, vrinæ commutatio, & pulsus diligentissimè consideranda sunt. Ex his omnis remediorum ratio colligitur. Et in hac febre, quæ sæpè incidit, nullum leue peccatum est. In summa clementer cum hac febre agere oportet.

6 Galen, ibidem, & libr. 4. Sanitatis tuendæ. Attamen si subflorida & subrubea facies eluceat, quæ indicio sit sanguinem laudabilem cruditatem adhuc sua copia exuperare, inconcinnum non erit venam secare.

7 Pro periti medici arbitrio, ut ad 3.4. scilicet vasculum vnum & dimidium.

8 Sanguinis mutatio expectatur, cum vitiatu sanguis paucus, & frugi multus: at si ille superet, minimè. Item mutatio eadem ex lib. 2. de vict. rat. in acutis expectanda in inflammationibus à secta vena non longè distitis.

9 Ut si maior eius copia adiiciatur, aut si eger diutius utatur.

10 Materiæ parte in halitus digesta.

11 Sed enim cum artus abundè calidi videbuntur, metusque erit, ne ex ampla frictione lassitudines sequantur, tum desistendum.

12 Virtutis vitalis præcipua in morbis ratio habenda. Arteriæ pulsu se prodit. Itaque salutis & mortis indicium securius ex pulsu, concoctionis ex vrina, petitur.

13 Tunc enim fiunt vrinæ similes sanorum, quæ sedimento carent.





# DE SYMPTOMATIS

## FEBRIVM.

**Q**Uæ cadūt in febres, vt & alios in morbos, symptomata, trium sunt generū: aut enim actiones læsæ, aut excrementorum & euacuatorum excessus, aut affectus corporum, seu mutatæ existunt qualitates. Primi generis sunt, somnus, vigilia, delirium, capitis dolor, syncope, sitis, deiecta appetentia, rigor: Secundi, fluor, obstipatio, sudor, vomitus, hæmorrhagia: Tertij, linguæ scabrities, nigredo, icterus, & cætera id genus. Leuiora sunt interdum, & quæ medicum minùs debeant exerce-re: aliàs grauiora, & quibus maiore cum diligentia & sollicitudine, quàm febribus ipsis, sit consulendum. Dictum quidem est antea de iis febrium accidentibus, quæ ipsarum generationem necessariò sequuntur, nec tamen curationem immutant: nunc ea traduntur, quæ præter communem aliorum sortem curationem ad sese trahunt, quòd causarum vicem obtineant. De his fusiùs Gal. lib. 12. Methodi.

### *De somno & vigilia.*

**S**I Omnis in febribus alius naturalis, alius præ-  
ter naturam. Maximè 2 naturalis est in declina-  
tionibus, tum totius morbi, tum particularis acces-  
sionis. Præter 3 naturam verò initiis accessionum,

atque vbi multus humor vitiosus aceruatus in capite. Sic enim vitium rapitur in medium corpus, laborem facit, conuulsiones, timores, & alia eiusmodi. Ideo scriptum ab Hippocrate. In quo morbo somnus laborem facit, mortale: si verò iuuat, non mortale. Laborem facit qui præter naturam est: iuuat, qui est naturalis.

1 Somnus & vigilia, vt animalis facultatis sunt symptomata, explicantur. Naturalis somnus in febribus causas arguit moderatas & vtilis: at qui præter naturam est, contrarias, vt in lethargicis: medius est interdum, vt in temulentis, qui à naturali recedens, nondum tamen est præter naturam, qualis in pueris etiam cernitur.

2 Tunc enim somnus calorem alienum refrigerat & restinguit, & natium adauget.

3 Qui symptomatis agrum auget, materiâ in intimum corpus confluyente, ex commentario in aphor. 1. lib. 2.

4 Quod funestum est ex Hippocrate aphor. 67. lib. 4.  
*In febribus ex somno timores, conuulsiones, malum.*

Bonus est (inquit Hippocrates apho. 2. lib. 2.) qui delirium sedat, intelligens malum, qui delirium facit. Ac rursus. Somnus atque vigilia, vtrâque si modum exceßerint, malum. Neque enim omninò dormire bonum, aut vigilare. Sed hæc duo temperari debent, & maximè, vbi cruditas est. Somnus enim concoquit: vigiliæ verò digerunt, fuso calore in habitum corporis, atque ita repurgatis fumosis excrementis.

Habenda quoque morborum ratio. Est enim, cum non ita dormiendum est, sed quantum vires requirunt: quod in peste dicetur. Ac febres omnes somniculosas plenas esse periculo certum est: item quæ perungiles sunt. Vtriûsque ergò accidentis cau-

## DE MORB. INTERNIS

sa inuestiganda est. In febribus 6 calor, siccitas, dolor, ferè vigiles inferunt: hinc celeriter vires concidunt, & facies illa Hippocratica inducitur. Nares acutæ, &c. Palpebræ vix se attollūt, pulsus ad instar chordulæ extensæ præ duritie & siccitate arteriæ, Huic itaque malo anacollematis, vinculis, odoribus, potionibus, maturè succurrendum.

5 Ac cùm noxiùs fuerit somnus, prohibendus iis, quæ ad lethargum præscripta sunt, clysteribus, frictionibus, erihinis, partium vellicationibus, clamoribus, odoratu calidorum, aut frigidorum incidentium & tenuantium.

6 A Galeno lib. 3. de causis pulsuum tres vigiliarum causæ assignantur, calor, siccitas, dolor: quibus totidem contraria sunt remedia opponenda, refrigerantia, humectantia, anodyna. Quæ refrigerant & humectant, partim assumentur, partim admouentur. Assumentur sorbitiones, vt hordeata & amygdalata è recentibus hordeo & amygdalis, additis seminibus frigidis lactucæ, portul. melon. cucurb. aut papau. alb. ad 3. 2. & hora somni, vel media nocte, si somni difficultas suadeat, exhibenda: potiones hypnoticæ, ex decocto seminum portul. lactuc. capitibus papau. alb. & simil. in quo. dissoluantur syrupi, papauerinus, nenupharinus. violac. diacodium sine speciebus. Admouenda sunt, linimenta, frontalia, cataplasmata lotiones partium inferiorum. Horum omnium formulæ subiiciuntur.

7 Græci sub horam somni manus & pedes ad articulos vinculis constringunt, dum defatigentur. Soluunt vincula, subducunt lumen, imperant silentium. In ratione vinculorum animaduertendum, ne corpus arthriticum sit, aut sint vlcera ad articulos. Sic enim ad alia remedia confugiendum est.

7 Vt Paulus Ægineta cap. 41. lib. 2. Arthriticis verò vincula aptanda non sunt, ne fluxio aliqua in articulos imbecillos, vel iam laborantes, vi doloris conuehatur.

Anacollemata, quæ frontalia appellant, ad repellendum commoda, ex olei rosacei  $\mathfrak{z}$ . i. aceti  $\mathfrak{z}$ . 2. cum oui candido.

*Aliud.*

$\mathcal{L}$ . olei viol. & ros. ana  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . aquæ ros. vel betonicæ,  $\mathfrak{z}$ . 2. agitentur cum oui albumine. Fortius erit, si Gr. 6. vel eò plus opij addideris, aut  $\mathfrak{z}$ . 2. populeonis. Sed in usu anacollematum habenda ratio naturarum. Nam pueris, mulieribus, epilepsia obnoxiiis, & mollioribus corporibus eiusmodi refrigerantia stuporẽ inferunt, & læduntque memoriam in reliquam vitam. In iis verò, qui remedia sustinere possunt, innouanda sunt sæpius: statim enim incalescunt.

8 Quinetiam lethargum promouent, vehementiorem cerebri frigiditatem cum humiditate coniunctam inducendo.

$\mathcal{L}$ . capita 3. papaueris. In pul. redacta commisce oui albumini. Bene fiet, si albumen oui ex aqua rosacea prius agites, & despumes. Aliud.

9  $\mathcal{L}$ . olei papaueris albi  $\mathfrak{z}$ . i.  $\beta$ . populeonis  $\mathfrak{z}$   $\beta$ . albuminis ouorũ ij, vt antè, despumat.  $\mathfrak{z}$ . 2. lactis muliebris  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . Præferunt in hoc lac muliebre, si nutrix albo colore est, & puellam nutrit. Frontale siccum.

9 Vel tale fiat cataplasma.  $\mathcal{L}$ . farinæ hordei subactæ cum succo lact. & oleo rosaceo  $\mathfrak{z}$ . i. vnguẽti popul.  $\mathfrak{z}$ . i. f. cataplasma. Valentiùs hoc erit.  $\mathcal{L}$ . flor. ros. viol. & nymphaeæ ana P. i. sem. hyposcyami, lactucæ, papau. alb. ana  $\mathfrak{z}$ . 2. coquantur, terantur, addendo olei papauerini  $\mathfrak{z}$ . i. populei  $\mathfrak{z}$ . i. Reposita inter duas telas raras portio fronti applicetur. Hic pertinebunt linimenta, qualia ex cerato refrigerante Galeni cum oleo rosaceo agitato, ex olei viol. ol. ros. & succ. solan. ana  $\mathfrak{z}$ . 6. cum popul. & aceto, ex oxyrhodino cum albumine oui & aliis id genus confici solent.

## DE MORB. INTERNIS

℥. quatuor sem. frigidorum ana ʒ. i. sem. papau. ʒ. 2. florum nenupharis, violarum, anethi ana ℞. i. fiat ex omnib. puluis, qui inuoluatur in linteo duplici: deinde perfumetur cum aqua rosarum & betonicę, aut cum vino albo diluto his aquis. Aliud.

℥. nenupharis, rosarum, violarum ana ℞. i. corticis radicis mandragorę ʒ. i. β. sem. papa. albi, coriandri ana ʒ. i. conquassentur crassiusculè, inuoluantur, & perfumentur, vt priùs.

### *Potiones.*

℥. syrupi papaueris, de nenuphare ana ʒ. 6. decoctionis lactucarum ʒ. 2. Capiat horà somni. Aliud.

℥. lactucarum ℞. i. dactylos tres, caput vnum papaueris. Fiat decoctio ad ʒ. 4. cum ʒ. i. syrupi rosati fiat potus. Vel.

℥. dactylos duos cum capite papaueris, fiat decoctio ad ʒ. 3. In col. dissol. sacchari rosati ʒ. 3. Conuenit vbi distillatio in pulmones cum vigiliis: ac ferè commiscemus ea, quę adstringunt, vbi fluxio est, vt in dysenteria.

℥. syrup. de papau. ʒ. i. diacodij sine speciebus ʒ. i. aquę ferratę ʒ. β. Detur hora somni. Conuenit & syrupus rosatus, aliàs per se, aliàs cum aliis. Olfacere oportet oleum de semine lactucę, de nenuphare, violarum, cucurbitę, aut ex his nares inungere. Alioqui refrigerantia, vt lactuca, flores violarum, nenupharis, semen & capita papaueris, semen album hyoscyami, coquuntur aqua: vapor auribus & naribus excipitur: spongia in his immersa & expressa subinde naribus admouetur. Conueniunt molles frictiones plantę pedum, linteamina bene

munda, instratum cubile refrigerantibus, fusurri facti, identidem infusa aquâ. Sunt qui abraſo capillo humectant caput ſpumâ ſeri lactis feruefacti: melius fuerit oleo roſaceo perfundere. Alij è floribus croci, demptis ſtaminibus, aquam diſtillant, eius aquæ ad 3.4. propinant hora ſomni. Quidam etiam probant manus & pedes ablui ex decocto refrigerantiũ. Bonũ quoque fuerit hordeata, lac amygdalarũ diſſoluere ex decocto lactucarum, capitum papaueris & ſimiliũ, iuſcula alterari cũ multa lactuca, nodulos quoque fieri, qui iuſculis incoquantur, vt.

℥. quatuor ſem. frigidorum maiorum, portulacæ ana 3.ß. fiat nodulus. Vbi verò nimiũ ſomniculoſi ſunt, expreme ſuccum è radice fœniculi, & indes naribus, aut ſpongiam imbues aceto, in quo priũ concifa radix fœniculi, hyſſopus, nux moſchata, aut quid ſimile coxerit. 10

10 Nam per cæcos neruorum meatus, qui ad partes illas perreptant, vapores cerebrum irrigantes & humectâtes, ſomnũque tepore ſuo concilians efferuntur. Parabitur autem lotio ex decocto foliorum ſalic. lactuc. vitium, florib. nymph. viol. chamæmeli. Licebit eodem decocto, (additis tamen aliquot cephalicis, vt beton. ſtæchade, & ſimilibus) caput ablucere: nam vapores acres reſoluendo & refrigerando ſomnum conciliabit. Poterit quoque ſacculus inſtitui ex roſis, violar. cortice papauer. alb. ſeminibus lactucæ & hyoſcyami, pulueratis, ac ſæpè & ſæpè naribus obiici.

### *De ſiti.*

**S**itis fit 1 ab humido deficiente, aut calido ſuperante. Calori aliquando coniuncta eſt ſiccitas, vt in ardoribus: aliquando humiditas, vt in hydropicis, & quum pituita ſalfa ventriculo inhæſit.

## DE MORB. INTERNIS

1 Galen. cap. 30. lib. 1. Simplic. Sic comment. 1. in lib. Hippoc. de natur. humana, sitis (inquit) fit nobis siccescētibus. Est autem id symptomatis genus febrium fermè omnium indiduum, sed maximè continuarum omnium, ardentium, atque adeò tertianarum proprium.

Nascitur autem vel ita alterato toto corpore, vel certis partibus: quales sunt gula, stomachus, ventriculus, viscera, primùm intestinum, pulmo. Sitis quædam est, quæ nullo potu expleri possit, ideóque *Ἰσχυρὸς* Græci vocant. Etenim non aliter quàm qui à dipsade serpente morfi, inexplibili siti ardent. Idque aliquando in morbo contingit, de quo cap. de profluuiio vrinæ. Aliquando id contingit iis, qui veteri vino 2 indulgentiùs sese ingurgitarunt: aut vinum alioqui calidum largiùs hauserunt: vel qui marinam aquâ, ducis inopiâ, diutiùs biberunt: qui deniq; falsis & medicatis alimentis, vel etiam pharmacis ipsum contraxerunt. Vbi humidû efferuescit, biliosus succus, falsave pituita in ventriculi tunicis imbibita est, hoc idem accidit. At verò ex contrariis causis sitis nulla est, vel quia sentiendi facultas demortua est in ventriculo. Hoc verò in febribus maximis & ardentibus exitium denūciat. Est quum adsit iusta causa sitis, non sitiant tamen, qui febricitant: tum quia, vt modò dicebatur, extincta est sentiendi facultas ventriculi: tum quia à capite 3 humiditas defluit, atque inde irrigatis partibus, vnde sitis incendi solet, non sitiunt.

2 Vinum enim meracius & largius epótum haud aliter in ventriculo, ac mustum in dolio, dum feruet, fumos & vapores calidos emittit, à quibus sitis.

3 Iuxta Hippocratis aphorism. 54. libr. 4. Quibus plurimùm siccæ russes leuiter irritantes in febribus arden-

tibus fiunt, non multum siti infestantur. Nam (ait Galen. in commentario) madescunt quodammodo loca, quæ ad asperam arteriam spectant.

Vitiosa quoque sitis est, cum scilicet alienos potus appetimus ex natura humoris viriosi imbibiti tunicis ventriculi, qualis est pica circa cibos, id est, absurda mulierum appetentia, quæ vterum gerunt. Hæc itaque prius distinguenda sunt, quàm de potu fideliter decernas. Neque permittendum est, ut diutius sitiant, maximè in febribus: atque vbi siccitas est. Quin & in declinatione cogendi sunt, ut bibant. In accessionis principio & augmento potus prohibendus, ne veluti in fornacibus fabrorum suffusa aqua, aut alio liquore febrilis calor vehementiùs incendatur: sed tum sitis fallenda est madefacta lingua, vel etiam conuoluta folio lactucæ, acetosæ, aut linteolo in aqua frigida, vel oxycrato madefacto. In vigore collutionibus iam utendum, & gargarismis: qui vbi inclinat, & vehementer sitiunt, largiter ac confertim bibendum, quantum, videlicet, haurire possint. Sic enim fit, ut subito motu & contrarietate potus excitatus calor foras dissipetur.

Somnus 4 sitim sedat à siccitate, declinationibus tempestivus. Sanguinè enim intrò colligit, unde siccitas temperatur. Vigilia verò sitim lenit à calore: calorè enim foras excludit. Ideòq; quicumque merum largius hauserunt, ac per fumos & vapores calidos sitiunt, iis non modò frigida potus, sed etiã vigilia remedio est. Sedandæ siti ardentium, & eorum, qui calido & sicco laborant, conueniunt, quæ refrigerant & humectant: quale est dilutum oxycra-



## DE MORB. INTERNIS

tum, id est, aceti modicum, eiusque tenuis & bene puri, multæ aquæ mixtum, ut facile bibi possit. Acriore enim utendum erit, ubi pituita salsa est, aut alioqui humiditas iuncta calori, ut in hydrope.

Aqua frigida, si neque infirmitas visceris, neque scætera prohibent, tempestivè data, efficacissimè sitim extinguit, quam calor & siccitas faciunt. Quòd si ab aqua frigida noxa metuitur, quinta parte tepidæ vini aquosi, iulepi violati, aut rosati, parte subdecupla sacchari temperari potest.

4 Hippocr. sect. 4. lib. 6. Epid.

5 Nam si sit aliquis humor collectus, qui perpetuam febris afferat consecutionem, purgatione deturbandus. Sic vomitu reiectabile, inquit Galenus, extinguitur sitis.

### *Aliud.*

℥. seminis lactuæ & cucumeris ana ℥. β. liquiritiæ recentis & rasæ ℥. i. bulliant in 6. lb. aquæ. Aqua refrigerata per se vel cum modico aceti, ut priùs, aut aliis proximè dictis, bibatur. Hordeatum mundatum & excorticatum in quadrupla aqua bibitur. Ptisana 6 vulgaris bene cocta ex hordeo mundato, recenti, succulento, excorticato, & glycyrrhiza similiter recenti, & rasa, utilissima est. Sed hæc Medico animaduertenda sunt, alioqui sitim facit, non extinguit. Cydonia & pira humidiora, cucurbita, cucumer in rotulas conciduntur, immittuntur vase aqua frigida pleno, vas in puteum ita demittitur: vsus tempore aqua bibitur, cum vehemens ardor est. Mel rosatum more Veterum præparatum, aut saccharum rosatum, sæpiùs refusa aquâ rosacea factum, in octupla aqua dissolvitur.

Cydonia, pruna, extrema lactucæ ac portulacæ, capreoli vitis, ramenta cucurbitulæ & cucumeris, aqua plantag. vel rosacea macerantur, & ore continentur. Similiter & granatorum succus, syrupi violacei  $\mathfrak{z}$ . 1. in  $\mathfrak{z}$ . 4. decoctionis lactucæ. Iulepus violatus, rosatus, vel ex aqua & saccharo factus, saccharo quidem communi, vel violato. Vinum granatorum, syrupus limonum & similia cum aqua hordei, decocto glycyrrhizæ & similibus propinantur. Pilulæ sunt ab Antiquis commendatæ sub lingua retinendæ.

℥. femin. cucumeris  $\mathfrak{z}$ . 4. gummi tragacanthi  $\mathfrak{z}$ . 2. gummi dissoluatur oui albumine, semina trita cōmisceantur, 7 fiant pilulæ.

Siccentur in vmbra, paulatim deglutiantur.

Circa guttur inunctio ex oleo rosaceo cum aquis, aut succis semperuiui, solani, vmbilici veneris, lactucæ, acetosæ, portulacæ, muccagine psyllij, aliquot granis caphuræ, in quibus linteolum subtile & rarum subinde madesiat, ac frequenter apponatur. Conueniunt & ea, quæ contra æstus dicta sunt cap. de Febre ardente.

6 Cum ea ptisana vulgari, vrgente siti, dissoluuntur syrupi conuenientes, acetosus simplex, de limonibus, violaceus. Vel vtere conferua rosa. recenti in cyatho aquæ agitata. Sitim enim mirificè sedat. Sed pottionis exhibendæ tempus imprimis captandum. Initiis accessionum à potu arcendus æger: in declinatione ad potum inuitandus largiorem: in incremento fallenda tantum sitis.

7 Harum pilularum vna sub lingua teneatur, & humor saliuæ solutus paulatim deglutiat.

# DE MORB. INTERNIS

*De 1 linguæ scabritie & nigredine,  
totiusque oris.*

**L**ingua tunica vestitur, quam communem habet cum toto ore, palato, larynge, gula, stomacho, internóque ventriculo: tum etiam angustissimas venas, per quas visceribus communicat: ita fit, vt ex colore linguæ de viscerum, venarúmque habitu coniiciamus.

**1** Quæ linguæ scabrities & asperitas fit ob immodicam siccitatem, vt nigror ob immoderatum calorem, Galen. commentar. in senten. 4. libr. 4. de rat. vict. in morb. acut.

Humores enim, aut certè vapores **2** è reliquo corpore eò sublatis, vbi iam non habent, quò vltra progrediantur, in spongiosa lingua consistunt, & corpus linguæ afficiunt, inducunt scabritiẽ, nigredinẽ, fissuras, siccitatẽ, aliãque id genus. Eadẽ quoque affectio totum os, quin & asperam arteriam & œsophagum occupat. Scriptum ab Hippocrate 4. Aphorif. & 6. Epide. Quibus plurimùm siccæ tussis leuiter irritantes in febribus ardentibus fiunt, nõ multum siti infestantur, neque iis lingua exurit, Aliquãdo enim tenuis humiditas in os & linguam defluit, vel frequente tussi è vicinis corporibus glândulosis eadem humiditas excuritur. Pars quoque in partes inferiores defluit, vnde hæc omnia humectantur, ex quo neque multa sitis, neque exustio. Pessimum signum est, vbi nigrescit lingua, & nimis scabra est. Hic igitur in primis **3** prohibendi fumi sunt, qui à reliquo corpore attolluntur, coriandris præparatis, saccharo rosato, interceptis viis, vt po-

steà dicetur. Lingua scabra hydrelæo tepido sæpiùs fouenda est. Sed oleum dulce sit, & bene lotum aqua pura, nulla qualitate vitiosa. Alioqui tantum aqua tepida vtendum est: in qua, si vis, præcoxerint semina cydoniorum, althææ, maluæ. Posteaquam verò abluta lingua est, scabrities & humor qui inhæsit, satis aspero linteo, spongia, cæruleo panniculo, cochleari argenteo, vel ad id parato instrumento detergenda, abradendâque. Sæpè enim veluti nigra fuligine obducta est lingua, quæ pertinaciùs hæret, nisi abradatur. Idque ferè fit ab adusta bile, & sursum lata, vnde iis & deliria, & profluvia sanguinis ferè contingunt. Aurelianus spongia aqua tepida imbuta absterget simul, & humectat. Quòd si humectandi consilium vincit, quia siccior lingua est, lini semen, cydoniorum, althææ, maluæ, psyllij, portulacæ, mÿxaria seu sebesten, althææ radices, aliæque eius generis, quæ humectant & emolliunt, in aqua priùs coquenda sunt, in qua molle linteolum subinde inculcabis, atque ita linguam remollies. Vbi verò scabrities vincit, atque ideò abstergendum magis asperiore linteo, panniculo illo cæruleo, extremitate baculi alligato, vel spongia vtêris, & in præscripta aqua aliquid sacchari candi dissolues, atque vbi satis humectatum, atque repurgatum os fuerit, frigida colluendum est. Cautio ne phreniticis & delirantibus, dum os abluis, in os digitum inducas. Mordicant enim, & digitum abscindunt. Cornelius Celsus penicillo è carpto linteolo & constructo, ne dissipetur, linguam deterget, quam priùs aqua calida inculcat: deinde melle vngit, & oleo rosaceo. Mel enim purgat & deterget. Rosaceum

## DE MORB. INTERNIS

reprimat,& siccescere non finit.

2 Non enim lingua colorem mutat ratione aliquorū humorum,nisi ij aut ventriculo contineantur,aut præ vehementi calore fusi, atque in spiritum versi, in sublime ferantur. Comment.in sent.14.sect.5.libr.6.Epid.

3 Quia verendum est, ne fumorum istorum in cerebrum raptus phrenitidem committat.

Alioqui butyrum recens sæpius ex aqua rosacea ablues, cui deinde saccharum commiscebis. Quod si sola ariditas,cerato rosaceo liquidiore vtitor,Saccharum candum retentum ore humectat & deterget. Paulus Celso ferè consentit, & rosaceum incorporatum melli plurimum commendat.Sumach incoquatur malsa,hinc scabritiem detergebis. Pruna damascena & sebesten incocta aqua rosacea humectando conueniunt,& reprimendo,succus portulacæ, eiúsque folia ac reliquæ id genus herbæ prius enumeratæ cap.de siti.

Archigenes sale Indo utebatur: nos saccharo cado.Auicennas bacculo rusci,aut salicis deterget: oleo amygdalino cum modico saccharo optimo humectat & deterget.Quod si oleum odiosum est, lacte amygdalino vtendum erit. Sed aliquando profundius scabrities inhæsit: cæcrum vulgus appellat. Tum Chirurgo vti oportet, qui depressa linguâ instrumentum ad id conueniens profundius immittat atque detergeat, ex quo gargarismis vtendum est. ℞. 4 aquæ hordei aut ptisanæ bene præparatæ ℥. 4.sacchari violati,sacchari candi ana ℥.β.vel.

4 Hoc gargarismate colluendum os: vel linteo aspero demerso lingua infricanda:vt si cochleari,aut instrumento conuenienti abradatur,mox abluatur.

℞.hordei

℥. hordei mundati ℥. i. tragacanth. alb. sem. cydoniorum, sem. maluæ, liquiritiæ recentis mundatæ, succi eiusdem ana ℥. β. Fiat decoctio in aqua purissima ad lb. β. In expressione dissolue penidiorum ℥. 2. Fiat gargarismus, quo tepido vtatur. Alius.

℥. sacchari candi, tragacanth. alb. gummi arabici ana ℥. 2. sem. psyllij, cydoniorum, portulacæ ana ℥. β. conferuæ violarum ℥. β. Vniantur omnia: deinde dissoluta in iulepi violati quantitate sufficienti, gargarismum faciunt contra scabriciem arteriæ, tioriusque oris interioris. Collum verò, qua maximè parte venæ sunt & arteriæ, illinatur subinde hoc vnguento.

℥. olei violati sæpiùs loti in aqua violarum ℥. 2. butyri recentis sæpiùs loti ex aqua rosarū ℥. β. Fiat vnguentum. Vulgus vtitur 5 foliis linguæ canis, quæ collo circumponit, aliisque herbis plurimis. Frequens quoque illi est aqua caprifolij & arnoglossi, similiter & omphacio aliquando vtitur. Decumbere oportet in 6 alterum latus. Supinis & ore 7 hiatibus celerius lingua exarescit. Sternutationes linguam humectant, quia violento motu è vicinis partibus humidis humiditas in os exprimitur.

5 Hæc parum iuuant sic admota. Addit interdum vulgus animalcula millepeda vocata, quia fortasse scriptum est à Dioscoride ea lita cum melle anginis remedio esse.

6 Nam per supinos decubitus vena caua & aorta arteria incalescunt impensius: vnde nimietas caliditatis, linguæ siccitatis & asperitatis parens.

7 Oris enim hiatus madorem, seu saluosum humorem absorbit.

## DE MORB. INTERNIS

*De dolore capitis in febris.*

**D**E dolore capitis iam multa dicta sunt, quæ in hunc locum referri possunt. Peculiariter in capitis doloribus, qui cum febre per initia iuuadunt, prima aut secunda remissione i sanguinem mittito, si vires & cætera permittunt. Verùm priusquam de phlebotomia decernas, videndum ne dolor hic propter adstrictam aluum, aut vapores ventris, non quia 2 materia in capite est, excitetur. Hic enim, quod ad dolorem attinet, phlebotomia necessaria non est, sed clyster sufficit: vt si post septimum diem dolor primùm inuasit, sanguis quidem detrahendus non est: sed aluus liberaliter mouenda est, vel pharmaco mediocri, vel rhabbaro, catholico, vel clystete acriusculo. Quòd si nec clysteri quidem, aut pharmaco concedit dolor, cucurbitula occipitio, vel ceruici defigenda est: sine vulnere quidem, si tantùm vapor est causa: cum vulnere, si qua materia capite continetur.

1 Dolor capitis febris symptoma non semper curationem ad sese trahit. Etenim in crisi, ne naturæ motus interturbetur, eo etiam infestante, nihil moliendum. Scopis tamen assentientibus si sanguis sit mittendus, interna primùm secanda, si plethora adest: sin minùs, externa: dein vena frontis. Nam posteriora capitis dolenti vena in fronte secta iuuat, aphor. 68. lib. 5. Denique ex arteria, si res postulat: quanquam ista particularium capitis venarum pertusio haud ita sit frequens, vt prima ad librum superiorem exercitatione diximus.

2 Materiæ in capite contentæ indicia ex rubentibus oculis & facie, pulsu magno in temporibus, produntur.

Veteres raso capillitio asperisionibus plurimùm

utebantur, & ex alto infusis liquoribus in eas partes capitis, quæ per suturas anteriores humor in caput descenderet. Utebantur ferè oxyrhodino, rosaceo cum aceti modico, si quidem calidior febris, talisque aëris conditio.

Frigidiore verò corporis habitu, & hyeme, chamæmelino cū aceti quinta parte, quod propè fiet, si 3. 2. aceti, olei 3. 1. commisceas. Sed nunc ferè anacollematis, seu frontalibus utimur, quæ frontem & tempora comprehendant ex eadem materia. Vel.

℞. olei rosarum 3. 2. olei communis, vel chamæmelini 3. β. Æstate frigidis, atque ubi feruentior febris est: ubi verò mitior febris, nec cælum feruet, modò tepidis, modò calidis utendum est. Aliquando proximæ mixturæ succum polygoni commiscemus, nonnunquam capita papaueris in oleis elixamus æstate, & vehementiori febre: alioqui serpillum, mentham, betonicam, saluiam, anethum, pucedanum, & similia.

Perseuerante dolore cataplasmata fingenda sunt.

℞. farinæ hordei M. 2. malaxentur cum succis fœniculi, & 3 olei rosacei ana quantum sufficit. Fiat cataplasma, quod in totam frontem & tempora extendatur. Quòd autem & subinde remedia commutari, priusquam nimium incalescant, quòdque olea nec rancida, nec grauius olentia, nec salsa esse oporteat, iam sæpè dictum est.

3 Efficacius erit cataplasma, si olei rosacei loco, papauerinum adieceris.

Cornelius Celsus 4 rosas in aceto macerat, fascia in eo aceto madefacta maceratas rosas inuoluit:



## DE MORB. INTERNIS.

fronti, & temporibus apponit, sæpè innouat : alioqui lana in eo aceto inculcata vim remedij conseruat, quod & in aliis remediis fieri potest, ne celerius incallescant, sæpiùsque commutanda sunt.

4 Ad huius imitationem similia fiunt ex lactuca recenti, portulac. seminibus frigidis, semine papauercis, floribus violar. & nymphææ, singulis parum contulis, & rariore panno exceptis.

Alij pane ex psyllij & similium succo subacto cataplasmata fiunt. Nonnulli eandem micam panis cum foliis hyoscyami conterunt, vel papaueris recentis, deinde oxyrhodino commiscent. Abstinentum verò assidua potatione, collutione immodica, luce, calore, colloquiis, ingratis odoribus & vaporosis, clamoribus, strepitu, & vehementi animi motu. Auicennas & Arabes hac irrigatione vtuntur.

℞. flor. chamæmeli M. β. furfuris, violarum, rosarum an. ℥. β. Fiat decoctio: materia sacculo excipiat, qui subinde madefactus in decocto exprimitur, deinde fronti ac temporibus apprimatur. Neotericorum formulæ sunt.

℞. olei rosarum ℥. β. olei violarum & lactis mulieris ana ℥. 2. aceti albi ℥. 1. panniculus in ea mixtura inculcatus applicetur fronti & temporibus. Aliud.

℞. aquæ rosarum & damasci ana ℥. 1. aquæ nenupharis ℥. β. misce, similiter vtere.

Vitis capreoli & folia concisa, tela inuoluta, & imposita dolorem sedant, & somnum conciliant: similiter & reliqua materia, quæ refrigerat. Viden-

dum tamen, ne nimium refrigeremus, ideoque & aceto, & aliis eiusmodi, sed illo maxime, interdictum est, ne quis, videlicet, solo utatur. Nam præterquam quod nimium refrigerat, nervis etiam inimicum est. Atque iis multò magis abstinendum est in pueris, mollioribus corporibus, & cælo frigido.

Auicennas in dolore capitis à febre abstinet stipticis refrigerantibus, quia timet ne inde materia compingatur, & crassescat nimium. Alioqui materia exprimitur, ubi catarrhus calidus est.

Delirium in vigore febrium multosprehendit ob capitis repletionem, inquit Galen. comment. in sent. 36. sect. 3. lib. 6. Epidem. De eo maximopere sollicitum esse Medicum minimè oportet, nisi fortè metuat, ne in phrenitidem concedat, ut ferè fit calidioribus in naturis, quæ ingentiore febrium ardore exercentur. Quanquam verò sepiùs leue est symptomatis id genus, huic tamen occurrere expedit, quia mente constare bonum. Si ergo à vaporibus acrioribus sursum latis fiat, sumenda & ad-mouenda sunt, quæ illorum ascensum prohibeant, tum quæ discutiant. Qualia multa inuenias cap. de phrenitide libro primo. Si humores in vasis calidi huic malo materiam suggerant, secunda vena. Si fæces in intestinis resistentes, enemata subdenda. Discutient materiam capite contentam catelli enterati, & calidè applicati.

# DE MORB. INTERNIS

## De sudore.

**S**Vdor excretio est serosi humoris per poros corporis. Causas 1 habet, efficientem quidem calorem, materialem vel vaporem, vel humiditatem. Vapor à calore, qui humores resoluit, deinde in superficiem corporis attollit, relaxat poros: sed vapor occurſu cutis reſiſtit, atque hîc in humorem conuertitur, non aliter quàm in aëre pluuia, in ollis coquinariis humor è vapore ſublato, ſi quid ſolidum opponitur. Humor verò eo modo materia eſt ſudoribus, vt etiam vrinis. Atque vt in his aliquid etiam bilis emungitur, ita & in ſudoribus tenuior bilis expurgatur. Sed venoſum genus per vrinas magis, habitus corporis per ſudores expurgatur. Eſt cum calor externus attrahit humores, liquefacit, ac reſoluit, quod in balneis & vaporariis intelligitur. Aliquando etiam medicamenta quædam partium tenuitate & calore humores liquefaciunt, ac celeriter in habitum corporis penetrant, ſecumque liquefactos humores rapiunt, vnde ſudor. Atque interim imbecillitate caloris natui, ac prope diſſoluta naturâ diſſluit ſudor, iſque ſerè frigidus, 2 vt in malignis febribus. Nonnunquam etiam præ copia humorum aut alimenti, ſudor fit, de quo ſcriptum ab Hippocrate aphor. 41. lib. 4. *Sudor multus à ſomno factus ſine cauſa manifeſta corpus vti pluri cibo ſignificat. Quòd ſi non aſſumentibus cibum hoc accidat, ſcire oportet, quòd indiget euacuatione.* Et ex copia humorum perpetuus ſerè ſudor eſt in febrium generib⁹, quas typhodeis, & helodeis appellabamus.

1 His cauſis duabus tertiam addere licet, vt corporis præparationem, ſcilicet raritatem.

2 In his enim vruntur interna, & externa frigent. Frigidus etiam sudor elicitur præ caloris imbecillitate, propter quam calferi non potuerit copiosior materia.

In febribus sudor est optimus, qui fit 3 die critico, præcedentibus signis coctionis, qualitate tepens, toto diffluens corpore, substantia tenui, nullo graui odore, cum pulsu bono & vndoso, & à quo leuatur febris, agerque incipit habere salubrius: cōtrà verò pessimus est ei contrarius. Quòd si ante crisim aut accessionem fit, malus est. Etenim vi exercitur, exprimiturque. Post crisim & accessionē fuso calore, laxato corpore, natura vincente salutaris est. Qui circà ceruicem tantum & thoracem, aut toto quidem corpore, sed exiguus, naturam languidam, vel copia grauata significat. Deterior tum est, vbi in supernis tantum partibus. Nam si tum natura infirma est, syncopem denunciat: quòd si etiam frigidus est, iam syncope est. Alioqui si non ita infirma natura est, partem, vnde effluit sudor, grauata copia coniicies, vel aliter affectam. Qua parte sudor, ibi morbus, inquit Hippocrates, aph. 38. lib. 4. vt & hoc. Frigidi sudores cum acuta febre mortem, cum mitiore morbi longitudinem significant, ex aph. 27. lib. 4. Hæc omnia in febribus distinguere oportet, vt intelligamus, qui sudor bonus, quique malus sit, qui reprimendus, & rursus quem excitare oporteat. Est & genus sudoris incogniti antiquis, qui paucis diebus hominem resoluit, ferè similis ei sudori, quem cardiacū dicebamus. Vocatur autē 4 Anglicus, quia in Anglia anno millesimo quadringentesimo octuagesimo sexto populariter grassari cæpit, quo correpti stomachi & capitis æstuoso

## DE MORB. INTERNIS

dolore cruciantur, toto corpore sudorem fœtidum effundunt, sitiunt, intra viginti quatuor horas animo deficiunt & moriuntur. De quo iam multa scripta sunt. Sed qui eo tempore vixerant, afferunt præcipuam causam mortis, quòd loco stare nequeant ægri, pedes, manúsque ad refrigerium iactent, ac suppresso sudore moriantur.

3 Dies criticos sudoribus dicatos expressit Gal. comment. in aphor. 36. lib. 4.

4 Nonnulli sudorem eiusmodi ad typhodem febrem retulerunt, cum tamen ad pestilentem potius videatur referendus. In Anglia, unde nomen obtinuit, cœpit grassari ob regionis illius humiditatem. Idem Germanos anno 1528. infestavit.

Itaque cautio fuit Anglis, ut qui interdium corriperebatur, 5 statim cum veste decumberet, foueret sudorem: qui verò noctu, sese colligeret, benè cooperiret ut efflueret medicus sudor. Potu vratur, qui temperet sitim, cibo si carere potest, bene est: sin minùs, frugaliter vratur: nec se dimoueat lecto, nec iactet membra ad refrigerium. Est enim lethale, ut vix centesimus quisque euadat: aut si qui euadunt, in morbum his térque relabantur, & tandem concidant. Hæc ex Chronicis Angliæ, quas scripsit Polydorus Virgilius.

5 Sic Aristoteles sect. I. Problemat. iubet ægros febricitantes, potissimum cum sudores eruperint, contineri.

Sudores verò in febribus aliàs cohibere, aliàs excitare oportet. Critici, si quidem resistunt, excitari debent: ac ferè resistunt, vel quia copiosior materia est, vel qualitate crassior & lentior: alioqui

externa causa est. Propterea consuetudo est, ut syrupum acetosum cum ptisana, vel aqua hordei calida imperent: alioqui ptisanam vel aquam hordei saccharo conditam. Atque hæc calida imperentur, ut citius penetrent in corpus.

In summa quæcunque vim habent aperiendi, nec adeò calefaciunt, mouendis sudoribus imperari debent.

Atque ubi materia crassior est, minusque viscida, decoctum hyssopi, thymi, pulegij & similium, vel oxymeliti, vel syrupo acetoso miscendum est.

Verum in sudoribus etiam criticis 6 modus quidem esse debet, quemadmodum & in reliquis omnibus criticis excretionibus.

6 Critica excretio etsi sistenda non est, si tamen vberior fuerit, metu nimix virium exolutionis, tutò sistitur. Nonnunquam enim natura suam semel molita euacuationē seipsam continere nequit, non secus, ac qui per decliue suum cursum instituerunt.

Modum verò tibi indicabit pulsus, qui per eiusmodi excretiones vehemens & magnus. Quo igitur tempore talis permanet, nihil ab excretionē tibi metuendum est: ubi verò cœpit imminui & languescere, sistenda hæc excretio est. Historia est apud Galenum libell. de usu respirationis. Imperitus quidā Medicus sudantem adolescentem in balneum deduxit, & extinxit, præter modum citatis sudoribus.

In 7 syncope copia grauante, inflammationibus viscerum, principiis morborum acutorum sudores mali. Etenim naturæ imbecillitate, non robore effluunt. Ab animi quoque molestia, conuulsionibus, magnis doloribus sudores commoti cohi-

## DE MORB. INTERNIS

beri debent, vt etiam qui 8 resolutio corporis habitu diffiunt. In sudoribus remissis neque satis fluētibus melius est aquam guttatim cadere, quàm tenuiter & parcè corpus madefacere.

7 Aqua frigidus est sudor, naturæ infirmitatem à crudis humoribus, vt antè dictum est, arguens.

8 Habitus corporis colliquatio abit in sudores: succorum verò in venis per deiectiones, aut vrinas.

Diapasmata Græci vocant, quæ ad sudores insperguntur, vt Alipasmata, quæ inunguntur, magisque cohibendis sudoribus. Diapasmata ex materia refrigerante & adstringente, vt est rosarum siccarum puluis, terra Samia, Cimolia, creta, alumen scissile, plumbum exustum, gypsum lotum, mala punica. Hæc singula commixta, vel per se subtiliter trita corpori asperguntur, vel astringente oleo commixta inunguntur.

Ad 9 sinistram mammam, & totum ventrem remedia adhibenda sunt, ac subinde mutanda sunt. Ceterum vbi tumor præter naturam in hypochondriis, adstringentibus abstinere oportet, vtendumque pane ex rosaceo subactis: Alioqui farinam volatilem ex aqua, vel rosaceo subactam hypochondriis impones. Atque remedia, quæ sudores cohibent, fugere oportet.

9 Ab his enim partibus sudores effluunt copiosiores.

Aëtius cataplasmatibus refrigerantibus sinistram mammam & totum ventrem comprehendit: smegmatibus verò aut diapasmatis, id est, puluisculis, collum, thoracem, alas, inguina conspergit. Corpus quoque ventilandum est, atque leuandum stragulis. Possumus succo plantaginis, portulacæ & simi-

lium media corporis irrigare: vniuersum corpus ceratis ex oleo adstringente inungere.

Paulus resistentem sudorem criticum, aut remissum, fotu, quiete, calido clystere, sorbilationibus, somno denique adiuuat.

Sudores ab animi molestia, conuulsione & similibus, extremitatum ligatura, fotu extremorum, vestimentis laneis compescit.

In summa nullus sudor vi exprimendus est. Sed ubi natura eam excretionem molitur, tum quidem adiuuanda est. Certissimum indicium salutaris sudoris è pulsu colliges, qui magnus & vndosus esse debet, si quidem sudor salutaris futurus est: ac præter cætera animaduerte, quæ sudoris causa extiterit.

Si enim præter natutam est, qualis est dolor animi, molestia, conuulsio, interior inflammatio, & similia: sudor quidem resoluit corpus, non leuat: itaque cohibendus est. Contrà verò si naturæ victoria est, pulsus magnus erit & vndosus, neque tum sudor cohibendus: sed si resistit, incitandus, dum incipiat pulsus languescere. Signa prognostica, è quibus præfagias sudorem, iam antè descripta sunt cap. de febre ardente.

Sudor qui grauitè olet, putridam, corruptamque materiam ostendit. Suspectus est, qui non soluit febrem, qui non minuit symptomata, qui alio die, quàm critico, existit.

*De morbo Regio.*

**Q**uibus in febribus morbus regius 1 ante diem septimum accidit, malum, inquit Hippocrates. Tum scriptum ab eodem primo de morbis popularibus, multos seruatos, quibus die



## DE MORB. INTERNIS

quarto morbus regius accidisset, & lib. de rat. victus acutorum. Morbus regius ante septimum si 2 cum horrore, salus: si sine horrore, mors. Quæ quia pugnare videntur, meminisse oportet morbum regium ante septimum ferè exitiosum, 3 nisi sequatur excretio, qualis est fluor sanguinis è naribus, alui profluuium, vrina multa, sudor, vomitus, & similia.

1 Non enim ante diem septimum bilem iudicatoriè efferri potis est, inquit Galen. comment. in eum Hippocr. locum. Adde quod etiam si fiat post septimum, periculo non vacat, ut si sit ab obstructione, inflammatione, vel scirrho.

2 Horror enim aut rigor sequuturam indicant excretionem.

3 Sic Hippocrates sent. 67. sect. 2. lib. 1. Epid. seruatos multos ante diem septimum commemorat, quòd alia copiosa excretio esset consequuta. Nam ante septem dies alij quoque sunt critici, in quibus omnimoda fieri potest excretio, sed non solius bilis in cutem. Hæc enim sola depulsio ad crism non sufficit ante septimum.

Alioqui naturæ infirmitas ostenditur, grauis intemperies, aut obstructio hepatis, eiusdem inflammatio, aut scirrhus. Quòd si initio morbi natura concidit, exigua spes reliqua est.

Post septimum diem verò, si quidem criticus est, salutaris est.

Post septimum significare sudorem scripsit Hippocrates lib. de 4 Iudicationibus,

4 In febribus enim ardentibus (inquit Hippocrates lib. de Iudicationibus) si posteriùs septimo die regius accidat morbus, indicium est sublati sudoris, & solutæ febris.

Si igitur post septimum morbus regius fit, & criticus est, expectanda salus: multò magis, si qua excretio critica coniuncta est: vnde leuetur natura,

minuatur febris, eiusque symptomata.

Verum aliquando & morbus regius fit, & sequitur excretio, & mori contingit. Ita Hermippus in Epidemiis cum à morbo regio abundè excreuisset per aluum, mortuus est.

Phanagoræ seruus tertio die auriginosus nihil excreuit, mortuus est.

Heraclides & alij permulti sexto die auriginosi seruati sunt: quibus sequuta per vesicam purgatio, turbata aluus est, vel profluxit sanguis è naribus.

Præter remedia, quæ proprio capite de morbo regio descripta sunt, conueniunt, balnea dulcia, vnctiones ex oleo chamæmelino, anethino, irino, aut cui rosmarinus incoctus sit.

Potiones, quæ aperiant, rarefaciant, moueant sudores, quæque partim capite de variolis, partim capite de sudoribus descripta reperiuntur. Atque ubi extincta febris est, liberior vsus est aperientium. Oculis conueniunt foci ex qua tepida, in qua summitas fœniculi, flores chamæmeli, anethi, rosmarini efferbuerint. Atque eadem aqua, & facies, & corpus vniuersum ablui potest.

Oxysacchara, Granatorum succus cum modico melle albo, vel saccharo oculis inungitur. Errhina imperantur.

Ablutio faciei ex aceto albo tepido. Errhinotum vsus in balneis ex aceto acerrimo scyllitico, succo nasturtij, maioranæ, betæ, fœniculi, rosmarini. Elaterij momentum in lacte muliebri dissolutum.

*De dissoluta i appetentia.*

**A**ppetentiæ ideo consulendum est, quia longior inedia vires dispereunt. Itaque quantum

## DE MORB. INTERNIS

morbis patitur, curandum vt æger aliquid appetat. Neque omnino denegandum est, quod æger appetit, etiam si non ita morbo conuenire videatur. Scriptum enim est ab Hippocrate aph. 38. lib. 2. Parùm deterior potus aut cibus, &c. quòd ea quæ cum voluptate assumuntur, ventriculus amplexetur auidius, & faciliùs concoquat.

1 Dissoluitur appetentia, & cibi fastidium ingeneratur à vitiosis humoribus, quos imbibit ventriculus. Ad hanc quoque causam accedit virtutis imbecillitas, quæ præsertim calidam sequitur intemperiem.

Atque interim coguntur vti clysteribus, 2 qui nutrant, vbi nimium deiecta appetentia, nihil assumit æger, aut omnia reuomit. Similiter & cibum non sentientibus, & cardiacis, iuscula caponum, pulastrorum cum modico saccharo, hordeatum & amygdaloga.

2 Galen. lib. 5. Method. air iniectos clysteres non ascendere ad ieiunum intestinum, & tenue vix pertingere. Primo de facultatibus naturalibus addit nihil nutrire posse, nisi quod concoctionis loca præterierit. Arabes contraria sunt in opinione. Agnoscit tamen Galenus lib. 3. de natural. facultatibus in intestinis vim coquendi, & ab his per mesaraicas hepar aliquando attrahere contendit. Sic lib. 6. de symptom. causis clysteres vomitu reiici posse asseuerat. Vnde constat alimentum his quoque posse suppeditari. Clyster ita imperabitur. ℞. decocti caponis cum lactuc. portulac. & acetos. alterati lib. β. vel lib. ι. sacchar. rosati, vel violati ʒ. ι. vitellos ouorum duorum. f. clyster. Iniiciatur ante somnum, vel quo tempore æger cibum capessere solebat, sed repurgata prius suis fæcibus per alium clysterem aluo.

Oribasius alicam, triticum, far, furfures, panes coquit, & decocta infundit nutriendo, & stercorea duriora excludendo. Meliùsque fuerit, priusquam nu-

trientem clysterem iniicias, alio clystere intestinum repurgare, ac quantum fieri potest, & paulatim & profundum nutriens clyster infundatur.

Aëtius oua confracta in ptisanæ cremore, aut alicæ, iniicit vacuo intestino, hoc est, bene repurgato veteri stercore. Nunc vitellum oui in hordeato, lacte amygdalino, iure carniū dissoluemus. Potus sit 3 iulepus rosatus, distillatum: sed quia dulcia sunt, quarta pars vini granatorum adiici debet. Gelatina cum eodē vino, vel granis acidi granati, granatum quoque acidulum, cum modico saccharo exhibeatur. Iulepus factus ex succo depurato capreolorū vitis. Syrupus de agresta cum aqua cocta frigida. In conualescentibus sæpè humor aliquis reliquus est imbibitus ventriculo, vnde deiecta appetentia. Eos scripsit Hippocr. egere vacuatione.

3 Huius zulapij duo aut tria cochlearia breuibz interval-  
lis sine aqua sunt assumenda. Vt. ʒ. zulapij rosati ʒ. 3. succi  
granatorum ʒ. 1. commisce: capiat per interualla.

Vacuatio olim ex hiera: nunc ex rhabarbaro. Optimum fuerit vacuans medicamentum impet-  
rare ex decocto eorum, quæ detergent, & maximè  
cicerum rubrorum, absynthij, hordei & similium. Cinamomum aceto scyllitico maceratur: estur ma-  
tutino.

Incidit aliquando febricitatibus vomitus super-  
fluus. Remedia ex lib. priore, cap. de cholera mor-  
bo & vomitu petenda sunt. Quinetiam incidunt  
hæmorrhagia, singultus, syncope, quorum remedia  
propriis capitibus descripta reperias, habita semper  
ratione causæ, seu febris copulatæ. Interim si alius  
durior fuerit, mollienda clysteribus, ex iis, quæ par-

## DE MORB. INTERNIS

tim ardorem attemperent, remolliant, & si fuerit opus, aliquid trahant. De profluentis alui remediis, tremore cordis & cardiaca febre abundè antè ductum est.

## DE EXANTHEMATIBVS, PAPVLIS, VARIOLIS ET MORBILLIS.

**C**Riticæ sunt 1 interdum eiusmodi papulæ in synochis putridis. Atque aliàs quidem vbi appetet morbi solutio, circa labia tantùm & nares existunt: in aliis febribus à corruptorum succorum colluie 2 toto ferè corpore, aut plurimis partibus erumpunt. In pestilenti constitutione & maligno genere febrium vlcerantur, saniem reddunt, & naturam carbunculi imitantur. Nonnunquam celeriter resiccantur & concidunt. Deteriores aliis quæ vel interna occupant, vel foris faciem. Plures deteriores paucioribus, maiores minoribus, diutius perseverantes iis, quæ celerius decidunt, malæ quoque pruriginosæ & ardentes, quæque sunt 3 cum fluore alui, aut frequenti vomitu. Etenim melius est hîc aluum adstringi, multò magis vbi apparuerint, aut mediocriter solui.

1 Pustulæ siue eruptiones, quæ florum instar in cute exiliunt (vnde *ἐξανθήματα* Græcis nominantur) febribus præsertim malignis & pestilentibus superueniunt, vt constat ex sent. 51. sect. 3. lib. 3 Epid. Variolæ verò minutæ vulgò appellantur, in quibus cutis tantùm deturpatur, & quæ neque fœda vlcera, neque arthritidas inducunt, vt lues venerea inferre eius generis morbos consuevit. Morbili sunt rubri paucitate materiæ à variolis distincti. De generatione papularum istiusmodi paulò pòst differitur.

2 Itaque

2 Itaque ait Hippocrates in Coacis animaduersionibus.

*Quibus in febris exantemata erumpunt per corpus vniuersum, lethale, si non purulentus abscessus fiat.*

3 Metus est enim lethalis dysenteriae ex acris humoris in aluum diadoche & effusione.

Vbi igitur apparent in febris, recognoscenda sunt, quæ præcesserunt signa. Virtus consideranda est, si præcessit coctio, si virtus robusta, si febris leuior, facilior spiratio, cætera quoque meliora facta sunt, salutare papulas iudicabis, alioqui exitiosas. Nonnullis sub mortem & in morte certis partibus excitantur, Vulgus purpuram rubras id genus maculas appellat. Variolas aliquando febricula præcedit, idque melius est, quàm consequi. Fiuntque ea omnia naturæ motu, quæ quod vel copia grauat, vel qualitate lædit, extrà propellit. Atq; aliquando tanta vitij multitudo, vt natura nequeat excludere, & papulis quidem scateat tota cutis, & pulmones, guttur, intestina, partésq; interiores eodem malo vitientur. Fit aliquando, vt quæ iam foras exierant, intrò recurrât imbecillitate naturæ, Vere plurimùm præ copia, Autumno magis vitio humorum, cælo & constitutione calida & humida, infantibus ac pueris, post etiam adolescentibus, rariùs iuuenibus & viris, rarissimè senibus excitantur. Arabes ad 4 menstruum sanguinem partem causæ referunt, qui poris corporis inhæsit, & robore naturæ aliquando excluditur. Alioqui ad ea, quæ priùs, copiam vitiùmque sanguinis, referenda causa est. Sed à copia ferè rubent, nisi cùm iam corrupta materia est. A vitio repræsentant colorem succi redundâtis.

4 Causam hanc Arabes protulerunt, quòd hic morbus velut congenitus videatur, quem pauci, vel propè nulli

## DE MORB. INTERNIS

possint effugere. Non tamen dubio caret ista ratio. Nam si variolæ & morbili causam habeant à retentione reliquiarum menstrui sanguinis in corporis poris, cur mulieres, quibus supprimuntur menses, istiusmodi morbis non defœdantur? Adhæc non omnes hoc laborant affectu, cùm tamen in omnium poris nonnihil menstrui sanguinis relinquatur. Ideoque è recentioribus nonnulli causam ad aërem transtulerunt.

Minus periculosa, quæ rubent, aut albicant, quæque extant superficie corporis. Magis periculosa, quæ flauæ, violaceæ, liuidæ, nigræ, quæque sanie virulenta sordent, aut latent in corpore.

Perniciem adferunt, quæ intrò redeunt, nisi cita aluo prolunies exeat. Periculum est, cum magnitudo febris, sitis vehemens, æstus, dyspnœa, iactatio corporis, dysenteria, vrinæ malæ, nigræ, animi deliquia & alia eiusmodi lethalia coniuncta sunt. Sunt qui paulò antè quàm erumpât papulæ, veluti Epileptici concidunt. Vbi enim naturæ impetus superiora appetit, aliàs hoc accidens commouet, aliàs graues capitis dolores, quo tempore summa difficultas anhelitus aliquândo fit, densatur sputû, 5 pruriunt nares, facies rubet, fulgor oculis prætenditur, vox raucescit, 6 fluunt lachrimæ, pulsatio in spina, dolor in dorso, territatio in somniis, corpus veluti aculeis configitur, exiguæ notæ quasi capita acuum, aut milij magnitudine, rubent, quæ paulatim inaugentur, & numero crescunt, apparent ferè primo, secundo aut tertio die post febriculam. Melius 7 est citò apparere, celeriter augeri & maturari.

5 Ab incensis vaporibus caput petentibus.

6 Liquata scilicet in cerebro materia vi caloris, & in oculos prolabente.

7 Hinc enim roboris naturæ certa significatio fit,

atque etiam materiæ facilitatis.

Alij anginosi, quod plurimum est: nonnulli dysenterici, quidam etiam syncope moriuntur. 8 Morbillos magis biliosos esse volunt: Variolas magis sanguineas.

8 Propterea morbili citius, variolæ tardiùs erumpunt. Ex his sanies: ex illis nihil profunditur humoris.

*Curatio.*

Apparent ferè exanthemata intra diem tertium. Primo itaque aut secundo die 9 sanguis detrahendus est, sic enim meliùs transpirat corpus. Putredinis causa intercipitur, leuatur natura, & si quid vitij reliquum est, celeriùs in superficiem corporis repurgatur: alioqui periculum est, ne ex magna putredine ardentissima sequatur febris, & natura oppressa multitudine, vel nihil exponat in superficiem, vel tantùm partem vitij: quæ si per imbecillitatem naturæ, quæ nimium oppressa est, intrò recurrit, suffocatur æger, nisi beneficio naturæ initio reuocata materia vomitu, vel deiectione excludatur.

9 Si pletoricū sit corp<sup>9</sup>, & metuatur, ne in effero illo materiæ orgasmo fiat humorū in nobilē aliquā partem decubitus.

Tempestiuè igitur detrahendus sanguis est ex interna brachij. Verùm vbi iam malum euasit in habitum corporis, periculosa est phlebotomia, quia videlicet, à superficie in medium corpus vitiosam materiam reuocat. Cæterùm perpetuum non est abstinere phlebotomia, cùm iam papulæ in superficie corporis extiterunt. Etenim fit aliquando præcopia vitij, vt & plurimum reliquum sit in corpore, vrgeat vehementer difficultas spirandi, grauis sit febris: quo tempore, si nihil repugnat, vena secanda.



## DE MORB. INTERNIS

est. Alioqui sanguifugis vtendum erit, quas dorso, scapulis & naribus affiges. Similiter cucurbitulis cum scarificatione.

Sunt, qui loco phlebotomiæ hæmorrhoidas, & menses incitant, profluuium quoque sanguinis è naribus.

Quòd ad purgationem attinet, 10 leues clysteres satis esse possunt, qualis est ex diluto hordeato, in quo vitellus oui, & oleum chamæmelinum dissolui debet. Alioqui in aquæ hordei, ℥b. β. cassiæ autem ʒ.6. modicum sacchari, & vitellus oui dissoluantur. Clysteres diutissimè retinere oportet, & minimè acres esse, multò maximè, cùm iam materia in superficiem commouetur. Pharmaca quoque 11 leuia esse debent, ex decocto iuiubarum, tamarindorum, prunorum, cassia, manna, glycyrrhiza, iure galli veteris.

10 Clysteres & purgationes non nisi vrgente necessitate vsurpantur, cum præsertim corpus extimum exanthematis scatet, quia intrò virulentam materiam reuocant. At papulis nondum extuberantibus non ita periculosum leuiter purgare. Sic Gal. lib.5. Metho. seruatos inquit omnes ab exanthematis pestilentibus, qui purgati antè fuerant.

11 Nam vehementiora alui profluuiam excitarent.

Aut vbi ardentior febris est, & bilis redundat in corpore, ʒ.1. aut ʒ.4. rhab. in aqua endiuiei infundantur. Fiat inde potus. Et similiter in aliis humoribus leuissima quoque 12 pharmaca eligenda sunt. Et quia hæc omnia vitia efferuescente sanguine fiunt, statim initio laborandum est, vt feruor sanguinis extinguatur, & putredo prohibeatur. Cui rei conueniunt, quæ refrigerant, & leuiter adstringunt. Alimenta quoque eiusmodi, & quæ contemperat.

Conueniunt itaque syrupus de ribes, de acetositate citri, de granatis, & reliqui refrigerantes syrupi mox in pestilentia numerandi, in quibus etiã misceri possunt antidoti illiẽ descripti ex 13 materia refrigerate.

12 Hæc exhibentur primo, vel secundo die, antequam natura mouere incipiat, corpore cacochymo existente & plethorico, ad vitandam bilis efferuescentis occasionem.

13 Vt conseru. rosar. viol. nenuph. bugloss. borrag. pulu. diamargarit. frigid. rasur. eboris. cornu cerui, oss. de corde cerui, vnicorn. margarit.

Quod si vehemens sanguinis motus est, neque id genus remedij resistit, natura iuuanda est, vt propellat foras.

Conueniunt igitur, quæ sudores mouent, & in superficiem corporis materiam adigunt: qualia ferè sunt descripta à multis, ficus sicca, passula, lens, semen apij, semen fœniculi, oxyfacchara, decoctum calamenthi, hyssopi, ligni sancti, syrupus acetosus simplex, aqua hordei & similia. In quorum delectu habenda est ratio 14 magnitudinis febris. Imperabis igitur ficuum siccarum  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . liquiritiæ  $\mathfrak{z}$ . 2. bulliant in aqua sufficiens, detur expressio ad  $\mathfrak{z}$ . 4. Cap. in siti, aut pastu.

14 Vt si ingens sit febris, temperatis: si læuis, fortioribus vtaris. Horum enim plurima impensè sunt calida.

*Aliud.*

$\mathcal{V}$ . sem. apij, & fœniculi ana  $\mathfrak{z}$ . i. lentium excorticatarum  $\mathfrak{z}$ . 2. ficus siccas duas, bulliant in aqua sufficienti, detur expressio. Aqua distillata è floribus lini huic rei confert, potestq; modico saccharo condiri. Alij 15 res rubras prætendunt corpori. Linteum insuccatum in aqua fœniculi & apij, vel horum succo tepidum corpori ad mouent, & tepidum conseruat.

## DE MORB. INTERNIS

15 Sed quæ corpus non contingant, quòd quandam habeant adstrictionem.

Nonnulli aquæ hordei  $\zeta$ .3. vini subtilis  $\zeta$ .1. propinant. Aëre temperato collocandi sunt initio, priúsqvam appareant.

Somnus conceditur, sed posteaquam eruperunt, idem minuendus est.

Alimenta initio, quæ refrigerant & 16 leuiter adstringant: postea verò quæ contemperant. Vbi apparet motus, frictio mollis cōuenit. Variolæ ferè ad septimũ maturantur, quo tẽpore animaduertendũ aliàs quidem maturas esse, aliàs crudas. Quæ maturæ sunt, molles, & plenæ sanie, acu configantur. Molli linteolo sanies detergeatur, quæque maiores sunt, pluribus locis configi debent. Vbi iam sanies deterfa est, ne supersit cauitas, puluis aliquis ex iis, quæ implent, inspergẽdus est: vt ex 17 amilo, thure manna thuris, aloë, lithargyro, cerusa, farina fabarũ, cicerum, orobi, lupinorum. Atq; hĩc habenda ratio partis est, ætatis, temperamentũ, eaq; omnia ad cõsiliũ adhibenda sunt, quæ adhiberi solent, cum vlcus carne replendum est, ne supersit deformitas.

16 Ad partium robur, quòd sese ab impetu humorum tueantur.

17 Hi pulueres sarcotici sunt, non quòd reuera carnem regenerent, sed quia dum saniem & sordes detergent, caro faciliùs refarciatur.

Crudæ, quæquæ duræ sunt, nec maturæ, vapore decocti chamæmeli, caricarum, passularum, tritici, dactylorum pinguium & maturorum, sem. althææ, lini, scœnũgræci & similibus perfumandæ sunt: tum eodem decocto fouendæ: post quæ linteum calens mediocriter imponendum, dum maturescant.

Atque vbi maturuerint, vt priores, curandæ sunt.

Variolis 18 oculi, nares, pulmones, intestina sæpè læduntur & vestigia supersunt, vnde deformitas. Itaque vbi signa se produnt variolarum, muniendi sunt oculi fortè è succo granatorum, aqua rosacea.

℥. coriandri, sumach. ana ʒ. i. santali albi & rubri ana ʒ. β. in pul. redacta concorporentur albumini, meliùsque fuerit albumen oui, mixta aquâ rosacea, priùs agirari & despumari. Vel.

℥. 19 sumach. cōquassati ʒ. 2. madefiant in aquæ ros. ʒ. 2. Fiat fortis expressio: expressioni adde caphuræ Gr. 4. Iam læsis oculis pistacia conteruntur, trita aqua rosacea madefiât, expressioni farina hordei torrefacti commiscetur. Item.

℥. cerusæ lotæ ʒ. 5. sarcocollæ ʒ. i. β. tragacanthi ʒ. β. opij. Gr. 4. cū mucagine tragacanthi extracta in aqua plantaginis, fiat collyrium, quod postea dissoluatur in lacte muliebri, vel albuminibus ouorum.

Ori & gutturi conseruando 20 granatorum succus & berberorum. Si iam vlceratio est, abluatur primùm aquâ hordei, cui aliquid sacchari vel mellis, vt ad ʒ. β. commixtum sit. Deinde ex supradictis succis, diamoro & diacorio fiat gargarisma. Post collutionem oris, folium plantaginis inducat.

18 Quia à variolis oculis albugo, & sæpè cæcitas, naribus erosio, pulmonibus phthisis, intestinis vlcus impendet, partes hæ meritò veniunt muniendæ.

19 Hoc collyrium deterget, refrigerat, exsiccat & agglutinat. Opium verò immiscetur ad acerbissimum dolorem obtundendum.

20 Ex his in aqua rosarum & plantaginis, vel in aqua hordei dissolutis gargarismata parantur.

## DE MORB. INTERNIS

Pulmonibus 21 syrupus de papauere: postea diatragacanthum in decuplo decocto liquiritiæ, caricarum, passularum dissoluatur.

Liquor ouorum extractus ex albuminibus, & distillatus, delet vestigia, & illustrat faciem.

21 Sumendum erit è cochleari sensim lambendo, vel ex bacculo glycyrrhiæ, vt eius aliquid in asperam arteriam isto sumendi modo deerret.

Naribus odoretur acetum rosaceum, item in quo rosæ coxerint. Excipiat vapor è decocto rosarû, santalorum. Linteolum quoque in his insuccatum, vel in mixtura omphacij, aceti, aquæ rosarum sæpè inducatur naribus.

Iam exulceratis, ceratum rosaceum, vel violaceû mixta quarta parte muccaginis tragacanthi in aqua ros. vel plantag. extractæ, conuenit. Intestinis decoctum rosarum & cydoniorum.

Delendis vestigiis hæc conueniunt.

℞. lithargyri, cerusæ lotæ, cadmiæ lotæ, pul. cannarû adustarum, croci ana ʒ. ʒ. Trita incorporentur cerato factò ex cera & oleo liliaceo. Conueniunt aqua fabarû, aqua distillata è pedibus vituli, arietis, porcellorum, aqua distillata è melle, terebinthina, radice serpentariæ, limonibus, citrangulis, floribus fabarum, aqua quæ folliculis vlmorum includitur.

Bene repurgatur à vermiculis, & modico saccharo cando commiscetur, vel cum melle & terebinthina distillatur.

℞. cerusæ lotæ, amili farinæ, fabarum, cicerum, phasiolorum, tragacanthi ana ʒ. 2. Vniantur omnia lacte muliebri.

*Aliud.*

℥. mastichis, myrrhæ electæ, aloës hepaticæ, spicæ nardi, sanguinis draconis, olibani, opopanax, bdellij, carpobalsami, croci, gummi arabici, styracis liquid. & rubr. ana ʒ. 2. ʒ. terantur omnia, & cum rebinthina ad pondus omnium fiat distillatio in alembico.

℥. lithargyri argenti lb. ʒ. Optimè trita decoquatur in lb. 2. aceti albi optimi, semper agitando, vsque ad consumptionem medietatis: deinde per filtrum distilletur, & in vase bene mundo reponatur. Postea.

℥. caphuræ ʒ. 3. aluminis, boracis, ana ʒ. 6. moschi Gr. 4. Terantur omnia: quibus adde olei de tartaro ʒ. 1. ʒ. Bulliant omnia in lb. 2. aquæ ros. ad consumptionem tertiæ partis, semper commiscendo. Postremò per filtrum distillentur, & in ampulla bene clausa reponantur.

Oportebit primùm contingere maculas priore distillato: deinde secundo. Alia permulta è Practicis colliges.

*De Varicibus.*

**V**arix vena est dilatata & tortuosa, nata primò imbecillitatis vitio ex 1 sanguine crasso, melancholico, interim pituitâ mixta.

Quæ ab atra bile, attriorem cutem reddit: quæ verò à pituita, albiorem. Nascitur plurimùm in cruribus, interiori tibiâ. Aliquando in testiculis, ventre, temporibus. Supposita vulneri prohibet, ne vulnus coalescat. Itaque primùm hoc modo curanda est.

1 Ex Galen. commentar. 3. in libr. de articulis sent. 4.

## DE MORB. INTERNIS

Consultis ægri viribus, cæterisque ad phleboto-  
miæ consiliū adhibitis, ex axillari brachij eiusdem  
lateris cum crure, in quo varix est, 2 sanguinem de-  
trahes, nisi vitio lienis varix intumuerit. Tum enim  
è sinistra axillari sanguis detrahendus est.

2 Vt plethora imminuatur, & fluentis sanguinis commo-  
da fiat retractio.

Missō sanguine vires reparandæ alimentis boni  
succī, ex quo imperandum pharmacum, quod vnà  
melancholiam & pituitam expurget, adhibita ta-  
men ea ratione, vt ex colore varicis, tum etiam aliis  
humorem redundantem iudicemus. Vtérque hu-  
mor cū sit crassus, 3 primū incidendus est &  
attenuandus, tum per interualla repurgandus.

3 Plerūque contingit serosum esse sanguinem, qui tum  
incidī, & attenuari minus postulat.

Incidentur oxymelite, in quo hyssopi, aut radicis  
fœniculi aliquid maduerit, si quidem pituita redū-  
dare videbitur.

Si verò atra bilis, eodem oxymelite, in quo cor-  
tex radicis capparis, aut tamarisci bullierit, adiectis  
interim feminibus anisi, apiij & similium.

Pituita repurgatur agarico ad ℥. 4. in eiusdem o-  
xymelitis ℥. 3. infuso cum granis aliquot zinziberis.  
Senna atram bilem repurgabit ad ℥. 3. aut 3. 3. in eo-  
dem oxymelite, aut sero lactis infusa, adiectis ℥. 4.  
cinamomi. Efficacior quoque potio, si 3. 2. eius pul-  
cum absynthij decocti ℥. 3. propines, aut epithymi  
tantundem loco sennæ.

Vtrunque humorem, qui ferè mixtus est in vari-  
ce, hoc syrupo purgabis.

*℥. betonicæ, cichorij, florum cordialium ana*  
*P. i. liquiritiæ, anisi, cuscutæ ana ʒ. 4. passularum*  
*mundatarum ʒ. i. ʒ. polipodij queryni ʒ. ʒ. agarici*  
*trochis. ʒ. 6. foliculorum sennæ electæ ʒ. i. ʒ. Fiat*  
*decoctio ad quartaria tria. In ea dissolue sacchari*  
*albissimi quartarium. Fiat syrupus mediocriter co-*  
*ctus, capiat ʒ. i. ʒ. per intervalla cum ʒ. 2. feri lactis,*  
*ptisanæ, aut aquæ hordei. Iam secta vena, & pur-*  
*gato corpore, 4 varicem in longum scarificabis,*  
*iniectis vinculis supra genu, vt tumeant magis, ita*  
*sanguinem è varice exprimes. Vbi satis vacuaueris,*  
*ei ipsi venæ sectæ varicosæ medeberis eo modo,*  
*quo venas vulneratas curare oportet.*

4 De sectione varicum vide Paul. Æginetam cap. 28. libri sexti.

\* Itaque curato varicis vulnere, tum demum ad maligni vlceris curationem redibis. Hæc ex. 4.

℥<sup>a</sup> γέρν.

FINIS.





I A C O B I  
HOLLERII STEMPANI,  
MEDICI PARISIENSIS  
CEELEBERRIMI, DE PESTE  
LIBELLVS,

*Anto. Valetij scholiis illustratus.*

**P**idemia 1 morbus est aliquo anni tē-  
pore, certisq̃ue locis inualescens : qui  
si multos rapit, λοιμώδης, id est, pe-  
stilens appellatur, & λοιμός pestis  
est : qui morbus populariter grassans  
multos interimit. Sūntque eiusmodi morbi 2 ab  
aëre omninò distinguendi, ab iis, quos σποραδικῆς  
appellant, quibus antecedens 3 vitæ ratio causa est.  
Atque imprimis animadvertere oportet, vnde pri-  
mum clades eiusmodi publicæ oriuntur. Nam &  
ad curandi rationem pertinet. σποραδικοὶ vniuf-  
cuiusque proprij sunt, tantumque vexant populi  
vulgus, ac ferè quo tempore longa præcessit fa-  
mes & annonæ raritas, cū videlicet obuiis qui-  
būsq̃ue alimentis sese ingurgitant, vnde humo-  
rum corruptela coaceruatur. Quòd si ferax anno-  
na sequitur, & frugum prouentus vberior, etiam

solito magis sese replent. Sed non pura corpora quantò plus nutriuntur, tantò læduntur magis. Quod enim bene succosum est, multitudine accenuati victus priore vita corrumpitur. Ab hoc non adeò metuenda contagio. Alterum genus, quod ab aëre est cōtagiosum magis, nullique parcit, temperatos, 4 scilicet, & alios corripit, quia communiter nobis, etiam nolentibus, idem hauriendus aër est. Ac ferè 5 Austri ac maritimi flatus, constitutio calida & humida, annus autumnalis, hoc est, quando modò calor, modò frigus est, pestem inuehunt. Causam alij è 6 cælo requirunt & decretis syderum. Alij in antegressæ causæ inuestigatione minùs se torquent. Multò magis enitendum, vt præsentēs causas declinemus, hoc est, aëris afflatus alioqui corrigamus, & in hac pessima lue quantum arte & consilio conceditur, nobis & aliis salutare auxilium afferamus. Aër enim aliàs cæde hominum & strage, alioqui animalium, stagnantibus putridisque aquis, aut maligno terræ halitu noxiis ventis, pestifero denique influxu syderis, sorde mechanicorum, vt coriarcorum, corrumpitur.

1 Ex commentar. Gal. ad sent. 20. sect. 3. lib. 3. Epidem. Pestem autem veteres febrem quidem perniciosam, cuius calor præ aliis habeat, vt insigniter sit putridus, definierunt, sed eius essentiam minimè explicarunt. Quicquid sit, quia celeriter, continenter & vehementer mouetur, de genere est febrium continuarum acutissimarum, quiddam malignius habens à venenata sorte, omnis vulgatæ putredinis modum superante. Venenati id genus virus vitalem primùm spiritum (vt solet venenum omne sua gemina proprietate cor vitæ fontem & domicilium petere) inuadit, tum verò in vniuersa viscera, totamque corporis molem dispergitur.

## DE PESTE

2 Quod pestilentes morbi omnium popularium perniciosissimi, ab aëre, cælive statu proficiscantur, docet Galen. præfatione in lib. 1. Epid.

3 Sic in Æno frumento semiputri & leguminibus qui vesci fuerant coacti, communem in morbum inciderunt, cruribus vacillârunt. Testis quoque est Cæsar in commentariis Massilienses graui peste conflictatos esse in obsidione vrbis suæ ob esum hordei & panici exoletorum.

4 Aliqua tamen desideratur corporis præparatio: siquidem nulla efficiens causa quicquam agat, nisi propensum subiectum nanciscatur: alioqui enim à labe illa nullus foret immunis. Itaque promptius corripiuntur, qui humorum vitio redundant, qui cute rariore sunt, substantiâque molliore & debiliore. Temperatis etiam interdum non parcit, vt si maior fuerit vis auræ pestilentis in agendo, quàm temperamenti in resistendo.

5 Vt in Cranone lib. 2. Epidem. Faciunt verò Austri maximas in aëre mutationes, cùm à calidiore loco, vt à meridie, flare incipiant, proptereaque sint calidi, & in humida loca perreptantes humidi fiant. Vnde tempestatis constitutio calida & humida exurgit putredini maximè obnoxia.

6 Pestis causa non ita ad cæleste defluuium referenda est, vt cælestium corporum virulentam aliquam expirationem esse existimemus (hoc enim impium esset cogitare) sed quòd suo motu & lumine aërem sic temperent, vt progenita de temperatura illa qualitas noxam mortalibus inferat. Huius autem temperaturæ ratio quia definiri nequit, cælo, velut occulta, accepta refertur.

Corruptus eadem lue nos inficit, ac deinceps publicè nos inspiratu & expiratu inficimur. Sed si accedit humorum corporis intemperies, & spiramentorum cutis raritas promptius subit lues in arterias, còrque prehendit. Astrologorum placita sunt, 7 Saturni coniunctione cum Marte pestem inferri.

7 Idcirco Saturnum & Martem maleficos esse, necnon

pestem inferre Genethiaci voluerunt, quòd vitæ nostræ in calido innato humido primigenio perfuso positæ, insidientur: cùm ille siccus, hic frigidus perhibeatur. Sed his commentis minimè credendum.

Porphyrus scriptum reliquit, 8 cometas orientes tabem pestemque mortalibus inferre, quibus occurrere non liceat. Sed Astrologi semel obseruato sydere legem statuunt. Porphyrus idem sequitur. Sed meminisse oportet, vt sua cuique elemento vis insit & perfectio, à cælo alterari. Verùm quia è cælo petuntur causæ nondum satis cognitæ, sed coniectura quadam capta, quam inuexit semel obblatus euentus. Et aliis saluber Oriens, aliis pestifer. Toti Italiæ, ac ferè Septentrioni, pestiferi Austri sunt, Aphricæ salutare. Quòdque apud nos Etesis faciunt, à media regione Aquilonum & Orientis afflantes, id Auster efficit Aphris. Tanta vis in eiusmodi Etesis, siquidem Græcis Medicis credimus, vt vim maiorem pestiferamque anni præcedentis omnino corrigant, si cuique regioni inspirant tempestiuè. 9 Febricula ferè leuis est, vt stent, nec decumbant ægri. Hinc etiam vulgus somnum prohibet, motum imperat, idque didicit longo vsu, quod confirmat ratio. Etenim lues intrò ad partes principes apperit. Reuellenda verò atque foras auocanda est: quod statu, motuq; melius fit, quàm quiete, cùm somno in ima corporis colligatur. Urina 10 sanis interdum persimilis, aliàs aquosa, biliosa, nigra, melancholia: dolor capitis multus & delirium à tetris vaporibus cerebrum petentibus, excrementa alui crassa, grauitè olentia, multum biliosa, spumosa: vomitiones biliosæ, nigra, inquietudo, nausea, o-

## DE PESTE

re ventriculi cordi consentiente, fastidium, car dialgia, sitis, lingua scabra, ardor parte interiori: hypochondrij contentio, calore naturali imbecilliore facto, respiratio magna, alta, dyspnœa, syncope, sudor fœtidus. Frigent extrema, conuulsio fit, mors, viribus à veneno exolutis. Accidunt autem modo hæc, modò illa potius, prout veneni vis cerebrum aut hepar videtur magis labefactasse.

8 Qui præsertim ad Orientem vergunt, indicia plurimæ materiæ in aëre vitiatæ exhibentes. Solent enim ad Meridiem & Septentrionem potius ferri extra solstitia, cùm intra solstitia & ad Orientem materia ipsorum à Sole celerius dissipetur. Quare ibi si consistant, maiorem esse materiam, quàm quæ resolui possit, significabunt.

9 Vehemens quidem est febris, sed iudicio tangentis levis.

10 Vel quia morbus non est in humoribus, vel superiores occupat thoracis partes, de quibus malè affectis non iudicatur ex vrina: vel, vt alij sentiunt, quia putredo non subest.

11 Si in superiore thoracis parte æstus consistat. In inferiore enim si sit, spiritus est demissior.

Signa futuræ pestilentia ex anno & aliis sunt, ignes in aëre volitantes, cometa vergens ad Orientem, Austrorum magna anni parte flatus, aliis orientibus, aliis occidentibus, aër turbidus, nebulosus. Vere pluuia rara, frigus, postea austrini flatus, vnde aër conturbatur, tum serenitas brevis sequitur, noctis frigus, vehemens calor interdum & ardor, variolæ, exanthemata, autumnalis æstus, ignes, inæqualitas caloris, frigoris, sereni & nubili cœli. Ranarum & reptilium, eorúmque, quæ ex putredine gignuntur, prouentus. Latibula refugiunt mures, talpæ, glires

pæ, glires & similia, quæ sub terra viuunt.

*Addita inter signa.*

Nulla interdum febris sensibilis: diastole minor, quàm systole: signa peculiarium humorum copioris sequitur color.

Diaria febris pestilentialis intra triginta horas interficit, sentiuntque vires paulatim exhalare, sæpèque neque 12 bubo, neque carbunculus apparet: sed totum venenum in corde hæret. Alia febris in quartum diem protrahitur. Omnia bona signa suspecta sunt. Cælum calidum, humidum, secundum ventos in Epid.

12 Vt cum debilior est natura, quæ aliqua ex parte sese nequeat exonerare.

*Præseruatio.*

**C**Orpus vacuum sit excrementis, non plethoricum. Obstructiones & adstrictiones declinentur, vt benè transpiret.

Cognoscenda causa est. Nam si cadauerum halitus aërem inficit, omninò procurandum, vt vel cremantur, vel sepeliantur: deinde frequenti rogo aër repurgetur. Quòd si virus exhalat è terra, vt ex antris & specubus, omninò præcludenda via est, atque intercipienda flamma. Sed & aquarum stagnantiũ residentiũque vapor declinari debet. Aëris verò pestifera conditio multò maximè, cùm is & turbidus & meridionalis est, aut maritimus, multo igni ea parte structo, qua venti importantur, deinde etiam compitatum domi & priuatim téperanda est. Constat experientia Medicorum inspiratũ halitum ignis, esse antidotum cõtra pestem & putredinem. Nota est historia Hippocratis. Cùm ex Aphricæ

## D E P E S T E

*Æthiopiæ*q; locis pestifer halitus per mediũ mare  
*Athenas* inueheretur, cõsultuit ignes incendi, atque  
 ita magna illa ciuitas lue vindicata est. Hoc idem  
*Empedocles* Græcis & *Acron* quidã consuluit. Pos-  
 sunt ignibus adhiberi i iuniperus, laurus, rosmari-  
 nus, myrrha, cinamomum, acorus, herbæ odoratæ,  
 lauendula, saluia, &c. Potest excitari aceto fumus, ex  
 vino & aqua rosarum, filice candenti, quem in ace-  
 to immerges, & subinde extingues. Ac priuatis ædi-  
 bus multò magis eadem fiât. Vestes quoq; , stragu-  
 la omnia, vel santali fumo, vel aqua rosarum, aut si-  
 milibus, quæ pòst dicentur, perfumari possunt. Ro-  
 sæ & similia, acetum, &c. spargantur solo. Optimũ  
 verò ac breuissimũ remedium secedere in salubre  
 cælum, tenere corpus benè mundum & vacuum  
 excrementis, haurire aërem *Aquilonium*, quia *A-*  
*quilo* ventorum saluberrimus est: atque fenestræ  
 huic apertæ sint. Victus sit mediocris. Neque enim  
 toleranda 2 fames & sitis, sed omnis incontinen-  
 tia vitæ fugienda est, alimento siccante ac refrige-  
 rante vsurpato, quòdque putredinem arceat. Itaque  
 vtédum & omphacio, & acetosa, granatorum suc-  
 co, limonum, citriorum, citrangulorum. Acetum,  
 cappares, passulæ, cichoriũ, endiuia, in summa quæ-  
 cunque vel acidula, vel subamara putredinem pro-  
 hibent. Quanquam in horum vsu ratio anni par-  
 tium temperamenti & aliorum ineunda est. Est e-  
 tiam cur vino optimo, cinamomo, moscho, aliisq;ue  
 calefacientibus aromatibus vtamur. Auib; , pisci-  
 bus saxatilibus, fructibus, cerasis, prunis, vua & ficu  
*Iunio* mense vti oportet. Hyeme passulis & ficu-  
 bus siccis, pomis aut piris odoratis, amygdalis. Sed

omnia æstate, aqua rosacea: hyeme, vino odorifero suffocari possunt.

1 Odorata istiusmodi spiritus reficiunt, aërem depurant, cor & cerebrum contra venenum roborant. Vfus commodus erit matutino tempore.

2 Cibandi ratio talis ineatur. Sit euchymus cibus, minimè excrementitius, vel putredini opportunus: vt oua sordilia, carnes auicularum. Vinum potui detur generosum quidem, sed dilutum aqua laudabili. Quæ acida sunt, quia putredinem mirificè arcent, maximè commendantur. Plenior hîc victus instituitur, quia viribus metuitur. Adde quod fames præterquam quod vires exoluit, humorum etiam malitiam exasperat, præsertim biliosis.

Exercitatio 3 domi sit pro consuetudine: alioqui mediocris, aut in vicinis hortis, cælo benè puro, atque vbi Sol non euerberat. Sit exercitij locus non suspectus, non decliuus, non vaporosus, in sublimè positus, quique ab Aquilone potiùs affecto, aut eo vento, qui loco sit salubris. Aliis enim Zephyrus, vt Italiæ: Aliis Subsolanus, vt nobis & Hyspaniæ salubrior est. Quin & qui pestifer nobis Auster est, multis partibus Aphricę salutaris est. Atque hinc salubres suos Etesias expectant. Vitentur colloquia cum suspectis, abigantur canes, catti, eiusmodique animalia. Exercitio verò corpus excrementis repurgatur, puròque spiritu vegetari potest. Venus rara, hylaris vita, & sine animi curis. Optimum verò ac tutissimum remedium commutare solum, & in salubre secedere.

3 Calorem enim natium auget, & commodè corpus euacuat. Rhazes itaque commemorat in magna quadam pestilentia peremptos fuisse omnes, præter venatores solos. At moderata esse debet exercitatio, ne ex ea concitatiores augeatur respiratio, quæ corruptum aërem proliciat.



## DE PESTE

Somnus & vigilia pro consuetudine mediocria. Atque imprimis reficcandum corpus, hoc est, declinanda plenitudo, & excremēta sæpè purgāda sunt. Itaq; vbi venæ tument, 4 vtile est aperta vena aliquid sanguinis detrahere. Excrementa quotidie repurganda, reddita aluo molliori exercitio. Ac singulis hebdomadibus 5 Ruffi pilulis vtendum est, quæ non vno modo à Græcis & Arabibus describūtur.

4 Vbi plethora non est, sanguinem ad præcautionem detrahere inutile est. At vbi plenitudo, mittetur quidem, sed parca quantitate, vt liceat larga, vitynte propter pestem necessitate.

5 Pilularum Ruffi hæc ferè descriptio est in Antidotariis. ℞. aloës ʒ. 2. myrrhæ & croci ana ʒ. 1. finguntur pilulæ cum vino aromatite. Crocus vires recreat: aloë immersos ventriculo humores educit: myrrha putredinem inhibet. Pregnantibus non exhibentur, quòd periculum sit internecionis fœtus ab amarore insigni. Non hæmorrhoidas patientibus, quia venarum oscula aperiunt.

℞. aloës lotæ in aqua endiuixæ, vel acetosæ ʒ. 2. myrrhæ, croci ana Gr. 15. cum vino al. fiant pillulæ.

6 Dosis ʒ. 1. aut ʒ. 2. Sumantur ante cibum aliquo tempore.

6 Antequam prehenderit pestis, minore quantitate hæ pilulæ dari debent, maiore verò, cùm iam inuasit.

℞. 7 terræ sigillatæ, boli armenæ ana ʒ. ʒ. ex succo cyperi fiant pil.

7 In huiusmodi terra & bolo armena, tantum virium reposuere veteres ad arcendam pestem, vt nemo vnquam sit visus pestilentia interiisse, qui his antè sit vsus.

℞. aloës lotæ ʒ. 4. boli armenæ ʒ. ʒ. croci. myr-

rhæ ana ʒ.β.

℥. aloës : croci ana ʒ.β. myrrhæ ʒ. 2. ex aceto  
fiant pil. Dosis erit ʒ. i.

Alioqui impera pilulas duas communes.

℥. aloës ʒ. i. myrrhæ, ammoniaci ana ʒ. i. aut  
ammoniaci æquum pondus cum aloë.

Bolus armena ad ʒ. i. in vino albo tenui & aqua  
buglossi, calendulæ, acetosæ, imperatur.

℥. aloës lotæ in aqua scabiosæ ʒ. 2. myrrhæ lotæ  
in aqua acetosæ, croci, mastiches ana drach. i. fiat  
massa. Meliores sunt, quæ aliquot iam diebus con-  
fectæ, quàm quæ recentes, quia meliùs compactæ,  
fermentatæque sunt.

Pompeius in sanctuario, victo Mythridate, hoc  
reperit, nullo veneno lædi, qui hac antidoto vtere-  
tur. 8 Nuces duæ, ficus totidem, rutæ folia. 2 o. salis  
granum: teruntur omnia, manè excepta deuoran-  
tur: aut conspersa vino manè ieiunus deuoret. Ex  
Plinio, Dioscoride, 9 Sereno. Aëtius alij tribuit,  
quàm Mythridati. Ficus diuidatur, nucleus nucis  
tritrus indatur, folia quinque ruthæ & granum sa-  
lis, torrefiant leuiter in igne, conspergantur vino,  
& ita deuorentur.

8 Galenus huius medicamenti meminit lib. 2. de fa-  
cultat. aliment. Sed cur tantas vires habeat, non alioqui ex-  
pressit. Vt enim caricæ pingues & nuces obstructa liberent,  
rutha putredini aduersetur, videtur tamen non vsque adeo  
efficax esse antidotus.

9 Sic enim ait Serenus.

*Be demum rutha folium, salis & breue granum,  
Iuglandisque duas, totidem cum corpore ficus,  
Hac oriente die pauco conspersa Lyæo  
Sumebat, metuens dederat qua pocula mater.*

## DE PESTE

Cucumeris siluestris radix in mortario teritur cū foliis tenerioribus semperuiui, apij, coriandri bene triti. Mel additur, & puluis cinamomi aut 9. gran. piperis. Omnia mixta stanneo vale seruabis. Utêris ieiunus castaneæ magnitudine ex vino tenui, albo, diluto aqua conuenienti. Poteris cum lue correptis versari, aut iam correptus statim sanesces.

Theriaca & mithrydatium nullis remediis cedūt. Datur bis in hebdomada 10 à 3. i. ad 3. i. ex liquore conuenienti. Quales sunt distillatæ aquæ, bugloss. borrag. melyssophilli, calendulæ, rosmarini, maioranæ, absynthij, violarum, rosarū, citrei mali, limonium, acetosæ, portulacæ, cichorij, hyperici, enulæ, raphani, aristolochiæ, gentianæ, laureolę, agrimonix, marrhubij, hyssopi scabiosæ, tormentillæ, capparum, citrullorum, scordij, verbenacæ, iuniperi, & similium. Nam & herbæ per se, aut earum maceratio, in vino, aceto, aut liquore conuenienti, qui pesti prodest, mirabiliter iuuant.

10 Iam correptis maiore quantitate datur, quia vi maiore, ut morbus depellatur, quàm ut præcaueatur, est opus.

Alij 11 caput egressuro domo præmanditur, vini odori modicū ad 3. 2. superbibitur, atque inde os colluitur, eodémq; excepto manib<sup>9</sup> facies abluitur.

11 Vnde allium theriaca rusticorum nominatur. Sed remedij id genus prophylactici Practicis veteribus non paucis improbat.

Vulgus enulæ radice in aceto priùs macerata, deinde linteolo conuoluta, sæpèque inspirata naribus rectè vitur.

Vrina propria alij vtuntur.

Stercoris columbini ꝑ. i. trita ex aqua buglossi.  
Syrupus de acetosa, acetositate citri, limonibus.

℥. cuprosæ albæ bene lotæ in succo limonum,  
& siccatae in eodem succo ꝑ. i. pul. tormentillæ, rad.  
dictamni albi, gentianæ, enulæ, herbę turcicæ, scordij  
ana ꝑ. ss. fiat pul. detur cum aqua scordij.

In oleo scorpionum magna vis est. Nam si quis  
arterias temporum, manuum, pedum inungat, cor-  
reptus præterea occiput, gulam, pectus & vicina bu-  
boni illinat, magnum auxilium sentit.

Fit oleum scorpionum ex scorpionibus in oleo  
ebullitis. Sed hoc melius. ℥. aristolochiæ, gentianæ,  
cyperi, corticum radicum capparum ana ꝑ. i. amyg-  
dalarum amararum lb. i. conquassata reliqua in  
oleo coquantur, & aqua, si vis, conuenienti, vel  
vulgari. In colatura x. viui scorpiones immergan-  
tur: contineatur vas in furno pistrinali, vnde sub-  
tractus panis, benè clausum: deinde loco salubri  
subiecto assere reponatur. Vsus est, vt inde arterias  
temporum, manuum inungas.

Tapso barbaro magna vis inest. Nam id anima-  
lium natura docuit contra venena posse. Mustella  
enim decertans cum serpente, si virus sensit, statim  
eam herbam quæritat & mandit, atque ita instau-  
rat pugnam. Et experimento vulgi certum est suc-  
cum ex ea herba expressum in vino tenui & odoro,  
non solum præseruare, sed liberare correptos.

Aqua è papauere rheade distillata maximè pro-  
batur rusticis.

℥. electarij lætificatis Galeni ꝑ. i. margaritarum  
splendidarum ꝑ. 4. ossis de corde cerui, coralli rub.  
ana ꝑ. ss. vnicornis Gra. 6. pul. pilularum commu-

## DE PESTE

nium  $\mathfrak{z}$ .i. Omnia dissoluantur in syrup. de limonibus & acetositate citri ana  $\mathfrak{z}$ . 6. aquarum scabiosæ, & absynthij ana  $\mathfrak{z}$ . 2. fiat potus. Pulvis per se cum bolo armena misceri potest, & in cochleari sumi cum vino tenui & odoro.

Coriandrum præparatum ieiunis, & à cibo.

Lac, à quo extractum est butyrum.

Mannæ granatæ, mell. ana  $\mathfrak{z}$ . 3. terebinthinæ.  $\mathfrak{z}$ . i.  $\beta$ . pulpæ granati acidī  $\mathfrak{lb}$ .  $\beta$ . cort. citri conditorum  $\mathfrak{z}$ . 3. aquæ scabiosæ, melyssoph. borrag. acetosæ ana  $\mathfrak{z}$ . 2. vini optimi  $\mathfrak{lb}$ .  $\beta$ . Per noctem distemperentur in liquoribus, postea distillantur in alembico.

$\mathcal{L}$ . supradicti distillati  $\mathfrak{z}$ . 4. transfundantur per manicam Hippocra. cum cinamomi  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . sacchari borraginati  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ .

Aristolochiæ rotundæ, baccarum lauri, gentianæ, myrrhæ ana  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . Omnia trita excipiantur melle. Dosis  $\mathfrak{z}$ . i.  $\beta$ . cum vino aut decocto berberis, passularum & similium.

12 Superstitiosum est, & è regibus Persarum sumptum. In hæmatite lapide insculpatur homo genibus flexis, cinctus serpente, ut dextra manu caput, sinistra, caudam teneat: tum in aure in annuli capsula subiiciatur serpentariæ herbæ folium: deinde lapis eadem capsula fideliter indatur.

12 Tale quippiam superstitiosum retulit Galen. de terra Lemnia, in qua Dianæ sacre sigillum esset impressum.

Oleum citriorum, seu ex eorum granis, laudatur: grana trita ex decocto berberorum & syrupo delimonibus.

$\mathcal{L}$ . boli armenæ  $\mathfrak{z}$ . i. vini  $\mathfrak{z}$ . 2. aquæ acetos.  $\mathfrak{z}$ . i. ante somnum & ieiuno.

℥. theriacæ veteris ʒ. i. include in cæpa, & coque cæpam in furno pistrinali: vbi cocta fuerit, calidam iniicies in vini granatorum aut berberis ʒ. 4. expressionem bibes. Eadem cæpa cum theriaca, succo tormentillæ iniicitur, & addita quarta parte syr. de limonibus propinatur herba turcica.

Ouum vtrinque perforatur, tota substantia vacuatur. In vacuam testam ʒ. 7. croci immittuntur. Traiecto per foramina baculo tenui ouum tectum igni assatur dum vehementer caleat testa: hæc cum croco ad summam tenuitatem teritur, tritis æquale pondus, aut ʒ. i. theriacæ adiicitur & ʒ. 2. granorum sinapi. Tota massa diuiditur in duas partes æquales, vtrâque partem in 7. 10. vel 11. pilulas formandam: si euomuerit, rursus dato alteras: si non euomuerit, saluus est. Sed post dabis.

℥. saluiæ, hyssopi, lauendulæ, foliorum quercus, ana M. i. bulliant in pinta vini ad consumptionem trium partium, vinum propinatur.

℥. mastiches ʒ. i. euphorbij ʒ. β. spicæ ʒ. i. fiat puluis, detur ex aqua gentianæ, scabiosæ, aut similis.

Aquarum endiuivæ, nenupharis, acetosæ ana ʒ. i. β. aceti ʒ. 2. theriacæ ʒ. i. vel ex aqua scordij eadem theriaca propinatur.

℥. corticum citri ʒ. β. ficus duas: scord. berberis ana P. i. fiat decoctio in aqua calendulæ ad ʒ. 3. expressioni adde theriacæ ʒ. i. boli armenæ ʒ. β.

℥. succi acetosæ depurati ʒ. 2. vini granatorum & berberis ana ʒ. i. theriacæ ʒ. 2. vel trypharæ Sarracenicæ tantundem.

Ac perpetuò meminisse oportet, distinguenda inter curandum calida à frigidis, vt rectè vtaris.

## DE PESTE

Frigida, sunt rosæ, viol. caphura, acetositas citri, vinum granatorum, berberorum, lac acetosum, acetum, nenupharis flores, aqua rosarum, acetosæ, &c. Succus limonum, citrangulorum, omphacium.

Calida, moschus, lignum aloës, cariophylli, &c.

*Trochisci è caphura.*

℞. tragacanthi albi, spodij electi, gummi arabici albissimi, seminis psylli ana ℥. β. sacchari candi, liquiritiæ mundæ, semin. cucurbitæ, citrulli, portulacæ ana ℥. i. penidiarum ℥. β. caphuræ ℥. i. succi citranguli, panis sacchari ana quant. sufficit, fiant trochisci. Dosis magnitudo lupini cum iulepo Alexandrino.

℞. sacchari rosati, triasantali, diatragacanthi frigidi an. ℥. i. fol. auri puri numero 5. margaritarū, hyacinthorum, ossis de corde cerui ana Gr. 16. fiat pul.

Boli armenæ ℥. i. ex vino tenui, oxycrato, aqua conueniente. Alij priùs abluunt: alij tritam conspergunt aqua conuenienti, siccant, & tertio ita terunt ac siccant.

℞. terræ sigillatæ ℥. 2. terantur, superaffundatur vinum tenue odoriferum: siccetur: secundo ac tertio ita fiat. Deinde adde baccarum lauri tritarum ℥. i. rad. ireos & tormentillæ ana ℥. 2. cinamomi ℥. β. croci Gra. 6. cum acetositate citri fiant trochisci ponderis ℥. i. Dentur cum succo conuenienti.

℞. boli armenæ, vt suprà descriptæ & præparate ℥. i. rad. tormentillæ, tunici, diptamni, santalorum rub. ana ℥. i. rasuræ eboris, spodij, corticum citri ana ℥. β. marg. splendidarum ℥. 2. fragmentorum rubini, granati, smaragdi, sapphyri, hyacinthi ana ℥. i. rasuræ cornu vnicornis ℥. β. fiat pul. Detur in

vino subtili diluto aqua acetosæ. Alioqui addatur sacchari albissimi in aqua rosarum, moschata, vel caphurata. Dissoluitur & siccatur. Dosis ad  $\mathfrak{z}$ . 4.

$\mathcal{L}$ . supradicti pul.  $\mathfrak{z}$ . 1. sacchari lb. 1. misce. Deinde.

$\mathcal{L}$ . succi acetosæ & pomorum odoriferorum ana  $\mathfrak{z}$ . 6. bulliant vsque ad consumptionem tertiæ partis semper despumando: dissoluto saccharo finge trochiscos ponderis  $\mathfrak{z}$ . 2.

Vel ad singulas libras sacchari pone  $\mathfrak{z}$ . 10. pulueris, & facias conditum.

$\mathcal{L}$ . setæ nouiter tinctæ lb. 1. immergatur per diem in aqu. rosar. acetosæ, & pomorum redolentium ana lb. 1. Deinde bulliat, donec aqua rubeat: in qua dissol. sacch. lb. 3. & cùm fuerit debitè coctum, adde pul.  $\mathfrak{z}$ . 3. si bolos facere volueris: vel si opiatam,  $\mathfrak{z}$ . 4.

Possunt quoque pul. syrup. aut conseruis misceri. Syrup. de granatis acetosis, dulcibus, limonibus, persicis, acetositate citri, de prunis, de succo acetosæ, de ribes, berberis, de succo cucurbitæ, de pomis odoriferis, rosar. violatus. Iulep. de bugloss. borrag. melyssophyllo, rosatus, viol. de aqua viol. borrag. scabiosæ, pimpinellæ, succo cydoniorum.

Conseruæ ex iisdem, & confectiones commodæ deaurantur pro diuitibus.

$\mathcal{L}$ . boli armenæ, vt priùs  $\mathfrak{z}$ . 1.  $\beta$ . cinamomi  $\mathfrak{z}$ . 1. rad. dictamni & tormentillæ ana  $\mathfrak{z}$ .  $\beta$ . radicis tunici, coriandrorum præparatorum ana  $\mathfrak{z}$ . 3. rhabarbari electi  $\mathfrak{z}$ . 2.  $\beta$ . zinziberis, terræ sigillatæ, corticum citri, ben albi & rub. corall. rubri, santalorum citrinorum, limaturæ eboris, margaritarū ana  $\mathfrak{z}$ . 2. carabe, macis ana  $\mathfrak{z}$ . 1. seminum acetosæ, endiuæ, portulacæ, spodij, ligni aloës, ossis de corde cerui ana  $\mathfrak{z}$ . 2.



## DE PESTE

setæ combustę ʒ. β. auri & argenti limatorum ana  
 ʒ. i. ambriæ Gr. 6. spicæ nardi Gr. 4. moschi Gr. i. vel  
 instar loci, moschi, caphuræ Gr. 6. Si addatur vni-  
 cornis ʒ. i. melius fuerit. Fiat puluis. Diuinus appel-  
 latur à Sarracenis.

℥. tormentillæ, diptamni, tunici an. ʒ. β. sem. citru-  
 li, boli armenæ an. ʒ. 2. ossis de corde cerui, coralli  
 albi & rub. trium fantalorum an. ʒ. β. rhabarbari ʒ.  
 i. β. spicę nardi. Gr. 4. caphuræ ʒ. i.

℥. cinamomi vnc. β. zedoariæ drach. 2. boli arme-  
 nę præparatę drach. 6. sem. acetosę & citri, corticis  
 citri ana drach. 3. rad. tunici, diptamni, tormentillæ,  
 limaturæ eboris ana drach. i. β. ossis de corde cerui  
 drach. i. fragmentorum smaragdi, rubini, granati &  
 sapphyri ana ʒ. i. fiat puluis qui incorporetur cum  
 conferuę acetosę & bugloss. an ʒ. 3. sacchari lb. i. β.  
 vel lb. 2.

### *Paruulis verminosis.*

℥. centonici in aceto fortissimo per diem infusi,  
 boli armenę in aqua absynthij infusę an. ʒ. i. rad.  
 diptamni, rasuræ cornu cerui adusti, seminis cauliũ  
 an. drach. 2. sem. citri, corticum citri, radice tormen-  
 tillæ, tunici, terre sigillatę, margaritarum splendida-  
 rum, coriandri præparati ana drach. 2. β. fragmento-  
 rum sapphyri, smaragdi, hyacynthi, granati an. drac.  
 i. corall. rub. ʒ. β. setę combustę, sem. plantaginis an.  
 ʒ. 2. ossis de corde cerui, rasuræ eboris an. drach. β.  
 vnicornis ʒ. i. ambriæ drach. i. fiat pul. detur stoma-  
 cho vacuo cum aqua portulacæ, vel vino lymphato  
 cum aqua acetosę vel portulacæ: lactantibus cum  
 modico lactis.

℥. sem. iuniperi drach. 2. β. cariophyllorum, ma-

cis, nucis moschatę, zinziberis. zedoarię ana drac. 2. vtriũque aristolochiæ, rad. gentianæ, tormentillæ, diptamni, tunici herbæ, rad. enulæ ana drach. 2. saluiæ, ruthæ, balsamitæ, pulegij ana drac. 1. baccarum lauri, doronici Romani, sem. acetosæ, sem. citri, cinamomi, macis, olibani, boli armenæ, terræ sigillatæ, spodij, ossis de corde cerui, rasuræ eboris, margaritarum, fragmentorũ saphyri, smaragdi, coralli rub. ligni aloës, santali rub. & moschatellini ana vnc. ʒ. conferuæ rosarum, bugloss. nenupharis, theriacæ ana ʒ. 1. panis sacchari lb. 3. fiat electarium cum aqua rosarum & scabiosæ.

℞. rad. tormentillæ recentis lb. 1. rad. enulæ ʒ. 4. radicis berb. betonicæ. & diptamni an. lb. ʒ. acetosæ cum seminibus lb. 2. vel acetosæ vnc. xx. seminis eiusdem ʒ. 4. buglossi & borraginis cum floribus ros. rub. siluestrium ana lb. 1. pimpinellæ & scabiosę an. lb. ʒ. succi limonum lb. 1. theriacę lb. ʒ. aquæ vitę ex optimo vino factę & sæpius distillatæ ʒ. 2. santali albi & rub. spodij, ben albi & rubri, margaritarum splendidarum ana vnc. 1. ʒ. ossis de corde cerui vnc. 1. rasurę eboris ʒ. ʒ. croci drach. 2. caphuræ vnc. 2. foliorum auri ʒ. ʒ. folia auri in porphyro vel marmore plurimũ agitabis cum modico mellis, vt omnino coniuncta sint, & repone in ampulla vitrea bene clausa cum aqua vitæ. Sic dimitte per dies 15. Item margaritas tritas repone in alia ampulla cum supradictis, libra succi limonum, bene obturetur per 15. dies. Radices optimo vino lauentur, terantur, deinde siccentur cum herbis & floribus loco bene mundo in vmbra. Reliqua omnia reponantur in vase vitreato, & superfundatur

*Aqua mirabilis ad pestẽ quæ describitur à Gainerio libello de fescleapite de bezoardicis.*

## DE PESTE

aqua vitæ, succus limonum &c. bene obturando, ne quid exhalet. Vas fouea tripedanea sepelies, locus sit humidus, calce viua instratus, cui infideat vas.

Deinde circundetur & cooperiatur vinaceis, vel fumo equino, aut vaccino omnino tegatur. Tum infundatur aqua, vt par sit humiditas loci. Illic per-  
mitte 12. dies. Sed sæpè, vt quarto quoque die, vinacea & finum commuta. Tota materia transpo-  
natur in alembicum vitreum bene sigillatum, ne quid expiret. Fiat distillatio lento igne, & sine fumo. Aqua rursus iniiciatur in relictum magna, & iterum distilletur, ac tertio sine facibus distilletur in balneo mariæ. Reponatur fideliter vase vitreo. Dosis cochleare vnum.

Gestata profunt, carbunculus, rubinus, granatus. Hic, etsi non in pretio sit, aliis generibus præferendus, sapphyrus, hyacinthus, agathus, &c.

℥. acetī albi ℥. 6. aquæ ros. & violarum an. ℥. i. β. caphuræ ℥. i. moschi Gr. i. β. caphura & moschus conterantur, cum spongia sæpè odorentur.

℥. ros. rub. lb. 3. viol. lb. i. acetī fortissimi lb. 2. caphuræ ℥. 3. moschi ℥. 2. conquassentur omnia simul, & ponantur in alembico vitreo, distillantur. Quod distillauerit iterum ingeratur in magma, & rursus distilletur. Loco rosarum & violarum, si recentes haberi non possunt, imperabis rosa. & violarum an. lb. i. aquarum earundem an. lb. β. Potest cortex citri adici, & moschus & caphura minore dosi tamen immitti, cum eadem calet. Distillata bene reponatur aqua, & inde facies abluatur, & spongia imbuta sæpè inspiretur. Poteris quoque addere ambræ, ligni aloës an. ℥. 2. aut solas aquas condite eius.

modi aromatibus, deinde commisce aceto albo.

Sed quia fortasse maculas faciei mulierum inferrent.

℥. lithargyri argenti ℥. β. optimè teratur, decoquatur in ℥. 2. aceti albi optimi vsque ad consumptionem medietatis, semper cum spata commiscendo. Deinde per filtrum distilletur, & in vase benè mundo reponatur.

*Deinde.*

℥. caphuræ 3. 3. aluminis rochæ, boracis ana 3. 6. moschi Gra. 4. terantur omnia: quibus adde olei tartari 3. 1. β. Et omnia pone in ℥. 2. aquæ rosarum. Bulliant ad consumptionem tertiæ partis, semper commiscendo, & postea per filtrum distilletur, & in ampulla bene clausa vsui reseruetur.

Pomum hyeme ita parabis ℥. styracis calamitæ, corticis citri ana 3. 2. ben albi & rub. menthæ siccæ, cariophyll. ligni aloës, cardamomi, valerianæ, calami aromatici, myrtillorum ana 3. 1. santalorum citrinorum, mastiches, caphuræ ana 3. 1. β. macis, nucis moschatæ, cinamomi, ambre ana 3. β. moschi 3. 1. 1. ladanii purissimi 3. 3. β. cum aqua melysophyll. fi. pomum.

Æstate verò sic. ℥. florum nenupharis, violarum, buglossi, ros. rub. santalorum rub. & citrinorum, spodij ana 3. 1. β. caphuræ 3. 3. corticis citri 3. 2. macis, nucis moschatæ, maioranæ, calendulæ, marubij, styracis calamitæ, cardamomi, mastichis, zedoariæ, ligni aloës, cubearum ana 3. β. ambre 3. 1. moschi 3. β. ladanii 3. 3. conquassentur cum aqua rosar. Postremò addatur ambra & moschus, fiat pomum perforatum.

## DE PESTE

℥. salis communis vsti, marmoris albi, pumicis, corallorum alborum ana ʒ. i. corticis citri ana ʒ. i. β. mastichis drach. i. moschi Gra. 4. fiat pul. subtilissimus.

Multa alia id genus remedia ad præseruationem faciunt, de quibus Practicos consulere potes.

## CVRATIO IAM COR- REPTORVM.

**V**idendum imprimis, an venenum cor appetat. Celer enim morbus est, & qui naturam inopinato obsessam perimit derepente.

Videndum etiam anne vitalis facultas deficiat. Initio ergo vtrunque præstandum est, tum iis quæ antidota sunt, tum motu, frictione & similibus, quæ foras euocant. Sed quia aliquantùm vigilia, motu, & frictione spirituum inanitio fit, habenda perpetuò vitæ ratio. Nam vt naturalis & animalis facultas integræ sunt, vitalis concidit. Initio igitur detur aliquot supradictorum antidotorum. Vel.

℥. rad. tormentillæ, betonicæ, dictamni, gentianæ, morsus diaboli, cum rad. & herba croci ana ʒ. i. fiat pul. Dosis ʒ. 2. cum vino aqua rosarum lymphato. Et vt sunt vires, distillatum cum vino granatorum, berberorum, aqua tormentillæ, &c. Expressiones, colatitia, alterata, vt dictum est. Tum de vacuatione cogitandum.

Phlebotomia, si omnia permittunt. Alioqui purgatio, vt in humoribus.

Hellebori ꝯ. i. pomo concluditur. Pomum conuoluitur stuppa, aqua rosarum priùs madefacta & expressa, & ita in cineribus coquitur. Abiicitur helleborus. Pomum cōspersum puluere aliquo salutarī datur fortioribus quidem: nam debilioribus secūdo pomo iterum coquitur. Secundum pomum datur. Iulep è vino granatorum, berberorū, aqua hordei cum saccharo, ex aquis intybi. Aqua saccacharata cum iulepo violat. aromatizato pul. supradictis.

Cibus è media materia, qui facilè coquatur.

Aër obiectus aut salutaris sæpè commutatus, vt cubile molle, &c. Somno abstineat, nisi vires dissolutæ videantur.

*Auicennæ familiare hoc erat ad pestem alexiterium.*

℞. aquæ rosarum ꝯ. 2. vini albi, aut clari, tenuis, odoriferi ꝯ. 1. boli armenæ tritæ subtilissimè ꝯ. 1. Si euomat, malum est. Sed abluatur os vino. 14 Deinde repetatur antidorus. Debet enim, vt etiam non reuomat, sæpiùs iterari. Quanquam qui retinent, ferè euadunt.

14 Vel. ℞. rasuræ cornu vnicornis gran. 6. syrupi de limonibus ꝯ. 8. aquar. oxalidis & scabiosæ ana ꝯ. i. 8. detur potio. Pauperibus mythridatij ʒ. ij. cum ꝯ. iij. aquæ oxalidis sufficient. Hæc subinde reperenda à purgationibus, aut iniectionibus, quia veneni frangendi, absumendi, fugandi & educendi, potior cura esse debet.

Clysteribus, balanis lenibus, 15 catharticis, quotidie alius lenienda.

15 Longiùs progressa pestis catharticis oppugnatur vehementioribus, etiamsi illa humores conturbent, & hoc nomine videantur omittenda: leuioribus enim non cedit. Verùm nefas est periclitatores Empiricos consecrari: quorum alij anti-

## DE PESTE

monium præparatum ad grana 4. vel 5. cum conferu. bugloss. rosarum, aut ouo sorbili exhibent : alij dacrydium ad gran. 6. 7. cum 3. i. theriacæ: vel pulueris mercurij calcinati 3. ℞. cum aqua cardui, aut conferua, vel opiata cardiaca. Hæc enim hypercathartica sunt, & naturæ insensibilissima. Itaque si promiscuè humores educere velis, sic præscriberis. ℞. cath. 3. 6. agar. trochiscati ʒ. 2. electar. diacarthami. 3. i. ℞. syrup. acetos. simplic. 3. ℞. theriaces ʒ. i. cum aqua lupuli, aut scabiosæ, vel vino albo, f. potio. Vel. ℞. diapruni solutiui & electar. de succo ros. ana 3. 2. syrup. de limonib. 3. ℞. trochisc. de caphura ʒ. i. cum aquis scabiosæ & cardui f. potio. Vel.

℞. cathol. senn. & rh. dupl. 3. 6. confect. hamech 3. 2. elect. diamargar. frigid. ʒ. 2. syrup. de scolopend. 3. ℞. cum aquis buglossi & borraginis f. potio.

16 Epithemata cordi ex aqua rosarum, violarú, bugloss. &c. cum aceto, vino granatorum, caphura, fantalis, &c. & modico vini.

16 Hæc epithemata tum cordi, tum hepati admouentur. ℞. aquar. bugloss. scabios. card. bened. ana 3. 4. aceti rosacei 3. 3. electar. de gemmis 3. ℞. caphuræ, ossis de corde cerui ana ʒ. i. theriaces veteris & mythridatij ana 3. i. croci gran. 4. Miscantur omnia pro fomento cordis tepido, cum spongia, vel lintecolo, vel panno scarlatæ. Item. ℞. aquarum cichorij. oxalid. & rosar. ana 3. 4. vini granat. 3. 3. aceti rosacei 3. i. puluer. corall. rub. & santal. omnium ana 3. ℞. Misc. pro epithemate hepatis. Non sunt frigida imponenda, non quæ recipiant adstringentia multum, quia hic repellere noxium est. Cæterum ad roborandas recreandasque vires conferent electar. vel opiata, ex diamargarito, diarhodo, aromatic. ros. conferua bugloss. cichorij & simil.

## DE BVBONE

Febri pestilenri aliàs superuenit bubo, vel etiam eam antecedit, aliàs succedit eidem. Ante febrem bubonem enasci optabilius est, quia naturæ valentis significationem affert.

Constat experimento phlebotomiam nocere iam eunte bubone, & vtendum attrahentibus, cucurbitulis, cauteriis, potu bezoardico, frequēti quidem, si reuomant. Iteretur tertio.

Phelebotomia nisi quid, dissuadeat, à vena cephalica, si sub auribus sit bubo, vel extrema manu, si sub mento; aliàs ab eadem: deinde à venis linguae fiet. Si sub alis, à media: si in inguinibus, à saphena, sciatica extremorum pedum secundum rectitudinem. Ita & cucurbitulæ. A venæ sectione vitetur somnus, ne venenum intrò rapiatur.

*Bezoardica.*

Laudatur plurimùm theriacæ 3.1. Cæpa cauata concoquitur, & apponitur loco.

Alij ita coctam cæpam aceto immergunt. Alij vini granatorum, & syrup. de acetositate citri ana 3.1. 3. atque ita succum exprimunt: cùmque 3.2. aquæ tormentillæ, vel succo propinant: materiam emplastri modo buboni apponunt.

℥. Valerianę lb. 3. rad. ebuli. 3. 3. lybistici cum rad. 3. 1. Bulliant in aqua & oleo chamemel. ana quantum sufficit. Deinde pistentur cum dicto oleo, & superponantur, vel addatur radix diptamni.

Diachyl. 3.2. ammoniaci, galbani ana 3. 3. cum oleo Scorpionum incorporentur.

Vtendum quoque sanguisugis, cucurbitulis cum scarificatione, &c. Alij omninò circuncidunt, & extrahunt.

Cauteria, si vires valent. Tenaculis etiam candentibus extrahunt.

Calcis viuæ lb. 2. cineris purgati & cribrati, aluminis rochæ ana lb. 3. de quibus fiat lixiuium. Sed



## DE PESTE

ita vt materia induretur, quantitate paruæ auellane  
vnguento alicui misceatur.

Catelli, 17 gallus, &c. Pulmones animalium.

17 Vt si viua hæc animalia per medium dissecentur, & calidè applicentur. Alij panem è cibano calidum admouent, aut denique tale aliquid aliud, quod cutis corporis spiracula relaxando fuliginem, aut virus educat.

Scabiosa teritur. Tribus horis retenta carbonem curat. *Lyfimachia* similiter.

Cum oleo de *Scorpionibus* anagallis malaxetur: addatur aliquid myrrhæ aut veteris theriacæ. Alioqui maturandum apostema. Maturatum fagitta aperiendum, vel theriaca veteri, qua parte acuitur, & mollius est apostema. Siquidem hinc via sit puri, fiat apertio ad modum folij myrthi, vel oliuæ. Caueantur venæ, arteriæ, nerui. Secta parte si dolor oriatur, lana in oui albumine intincta ponatur. Sic per diem maneat. Si dolor contingat, deterge prius, & intinge in oui liquore, & modico olei rosacei.

Eschara tollatur, modico butyro, oui vitello, farina triticea mixtis in vncia olei rosacei, & vitellus oui simul agitetur.

### *Carbunculus.*

Carbunculus à melancholico sanguine est, velut clauus quidam paruus, qui malignior factus pustulas quasi ab igne vrendas, escharam, ardorem, dolorem intolerabilem facit, rubens, viridis, niger. Parui, oblongi deteriores, vicinia liuet, ardet in partibus carnosiss & vicinis nobilium.

Bezoardica. Emmittantur fœces ventris, mittatur sanguis etiam ad lipothymiam, habita semper ra-

tione virium, &c. Scarifica punctim: emplastrum è pane medio malaxatur cum succo plantaginis, adhibetur, vt & cætera, quę discutiunt modicè & refrigerât. Vel ex plantagine, lentibus, pane cibario coctis in aqua. Granata acida aceto cocta ad putrilaginem, & linteolo extensa, initio ac statu.

18 Liliorum radix recens emplastri modo: deinde superpone folia caulium, betę, &c.

18 Hoc Galeni emplastrum est 14. Meth. Non vsque adeò probatur: quia metus est ne vi adstrictoria materiam venenatam intrò regerat. Attamen si carbo parum caleat, parum doleat, parum rubeat, apponetur.

Bonus armentorum fimus, siccus ex aqua subactus.

Quidam practici maturant. Galen. prohibet vti pus mouentibus, quia non maturant, sed putrefaciunt.

Scabiosa, cauda equina, Sapphyrus circumagitur carbunculo, deinde retinetur è directo. Albertus Magnus multos carbones vidit vnius sapphyri gestatione curatos. Tapsus barbatus, Theriaca, Mythridentiũ. Sed remedia celeriter exarescunt. Subinde itaque commutanda.

Sanguifugę, gallinę.

Defensiuæ circa locum. ℞. ol. ros. ℥. 3. aceti ros. ℥. 1. boli armenæ quantum sufficit ad inspissandum.

℞. vnguenti populei, olei rosati & myrryllorum ana ℥. 2. vini granatorum ℥. 1. s. boli armenę, terrę sigillatę ana quod sufficit.

Possunt emplastra malaxari cum succo plantaginis.

Cotula fœtida trita circumponitur.

## DE PESTE

Supra verò sterco humanum calidum, vel vitellus oui recens agitetur cum sale benè trito.

Nasturtium vel vrtica cum sale teratur, & malaxetur cum ol. liliaceo. Allium tritum per se, vel cum pipere, & auellandarum nucleo, detracta pelle.

Terebinthina cum nitro, carne passularum, cum sale vel stercore passeris, columbarum.

Mel & ol. cum sale trito cocta,

Cor turturis recenter detractum & deuoratum singulare remedium. Fodus ante scarificationem, & alia. Chamæmeli ℥. 3. spicæ Celticæ ℥. 2. maioranæ ℥. 2. bulliant in aqua, cum spongia fiat fodus. Deinde ventosæ affigantur cum multo igne. Fiat idem fodus, tum scarifica punctim, & cucurbitula apponatur, vbi res vrget.

FINIS LIBELLI DE PESTE.



















